

0.0.1 *Percus* BONELLI 1810

1. Elitre con un solco presso l'ultimo quarto dell'8^a stria 2.
- Elitre senza solco presso l'ultimo quarto dell'8^a stria 8.
2. Tarsi più o meno slanciati 3.
- Tarsi molto corti e larghi. Elitre con fini strie di punti 6.
3. Capo molto grande. Protorace proporzionatamente lungo, nel terzo anteriore dolcemente arrotondato. Elitre allungate, parallele: le strie sono ben evidenti e finemente punteggiate, alle volte appena visibilmente; le interstrie leggermente rilevate, la 3^a, 5^a e 7^a più fortemente che le altre, la 5^a si riunisce all'angolo omerale con la 7^a. In alcuni esemplari le interstrie sono pressochè egualmente elevate L. 26–32 mm. Appennino Tosco-Emiliano *passerinii* (DEJEAN 1828)
- Capo in proporzione più piccolo. Protorace più corto, nel terzo anteriore più fortemente arrotondato. Elitre oblunghe od ovali. L. 16–25 mm 4.
4. Le impressioni basali longitudinali del protorace non raggiungono la metà del disco 5.
- Le impressioni basali longitudinali del protorace raggiungono la metà del disco o la superano. — Gola a ciascun lato, presso la metà, con un piccolo tubercolo. Settima interstria più elevata che le altre; la 3^a, 5^a ed 8^a più fortemente elevate che la 1^a, 2^a, 4^a e 6^a; capo e torace nero lucido, elitre nere opache, talora di un castano scuro. L. 17–24 mm. Italia Centrale e Merid.le *bilineatus* (DEJEAN 1828)
5. Elitre oblunghe, dolcemente arrotondate ai lati, debolmente convesse, senza dente omerale. Gola senza piccoli tubercoli. L. 19–23 mm. Alpi Marittime, Alpi Liguri *villai* KRAATZ 1858
- Elitre molto più corte, ai lati più fortemente arrotondate, più ovali, più convesse, con dente omerale più o meno evidente. Gola a ciascun lato, presso la metà, con un piccolo tubercolo. L. 16–22 mm. Sicilia *lineatus* SOLIER 1835
6. Corpo non lucidissimo, non subcilindrico 7.
- Corpo lucidissimo, subcilindrico. — Punti dell'8^a stria allungati, assai meno decisi di quelli delle altre strie. L. 20–22 mm. Italia Centrale *andreinii* MAINARDI 1914
7. Punti dell'8^a stria delle elitre assai più grossi di quelli delle altre; 7^a interstria rilevata in costa solo verso gli angoli omerali; 8^a interstria un po' rilevata. L. 24–27 mm. Toscana, Isola d'Elba *paykullii* (P. ROSSI 1792)

- Punti dell'8^a stria fini quanto quelli delle altre; 7^a interstria rilevata in costa verso gli angoli omerali; 8^a non rilevata. L. 20–23 mm.
Italia Centrale ***dejeanii*** (DEJEAN 1831)

- 8. Specie convesse, con base del pronoto bombata tra le fossette basali e gli angoli posteriori. La doccia laterale delle elitre scompare molto prima dell'apice. Rigonfiamento delle guance con solchi più o meno evidenti, talvolta quasi liscio 9.

- Specie depressa, con base del pronoto spianata tra le fossette basali e gli angoli posteriori. La doccia laterale delle elitre si prolunga quasi fino all'apice. Rigonfiamento delle guance sempre liscio. L. 16–22 mm. Sardegna Centro-orientale ***cylindricus*** CHAUDOIR 1868

- 9. Elitre più lunghe di capo e protorace presi insieme, e regolarmente arrotondate all'apice 10.

- Elitre più brevi, lunghe circa quanto capo e protorace presi insieme. Estremità delle elitre formante un seno triangolare. Elitre con linee longitudinali ondulate, che le fanno sembrare leggermente reticolate; lungo il bordo esterno si osserva una visibile serie di punti; 7^a interstria rilevata in costa solo verso gli angoli omerali; tubercolo omerale distinto. L. 22–33 mm.
Sardegna NE ***grandicollis*** (AUDINET-SERVILLE 1821)

- 10. Corpo stretto, elitre quasi parallele, leggermente convesse, talora lisce, talora con linee ondulate. Guance con solchi più o meno evidenti. L. 19–23 mm. Sardegna ***strictus*** (DEJEAN 1828)
f. typ. — Guance con solchi deboli o quasi assenti. Protorace quasi quadrato, posteriormente poco ristretto, margini laterali lisci o poco crenulati. Sardegna NE.
ssp. ***oberleitneri*** (DEJEAN 1831) — Guance con solchi evidenti, pronoto più ristretto alla base. Sardegna Centro- e Sud-Occidentale.
ssp. ***ellipticus*** (PORTA 1901) — Guance con solchi evidenti, elitre notevolmente striate, brevi, più o meno convesse. Sardegna Centro- e Sud-Orientale.
ssp. ***folchinii*** CAPRA 1928 — Scultura delle elitre consistente in pieghe o rugosità trasversali, irregolari, ondulate, più o meno elevate. Sardegna NO, Is. Asinara.

- Corpo più largo. Guance con solchi sempre ben evidenti. Elitre posteriormente arrotondate, allargate, convesse, ora evidentemente striate, ora mediocrementemente, ora lisce. L. 22–32 mm (= *lacertosus* DEJEAN 1828). Sicilia ***corrugatus*** (BILLBERG 1815)