

15. *Lesteva omissa* Rey, 1880

ssp. *omissa* Rey, 1880

Lesteva omissa Rey, 1880: 71; Lohse, 1955a: 510; Porta, 1959: 50

ssp. *carinthiaca* Lohse, 1955

Lesteva fontinalis Luze, 1903b: 195 (p.p.); Porta, 1926: 29 (nec Kiesenwetter)

Lesteva carinthiaca Lohse, 1955a: 508; Lohse, 1955b: 55; Porta, 1959: 50; Horion, 1963: 128; Lohse, 1964: 59

Lesteva Peezi Scheerpeltz, 1957: 478

Lesteva omissa carinthiaca Zanetti, 1986: 96

LOCUS TYPICUS: ssp. *omissa*: Corsica

ssp. *carinthiaca*: Reichenhall/Thumsee (Carinzia)

DESCRIZIONE. Corpo nero di pece o bruno, con le elitre un po' più chiare; zampe giallastre, spesso con l'apice dei femori e le tibie oscurate; antenne da giallo-bruno a bruno, spesso con gli ultimi articoli un po' più chiari.

Capo con occhi grandi e convessi, un po' variabili nelle dimensioni, comunque più lunghi delle tempie. Superficie del capo poco lucida, con punteggiatura fine e densa. Pronoto piuttosto piccolo e stretto in rapporto alle elitre, appena più largo che lungo, con punteggiatura fine e densa, il diametro dei singoli punti è un po' minore di quello di un ommatidio. Elitre ampie e poco convesse, allargate caudalmente, lunghe un po' più del doppio del pronoto, finemente punteggiate. Antenne molto lunghe e lineari, il 7° articolo lungo tre volte la larghezza (fig. 94g). Primo articolo dei tarsi posteriori più lungo dell'ultimo ed anche del secondo e terzo presi assieme. mm 3,7-4,6.

Edeago: figg. 92a, b.

Si distingue dall'affinissima *L. hanseni* soprattutto per la forma dell'edeago, che presenta il lobo mediano appiattito nella parte prossimale e convesso al centro nella parte distale, e i parameri ben diversi. I caratteri esterni sono estremamente poco evidenti e si limitano in pratica alla superficie del capo in genere un po' più lucida. *L. fontinalis* è pure molto simile, ma si differenzia nettamente per il lobo mediano dell'edeago carenato nel mezzo (fig. 90e).

Specie politipica.

CHIAVE DELLE SOTTOSPECIE

1. Punteggiatura elitrale più spaziata, aspetto più lucido. ssp. *omissa* Rey
- Punteggiatura elitrale più fitta, aspetto più opaco. ssp. *carinthiaca* Lohse

KEY TO SUBSPECIES

1. Elytral puncturation sparse, body more shining. ssp. *omissa* Rey
- Elytral puncturation denser, body duller. ssp. *carinthiaca* Lohse

NOTIZIE ECOLOGICHE. Piani collinare e montano, non rara. Ripicola

lungo sorgenti, torrenti e ruscelli, soprattutto sotto pietre o tra le ghiaie grossolane, più raramente nei muschi. Adulti in primavera-estate.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Alpi, Appennini, Sicilia, Sardegna, Corsica.

Distribuzione in Italia: tutta Italia comprese le isole.

ssp. *omissa*: Sardegna, Corsica, *Isola d'Elba, *M. Amiata.

ssp. *carinthiaca*: tutta la catena alpina, dal Friuli alla Liguria. Nel-

4. *Lesteva corsica* Perris, 1869

Lesteva corsica Perris, 1869: 8; Fauvel, 1872: 103; Rey, 1880: 86; Luze, 1903b: 186; Porta, 1926: 29; Portevin, 1929: 437

LOCUS TYPICUS: Monte Rotondo (Corsica)

DESCRIZIONE. Interamente bruna o nera, zampe giallastre o giallo-brune, con femori e base delle tibie più scuri; antenne giallo-bruno o bruno a base ed apice più chiari.

Occhi molto grandi e convessi, impressioni interoculari profonde ed impressione tra fronte e clipeo netta e profonda. Punteggiatura del capo poco densa e forte su fondo lucido. Pronoto appena trasversale, largo 1,2 volte la lunghezza, lucido, con punteggiatura simile a quella del capo. Elitre ampie, lunghe il doppio del pronoto, densamente punteggiate, i punti un po' confluenti. Tarsi posteriori lunghi la metà della tibia. mm 3,2-3,5.

Edeago: figg. 88n, o.

Si distingue da *L. sicula* e *L. foveolata* per le dimensioni un po' minori, l'aspetto più stretto ed allungato, il pronoto proporzionalmente più piccolo, molto lucido, le elitre proporzionalmente più lunghe; la punteggiatura del pronoto è più sparsa che in *L. foveolata* e meno forte che in *L. sicula*: in quest'ultima, inoltre, il capo appare meno profondamente inciso dalle impressioni interoculari. Una determinazione sicura, in mancanza di materiale di confronto, richiede l'esame dell'edeago.

NOTIZIE ECOLOGICHE. Piani collinare e montano, localmente abbondante in Corsica e Sardegna, rara sul continente. In Corsica raccolta in muschi di ruscello (teste Sette, i.l.). Estate.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Specie endemica italiana.

Distribuzione in Italia: la conosco delle seguenti località: (Cors.): M. Rotondo, *Vizzavona, *Haute Asco; Sard.: *Banari, *Laconi, *M. Limbara, *M. Gennargentu. Mi è nota inoltre dell'*Isola di Capraia e dell'*Isola d'Elba. Esemplari ♀♀ di due sole località continentali (Abr.M.: *Parco Nazionale Rif. d. Liscia; Cal.: *Aspromonte (teste Lohse, i.l.)) potrebbero appartenere a questa specie, cui corrispondono nei caratteri esterni, o all'affine *L. foveolata*.