



Kalogria Dépt Achaia
03 au 15/06/2017
Péloponnèse GRECE

- 298 MELOLONTHA BORYI Br. — Fusca, subtus villo albo lepide maculata; pectore rufo, semihirto; abdomine albo-villoso; clypeo subquadrato, antice subemarginato; marginibus elevatis, angulis subproductis; elytris ovato-subparallelis, interstitiis macularum pilis albis conspersis. — Long. 33 millim., lat. 16. — (Voyez notre Pl. XXXVIII, fig. 9.)

DESCR. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec le *M. Fullo*, mais un examen attentif permet de l'en distinguer. Elle est ordinairement plus petite et toujours plus étroite dans toutes ses parties; le chaperon est plus long, moins large, échancré et relevé vers ses angles, qui sont carrés, tandis que dans le *Fullo* le chaperon est court, large, nullement échancré, mais arrondi en avant et à ses angles. Le corselet est également plus étroit et plus long; les élytres, étroites et presque parallèles, sont au contraire ovales dans le *Fullo* et plus fortement bordées. Sur la tête et le corselet, les bandes et touffes de poils sont plus fournies, et les élytres, au lieu d'être nues dans les intervalles des taches irrégulières qui les ornent, sont parsemées de poils isolés blanchâtres qui donnent à l'insecte un aspect soyeux.

Hab. Nous avons découvert cette belle espèce en Juillet sur les arbrisseaux au pourtour des moulins que font aller les magnifiques sources de la base de Scala, près de l'Eurotas, à une lieue de la mer et dans la basse Laconie. Nous ne l'avons guère retrouvée plus tard et jamais plus tôt, ce qui prouve qu'elle ne se montre que durant peu de temps.