

*Pyrgus serratalae* (Rambur, 1839) SIE

M. Cucco 1150-1500 m, 3. VI. 2000, 4♂♂.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata in tutte le regioni alpine e, quasi esclusivamente, sui massicci più elevati dell'Appennino Centrale (Verity, 1940; Teobaldelli, 1976, 1978; Prota *et al.*, 1978; Zahm, 1994; Balletto e Cassulo, 1995).

OSSERVAZIONI. Si tratta della prima segnalazione di *P. serratalae* in Umbria. È interessante che questa presenza sia stata riscontrata al di fuori dei Monti Sibillini.

*Pyrgus onopordi* (Rambur, 1839) ESW 1

S. Anatolia di Narco 1100 m, 15. VI. 2001, 1♂; idem, 22. VIII. 2001, 1♂.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata in quasi tutte le regioni dell'Italia continentale.

*Pyrgus centralitaliae* (Verity, 1920) APP

M. Cucco 1150-1566 m, 19. VI. 1993, 1♀; Monti Sibillini: M. Patino 1150-1450 m, 27. VI. 1989, 2♂♂; M. Subasio 1100-1270 m, 9. VII. 1993, 1♂; idem, 1100 m, 2. VII. 1997, 1♂; idem, 11. VII. 1997, 1♂.

DISTRIBUZIONE. Specie nota su una limitata area dell'Appennino Romano (Bertaccini *et al.*, 1980), quasi esclusivamente sui massicci più elevati dell'Appennino Centrale e sul Pollino (Wheeler, 1909; Verity, 1940; de Jong, 1972; Teobaldelli, 1976, 1978, 1993; Balletto *et al.*, 1977; Prota *et al.*, 1978; Renner, 1991; Zahm, 1994; Balletto e Cassulo, 1995).

OSSERVAZIONI. I reperti in possesso dell'autore confermano la presenza di *P. centralitaliae* in Umbria, al di fuori dei Monti Sibillini (dove peraltro non erano noti esemplari raccolti sul territorio umbro). Tuttavia, i dati che esistevano in precedenza lasciavano qualche dubbio: infatti, i due esemplari citati da Wheeler (1909), a causa delle loro date di cattura (25. IX. 1907; 26. VI. 1909) inducono a pensare che potesse trattarsi di una specie bivoltina del gruppo di *P. alveus* Hübner (*sensu* de Jong, 1972 e Renner, 1991) (probabilmente *Pyrgus armoricanus* Oberthür, 1910).

*Pyrgus piceus* (Verity, 1920) APC

M. Coscerno 1300-1685 m, 17. VII. 1999, 1♂; M. Subasio 1000 m, 6. VIII. 1996, 1♂.

DISTRIBUZIONE. Specie nota sui rilievi dell'Appennino Centrale (Verity, 1940; de Jong, 1972; Balletto *et al.*, 1977; Teobaldelli, 1976; Prota *et al.*, 1978; Renner, 1991; Zahm, 1994; Balletto e Cassulo, 1995); esiste anche un dato, relativo ad una ♀, della Penisola Sorrentina (de Jong, 1972).

OSSERVAZIONI. Si tratta della prima segnalazione di *P. piceus* in Umbria.

*Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910) WPA

M. Acuto 900 m, 15. VI. 1986, 1♂; M. Pennino 1200 m, 14. VIII. 2000, 1♂; M. Subasio 1000 m, 6. VI. 1993, 1♂; idem, 6. VIII. 1996, 1♂; S. Anatolia di Narco 1100 m, 15. VI. 2001, 1♂; idem, 22. VIII. 2001, 4♂♂.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata in quasi tutte le regioni dell'Italia continentale.

*Heteropterus morphheus* (Pallas, 1771) ASE

Gubbio 400 m, 22. VI. 1997, 2♂♂; M. Subasio 1100 m, 16. VI. 1993, 1♂; idem, 900 m, 11. VII. 1997, 1♂, 1♀; Perugia 450 m, 24. VI. 1989, 1♂.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata nelle regioni centro-settentrionali fino all'Abruzzo (Verity, 1940; Bassi, 1965; Prota *et al.*, 1978; Bertaccini *et al.*, 1980; Balletto *et al.*, 1982; Casini, 1983, 1990; Marini e Trentini, 1986; Teobaldelli, 1993; Balletto e Cassulo, 1995; Nakamura, 2001) ed in Campania (Volpe e Palmieri, 2001).

OSSERVAZIONI. Balletto *et al.* (1982) e Balletto e Kudrna (1985) considerano *H. morphheus* specie legata alle formazioni dominate da *Molinia caerulea* (L.) Moench e, secondariamente, alla vegetazione ripariale. Le osservazioni effettuate dall'autore in Umbria, hanno in qualche caso evidenziato la presenza della specie ai margini delle formazioni erbacee della classe *Festuco-Brometalia* (molto più frequentemente tra la vegetazione ripariale).

*Thymelicus lineolus* (Ochsenheimer, 1808) PAL (OLA)

Monti Sibillini: Pian Grande 1300 m, 23. VII. 1983, 1♂.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata, tranne in Sardegna, in tutta Italia.

*Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) (= *flava* Brunnich, 1763; *thumus* Hufnagel, 1766; *stylestris* auct.) EUR 1,2

Gubbio 400 m, 22. VI. 1997, 1♂; Monti Sibillini: Pian Grande 1300 m, 29. VI. 1987, 5♂♂, 1♀; M. Subasio 1000 m, 11. VII. 1997, 5♂♂, 2♀.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata, tranne in Sardegna, pressoché in tutta Italia.

OSSERVAZIONI. Si tratta della prima segnalazione di *T. sylvestris* in Umbria.

*Thymelicus acteon* (von Rottemburg, 1775) MES mac

Monti Sibillini: Pian Grande 1300 m, 23. VII. 1985, 1♂; Perugia 450 m, 10. VI. 1986, 2♂♂.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata, tranne in Sardegna, in tutta Italia.

*Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) OLA

S. Anatolia di Narco 1100 m, 22. VIII. 2001, 1♂, 1♀.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata, tranne in Sardegna, pressoché in tutta Italia.

*Ochlodes venustus* (Bremer & Grey, 1857) (= *syllanus* Esper, 1779) ASE

Magione 240 m, 19. IV. 1997, 2♂♂; M. Subasio 1100 m, 26. VII. 1996, 2♀.

DISTRIBUZIONE. Specie segnalata, tranne in Sardegna, in tutta Italia.

*Gegenes nostradamus* (Fabricius, 1793) INM

Assisi 300 m, 26. VIII. 2001, 1♂.

DISTRIBUZIONE. Specie che, seppure con qualche lacuna, in Italia è segnalata sui litorali e, occasionalmente all'interno, a partire dalla Toscana e