



<http://www.biodiversitylibrary.org>

Annales de la Société entomologique de France.

Paris :La Société,

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/8188>

t.2 (1833): <http://www.biodiversitylibrary.org/item/100631>

Page(s): Title Page, Page 495, Page 496, Page 497

Contributed by: Harvard University, MCZ, Ernst Mayr Library

Sponsored by: Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Generated 5 January 2011 9:15 AM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/005338800100631>

This page intentionally left blank.

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ
ENTOMOLOGIQUE
DE FRANCE.

TOME SECOND.

Natura maximè miranda in minimis.



PARIS.
MÉQUIGNON-MARVIS, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE DU JARDINET, N^o 13.

—
1833.

NOVA

**SPECIES EUROPÆA SECTIONIS TRICHIDUM, A I. G. HELFER
(PRAGENSIS).**

(Séance du 4 septembre 1833.)

GEN. *Gnorimus*. LE PEL. et SERVILLE.

Gnorimus Decempunctatus, MICH.

Diagnosis.

Pl. 17. B.

Niger, elytris supra sericeis thoracis margine laterali, punctis duobus versus scutellum impressis, punctis quinque in quavis elytra, segmentis analibus ad latera abdomineque fascia lata squamis albidis tecta.

VARIET. Elytris flavo-lateritiis.

Insectum *Trichio* 5-punctato affine, sed jam primo intuitu sufficienter distinguendum.

Descriptio comparativa.

Trichius, FAB.

Gnorimus, LEP. et SERV.

8- punctatus, FAB.

II.

Trichius, FAB.

Gnorimus, LEP. et SERV.

10-punctatus, MICH.

37

Thorax.

Punctatus puncto utrinque ad basin. E squamis minutis albidis conformato.

Punctatus, lacunis quatuor constantibus impressus, quorum duo in medio versus marginem exteriorem, duo majora ad latera scutelli. Illa sic quoque margo lateralis sat lata, ast inequaliter squamulis albidis tecta.

Scutellum.

Glabrum punctis paucis ad basin impressum.

Punctis concinnis fere totum impressum.

Elytra.

Rugose punctata glabra punctis duobus, uno externo inferiore, altero interno superiore, squamulis albidis tecta.

Irregulariter obsolete punctata, versus apicem rugosa, striis duabus elevatis humerali media tertia, sericea, punctis 5-albidis, e squamulis formatis cum margine exteriore triangulum formantibus ornata.

VAR. Elytris flavo-lateritiis margine toto suturaque fuscis.

Segmenta abdominalia ad latera.

Penultimum et ultimum squamulis albidis, nonnunquam deficientibus puncta formantibus obteria.

Ultima quinque constanter et sat magni squamulis albidis maculam formantibus ornata.

Segmentum ultimum abdominale.

Puncto è squamulis formato nonnunquam interrupto, sæpius penitus deficiente.

Fascia abdominali late magnam partim abdominis tegente (ano nigro) maculisque aliquot iili nonnunquam adhærentibus.

Tarsi.

In comparatione multa gravitiores magnitudo et forma insecti penitus illa 8-punctati, qui invenitur in Italia et Gallia, quæ individua semper minora sunt illis quæ in Germania et Suecia reperiuntur.

Varietatem elytris flavo'lateritiis eadem quantitate ♂ et ♀ inveni. Nequaquam illa varietas forse insectum nuper exclusum habendum. Vidi nempe individua nondum conformata, ubi elytra ad medium elaborata fuerunt, fueruntque jam nigra.

Invenitur in catena montium Madonia, in parte septentrionali Siciliæ, in regione 3500—4000 pedes alta, degitque in truncis putridis Querciis, Ilicis, ubi etiam ejus larvæ vivunt.