

1. Parte inferiore uniformemente rossa. Antenne in gran parte, zampe per lo più, completamente nere, tarsi rosso-bruni. Giallo rossiccio; testa, bordo anteriore del protorace ed elitre nere; queste con la parte basale rossa, dietro questa con una fascia stretta bianca, ondulata, ed una fascia più larga pure bianca avanti l'estremità. Lung. 7-10 mm. Tutta Italia. *formicarius* Lin. X
- a. *semifasciatus* Fleisch. — Fascia anteriore bianca delle elitre, fortemente interrotta nel mezzo.
- a. *brevicollis* Spin. — La fascia anteriore bianca è della larghezza della posteriore.
- a. *laetipes* Reitt. — Zampe completamente o in parte rosse. Sicilia.
- a. *ruficeps* Fleisch. — Testa completamente giallo-rossiccia, chiara.
- 1' Meso e metasterno nero, prosterno e addome rosso. Antenne e zampe gialle o rosse. Elitre nere con la base rossa, una fascia ondulata bianca in avanti, ed una oltre la metà. Lung. 6-8 mm. Venezia Tridentina. *rufipes* Brahm.
- a. *femoralis* Zett. — La fascia anteriore bianca è posta in campo nero, e pure in avanti è orlata di nero. Zampe completamente o in parte scure.

GEN. *Allonyx* DUVAL

Elitre con fine serie di punti fin quasi all'estremità, gradatamente svanite, senza fascie tomentose nere. Penultimo articolo dei tarsi non bilobo, unghie alla base non dentate. Tarsi posteriori del ♂ fortemente ingrossati.

Nero lucido; base delle antenne e femori, zampe e protorace rossi; una fascia largamente interrotta avanti la metà, ed una avanti l'estremità, gialle. Testa, protorace, e base delle elitre con lunga pubescenza nera. Alle volte antenne e zampe del tutto gialle, testa avanti rossa. Lung. 5-6 mm. Venezia Tridentina, Corsica. *quadrifasciatus* Schall.

GEN. *Trichodes* HERBST

Antenne con grossa clava conica di tre articoli, questi compatti, ultimo troncato. Elitre anche posteriormente senza stria suturale impressa, rosse o gialle con fascie trasverse bleu metalliche, verdi o nere, oppure bleu o verdi con fascie o macchie gialle o rosse. Femori posteriori del ♂ per lo più ingrossati; nel ♂ penultimo segmento ventrale (5° segmento) incavato ad arco, e segmento anale (6° segmento), almeno così lungo che largo, subcilindrico o conico.

BIBLIOGRAFIA: ESCHERICH, K. — Zur Kenntniss der Coleopterengattung *Trichodes* Herb.: Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1893 p. 149.
CHAMPENOIS, A. — Synopsis des espèces paléarctiques du genre *Clerus* Müll. (*Trichodes*): Abeille, Tom. 89, 1900 p. 1-46.

1. Estremità delle elitre rossa (1). Sutura, macchia scutellare, tre fascie trasverse, nero-blen. Protorace con punteggiatura densa grossolana. Lung. 10-15 mm. Tutta Italia, anche Is. Elba. *alvearius* Fabr. X
- a. *Dahli* Spin. — L'ultima fascia scura è a forma di ferro di lancia. Il DEVILLE (*Cat. Col. Corse* p. 224) dice che gli esemplari della Corsica si riferiscono più o meno nettamente a questa forma, ed aggiunge: «chez certains d'entre eux les bandes foncées des élytres se réduisent à d'étroites lanières, ce qui donne à l'insecte un aspect insolite et très particulier». I. Capri, Sicilia, Sardegna, Corsica.
- a. *interruptus* Kr. — Fascia anteriore interrotta sulla sutura delle elitre. Sicilia.
- 1' Estremità delle elitre nero-blen, o verdastra (vedi: (2) v. *apicalis*).
2. Omeri non macchiati (vedi: a. *humeralis*, a. *georgianus*).
3. Protorace finemente punteggiato. Colorazione del fondo delle elitre rossa o gialla con due fascie dorsali nere ed una macchia apicale.

(1) Il BERTOLINI cita l'*octopunctatus* F. di Sicilia. Il CHAMPENOIS ritiene che l'OLIVIER abbia citato per errore l'*8-punctatus* come specie italiana. Nella mia collezione ho indicato di Sicilia un esemplare di *Tr. umbellatum*; non so se questa indicazione sia errata. Distinto per la punteggiatura delle elitre molto densa e quasi a forma di fossette; angolo suturale non arrotondato bensì nella femmina sempre nel maschio per lo più acuminato. Lung. 10-16 mm, Portogallo, Spagna, Algeria.

(2) Il CHAMPENOIS descrive la var. *apicalis* dell'*affinis*, Chevr. (Creta, Egitto, Siria) caratterizzata dalla macchia posteriore subrettangolare con l'estremità largamente unita al bordo esterno, mentre invece nel tipo la macchia posteriore orbicolare o in ovale trasverso, è completamente circondata dal colore fondamentale rosso. Il solo esemplare maschio ch'egli ha avuto porta come indicazione d'origine «Sicilia». L'A. però aggiunge «ce qui me parait fort douteux».

4. Sutura delle elitre dalla fascia scura anteriore alla macchia apicale, annerita. Nel ♂ femori posteriori fortemente ingrossati, tibie posteriori allungate all'estremità con uno sperone a forma di uncino; angolo suturale delle elitre indistintamente dentato. Nella ♀ elitre troncate all'estremità, angolo suturale sporgente in un piccolo dente. Lunghezza 15-30 mm. Sicilia. *crabroniformis* Fabr. X
- a. *humeralis* Müll. — Una piccola macchia nera al disotto del callo omerale. Dalmazia.
- 4'. Sutura delle elitre non annerita. Tarsi gialli. Elitre dietro la metà debolmente allargate; protorace poco più lungo che largo. Nel ♂ femori posteriori debolmente ingrossati. Lunghezza 9-15 mm. Tutta Italia, Corsica. *apiarius* Lin. X
- Tipo: — Fascia dorsale anteriore e posteriore completa.
- a. *apicida* Klug. — Seconda fascia interrotta alla sutura delle elitre. Diffusa nell'Italia meridionale, più piccola del tipo. Gli esemplari della Corsica si avvicinano a questa forma.
- a. *arcuatus* Spin. — La fascia nera anteriore è ridotta ad una macchia comune suturale. Piemonte.
- a. *subtrifasciatus* Klug. — La fascia nera anteriore è interrotta a lato della sutura e non raggiunge il bordo laterale.
- a. *interruptus* Klug. — Fascia dorsale anteriore ridotta a 2-3 macchie di grandezza variabile.
- a. *unifasciatus* Klug. — La fascia nera anteriore manca completamente. Campania.
- a. (*georgianus* Chevr.) — Callo omerale con una piccola macchia nera al lato inferiore; elitre a fasce dorsali complete
- 3'. Protorace con punteggiatura grossolana, densa. Elitre giallo-rossicce con una macchia scutellare, due fasce trasverse, ed una macchia apicale nero-bleu; sutura nero bluastra; pubescenza densa, nera. Nel ♂ femori posteriori poco, ma distintamente ingrossati. Lunghezza 8-15 mm. Venezia Tridentina, Toscana. *favarius* Illig.
- 2'. Omeri macchiati. (vedi: a. *humeralis*, a. *georgianus*).
5. Macchia omerale scura piccola, isolata. Elitre con serie di grossi punti, rossastre, con sutura, macchia scutellare e tre fasce d'un nero bleu. Segmento anale nel ♂ scuro o solo ai lati chiaro, nella ♀ del tutto rosso. Lunghezza 10-13 mm. Alpi Marittime, Lazio, Sicilia. *leucopsideus* Oliv. X
- 5'. La colorazione bleu o verde nel primo terzo delle elitre, fascia libera nel mezzo una macchia più grande o più piccola gialla o bruna.
6. Protorace lucido, con punteggiatura fine e poco densa, non confluyente. Elitre densamente punteggiate, parte superiore poco lucida e pubescenza più densa. Nel ♂ femori posteriori molto fortemente ingrossati, tibie posteriori allargate a forma di clava con una lamella lunga, arcuata, quasi della lunghezza del primo articolo tarsale; trocanteri delle zampe posteriori prominenti, gibbosi. Elitre gialle con sutura, base, e tre fasce verdi; macchia basale riunita ai lati alla prima fascia trasversale. Lunghezza 13-16 mm. Sicilia, Sardegna. *ammios* Fahr.
- 6'. Punteggiatura del protorace fina, nella parte posteriore del disco densa, confluyente, per cui appare quasi opaco. Nel ♂ femori fortemente ingrossati, tibie posteriori corte, claviformi, con una lamella arcuata che raggiunge appena la metà del primo articolo tarsale; trocanteri delle tibie posteriori semplici. Lunghezza 6-13 mm. Corsica. (*flavocinctus* Spin.)
forché da escludere dallo fau

II. Subfam. Corynetinae

Protorace con orlo laterale sporgente, o ribordo laterale.

TABELLA DELLE TRIBÙ

1. Addome di sei segmenti; antenne con clava molto lunga di tre articoli; base del protorace ribordata; corpo lungo cilindrico. I. Enoplini
- 1'. Addome di cinque segmenti; clava antennale corta di tre articoli; base del protorace di rado finemente ribordata; elitre di rado parallele, per lo più un po' allargate nella parte posteriore; primo articolo dei tarsi posteriori piccolo. Corpo piccolo. II. Corynetini

I. Tribù: Enoplini

Addome di sei segmenti; antenne con clava molto lunga di tre articoli; base del protorace ribordata; corpo lungo, cilindrico.