

***ANTHIA cincitipennis cincitipennis* LEQUIEN, 1832**

*cincitipennis* LEQUIEN, 1832, Mag. Zool., Cl, IX, p. 38

loc. typ. „Cap de Bonne-Espérance“

VERBREITUNG: S. Angola, Namibia, Botswana, Sambia, Zimbabwe, Transvaal, Orange F. S., Swaziland, Lesotho, Natal, Cape Province, Mosambique

♂ (li.) lang 43 mm, ex: NAMIBIA, ca. 7 km NW Rehoboth: Lake Oanob Resort, 23°19'S/17°01'E, 1500 m

♀ (re.) lang 43 mm, ex: NAMIBIA, Str. südl. Omaruru (C33): Onduruquea Game Lodge, 21°36'S/16°00'E, 1200 m

Aedeagus nach einem Expl. ex Namibia, Grootfontain: Kamrav Farm, 1400m

Foto Kleinfeld IV. 2010

nach Schmidt:

Pronotum ohne weiße Haarbinden, selten mit vereinzelt dunklen Haaren am Seitenrand, ohne oder nur vereinzelt grobe Porenpunkte; Elytren entweder glatt, fein in Längsreihen punktiert oder deutlich gestreift, Zwischenräume können völlig eben oder schwach oder deutlich konvex sein; Elytrenform sehr variabel, von konvex mit der größten Breite in der Mitte oder der größten Breite am Apex bis nahezu parallelseitig; weißer Elytrensaum schmal oder kräftig auch Teile des 8. Intervalls mit einbeziehend. Nahezu im gesamten südlichen Afrika verbreitete sehr häufige Art mit langer Aktivitätsperiode (im Sommerregengebiet von September bis April). Große Variabilität in der Körpergröße, 3,3 bis 5,2 cm.



***ANTHIA cincipennis actaeon* ERICHSON, 1843**

*actaeon* Erichson. 1843. Arch. f. Naturg. 9, I. p. 213

loc. typ.: „Angola“

VERBREITUNG: Angola, N.-Namibia


♂ lang 36 mm, HOLOTYPUS ex: Angola Schönb., acteon Er. / Type / 1253 / *A. cincipennis* ssp. *actaeon* Er., P. Basilewsky vid. 1978 / in coll. Naturhistorisches Museum Berlin

♀ lang 38 mm, ex: Angola, Giraul (?), Brühl S. G., 29.X.22 / 22.X.22, Graul, An..., ...? Bahnkörper, Sandgelände / in coll. Naturhistorisches Museum Berlin

Fotos Kleinfeld XI. 2011

nach Basilewsky:

Elytres à stries bien marquées. à intervalles plus convexes. Bordure latérale blanche des élytres très large. Occupant les intervalles 7 et 8, avec une assez grande tache humérale à la base des intervalles 6 et 5.



### ***ANTHIA circumscripta circumscripta* KLUG, 1853**

*circumscripta* KLUG, 1853. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin, p. 245

loc. typ. „Tette“

VERBREITUNG: Mozambique, Namibia, Tanzania, S. Kenya, Zaire, Malawi, Zambia, Botswana, Zimbabwe

♂ (li.) lang 52 mm / ♀ (mi.) lang 52 mm, ex: NAMIBIA, Str. ca. 20 km SW, Otjiwarongo (C33): Kudubos-Farm, 20°33'S/16°33'E, 1500m, II. 2008

♀ (re.) lang 49 mm, ex: NAMIBIA, ca. 7 km NW Rehoboth: Lake Oanob Resort, 23°19'S/17°01'E, 1500 m, II.2008

Aedeagus nach einem Expl. ex Namibia, 75 km SW Runda, 1200m

Foto Kleinfeld IV.2010

nach Schmidt:

Pronotum mit weißen Haarbinden, die manchmal auf einzelne Haare reduziert sein können, Seitenränder in der Regel deutlich punktiert, Elytren fein in Längsreihen punktiert oder deutlich gestreift, seltener nahezu glatt, Zwischenräume eben oder deutlich konvex; Elytrenform variiert ähnlich wie bei *cinctipennis*, Elytrensaum meist kräftig entwickelt. In Namibia stellenweise häufige Art, von dort über Nordbotswana, Zimbabwe bis Ostafrika verbreitet. 3,4 bis 4,7 cm

