

pattes sont noires. Elle vient du Cap Adler, sur la mer noire en Abhasie.

162. *Amphicoma chloridicollis* m. Faldérman a confondu cette espèce avec *A. chrysopyga* Steven, qui est plus petite et qui a l'abdomen velu de poils jaunâtres dans les deux sexes. Chez l'*A. chloridicollis* la femelle a l'abdomen noir et le corselet d'un noir métallique souvent bleuâtre. L'*A. chrysopyga* habite la Géorgie, l'*A. chloridicollis* la frontière de Perse et l'Arménie.

163. *Osmoderma barnabita* m.

*breviter ovata, subdepressa, punctata, nigro-ænea; thorace subquadrato, rugoso-punctato, plano.*

Long. 9 lign.—Larg. 6 lign.

Elle est plus petite, et plus déprimée que l'*O. eremita*, le corselet est plus carré, plus fortement ponctué, rugueux, et sans ces élévations et ces impressions qui caractérisent l'espèce d'Europe. Du reste elle ressemble beaucoup à quelques espèces de l'Amérique septentrionale. Elle habite le centre de la Russie depuis Orenbourg jusqu'au Gouvernement de Poltava.

164. *Cetonia viridis* F., Je crois qu'avec cette espèce on en confond au moins trois autres. 1° *C. cirsii* m. qui n'a pas de taches blanches sur