

*Syrphidæ.*

39. CHRYSOTOXUM TRIARCUATUM. *Macq.*

*Abdomine rufo; segmentis secundo, tertio, quartoque utrinque fasciâ arcuatâ, obliquâ, nigrâ vel fuscâ; alis margine externo fusco.*

Longueur, 5 à 6 lignes (*mâle*). — Face jaune, à bande noire; la proéminence un peu plus basse et moins saillante que dans les autres espèces; une bande noire de chaque côté des joues; front noir, bordé postérieurement de duvet jaunâtre; antennes noires; les deux premiers articles d'égale longueur, moins longs que dans les espèces européennes, et n'atteignant pas ensemble la longueur du troisième; celui-ci un peu plus long que dans les autres espèces; style fauve; thorax noir, à reflets verts; deux petites bandes de duvet blanchâtre, n'atteignant que la moitié de la longueur; une bande longitudinale jaune de chaque côté, interrompue au-dessous de la base des ailes; flancs à tache jaune en avant des ailes; une autre petite sous celle-ci; une troisième derrière les ailes; écusson jaune; abdomen convexe, d'un fauve rougeâtre; premier segment noir; bandes entières au deuxième, interrompues au milieu dans les troisième et quatrième, allant du milieu des segmens aux bords latéraux et postérieurs, et se prolongeant sur le segment suivant; ventre de la même couleur, sans bandes; pieds fauves; hanches brunes; balanciers et cuillerons fauves; ailes un peu jaunâtres; base fauve.

La femelle a une tache jaune de chaque côté du front, et le derrière de la tête jaune.