



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Bulletin de la Société entomologique de France.**

Paris :La Société,1896-

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/8187>

**1905:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34157>

Page(s): Page 207, Page 208

Holding Institution: Smithsonian Libraries

Sponsored by: Smithsonian

Generated 27 April 2020 3:48 PM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/110299100034157.pdf>

This page intentionally left blank.

nane), dans des excréments à moitié secs et sous un cadavre de Crapaud.

L'espèce a déjà été capturée en France. Il en est fait mention par le descripteur sans indication de localité précise. Les localités indiquées depuis lors sont les suivantes : forêt de St-Germain (Ch. Brisout de Barneville in *Bull. Soc. ent. Fr.* [1882], p. CLXIV), et Hautes-Pyrénées (Pandellé, d'après un renseignement dû à l'obligeance de M. E. Abeille de Perrin).

Aussi en Autriche et Tyrol.

L'exemplaire pris à St-Épain, de même que celui de la collection Ch. Brisout, mesure exactement 2 mill. au lieu de 2,5 mill., taille indiquée par F u s s dans sa description.

---

## Communications.

### Descriptions de trois Buprestides méditerranéens nouveaux [COL.]

par E. ABEILLE DE PERRIN.

I. **Coroebus orientalis**, n. sp. — Long. : 6 mill. — *Viridis, lucidulus, elongatus, fronte sulcata, thorace lateribus valde rotundato-ampliatis, postice constrictis, angulis ipsis rectis, in medio elevato, undulatum impresso; elytris subparallelis, separatim ad apicem rotundatis, transverse undulata, ventre ruguloso, micante.*

Roumanie : Bukarest.

Espèce européenne très voisine du *Theryi* Ab., propre à l'Algérie, vert et brillant comme lui, avec des tons un peu cuivreux; à front plus étroit entre les fossettes oculaires, à corselet plus dilaté-arrondi sur les côtés en avant; à élévation médiane non écrasée; à ventre franchement vert, assez guilloché entre les ondulations.

II. **Agrilus divaricatus**, n. sp. — Long. : 5,5 mill. — *Cupreus, subopacus, parum elongatus; pube ochracea omnino vestitus. Caput impressum, in medio sulcatum; fronte stricta. Thorax antice rotundato-dilatatus, dein ad apicem constrictus, angulis ipsis posticis valde divaricatis; trisulcatus, in medio valde et profunde, ad latera sulcis abbreviatis, externe curvatis. Elytra dense granulata, sutura ipsa ad basim profunde depressa; disco ad suturam usque ad apicem bene depresso, pube et sculptura in hoc sulco vix perspicue densatis. Venter submicans, integer.*

Un seul sujet pris par moi en mai, en fauchant sous les remparts d'Orléansville (Algérie, province d'Alger).

Distinct de tous les *Agrilus* pubescents par les angles postérieurs du thorax extrêmement divariqués.

III. **Agrilus Bedeli**, n. sp. — Long. : 7 mill. — *Aeneus, micans, elongatus, postice valde attenuatus et quasi caudatus, pube nivea in sulco suturali densata, punctisque transversim undulatis quoque, in caeteris elytrorum partibus aequaliter, nec dense conspicua. Thoracis lateribus in dimidia parte antica subparallelis, dein magis strictis, angulis ipsis subrectis, vix apertis, haud divaricatis.*

Rapporté de La Granja (Espagne) par M. Louis Bedel, qui l'y a capturé, le 7 août 1901, sur une Génistée arborescente très différente du *Sarothamnus* sur lequel se trouve le *cinctus* commun aussi à La Granja. On les prend tous deux vers le coucher du soleil.

Espèce très voisine de plusieurs autres du même groupe à sillon juxtasutural prononcé, et surtout de *Linderi* et de *pruinosulus*; distincte du 1<sup>er</sup> par ses fortes ondulations thoraciques, par ses élytres plus prolongés au sommet, par une moucheture blanche située à la base de l'élytre, à l'origine du sillon juxtasutural; — du 2<sup>e</sup> par sa couleur moins chaude, par la ponctuation relativement très espacée de ses étuis, par sa tête moins convexe avec son sillon médian bien plus immergé, etc.; — des deux par sa taille plus forte.

---

### Description d'un nouveau Coléoptère aveugle de France

par E. ABEILLE DE PERRIN.

**Bathyscia Bucheti**, n. sp. — *Mas latet. Feminae long. 2,5 mill. — Rufo-testaceus; ovatus, nitidus, postice attenuatus et prolongatus, valde convexus, antennis elongatis, ultimas coxas superantibus, stria suturali profunda, pedibus longis, elytris minute denseque punctulatis, praecipue ad apicem, longe pilosis, his pilis depressis.*

Un exempl. ♀, découvert à Nice (Alp.-Marit.), dans le canal de la Vésubie. (Coll. Buchet.)

Espèce des plus tranchées, différant de *Grouvellei* Ab., la seule dont la rapproche sa strie suturale parmi celles de la même région, par ses élytres brillants, ponctués, non striolés en travers, gibbeux, prolongés à l'apex, ses longues antennes et sa villosité dense et forte. A quelque