

SPECIE	taglia	arista	occhi	banda facciale	faccia	ali	pterostigma	addome	tibia	femori	tarsomeri
tenax	14-16 mm.	scura o nera; nuda	interamente pelosi, con due bande verticali (che si uniscono in alto) in cui i peli sono più lunghi e fitti	scura e larga; pelosa	bianca	Ombrate in area centro-costale	Rettangolare		Gialle alla base, 3° dilatata	Ginocchi gialli 3° dilatato	neri
cryptarum		nuda			sotto gli occhi peli neri o bianchi e neri				interamente arancio	neri basalmente e per il resto arancio con abbondanti peli neri e alcuni peli chiari	
oestracea		quasi nuda, o con peli non più lunghi di 2 volte il diametro dell'arista			tra gli occhi peli neri		tibie posteriori nere per almeno più della metà della loro lunghezza, e tutte le tibie almeno parzialmente nere	tergite 2 opaco con macchie chiare			nelle zampe posteriori gialli,
abusivus	11-13 mm.	quasi nuda, o con peli non più lunghi di 2 volte il diametro dell'arista	Pelosi M. poco vicini separati da una banda stretta	Assente o nera e molto stretta				femmine con margine posteriore dei tergiti 2-3-4 con banda bianca opaca su tutta la larghezza	Nel maschio le medie interamente pallide, ad eccezione di una striscia nerastra (che può essere assente) sulla superficie antero-laterale, nel terzo apicale		tutti i tarsomeri con peluria chiara dorsalmente nelle femmine
anthophorina		arista uniformemente bruno pallida quasi nuda, o con peli non più lunghi di 2 volte il diametro dell'arista					2 volte più lungo che largo	tergite 3 interamente opaco; tutti i tergiti con peluria chiara	nel maschio tibie medie nerastre su tutta la superficie, almeno nel terzo apicale		
intricaria		Arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista						Tergiti addominali 3-4 (maschi) o 4 (femmine) densamente ricoperti di folto pelo lungo quasi quanto la lunghezza mediana dello scutello			
pertinax	12-16 mm.	Arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista	Omogeneamente pelosi	Presente ma sottile		alalina spesso con banda bruna mediana	rettangolare, allungato	peli sui tergiti 3 e 4 lunghi meno della metà della lunghezza mediana dello scutello M. addome conico-triangolare	Ant e media preval. chiare	prevalentemente scuri	tarsomeri delle zampe anteriori e medie interamente gialli/arancioni zampe posteriori scuri
similis	13-15 mm.	Arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista	occhi piccoli e poco pelosi	Presente			4 volte più lungo che largo	peli sui tergiti 3 e 4 lunghi meno della metà della lunghezza mediana dello scutello		3° nero stretto e lungo	almeno i tarsomeri apicali di entrambe le zampe anteriori e medie neri (il basitarsus può essere arancione scuro)
arbustorum	9-11 mm.	Arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista	Pelosi 1/2 inf	Assente.	Faccia pruinosa e grigiastra	Trasparente, senza banda ombrata.	rettangolare, 3 volte più lungo che largo	Nero sulle tergiti sabbiato con margine inferiore bordato di chiaro	Giallorossastre alla base T2 bicolore giallo prevale	Nero prevale	Neri 1° ispessito
jugorum		Arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista			striscia nera mediana lucida, ampia e distinta		non più lungo di 2,5 volte che largo			maschio con frangia postero-laterale di peli sui femori anteriori notevolmente più fitta della frangia postero-laterale sui femori posteriori	
alpina		Arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista			striscia nera mediana lucida, ampia e distinta		non più lungo di 2,5 volte che largo	addome bianco-grigiastro		frange postero-laterali di peli sui femori anteriori e posteriori di uguale densità; i peli sui femori anteriori giallastri	
rupium	9-12 mm.	Antenne rossastre, arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista		Presente		Macchia scura quadrangolare nella F poco visibile	2 / 3 volte più lungo che largo	Tergiti tutte nere brillanti	3° +/- bicolori	3° +/- bicolori; frange postero-laterali di peli sui femori anteriori e posteriori di uguale densità; i peli sui femori anteriori nerastri	
picea		Arista piumosa, con peli lunghi più di 3 volte il diametro dell'arista									
interrupta (nemorum)	10-13 mm.	Arista piumata solo alla base	Pelosi	Stretta, poco evidente		alalina senza macchia ombrata	Piccolo scuro e rettangolare		gialle	Bicolore 3° nero eccetto l'apice	T1-2 neri
lineata (horticola)	11-14 mm.	Arista piumosa	Pelosi	Presente		Con banda ombrata sinuosa al centro	2 volte più lungo che largo			1° con peli lunghi gialli F: 3° base gialla	

rosso: non presente in Italia (ma in paesi confinanti)  
 azzurro: presente in Italia ma non in Sardegna  
 verde: presente in Italia e in Sardegna