



<http://www.biodiversitylibrary.org>

Voyage de la corvette l'Astrolabe : exécuté par ordre du roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829 / sous le commandement de J. Dumont d'Urville.

Paris :J. Tastu,1830-1834.

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/2132>

Entomologie. pt.2: <http://www.biodiversitylibrary.org/item/18526>

Page(s): Page 636, Page 637

Contributed by: MBLWHOI Library

Sponsored by: MBLWHOI Library

Generated 24 November 2009 4:05 PM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf2/001544800018526>

This page intentionally left blank.

foncés, sauf la dernière paire, dont les cuisses sont noirâtres, et les jambes brunes.

Elle se trouve à Doreï.

—

GENRE ALIDUS. Fabricius.

A. ANNULICORNE. *A. annulicornis*.

PL. II, FIG. 14.

Fuscus, antennis elytrisque subferrugineis; pectore utrinque fascia longitudinali interrupta lutea; femoribus posticis serratis.

Brun, avec les antennes et les élytres un peu ferrugineuses; poitrine ayant de chaque côté une raie jaune interrompue; cuisses postérieures dentées en scie.

Il se rapproche du *Serripes* de Fabricius. Il est brun. La tête est triangulaire, avec les yeux jaunes, et les antennes un peu ferrugineuses, plus obscures vers l'insertion de leurs articles. Le corselet offre en arrière deux petites épines recourbées. L'écusson est triangulaire, pointu, d'un beau roux. Les élytres sont parallèles; leur partie coriace est de la couleur de l'écusson, et la partie membraneuse

transparente, un peu roussâtre. L'abdomen manque. La poitrine est brunâtre, et elle offre de chaque côté une raie longitudinale, maculaire, jaune ou un peu fauve, commençant sur la tête, et paraissant devoir se continuer de chaque côté de l'abdomen. Les pattes sont d'un brun roussâtre. La dernière paire est un peu plus foncée, avec cuisses beaucoup plus grosses et plus longues, et munies intérieurement d'une rangée de petites dents ou épines.

Il est indiqué comme de Vanikoro; mais il est plus probable qu'il vient de la Nouvelle-Guinée.

GENRE ASTACOPS. Boisduval.

Ce genre a beaucoup de rapport avec les *Lygæus*, mais il en est bien distinct par la tête plus large que le corselet, par les yeux qui sont très-saillants et presque pédicellés, et enfin par deux ocelles rapprochés l'un de l'autre et placés sur le milieu du vertex.

1. A. AUSTRAL. *A. australis*. Boisduval.

PL. 11, FIG. 15.

Niger, capite, elytris, thorace postice pedibusque rubris.