Phytophaga, XV (2005-2006): 1-1051
I S S N: 0393 – 8131
Allegato in .pdf

I macrolepidotteri italiani

Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera)*

Paolo Parenzan - Francesco Porcelli

Riassunto

Ad oltre sessanta anni dalla pubblicazione della "Fauna Lepidopterorum Italiae" di Mariani, si ritiene necessario aggiornare le conoscenze relative alla presenza e diffusione delle specie di macrolepidotteri sul nostro territorio.

Questa monografia ha richiesto oltre tre decenni di paziente ricerca per reperire quanto è stato pubblicato sui lepidotteri italiani, dalle monografie alle note di poche righe, alle tesi di laurea ed ai lavori in campo agrario e forestale, spesso trascurati perché di difficile reperimento, compresi i lavori riguardanti altre Nazioni, in cui sono presenti dati relativi a catture in località italiane.

Complessivamente sono stati riuniti 3570 riferimenti bibliografici, coprenti uno spazio temporale che va dal 1713 al 31 dicembre 2005 oltre poche pubblicazioni in stampa nel 2006. Tali lavori sono elencati integralmente in ordine di pubblicazione e preceduti da un numero progressivo per una facile individuazione.

Purtroppo non è stato possibile ottenere copia di tutto quanto avremmo voluto consultare: le citazioni contrassegnate da un "*" riportano a pubblicazioni non in nostro possesso, i cui dati sono stati tratti da altri lavori.

Le citazioni antiche, se non suffragate da verifiche della correttezza dell'identificazione o da segnalazioni in epoche successive, in molti casi attendono conferma; non sono state ignorate in quanto consentono di avere un quadro della situazione delle conoscenze lepidotterologiche nelle varie epoche.

I dati bibliografici sono integrati con numerose segnalazioni inedite, anche comunicate in litteris da colleghi che indichiamo di volta in volta. Alcune di queste comunicazioni in litteris sono tanto estese da essere citate in bibliografia, contrassegnate da un "°" accanto al rispettivo numero di riferimento.

---

*Pubblicazione finanziata con contributi M.I.U.R (ex 60%) di entrambi gli autori.
Citare come: Parenzan P., Porcelli F. 2006 - I macrolepidotteri italiani Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera). Allegato in .pdf a *Phytophaga*, Palermo, XV: 1-1051. I dati vanno riferiti al mese di Dicembre 2006.

Nella elencazione si segue la Checklist "The Lepidoptera of Europe" (2980), aggiornata per quei gruppi sui quali sono stati pubblicate in epoca successiva revisioni complete. In particolare: per gli Psichidi si segue Hattenschwiler (2905), (3198); per le Sesie Lastuvka (3245); per i Nottuidi i "Noctuidae Europaeae" (2605), (2783), (2877), (2936), (3018), (3253), (3288), (3331), (3465); per i Geometridi "The Geometrid Moths of Europe" (3240), (3342), (3376).

Per motivi di spazio il testo integrale, complessivamente di oltre 1000 pagine, viene riportato nel CD allegato. A stampa viene riportato l'elenco integrale delle specie, le descrizioni originali, le note e l'elenco delle regioni per cui la specie è segnalata (in parentesi quelle per cui si ha solo una citazione generica), l'indice e la bibliografia essenziale.

Nella compilazione del testo abbiamo seguito alcune convenzioni.

SPECIE - Tutte le specie sono precedute da un numero progressivo:

quelle precedute da (-) sono state citate erroneamente nel passato o in epoca recente per l'Italia, o sono state segnalate per regioni (Savoia, Nizzardo, Istria, Carniola) oggi non facenti più parte del territorio nazionale; quelle precedute da (?) sono di dubbia validità o di dubbia appartenenza al territorio nazionale.

Ogni specie è indicata con il nome recante la desinenza originale. Questa strada, anche se in disaccordo con il Codice (ICZN), e stata intrapresa sulla base di scelte condotte da altri autori . Ad esempio quelle di: Karsholt O., Razowski J. - 1996 - The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist - Apollo Books Ed., Stenstrup, 380 pp. (2980); Raineri V., Zangheri S. - 1995 - Lepidoptera Drepanoidea, Axioidea, Geometroidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 90. Calderini, Bologna, 23 pp. (2929); Leraut P. - 1997 - Liste systematique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition) - Suppl. à Alexanor & Bulletin de la Société entomologique de France, Paris, 404 pp. (3031). A titolo esemplificativo si riporta una tabella derivata dai testi appena citati.

Genere	**(2980)**	**(2929)**	**(3031)**
Triodia	*sylvina*	*sylvina*	*sylvina*
"	*adriaticus*	*adriaticus*	*adriaticus*
Korscheltellus	*lupulina*	*lupulinus*	*lupulinus*
Pharmacis	*aemilianus*	*aemiliana*	
Smerinthus	*ocellata*	*ocellatus*	*ocellata*
Proserpinus	*proserpina*	*proserpinus*	*proserpinus*
Biston	*strataria*	*stratarius*	*strataria*
Synanthedon	*spheciformis*	*spheciforme*	*spheciformis*

Per le specie descritte su esemplari di località italiane è riportata la descrizione originale; se non si è in possesso del riferimento originale è indicata di seguito la fonte bibliografica intermedia.

Sono citati i sinonimi più frequentemente presenti nei lavori sulla fauna italiana.

Nel caso di specie di controversa interpretazione o di dubbia validità, come per le specie partenogenetiche e/o anfigoniche degli Psychidae, per il gruppo delle *Hipparchia*, ecc. abbiamo mantenuto le citazioni distinte. Tale scelta deriva dalla maggiore facilità nell'accorpare dati piuttosto che nel dividerli in seguito a chiarimenti futuri.

NOTE - Nelle note sono riportate le principali sottospecie, le specie descritte su esemplari italiani poste in sinonimia, nonché le notizie tassonomiche e tutte le osservazioni e le correzioni riscontrate in letteratura. Sono impostate in brevi periodi, che riguardano ognuna un dato bibliografico, ricordato dal numero corrispondente, oppure notizie comunicate in litteris ovvero osservazioni o riflessioni degli autori.

NUOVI DATI - Sono desunti dagli esemplari di numerose collezioni indicate dalle sigle riportate fra parentesi, in alcuni casi comunicati in litteris. Tale scelta permette di evitare che specie banali, poco citate proprio perché tali, vengano inserite fra le specie da proteggere in quanto poco segnalate o indicate solo genericamente in letteratura.

Le collezioni ed i raccoglitori, sono indicati come in legenda.

Tutta la serie di catture precedenti una sigla si intendono effettuate dallo stesso raccoglitore e/o collezionista.

Per comodità viene indicato (PRN) il materiale raccolto da Parenzan sia conservato nella propria collezione, sia quello depositato presso la collezione della Sezione di Entomologia Agraria del Dipartimento di Biologia e Chimica Agroforestale ed Ambientale (DiBCA) dell'Università degli Studi di Bari, sia quello conservato nella collezione della Sezione di Entomologia Agraria del Dipartimento di Scienze Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche Agrarie e Zootecniche (S.En.Fi.Mi.Zo) dell'Università di Palermo. I dati inediti di Parenzan riportano anche la presenza di specie banali, poco rappresentate nelle collezioni per ovvi motivi di spazio. Di queste specie è stata presa nota durante lo smistamento del materiale o nel corso delle escursioni.

REGIONI E PERIODI DI PRESENZA - Sono riportati i dati di presenza nelle singole regioni, seguendo le suddivisioni politiche attuali. Poche le eccezioni: il Trentino-Alto Adige - dove abbiamo separato le province di Bolzano (prevalentemente montana) e Trento (di quote minori, con il Lago di Garda); il Friuli - Venezia Giulia - separando il Friuli dalla Venezia Giulia (con il Carso e le coste triestine); l'Emilia - Romagna dividendo le citazioni per l'Emilia (interna e con le catene montuose) da quelle della Romagna (prevalentemente pianeggiante e costiera) limitatamente alle provincie di Ravenna e Forlì - Cesena.

Le località della Romagna storica, oggi appartrenenti alla Toscana o alle marche, sono riportate in queste regioni.

Per ogni regione sono indicati i periodi effettivi di presenza, ricavati non dalle date di pubblicazione dei lavori ma dalle date di cattura, raggruppate in periodi di cinquanta anni quelle antecedenti al 1900 e di 25 anni dal 1901 in poi. Per ogni regione sono riportati solo il primo e l'ultimo riferimento bibliografico; quando è fornito un solo riferimento vuol dire che è l'unico per la regione e che eventuali altri lavori hanno ripreso gli stessi dati.

Per i lavori di faunistica che riuniscono molti dati di cattura, se pubblicati nei primi due o tre anni di un dato periodo viene indicato di volta in volta o solo quello comprendente la data di pubblicazione o anche quello precedente.

Ad esempio per il lavoro di Prola et al. del 1978 (2141) il periodo di presenza di una specie sarà indicato fra il 1976 ed il 2000 nel caso sia riportata una sola località, fra il 1951-2000 se ne sono citate due o più, in quanto si ritiene che almeno per una località le catture risalgano al periodo precedente.

Le regioni ed i periodi per i quali si hanno solo segnalazioni generiche sono riportati fra parentesi.

Summary

Italian macrolepidoptera

Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera)

More than sixty years after the publication of "Fauna Lepidopterorum Italiae" by Mariani, it is considered necessary to update the knowledge about Macrolepidoptera distribution in Italy.

This paper proposes some thirty years of research and reasoned bibliographical references collection plus new collection data. The job allows to collate the today most complete body of information about Italian macrolepidoptera.

Unfortunately printing the whole catalogue will result into a some 1000 pages book. So that it was preferred to print a concise full list of species containing: the reference for the species described from Italy; related loci typici; some notes and the concise list of regions where they are collected.

By side you find the CD containing the complete text with further information: a plenty of new collection data; the analytical occurrence of the species in region; the species occurrence that refers to the actual

collection year and time of flight and is split in fifty (ante 1901) and twenty-five (from 1901) years time lapse; first and last regional reference.

Totally 2388 species are listed, taxonomically sorted, and ranked with an index number useful from the index name search.

Reference data flow from 3570 references published from 1713 to 31st December 2005 plus few selected paper in press during 2006. All references are fully listed and ordered by publication date. Each reference is ranked with an index number you find in the text in place of the more usual Author's name and reference year. The use of this index number helps to make concise the body of the text.

Some papers are still unavailable, of course. The "not seen" references are marked by an "*". The data reported in not seen references are treated as "second hand information" arising from other papers.

Second hand information is often referred to ante-1800 bibliographical source. Very old reports or books have not been ignored to allow us a better understand of the Lepidoptera knowledge during ages.

Legenda

Species:

Each species name is reported bearing its original ending. This just to avoid the confusing behaviour that results today. We realize that it is not in compliance with the rule of the Code (ICZN) but several large (2980; 2929 and 3031) checklist do the same at the present time.

(-) refers to species wrongly quoted in the past, or quoted for regions no more in Italian borders;

(?) refers to species with unclear status or unsure belonging to Italian fauna;

Note:

Notes refer mainly to species; subspecies; synonymies; taxonomy and collection data.

New data:

Data reported on usually collected specie is here considered important to avoid unnecessary placement of very common Taxa in "red" or "alert list". New data came from Parenzan collection, or from other Collector as follows, each acronym ends the proper dataset:

(ADD) = (leg. et coll. Addante)

(GRL) = (leg. et coll. Grillo)

(SCL) = (leg. et coll. Scalercio)

(PRN) = (leg. et coll. Parenzan)

(SCR) = (leg. et coll. Sciarretta)
(NRD) = (leg. et coll. Nardelli)
(VTL) = (leg. et coll. Vitale)
(SNN) = (leg. et coll. Sannino)
(FLM) = (leg. et coll. Flamigni)
(FLM/BST) = (leg. et coll. Flamigni & Bastia)
(BLL/RSS) = (leg. et coll. Bella & Russo)
(MRN) = (leg. et coll. Morin)
(RTN, PRN) = (leg. Rotundo, coll. Parenzan)
(DMR, PRN) = (leg. De Marzo, coll. Parenzan)
(GLL, PRN) = (leg. Gallo, coll. Parenzan)
(DBR, PRN) = (leg. Della Bruna, coll. Parenzan)
(BER, PRN) = (leg. Berio, coll. Parenzan)
(CMC, PRN) = (leg. Cameron-Curry, coll. Parenzan)
(HRT, PRN) = (leg. Hartig, coll. Parenzan)
(PRT, PRN) = (leg, Portalatina, coll. Parenzan)
(MSS, PRN) = (leg. Massa, coll. Parenzan)
(TRG, PRN) = (leg. Triggiani, coll. Parenzan)

Regional occurrence:

The data follow the actual politic status, with some exception due to ecology and history. This occurs for Trentino and Alto Adige, Friuli and Venezia Giulia, Emilia and Romagna. Region and time lapse with only generic reports are within brackets.

Key words: lepidoptera species distribution, zoogeography.

Elenco delle specie

Fam. Hepialidae

1. - ***Gazoryctra ganna*** **(Hübner, 1808)**

Piemonte: 1851-1900; (218); (797); **Lombardia:** 1926-1950; (1053); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (1053); (3007); **Alto Adige:** 1851-1950; (273); (1053); **Veneto:** 1976-2000; (3007).

2. - ***Triodia sylvina*** **(Linnaeus, 1761)** (= *kruegeri* Turati, 1910)

Nota - È citata come probabilmente presente in **Sardegna:** (2915), (2980), non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Liguria:** Caprieto di Vobbia 30-31.VIII.1977 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.IX.1981, 20.IX.1982, 16.IX.1985, 5 e 9.IX.1987; Molinelli 13.IX.1986 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Rotonda 10.IX.1977, 16.IX.1979, 15.IX.1980, 23.IX.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 7.X.1980 (PRN); Amantea 100 m 1.X.1995; Donnici (CS): Fosso Cucolo, 550 m, 20.IX.1989, 13.IX.1992 (SCL). **Sicilia:** Giacalone 12.IX.1979, 3.IX.1982, 13.VII e 12.IX.1984, 3.X.1987, 2.X.1995; Mandria del Conte 13.IX.1979; Piana degli Albanesi 22.IX.1981; Ficuzza 24.IX.1979, 11.X.1984, 13 e 26.IX.1986 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3461 bis); **Trentino:** 1851-2005; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (157); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1950; 1976-2000; (1007); (2426); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1926-2000; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (1980); (2145); **Lazio:** 1901-1950; 1976-2005; (772); (3417); **Abruzzo:** 1976-2005; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** (1976-2000); (3007). **Puglia:** 1976-2000; (2108); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (3298); **Calabria:** (1976-2000); 2001-2005; (2732); (3347); **Sicilia:** 1851-2000; (144); (3083).

3. - **(-)** ***Triodia adriaticus*** **(Osthelder, 1931)**

Nota - È riportata come presente in **Italia** (2980), ma sulla base di citazioni per l'Istria.

4. - **(-)** ***Triodia amasinus*** **(Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (360), (506), (1340). In (488) è riferito: "avendo comunicato al sig. Püngeler l'esemplare della collezione Failla

a suo tempo dallo Staudinger determinato per *Amasinus* HS., risulta invece trattarsi della *sylvina*"; pertanto la specie non è presente nell'isola.

5. - ***Korscheltellus lupulina*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** di *K. lupulina* vanno riferite a *T. sylvina* (488).

Nuovo dato - **Liguria:** Caprieto di Vobbia 27.V.1978 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2005; (164); (3461 bis); **Trentino:** 1851-2005; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (204); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (262); (3007); **Romagna:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3062); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2204); (3007); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3007); **Puglia:** 1976-2000; (2923); **Basilicata:** (1951-1975); (1943); **Calabria:** 1976-2000; (3007).

6. - ***Pharmacis fusconebulosa*** **(De Geer, 1778)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** vanno riportate a *T. sylvina* (488). Le citazioni per **Emilia**, **Romagna**, **Toscana**, **Umbria**, **Marche**, **Abruzzo** e **Lazio** vanno riferite a *P. aemilianus*. La citazione per la **Sardegna:** (2980) non è attendibile.

Valle d'Aosta: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3007); **Lombardia:** 1976-2000; (2544); (3007); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3007); **Alto Adige:** 1851-2005; (216); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (3007); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

7. - ***Pharmacis carna*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia:** (1388), (2732) sono da riferire a *P. aemilianus*. La citazione per la **Valle d'Aosta** è dubbia (3145).

Valle d'Aosta: 1951-1975; (1717); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (3073); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2710); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (3007); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-2000; (1053); (3250); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (3007); **Liguria** (1801-1850); (114).

8. - ***Pharmacis aemilianus*** **(Costantini, 1911)**

Hepiolus fusconebulosa var. *aemilianus* è descritta su esemplari dell'**Emilia**: Montegibbio e Fiumalbo (Entomologische Zeitschrift, Frank. a. M., 24: 247, taf. 2, figg. 22-25) (688).

Nota - La citazione generica per la **Sicilia:** (2732) è molto dubbia.

Piemonte: 1976-2005; (3384 bis); (3461 bis); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3384 bis); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (501); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1901-2005; (518); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1976-2005; (2544); (3419); **Abruzzo:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2005; (835); (3402); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3447); **Campania:** 1901-1950; (1350); (2710); **Basilicata:** 1976-2000; (2732); (3298); **Sicilia:** (1976-2000); (2732).

9. - ***Pharmacis bertrandi*** **(Le Cerf, 1936)**

Nota - La segnalazione di *H. bertrandi* per la **Valle d'Aosta:** (2084) va riferita a *P. anselminae* (2216).

Piemonte: 1976-2005 (3463 bis).

10. - ***Pharmacis claudiae*** **Kristal, Hirneisen & Steiner, 1994**

Pharmacis claudiae è descritta su esemplari della **Valle d'Aosta**: Valtournanche: Antey-Saint-André, 2200 m, Breuil di Cervino, 2000 m (Nota lepidopterologica, 17 (1/2): 53) (2854).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2854); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3007); (3395).

11. - ***Pharmacis anselminae*** **(Teobaldelli, 1977)**

Hepialus anselminae è descritta su esemplari della **Valle d'Aosta**: Cogne: Valle Valeille, 2000 m, Peradza, 2500 m (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 26 (3): 38) (2115).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2115); (3210).

12. - ***Phymatopus hecta*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (343), (2915), (2980). In (488) è riferito: "avendo comunicati al sig. Püngeler gli esemplari di *Hepialus hecta* della mia raccolta, risulta invece trattarsi della *sylvina*"; pertanto la specie non è presente nell'isola. È citata per l'**Emilia:** (262), non presente nella collezione Fiori, il che sembra confermare l'ipotesi che la citazione per l'Emilia sia da attribuire a un errore di determinazione (3139). La citazione per le **Marche:** (385) è dubbia. È riportata genericamente per la **Venezia Giulia** e la **Sardegna:** (2732), non risultano segnalazioni per queste regioni.

Piemonte: (1801-1850); 1926-1950; (114); (3139); **Lombardia:** (1851-1900); (2362); **Trentino:** 1901-1950; (1053); (1320); **Alto Adige:** 1901-1950; (1038); (3007); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (161); (3139).

13. - ***Hepialus humuli*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per le **Marche:** (385) e la **Campania:** (1350) probabilmente vanno riferite a *P. aemilianus*, quella per la **Sicilia:**

(2710) è molto dubbia.

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3007); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (3007); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

Fam. Psychidae

14. - ***Diplodoma laichartingella*** **(Goeze, 1783)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte;** (1926-1950); (1388); **Lombardia:** 1951-1975; (1555); **Trentino:** 1851-1900; 1976-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1900; (171); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** (1951-1975); (1943); **Liguria:** (1926-1950); (1388).

15. - ***Diplodoma adspersella*** **Heinemann, 1870**

Trentino: 1851-1900; 1926-1950; (1618); **Alto Adige:** 1951-1975; (1618).

16. - ***Narycia duplicella*** **(Goeze, 1783)** (= *monilifera* Geoffroy in F., 1785)

Trentino: 1976-2000; (2211); (2475); **Alto Adige:** 1976-2000; (3024); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (805).

17. - **(-)** ***Narycia astrella*** **(Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - È citata per l'**Alto Adige:** Dolomiti: St. Ulrich (1311). Si conosce solo un esemplare etichettato Gröden leg. Schawerda, probabilmente di Ortisei-S. Ulrich (1618). Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

18. - ***Eosolenobia mannii*** **(Zeller, 1852)**

Alto Adige: 1926-1950; (1475); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (887); (805).

19. - **(-)** ***Praesolenobia clathrella*** **(Fischer v. Röslerstamm, 1837)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte**, **Lombardia**, **Venezia Giulia**, **Sicilia** e **Sardegna** sono errate.

20. - ***Dahlica triquetrella*** **(Hübner, 1813)** (partenogenetica)

Nota - Per il **Veneto** si conoscono solo astucci, per cui non si può dire se bisessuata o partenogenetica: (1943); inoltre, nell'indicare la diffusione in Italia non viene indicata la forma, se partenogenetica o bisessuata. In **Italia settentrionale** sarebbe presente solo la forma partenogenetica tetraploide (2905).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** (1926-1950); 2001-2005; (1388); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); (1388); (1943);

Trentino: (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3293); **Alto Adige:** 1851-1900; 1951-1975; (273); (2018); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Calabria:** 2001-2005; (3467).

21. - **(?)** ***Dahlica triquetrella*** **(Hübner, 1813)** (bisessuata)

Nota - Nella collezione Hartig sono presenti esemplari di **Sardegna,** segnalazione da confermare.

Veneto: 1851-1900; (244); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (1943); **Sardegna:** (1951-1975); (2367).

22. - ***Dahlica lichenella*** **(Linnaeus, 1761)** (partenogenetica)

Piemonte: (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1976-2000; (2475); (2211); **Alto Adige:** 1951-1975; (2018); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

23. - ***Dahlica lazuri*** **(Clerck, 1759)** (= *fumosella* Heinemann, 1870)

Nota - È citata per **Sicilia** e **Sardegna:** (630); probabilmente identificazioni errate.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3210); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

24. - ***Dahlica generosensis*** **(Sauter, 1954)**

Veneto: 1976-2000; (2367).

25. - ***Dahlica leoi*** **(Dierl, 1970)**

Solenobia leoi è descritta su esemplari del **Piemonte**: Gran Paradiso: Piamprato, 1550-1700 m (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 19 (3): 33) (1901).

Piemonte: 1901-1925; 1951-1975; (1901); (3021).

26. - ***Dahlica rebeli*** **(Wehrli, 1924)**

Solenobia rebeli è descritta su esemplari del **Piemonte**: Mont Gelas, 3000-3150 m e Cima d'Argentera, 3300 m (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", Dresden, 38: 95, Tav. I, fig. 11) (1031).

Nota - "Conosciuta solo per il luogo tipico, il Mont Gelas nelle Alpi Marittime (Francia) a 3.000 m di quota" (2367).

Piemonte: 1901-1925; (1031).

27. - ***Dahlica argenterae*** **(Wehrli, 1924)**

Solenobia alpicolella f. *argenterae* è descritta su esemplari del **Piemonte**: Cima d'Argentera, 3300 m, e Plateau des Mont Gelas, 3000-3150 m (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", Dresden, 38: 95, Tav. I, fig. 9) (1031).

Piemonte: 1901-1925; (1031).

28. - **(-)** ***Dahlica larella*** **(Chrétien, 1906)**

Nota - È citata come presente in **Italia settentrionale** (1495). Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

29. - ***Dahlica marmorella*** **Hermann, 1988**

Dahlica marmorella è descritta su esemplari della **Toscana**: Alpi

Apuane, Arni 800-1000 m, 25 km a E di Massa (Nota lepidopterologica, 10: 203) (2518).

Toscana: 1976-2000; (2518).

30. - **(-)** ***Dahlica inconspicuella*** **(Stainton, 1843)**

Nota - Una citazione generica per il **Tirolo meridionale** (172) è poco attendibile.

31. - **(-)** ***Dahlica sauteri*** **(Hättenschwiler, 1977)** (= *inconspicuella* auct.)

Nota - Le citazioni generiche per la **Sicilia** e la **Sardegna:** (630) sono molto dubbie.

32. - ***Dahlica klimeschi*** **(Sieder, 1953)**

Lombardia: 1976-2000; (2367); **Trentino:** 1976-2000; (2211); **Alto Adige:** (1951-1975); (1647).

33. - **(-)** ***Dahlica siculella*** **(Rebel, 1919)**

Solenobia siculella è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", 32: 108) (887).

Nota - *Dahlica siculella* Rebel sarebbe sinonimo di *Siederia cembrella* (1555). È considerata specie valida (2385). "*S. siculella* Rebel è stata descritta su un maschio ricevuto da Mann con l'etichetta "Sizilien", ma non può essere escluso un errore circa la provenienza dell'esemplare; l'esemplare non si trova nel Naturhist. Mus. Wien" (2518). Non è citata in (2905), che riporta solo *siculella* (Bruand, 1852) come ssp. di *Phalacropteryx apiformis* Hb.

34. - ***Siederia alpicolella*** **(Rebel, 1919)**

Lombardia: 1901-1925; (887); **Alto Adige:** 1901-1925; (887); **Veneto:** 1901-1925; (887).

35. - ***Siederia pineti*** **(Zeller, 1852)**

Nota - Una citazione per la **Sicilia:** (630) è poco attendibile.

Piemonte: 1976-2000; (3021); **Trentino:** 1926-1950; (1320); **Alto Adige:** 1926-1950; (1311).

36. - ***Siederia meierella*** **(Sieder, 1956)**

Trentino: (1951-1975); (1943); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528); (1647).

37. - ***Siederia rupicolella*** **(Sauter, 1954)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145).

38. - ***Postsolenobia juliella*** **(Rebel, 1919)** (= *friulana* Meier, 1957)

Bankesia juliella è descritta su esemplari del **Friuli**: Monte Matajur (Deutsche Entologische Zeitschrift "Iris", 32: 100) (887). *Solenobia friulana* è descritta su esemplari del **Friuli:** Interneppo, Gemona,

Monte Festa, Lago di Cavazzo (1586).

Friuli: 1901-1925; 1951-2005; (887); (3343); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2547).

39. - ***Postsolenobia thomanni*** **(Rebel, 1936)**

Trentino: (1926-1950); (1943); **Alto Adige:** 1951-1975; (2018); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1951-1975; (1495).

40. - ***Brevantennia triglavensis*** **(Rebel, 1919)**

Friuli: 1926-1975; (1493); (1536).

41. - ***Brevantennia siederi*** **(Sauter, 1954)**

Trentino: 1951-1975; (1943); **Veneto:** 1951-1975; (1943).

42. - ***Taleporia politella*** **(Ochsenheimer, 1816)**

Nota - La citazione per la **Romagna:** (1885), probabilmente va riferita ad altra specie, poichè la specie non vola in novembre (1943).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (693); (3145); **Piemonte:** (1901-1925); 1976-2000; (693); (3021); **Trentino:** 1851-1900; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1900; 1926-1950; (171); (1475); **Veneto:** 1951-2000; (1943); (3021); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3064); **Toscana**: 1976-2000; (3424); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Puglia:** 1976-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-1975; (2108).

43. - ***Taleporia tubulosa*** **(Retzius, 1783)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: San Severino 26.V.1983 (PRN). **Calabria:** Saracena: Rifugio Fornelli 1200 m 26.X.2001 (astucci); Sila: La Fossiata 14.VIII.1996 (astucci); Fago del Soldato 20.III.1992; San Donato di Ninea 15.II.2002 (astucci) (SCL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1900; 1926-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1943); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (805); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1951-1975; (2029); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1951-2005; (112); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2142); **Puglia:** 1951-1975; (2923); **Basilicata:** 1976-2000; (2923); **Calabria:** 1976-2005; (3400).

44. - **(-)** ***Taleporia autumnella*** **Rebel, 1919**

Nota - È citata genericamente per la **Toscana:** (1555). Un esemplare probabilmente appartenente a questa specie è stato rinvenuto in **Toscana:** (2385); non si hanno altri dati per l'**Italia**.

45. - ***Taleporia defoliella*** **Constant, 1895**

Piemonte: 1951-2000; (3333); **Liguria:** 1951-1975; (3333); **Toscana:** 1976-2005; (3424); **Calabria:** 2001-2005; (3333); (3400).

46. - ***Pseudobankesia alpestrella*** **(Heinemann, 1870)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1719); (3145); **Piemonte:** 1951-1975; 2001-2005; (1719); (3378); **Trentino:** 1951-1975; (1647); **Alto Adige:** 1926-1950; (1311).

47. - ***Pseudobankesia contractella*** **Hättenschweiler, 1994**

Trentino: 1976-2000; (2846); **Veneto:** 1976-2000; (2846).

48. - **(-)** ***Bankesia douglasi*** **(Stainton, 1854)** (= *staintoni* Walsingham, 1899)

Nota - Una citazione per l'**Italia centrale:** (1719) di *S. staintoni* Walsh. è probabilmente errata.

49. - ***Bankesia conspurcatella*** **(Zeller, 1850)**

Talaeporia conspurcatella è descritta su esemplari della **Toscana:** Pratolino (FI) e Pratovecchio (AR) (Stettiner entomologische Zeitung, 11 (1): 59) (112).

Veneto: 1976-2005; (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3424); **Calabria:** 2001-2005; (3400).

50. - ***Sciopetris hartigi*** **Sieder, 1976**

Sciopetris hartigi è descritta su esemplari della **Sardegna:** Musei (CA), 120 m (Entomologische Berichten, 36: 43) (2082).

Sardegna: 1951-1975; (2082).

51. - ***Penestoglossa dardoinella*** **(Millière, 1864)** (= *latiorella* Mann, 1873; *incerta* Millière, 1886)

Penestoglossa latiorella è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo (206).

Nuovi dati - **Puglia:** Terlizzi 27-31.V.1978; Bari: Campus univ. 31.VII.1987; Mola 26.VII.1979; gravina di Riggio 20.VIII.1991. **Basilicata:** Pollino: Rotonda 18.VII.1980 (PRN). **Calabria:** Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 27.VIII.2001; Fiumara Trionto 10.VIII.2000 (SCL). **Sicilia:** Casteldaccia 5.VII, 18.VIII.1978; Cefalù monte 350 m 10.VIII.1978; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 6.VIII.1978; Contrada Traversa 850 m 30.VII.1978 (PRN).

Lombardia: 1851-1900; (332); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (1361); (3183); **Romagna:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1885); **Toscana:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3310); **Lazio:** 1976-2000; (3452); **Molise:** 1976-2000; (3452); **Puglia:** 1976-2000; (2108); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 2001-2005; (3452); **Sicilia:** 1851-1900; 1951-2000; (206); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226); **Sardegna:** 1851-1975; (301); (1975).

52. - ***Typhonia ciliaris*** **(Ochsenheimer, 1810)** (= *lugubris* Hübner, 1803, nec Fabricius, 1776)

Nota - Le segnalazioni di *T. ciliaris* e *T. lugubris* per la **Calabria** e la

Sicilia vanno probabilmente riferite a *T. beatricis* (3424).

Valle d'Aosta: 1801-1850; 1951-2000; (114); (3424); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3424); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (2362); (3424); **Trentino:** 1901-2000; (2475); (3210); **Alto Adige:** 1851-1900; 1926-1975; (216); (1618); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2005; (3424); **Toscana:** 1851-1900; (344); **Marche:** 1976-2000; (3424).

53. - ***Typhonia beatricis* Hättenschwiler, 2000**

Typhonia beatricis è descritta su esemplari di Rangierbahnhof Weil am Rhein-Basel (Germania-Svizzera) (luogo tipico) e della **Puglia:** San Cataldo "Salerno" Lecce (Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 50 (1): 6, figg. 1-3) (3199).

Nota - La località di San Cataldo "Salerno" Lecce (**Puglia**), è in realtà Amalfi: monastero di San Cataldo (SA) (**Campania**), dove Worm-Hansen ha cacciato fra il 1930 ed il 1939.

Piemonte: 1976-2005; (3378); (3424); **Romagna:** 1976-2000; (3424); **Campania:** 1926-1950; (3199); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2000; (156); (3424); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (389); (3424).

54. - ***Luffia lapidella* (Goeze, 1783)** (forma bisessuale)

Nota - In **Italia** "oltre alla forma bisessuata (*L. lapidella* s.str.), è presente anche la forma partenogenetica, conosciuta come *L. lapidella* f. *ferchaultella* (Stephens, 1850)" (2905).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1014); (805); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 2001-2005; (3424); **Lazio:** 1926-1950; (1555); (2142); **Puglia:** 1976-2000; (2108); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 2001-2005; (3400); **Sicilia:** 1951-1975; (2046); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3055); **Sardegna:** 1926-1950; (1303); (1476).

55. - ***Bacotia claustrella* (Bruand, 1845)**

Nota - È riportata genericamente per il **Tirolo meridionale:** (2973); citazione da confermare.

Venezia Giulia: 1851-1900; (1060); **Toscana:** 1976-2005; (3424); **Calabria:** 2001-2005; (3400).

56. - ***Proutia betulina* (Zeller, 1839)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); **Toscana:** 1851-1900; (344); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2145); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Calabria:** 2001-2005; (3400); **Sicilia:** 1976-2000; (2949).

57. - ***Bruandia comitella*** **(Bruand, 1853)** (= *saxicolella* Bruand, 1853)

Piemonte: (1951-1975); (1943); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (2018); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1951-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (1943); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2000; (582); (3044); **Marche:** 1951-1975; (2085).

58. - **(?)** ***Bruandia reticulatella*** **(Bruand, 1853)**

Nota - È citata genericamente per il **Tirolo meridionale** (1324); non si hanno altri dati per l'**Italia**.

59. - ***Bruandia raiblensis*** **(Mann, 1870)**

Fumea raiblensis è descritta su esemplari del **Friuli:** Raibl (Cave del Predil) (Wiener Entomologische Monatschrift, 20: 40) (181).

Nota - È riportata genericamente per il **Piemonte**, la **Lombardia** e il **Tirolo meridionale** (1943); sole citazioni per queste regioni, da confermare.

Veneto: 1901-1925; 1951-1975; (661); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528).

60. - ***Psyche casta*** **(Pallas, 1767)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Abbazia della Ranversa 28.VI.1983 (astucci su platani) (PRN). **Lazio:** Monti Albani 5.VI.1941; Roma 29.V.1941 (PRN). **Calabria:** Donnici 8.VI.1995 (1f), 30.VI.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); 1976-2000; (1555); (2658); **Trentino:** (1901-1925); 1976-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2346); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2000; (518); (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (656); (3052); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); **Campania:** 1901-1950; (811); (1285); **Basilicata:** 1951-1975; (2108); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (70); (3400); **Sicilia:** (1976-2000); (2905): (2980); **Sardegna:** (1976-2000); (2905): (2980).

61. - ***Psyche crassiorella*** **(Bruand, 1850)** (= *subflavella* Millière, 1875)

Fumea subflavella è descritta su esemplari delle Alpi Marittime francesi e della **Liguria:** San Remo e Bordighera (207).

Nuovo dato - **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 30.V e 8.VI.1995 (femmine da astucci) (SCL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; (683); (747); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658);

Trentino: 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (390); (1958); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (446); (1943); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (207); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1579); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (319); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1975; (772); (3052); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1926-1950; (1285); (1350); **Puglia:** 1951-1975; (2108); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (833); (3400); **Sicilia:** (1976-2000); (2905): (2980); **Sardegna:** (1976-2000); (2905): (2980).

62. - ***Bijugis bombycella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1463); **Emilia:** 1976-2005; (3301); (3424); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3424).

63. - ***Bijugis pectinella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le segnalazioni di *B. pectinella* per l'**Emilia** e la **Romagna** vanno riferite a *Rebelia kruegeri* (3424). Probabilmente anche la citazione per la **Toscana:** (206), va riferita a *R. kruegeri.*

Piemonte: (1851-1900); (114); **Lombardia:** (1851-1900); (260); **Trentino:** 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114).

64. - ***Bijugis apistella*** **(Rebel, 1917)**

Psychidea apistella è descritta su esemplari dell'**Emilia:** Bologna, Modena, Montegibbio e della **Liguria** (Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, LXVII (5/6): (136)) (863).

Liguria: 1901-1925; (863); (1555); **Emilia:** 1851-1925; (302); (863).

65. - ***Reisseronia tarnierella*** **(Bruand, 1851)**

Veneto: 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528); (1959).

66. - ***Reisseronia hofmanni*** **(Heylaerts, 1879)**

Epichnopteryx hofmanni è descritta su un maschio della **Sicilia:** Palermo (Annales de la Société entomologique de Belgique, XXII. Comptes-Rendus des Séances, 4 oct.: CXXXIX) (250) & (Le Naturaliste, 1 (2): 3) (251).

Nota - È citata come presente in **Italia settentrionale** (2905); non si hanno altri dati per questo settore.

Calabria: 1901-1925; (1013); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1975; (250); (2046).

67. - ***Montanima karavankensis*** **(Höfner, 1898)**

Lombardia: 1901-1925; (807).

68. - ***Montanima venetiana*** **Meier, 1964**

Montanima venetiana è descritta su esemplari del **Veneto:** Monte Cavallo (Belluno), 1400-1800 m e della **Lombardia:** Val Brembana, Foppolo (BG), 1500-1900 m (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft, 49: 56) (1747).

Lombardia: 1951-1975; (1747); **Trentino:** 1901-1925; (1747); **Veneto:** 1951-1975; (1747); (1943).

69. - ***Rebelia sapho*** **(Millière, 1864)**

Nota - È riportata con dubbio per l'**Emilia:** (269) e la **Toscana:** (206); citazioni poco attendibili.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; (747); (797); **Lombardia:** 1851-1925; (260); (894); **Trentino:** 1926-1950; (1184); **Alto Adige:** 1851-1950; (244); (1184); **Veneto:** 1976-2000; (3289); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1780); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1780).

70. - ***Rebelia kruegeri*** **Turati, 1914** (= *marpessa* Sieder, 1947)

Rebelia kruegeri è descritta su esemplari della **Lombardia:** Valcamonica. Ossimo (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, 53: 577, fig. 1, 3, 5) (807).

Lombardia: 1901-1925; (807); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Emilia:** 1801-1900; (110); (269); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Lazio:** 1926-1950; (3052).

71. - **(?)** ***Rebelia majorella*** **Rebel, 1910**

Nota - È riportata genericamente per la **Liguria:** (1555); non si hanno altri dati per l'**Italia**.

72. - ***Rebelia surientella*** **(Bruand, 1858)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (894); (2658); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1975; (1038); (1572); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145).

73. - ***Rebelia herrichiella*** **Strand, 1912** (= *plumella* auct., nec Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per le Alpi Marittime, versante piemontese e versante ligure (114); dati non attendibili.

Trentino: 1851-1925; (171); (1053); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (2018); catturata dopo il 1970 (2973); **Lazio:** 1926-1950; (2142).

74. - **(?)** ***Rebelia styriaca*** **Rebel, 1937**

Nota - Le citazioni per l'**Italia** vanno confermate.

(?) **Alto Adige:** (1951-2000); (1647); (2973); (?) **Friuli:** (1926-1975);

(1425); (1528).

75. - ***Rebelia thomanni*** **Rebel, 1937**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2211); **Alto Adige:** 1951-1975; (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528).

76. - **(?)** ***Psychidea nudella*** **(Ochsenheimer, 1810)**

Nota - Si hanno solo vecchie citazioni, molto dubbie.

(?) **Valle d'Aosta:** 1851-1900; (797); (?) **Piemonte:** 1801-1850; (114); (?) **Lombardia:** 1851-1900; (260); (?) **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); (?) **Veneto:** 1851-1900; (446); (?) **Friuli:** 1851-1900; (181); (?) **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

77. - ***Epichnopterix plumella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pulla* Esper, 1785)

Nota - Le citazioni per la **Calabria** e la **Sicilia** sono da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (797); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1851-1925; (174); (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (262); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-1975; (1010); (3062); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (70); (3052); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (817); (2142); **Calabria:** (1801-1850); (70); (1555); **Sicilia:** 1851-1900; (144); (343); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

78. - ***Epichnopterix alpina*** **Heylaerts, 1900**

Piemonte: 2001-2005; (3378).

79. - ***Epichnopterix ardua*** **(Mann, 1867)**

Nota - Le citazioni per il **Veneto**, l'**Emilia** e la **Toscana** sono da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Trentino:** 1851-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1975; (445); (1647); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** (1926-1950); (1388); **Emilia:** 1851-1900; (314); **Toscana:** 1851-1900; (344).

80. - ***Epichnopterix montana*** **Heylaerts, 1900**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Trentino:** 1976-2000; (2211); **Alto Adige:** 1951-1975; (1958); (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-1975; (1528).

81. - **(-)** ***Epichnopterix montanella*** **Heylaerts, 1900**

Nota - Una citazione per il **Piemonte:** (797) molto dubbia; non si hanno altri dati per l'**Italia**.

82. - ***Epichnopterix pontbrillantella*** **(Bruand, 1858)** (= *turibulella* Fuchs, 1901)

Epichnopteryx turibulella è descritta su esemplari della **Lombardia** (442).

Lombardia: 1851-1925; 1976-2000; (442); (2658); **Friuli:** 1926-1975; (1528).

83. - **(-)** ***Epichnopterix sieboldii*** **Reutti, 1853**

Nota - Le citazioni per la **Lombardia** e l'**Alto Adige** sono da riferire a *E. plumella*.

84. - ***Epichnopterix kovacsi*** **Sieder, 1955**

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Alto Adige:** 1951-1975; (1820); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (1930); **Umbria:** (1976-2000); (3198).

85. - ***Oiketicoides febretta*** **(Boyer de Fonscolombe, 1835)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte:** (114), (293) ed il **Veneto:** (268), (446), sono poco attendibili.

Marche: 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Abruzzo:** 1851-1900; (344); **Campania:** 1901-1925; (811); **Calabria:** 1901-1925; (811); **Sicilia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (147); (2949); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-1950; (114); (1476).

86. - ***Oiketicoides lutea*** **(Staudinger, 1870)** (= *heylaertsii* Milliére, 1878; *sera* Wiskott, 1880)

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Riggio 20.VIII.1991; Mottola San Antuono 13.VIII.1977 (PRN). **Calabria:** Monte Moschereto 2.IX.2001; Laghi La Vota (CZ) 5m 5.IX.1997; Copanello 180 m 17.IX.1998 (SCL). **Sicilia:** Contrada Traversa 850 m 30.VII.1978; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 5.VIII.1978; Piana degli Albanesi 27.VIII.1979, 8.VIII.1988, 31.VIII.1989; Ficuzza 2.IX.1975; Mandria del Conte 5.VIII.1975 (PRN).

Abruzzo: 1851-1900; 1951-2000; (344); (2142); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (3298); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3298); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3128).

87. - ***Oiketicoides tedaldii*** **(Heylaerts, 1882)**

Acanthopsyche tedaldii è descritta su esemplari di Siria, Algeria e **Sicilia:** Anapo 1847 (astucci) (Annales de la Société entomologique de Belgique, XXVI; I. Comptes-Rendus des Séances, Sér. III, N. 19: CXXXIX; XIX) (283).

Calabria: 1976-2000; (2923); **Sicilia:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-

2000; (283); (2949).

88. - ***Acanthopsyche atra*** **(Linnaeus, 1767)** (= *opacella* Herrich-Schäffer, 1846)

Nota - La citazione per l'**Emilia:** Modenese (319), va riferita a *Ptilocephala agrostidis.*

Valle d'Aosta: 1926-1950; (1120); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 2001-2005; (188); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (260); (807); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-1975; (10); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Toscana:** 1751-1800; (19); **Lazio:** (1926-1950); (1388); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 1901-1925; (1013).

89. - ***Acanthopsyche ecksteini*** **(Lederer, 1855)**

Trentino: 1901-1950; (1038); (1438); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (1014); (1780).

90. - ***Acanthopsyche zelleri*** **(Mann, 1855)**

Lombardia: 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Veneto:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (2014); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1959); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (1014); (1780).

91. - ***Canephora hirsuta*** **(Poda, 1761)** (= *unicolor* Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** vanno confermate.

Nuovi dati - **Lombardia:** Brescia 5.V.1942 (DBR, PRN). **Puglia:** Chienti Scalo (FG) 24.VII.1988 (astucci) (PRN). **Basilicata:** Fiume Mercure 5.VII.1981 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 8.VI.1995 (astucci); Potame 1000 m 5.VI.1996 (1f); Monte Serratore 1200 m 11.VI.2000 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2005; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (146); (1572); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1943); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1851-1900; 1951-1975; (421); (1847); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3052); **Abruzzo:** 1851-1900; (344); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1901-1950; (1013); (1285); **Puglia:** 1976-2000; (2923); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (2923); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3400); **Sicilia:** 1851-1900; (247); (506).

92. - ***Pachythelia villosella*** **(Ochsenheimer, 1810)**

Nota - Secondo Hättenschwiler gli astucci della **Basilicata**: fiume

Mercure 5.VII.1981 segnalati in (2923) sono di *Canephora hirsuta*.

Nuovi dati - **Lombardia:** Brescia 5.V.1942 (DBR, PRN). **Campania:** Vesuvio 1000 m 15.VI.2000 (PRN). **Puglia:** Chienti (FG) 24.VII.1994 su *Quercus coccifera* (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 8.VI.1995 (1 maschio e astucci); Riace 22.VI.2002 (astucci); Cerisano 14.VIII.2000 (astucci); Lago di Tarsia 15.VI.2000 (astucci); Cosenza 18.VI.2000 (astucci); Diamante 6.VIII.2000 (astucci); Foce del Fiume Neto 19.V.2001 (SCL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (1943); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (932); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-1975; (110); (2029); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2142); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (811); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2923); **Basilicata:** 1976-2000; (2923); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (144); (1340).

93. - ***Oreopsyche tenella*** **(Speyer, 1862)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 2001-2005; (797); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (218); (661); **Trentino:** 1976-2000; (2211).

94. - ***Oreopsyche vorbrodtella*** **(Wehrli, 1920)**

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Trentino:** 1976-2000; (3021).

95. - ***Leptopterix hirsutella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *schiffermülleri* Staudinger, 1871)

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; (114); (797); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (617); (3024); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (3024); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Sardegna:** (1976-2000); (2905); (2980).

96. - ***Leptopterix plumistrella*** **(Hübner, 1793)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (244); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (390); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1647); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (1038); (1943); **Liguria:** (1801-1850); (114); (1555).

97. - ***Leptopterix dellabeffai*** **(Hartig, 1936)**

Lepidoscioptera dellabeffai è descritta su esemplari del **Piemonte:** Val Soana: Piamprato, 1600 m (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 : 35) (1291).

Piemonte: 1926-1975; (1291); (1850).

98. - ***Leptopterix sciopterella*** **(Hartig, 1936)**

Lepidoscioptera sciopterella è descritta su esemplari del **Piemonte:** Val Soana: Valprato, 1100 m (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15: 37) (1291).

Nota - La citazione come luogo tipico di *L. sciopterella* **Lombardia:** Primolano (*recte* Primaluna) (1555), è dovuta a uno scambio con *L. turatii. Lepidoscioptera sciopterella* Htg è posta in sinonimia di L. dellabeffai in (124), ma lo stesso Sieder, sull'estratto inviatomi, ha corretto scrivendo che in realtà è una buona specie.

Piemonte: 1926-1975; (1291); (1850).

99. - ***Leptopterix turatii*** **(Hartig, 1936)**

Lepidoscioptera turatii è descritta su esemplari della **Lombardia:** Valsassina: Primaluna (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 : 37) (1291).

Nota - È citata erroneamente per il **Piemonte:** (1555), per confusione con *L. sciopterella.*

Lombardia: 1901-1925; (1291).

100. - ***Ptilocephala silphella*** **(Millière, 1871)**

Piemonte: 1851-1925; (505); (797).

101. - **(-)** ***Ptilocephala malvinella*** **(Millière, 1858)**

Nota - Si ha una citazione per la **Sicilia:** (2362), molto dubbia; non si hanno altri dati per l'**Italia**.

102. - ***Ptilocephala albida*** **(Esper, 1787)** (= *tabanivicinella* Bruand, 1853)

Nota - È citata genericamente per l'**Italia** (2980) e per l'**Italia settentrionale** (2905). Citata per il **Lazio:** (1388); probabilmente per errore Mariani ha indicato il **Lazio** invece dell'**Abruzzo** che non cita, ma tale segnalazione potrebbe essere da riferire a *P. wockei* (3424). La citazione per la **Liguria:** (114) è in realtà per il "contado di Nizza". La citazione per le **Marche:** (385) è molto dubbia. Come *tabanivicinella* Bruand è segnalata per il **Piemonte**: Mont Gelas, 3000 m, Argentera, 3100 m, astucci VII.1923 (1031); citazione da confermare.

Emilia: 1976-2005; (3424); **Abruzzo:** 1901-1925; (772).

103. - ***Ptilocephala wockei*** **(Standfuss, 1882)**

Psyche wockei è descritta su esemplari di "**Italia centralis**" (Entomologische Nachrichten, VIII (23): 322) (286); *Psyche wockei* è ridescritta su esemplari di "Italia centralis, regio Romana", (**Lazio**) Monti Sabini a N di Roma, M.IV-E.V (Stettiner entomologische Zeitung, 45: 205) (312).

Nuovo dato - **Calabria:** Arcavata (Rende, CS), 250 m, 22.IV.1992

(SCL).

Romagna: 1976-2000; (3198); (3424); **Marche:** 1976-2000; (3424); **Lazio:** 1851-1975; (312); (2142); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); **Basilicata:** 1976-2000; (2923); **Calabria:** 1976-2000; (3424).

104. - ***Ptilocephala vesubiella*** **(Millière, 1872)**

Piemonte: 1901-1925; (747).

105. - ***Ptilocephala pyrenaella*** **(Herrich-Schäffer, 1852)** (= *tabanella* Bruand, 1853)

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1709); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378).

106. - ***Ptilocephala kahri*** **(Lederer, 1857)** (= *lucasi* Trautmann, 1909)

Psyche kahri è descritta su esemplari di **Puglia:** Bari e **Sicilia:** Messina (Wiener entomologische Monatschrift, 1: 80) (130).

Nota - Ghiliani riporta correttamente la citazione di Curò "Bari e **Sicilia**", però indica come regioni **Calabria** e **Sicilia**, regioni riportate anche da Perlini e da tanti altri; a seguito di questo errore la **Calabria** diventa il luogo tipico in (1555).

Nuovi dati - **Calabria:** Frascineto (CS): Colle Marcione, 1300 m, 2.IV.2000 (1 maschio) (SCL). **Sicilia:** San Mauro Castelverde (PA) 7.V.1970 (GRL).

Puglia: 1851-1900; (130); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1925; 1951-2000; (130); (2949).

107. - ***Ptilocephala muscella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *graminella* Vieweg, 1789)

Nota - Le citazioni di *P. muscella* per **Lazio**, **Campania**, **Arcipelago campano**, **Puglia**, **Calabria**, **Sicilia** e **Arcipelago siciliano** vanno riferite a *P. sicheliella*.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; (114); (747); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1475); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Toscana:** 1901-1925; (830); **Marche:** 1951-1975; (2085).

108. - ***Ptilocephala sicheliella*** **(Bruand, 1858)**

Psyche sicheliella è descritta su esemplari dell'**Italia meridionale**, inviati da Sichel (Annales de la Société entomologique de France, 3 ser., 6: 464) (134).

Nota - Sichel ha raccolto solo in **Sicilia,** che quindi è il luogo tipico, come indicato anche dal nome. Le antiche citazioni per la **Campania**, l' **Arcipelago campano** e la **Puglia**: (126), attendono conferma; va confermata anche la citazione per l' **Arcipelago siciliano**, essendo basata su un astuccio con i resti di una femmina, di incerta

determinazione (3226).

Piemonte: 1901-1925; (797); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Lazio:** 1976-2000; (2142); **Campania**: 1801-1850; (72); **Arcipelago campano**: 1801-1850; (72); **Puglia**: 1801-1850; (72); **Calabria**: 1801-1850; (70); **Sicilia:** 1801-1900; 1951-1975; (109); (1566); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226).

109. - ***Ptilocephala agrostidis*** **(Schrank, 1802)** (= *bicolorella* Boisduval, 1840; *angustella* Herrich-Schäffer, 1846)

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (1340) è poco attendibile.

Emilia: 1851-1925; 1976-2005; (377); (3424); **Toscana:** 1851-1900; (344).

110. - ***Ptilocephala plumifera*** **(Ochsenheimer, 1810)**

Nota - In **Italia centrale** è presente la ssp. *mediterranea* (Lederer, 1852). È citata per l'**Abruzzo:** Cerchio, astucci giovani di questa specie o di *Phalacropteryx apiformis* (553).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (218); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (215); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2441); **Alto Adige:** 1851-2000; (275); (2325); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** (1951-1975); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Toscana:** 1851-1900; (206); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-1975; (772); (2142); (?) **Abruzzo:** 1901-1925; (553).

111. - ***Megalophanes viciella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione di *vicinella* (sic!) per l'**Emilia:** (269) va riferita a *Canephora unicolor* (377).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; (114); (372); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1926-1975; (1106); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (2721); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (268); (2795); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060).

112. - **(-)** ***Megalophanes stetinensis*** **(Hering, 1846)**

Nota - *Psyche viadrina* (Staudinger, 1871) è ssp. di *Megalophanes stetinensis*; *P. viadrina* è citata per la **Sicilia**, ma tali citazioni sono dubbie, probabilmente da riportare a *M. turatii* (1555).

113. - ***Megalophanes turatii*** **(Staudinger, 1877)**

Psyche turatii è descritta su esemplari della **Lombardia:** Alserio (Brianza) (Entomologische Zeitung, Stettin, 38: 178) (238).

Nota - La citazione per la **Campania:** (1350) è errata, essendo un endemismo alpino.

Lombardia: 1851-1925; (238); (894).

114. - ***Phalacropterix apiformis*** **(Rossi, 1790)**

Bombyx apiformis è descritta su esemplari della **Toscana**: "provincies florentina et pisana, habitat in locis silvestribus, rara" (Fauna Etrusca, sistens Insectaque in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit Paulus Rossius, II: 178, n. 1105, tav. 8, fig. 2) (19).

Nota - Milliére (245) dice di avere illustrato il tipo di *Psyche apiformis* proveniente dai dintorni di Napoli.

Nuovi dati - **Lazio:** Acilia 26.V.1939; Monti Albani 8.VI.1941 (DBR, PRN).

Piemonte: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3183); **Friuli:** 1951-1975; (2046); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (661); (1780); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3332); **Emilia:** 1851-1925; (262); (893); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3332); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3310); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3332); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2142); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1851-1925; (207); (811); **Puglia:** 1976-2000; (2923); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (2923); **Calabria:** 1976-2005; (3400); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (2949); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (1476).

115. - ***Phalacropterix graminifera*** **(Geoffroy, 1785)**

Piemonte: (1926-1950); 2001-2005; (1388); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1787); **Trentino:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1787); **Veneto:** 1951-1975; (1787).

116. - ***Phalacropterix praecellens*** **(Staudinger, 1870)** (= *calberlae* Heylaerts, 1890)

Valle d'Aosta: 2001-2005; (3378); **Piemonte:** (1901-1925); 2001-2005; (569); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1851-2000; (362); (2273); **Alto Adige:** 1851-1950; (445); (1475); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1959); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (1014); (1647).

117. - ***Phalacropterix graslinella*** **(Boisduval, 1852)**

Piemonte: 1901-1925; (621); **Lombardia:** 1851-1925; (260); (621); **Trentino:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; (1053); (1958); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085).

118. - **(?)** ***Loebelia crassicornis*** **(Staudinger, 1870)**

Nota - È citata per l'**Italia peninsulare:** (2905), (2980). Si ha una sola citazione per la **Puglia:** Brindisi (Erber, 1872) (1361); molto dubbia o presenza accidentale.

119. - ***Sterrhopterix fusca*** **(Haworth, 1809)** (= *hirsutella* Hübner,

1796)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2000; (218); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (273); (2795); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Emilia:** (1851-1900) 2001-2005; (262); (3424).

120. - ***Sterrhopterix standfussi*** **(Wocke, 1851)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1901-2000; (3090); (3293); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528).

121. - ***Apterona helicoidella*** **(Vallot, 1827)** (= *helix* Siebold, 1850) (partenogenetica)

Nota - La citazione per la **Sicilia:** "(*helix*) visto solo i astucci eliciformi" (343) è da confermare.

Nuovi dati - **Calabria:** Mirto-Crosia (CS) 80 m 20.VIII.2000 (astucci); Caloveto (CS) 250 m 15.VII.1998 (astucci); Lago di Tarsia (CS) 90 m 15.VI.2000 (astucci); Donnici (CS): Fiego 500 m 15.VII.1998 (astucci); Copanello 20.X.2001 (astucci); Ponte Calderaio (CZ) 100 m 29.VI.2001 (astucci); Stazione di Ferruzzano (RC) 10 m 21.VI.2001 (astucci); Monasterace Marina (RC) 20 m 10.VI.2001 (SCL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1478); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (164); (734); **Trentino:** 1926-1950; 1976-2000; (1438); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (2018); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (373); (1060); **Liguria:** 1851-1900; (419); **Emilia:** 1976-2000; (2482); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2142); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-1950; (344); (2142); **Campania:** 1901-1975; (1013); (1464); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3400).

122. - ***Apterona helicoidella*** **f.** ***crenulella*** **(Bruand, 1853)** (bisessuata)

Valle d'Aosta: 1901-1925; (659); **Piemonte:** 1901-1925; (797); (747); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (334); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (334); (3021); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (413); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (471); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2482); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; (334); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Arcipelago campano:** 1851-1900; (334); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Sardegna:** 1926-1950; (1476).

123. - ***Apterona helicinella*** **(Herrich-Schäffer, 1845)**

Psyche helicinella è descritta su esemplari di **Sicilia** (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, Bombyx, 2 (1): 21, Tav. 20, fig. 108) (100*).

Nota - Nel Museo di Vienna sono presenti 4 esemplari della **Sicilia**, dei quali 2 sono stati catturati da Grohmann nel 1836 (uno a Palermo) e gli altri due da Mann nel 1858 (334).

Lombardia: 1851-1900; (260); **Campania:** 1901-1925; (1013); **Basilicata:** 1976-2000; (2923); **Calabria:** 1901-1925; (811); (1013); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1975; (100*); (2046).

124. - ***Apterona stauderi*** **Wehrli, 1923**

Apterona stauderi è descritta su esemplari della **Calabria:** Aspromonte, verso la vetta (Societas Entomologica, 38 (7): 25, fig. 1) (1008).

Nuovo dato - **Calabria:** Pollino, Colle Marcione, 1400 m, 10.VI.2001 (numerosi adulti e astucci) (SCL).

Basilicata: 1951-1975; (2108); **Calabria:** 1901-1925; 2001-2005; (1008).

125. - ***Eumasia parietariella*** **(Heydenreich, 1851)**

Nota - La citazione per la **Romagna** va confermata (2516). Le citazioni generiche per la **Sicilia:** (1388) e la **Sardegna:** (1388), (3451); sono poco attendibili.

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Trentino:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2211); **Alto Adige:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3024); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1976-2000; (2518) (3451); **Abruzzo:** (1976-2000); (3451); **Calabria:** 2001-2005; (3451).

Fam. Limacodidae

126. - ***Apoda limacodes*** **(Hufnagel, 1766)** (= *testudo* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 7.VII.1983 (GRL). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 3.VII.1974 (GLL, PRN). **Liguria:** Andora 11.VI.1985 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 25 e 28.VI.1976 (GRL), **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 1.VI.1982. **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Terranova 16 e 18.VI.1982, 6.VI.1981; Rotonda 20.VI.1982, 19.V.1979, 21.VI, 16.VII.1980 (PRN); Fiume Noce (PZ) (5 km dalla foce) 20 m, 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località

Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Vallone Colloreto 6.VI.1981; Monte Moschereto 15.VII.1982; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (377); (2346); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1900; 1976-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2732); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2145); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3386); **Abruzzo:** 1976-2005; (2142); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 2001-2005; (99); (1183); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2108); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2732); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (196); (3247).

127. - ***Heterogenea asella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Sardegna** e quelle generiche per l'**Abruzzo** e la **Calabria** sono molto dubbie, da confermare.

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (3007); **Trentino:** (1926-1950); (1388); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); **Veneto:** 1951-2005; (2014); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2710); **Emilia:** 1976-2000; (2482); **Romagna:** 1976-2000; (2270); (3007); **Toscana:** (1851-1900); 2001-2005; (313); (3462); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1976-2000; (3268); **Abruzzo:** (? 1976-2000); (2732); **Campania:** 1851-1900; (298); **Calabria:** (1851-1900); (156); **Sardegna:** 1851-1900; (331).

128. - ***Heterogynis penella*** **(Hübner, 1819)**

Nota - La citazione di *H. penella* per la **Basilicata:** (2274) va riferita a *H. eremita*. La citazione per la **Romagna:** (2516) è un probabile errore di cartellinatura (3007). È citata con dubbio per la **Toscana:** (218). Dubbia anche la citazione per la **Sardegna:** "Monte Limbara (patria dubia!)" (3323). È riportata come presente nel **Trentino:** (2732), citazione da confermare.

Piemonte: 1851-1950; 1976-2005; (218); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** (1976-2000); (2732); **Veneto:** 1951-2000; (1796); (3323); **Friuli:** 1951-1975; (3368); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3210); **Lazio:** 1901-1925; (807); **Abruzzo:** 1926-2005; (2142); (3415).

129. - ***Heterogynis eremita*** **Zilli, Cianchi, Racheli & Bullini, 1988**

Heterogynis eremita è descritta su esemplari della **Basilicata:** Pollino, Timpone della Capanna, 1600-1800 m (Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 6 (1): 1) (2545).

Nuovo dato - **Calabria:** Monte Pollino (CS) 20.VII.1984; Monte Moschereto 29.V.2002 (1 maschio) (SCL).

Basilicata: 1951-2000; (2274); (2545); **Calabria:** 1976-2005; (3415).

Fam. Zygaenidae

130. - ***Theresimima ampellophaga*** **(Bayle-Barelle, 1808)** (misspelling: *ampelophaga*)

Nota - La specie, quasi estinta a seguito delle continue distribuzioni di insetticidi nei vigneti, sta ricomparendo in varie regioni.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3129); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1851-1900; (166*); (3129); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); estinta (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (204); (2573); **Friuli:** 1901-1925; (990); **Liguria:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (46*); (3140); **Emilia:** 1801-1950; (110); (1310); **Romagna:** 1926-2000; (1235); (3129); **Toscana:** 1751-2000; (19); (3210); **Arcipelago toscano:** 1926-1975; (1410); (1490); **Umbria:** 1926-2000; (1457); (2453); **Marche:** 1926-1950; (1310); (1457); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1950; 1976-2000; (990); (3129); **Campania:** 1851-1900; (233); **Puglia:** 1801-1925; (70); (990); **Basilicata:** 1901-1925; (990); **Calabria:** (1851-1900); (156); **Sicilia:** 1851-1925; (323); (609); **Sardegna:** (1926-1950); (1169).

131. - ***Rhagades pruni*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La specie indicata come *Procris pruni* da Rossi (19) in realtà è *Theresimima ampellophaga* (63). Le citazioni per la **Toscana** e la **Sicilia** sono poco attendibili (3129).

Piemonte: 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1801-1900; (79*); (164); **Trentino:** 1851-1925; 1976-2000; (171); (3129); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (3129); **Veneto:** 1801-1900; 1976-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1851-1900; 1926-1950; (262); (1407).

132. - ***Adscita alpina*** **(Alberti, 1937)**

Procris alpina è descritta su esemplari di Svizzera e **Alto Adige:** Ortles, Trafoi, Franzenshöhe, 2000 m, Stilfser-Joch-Strasse, Stelvio, 2000-2400 m (Entomologische Zeitschrift, 50: 435, p. 515 figg. B 1-4) (1301).

Nota - Le citazioni di *A. alpina* ssp. *italica* per **Emilia**, **Romagna**, **Toscana**, **Marche**, **Abruzzo**, **Molise**, **Campania**, **Puglia**, **Basilicata**, **Calabria** e **Sicilia**, vanno riferite ad *A. italica*.

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1407); (3145); **Piemonte:** 1851-1950; 1976-2005; (2424); (3378); **Lombardia:** 1926-2000; (1310); (3073); **Trentino:** 1926-2000; (1407); (3129); **Alto Adige:** 1926-2000; (1301); (3129); **Veneto:** 1926-2000; (1788); (3195); **Friuli:** (1951-1975); (1943); **Liguria:** 1951-2000; (2284); (3183).

133. - ***Adscita italica*** **(Alberti, 1937)**

Procris alpina r. *italica* è descritta su esemplari della **Toscana:** collina e **Calabria:** Montalta (*recte* Montalto) (Entomologische Zeitschrift, 50: 438) (1301).

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 4-6.VII.1981, 20.VI.1982; Monte Pollino 1700 m 25.VI.1983 (PRN); Cozzo del Pellegrino 4.VIII.1996; Piani del Pollino 1850 m 11.VI.1997 (SCL). **Calabria:** Sila: Camigliatello 30.VI.1991 (PRN). **Sicilia:** Etna 23.VII.1992 (1f) (coll. Giuliano); Etna N: Pineta di Linguaglossa 20.VI.1993 (GRL); Linguaglossa: Bosco Ragabo 1400 m 15.VII.1992, Piano Provenzano 1600 m 12.VII.1997 (PRN).

Piemonte: 1976-2005; (3461 bis); **Alto Adige:** 1976-2000; (2173); **Emilia:** 1926-1950; (1407); **Romagna:** 1951-2000; (1788); (2423); **Toscana:** 1926-2005; (1301); (3310); **Marche:** 1926-2000; (1407); (3129); **Lazio:** 1926-2000; (1407); (3195); **Abruzzo:** 1926-2000; (1407); (3195); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1976-2000; (2274); **Basilicata:** 1951-2000; (2173); (2274); **Calabria:** 1926-2000; (1301); (3195); **Sicilia:** 1976-2000; (2949); (3129).

134. - ***Adscita statices*** **(Linnaeus, 1758)** (= *micans* Freyer, 1831)

Nota - Le citazioni per **Marche**, **Lazio**, **Campania**, **Calabria** e **Sicilia** vanno riportate a *A. manni*. La presenza di *A. statices* è stata accertata solo in **Piemonte:** Sorgenti del torrente Maira (CN) 1400 m 18.VII.1985 (3129); **Liguria:** Colla Melosa 1500 m 27.VI.1976 (2284), **Friuli:** Monte Festa, Monte San Simeone, Val Cellina (PN) E.VI-E.VIII, Sella Nevea (UD) 900 m 26.VI.1991, 1150 m 21.VI.1997 (3129); **Venezia Giulia:** Basovizza, Altopiano della Bainsizza (2284). Le altre citazioni per l'Italia settentrionale sono da confermare, potrebbero riferirsi a *A. alpina*.

Piemonte: (?) (1751-1800); (?) (1851-1950); 1976-2000; (20); (747); **Lombardia:** (?) (1851-1950); (164); (1238); **Trentino:** (?) (1851-1950); (1038); (1190); **Alto Adige:** (?) (1851-1950); 1951-2000; (146); (2173); **Veneto:** (?) (1851-1950); (98); (1081); **Friuli:** (?) (1851-1900); (?) (1926-1950); 1951-2000; (174); (3129); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2284); **Liguria:** (?) (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183);

Emilia: (?) (1851-1925); (110); (1004); **Romagna:** (?) (1901-1925); (1010); **Toscana:** (?) (1751-1800); (?) (1851-1925); (19); (933).

135. - ***Adscita geryon*** **(Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta: 1901-1950; (659); (1459); **Piemonte:** 1851-1900; 1926-2005; (114 bis); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1950; (215); (1407); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (244); (3140); **Friuli:** 1976-2000; (3129); **Liguria:** (1976-2000); (2370); **Emilia:** 1976-2000; (3140); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (933); (3129); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3129); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); **Calabria:** 1901-1925; (1013); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (271); (3129).

136. - ***Adscita albanica*** **(Naufock, 1926)**

Piemonte: 1976-2000; (2558); **Trentino:** 1951-2000; (2014); (3293); **Veneto:** 1926-1950; 1976-2005; (3129); (3380); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1636); **Liguria:** 1951-2000; (2219); (3183); **Marche:** 1976-2000; (3129); **Lazio:** 1976-2000; (3129); **Abruzzo:** 1951-1975; (1801); **Campania:** 2001-2005; (3457); **Basilicata:** 1951-1975; (2274); **Calabria:** 1951-1975; (2219).

137. - ***Adscita mannii*** **(Lederer, 1852)** (= *crassicornis* Staudinger, 1862)

Ino crassicornis è descritta su esemplari della Toscana: Livorno (153).

Nuovi dati - **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Mellitto 28.V.1982; Pulo di Altamura 30.V.1977 (PRN). **Basilicata:** Moliterno 800 m 16.VI.1967; Ofanto 300 m 2-26.V.1976; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Pollino: Cropani 6.VI.1981 (PRN); Vulture (PZ): Monticchio laghi 23-31.V.1966 (coll. Tarmann). **Calabria:** Oriolo-Cersosimo 9.VI.1978; Pollino: Anticristo 10.VI.1978; Fossiata 24.VII.1979; Lago Ampollino 27.V.1973 (PRN); Sila: Camigliatello 30.VI.1991; Donnici (CS) 5.VII.1991; Carolei (CS) 400 m 12.VII.1997 (SCL).

Valle d'Aosta: (1926-1950); 1976-2000; (1310); (3145); **Piemonte:** 1901-1950; 1976-2005; (684); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (273); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3129); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** (1851-1900); 1926-2000; (218); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3129); **Liguria:** 1926-2000; (1407); (3183); **Emilia:** 1901-2005; (501); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (153); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1901-2000; (847); (1885); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3194); **Abruzzo:** 1926-2000; (1407); (3305); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3457);

Puglia: 1951-2000; (2108); (3129); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3265); **Calabria:** 1801-1850; 1901-2000; (70); (3193); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (139*); (3129).

138. - ***Jordanita budensis*** **(Speyer & Speyer, 1858)** (=*cuprea* Rambur, 1866)

Nota - Le citazioni di *J. budensis* per **Emilia**, **Romagna**, **Abruzzo**, vanno riferite a *J. tenuicornis* (344). La citazione per il **Trentino:** (1714) è errata in quanto gli esemplari di *budensis* della collezione Daniel sono in realtà piccole *J. globulariae* (2558). La citazione per il **Veneto:** (2051) è da confermare. La specie è confermata per la **Venezia Giulia** e la Sila (**Calabria**) in base a materiale determinato con i genitali (2142). Non rinvenuta in **Italia** (2370).

Piemonte: 1976-2005; (2558); (3378); **Alto Adige:** 1951-1975; (2558); (3129); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1976-2000); (1060); (2558); **Calabria:** 1951-1975; (2142).

139. - **(-)** ***Jordanita volgensis*** **(Moeschler, 1862)**

Nota - La citazione per la **Sicilia** di *P. volgensis* var. *hector* (1388) è certamente errata; *J. hector* (Jordan, 1907) è buona specie di Turchia.

140. - ***Jordanita notata*** **(Zeller, 1847)**

Atychia notata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa (Isis, 40 (4): 294) (109).

Nota - Le citazioni di *J. notata* per l'**Italia centrale** sono dubbie, tranne quella di (1407).

Nuovo dato - **Lazio:** Fondi: Campo di Mele 8.VI.1937 (coll. Tarmann).

Lombardia: 1926-1950; (1310); **Trentino:** 1926-1975; (1310); (1943); **Veneto:** 1976-2000; (3129); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3129); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3129); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1407); (2558); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3062); **Toscana:** 1901-1950; (1407); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1926-1950; (1310); (1407); **Abruzzo:** 1926-2000; (1407); (3305); **Campania:** 1976-2005; (3265); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2274); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3129).

141. - **(?)** ***Jordanita algirica*** **(Rothschild, 1917)**

Nota - Presso il Museo di Zoologia Alexander Koenig di Bonn è conservato un esemplare etichettato **Sicilia**, 1905 (2841); da confermare.

142. - ***Jordanita chloros*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la **Sicilia:** (609) è poco attendibile.

Piemonte: 1951-2005; (3129); (3378); **Lombardia:** 1801-1850; 1976-2000; (71*); (3129); **Trentino:** 1926-1950; (1190); (1714); **Alto**

Adige: (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3129); **Veneto:** 1926-1975; (2051); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3129); **Liguria**: 1976-2000; (3384 bis); **Emilia:** 1851-1975; (377); (1459); **Abruzzo:** 1851-1950; (344); (1459).

143. - ***Jordanita tenuicornis*** **(Zeller, 1847)**

Atychia tenuicornis è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa e Ispica (Isis, 40 (4): 293) (109).

Nota - Le citazioni per **Piemonte**, **Liguria**, **Emilia**, **Romagna** e **Toscana**, sono errate; è esclusa la presenza al Nord delle **Marche** (3140).

Nuovi dati - **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 22.VI, 22.VI.1969; Grotticelle 21.V.1968; Sellata: La Maddalena 26.VI.1969; Pietrapertosa 15.VI.1977; Pollino: Fiume Mercure 26.VII.1982; Rotonda 28.VI.1994 (PRN). **Calabria:** Serra Juncaria 1700 m 20.VI.1971; Crotone 100 m 29.V.1973; Lago Ampollino 1400 m 7-11.VI.1978; Oriolo-Cersosimo 9.VI.1978 (PRN); Longobucco: Vallone dei Ronzi 560 m 27.V.1997, Macrocioli 1150 m 27.V.1997; Donnici (CS) 560 m 26.VI.1989; Pollino: Colle del Dragone 16.VII.1980 (SCL). **Sicilia:** Madonie: Piano Zucchi 16.VI.1991 (PRN).

Marche: 1901-1950; 1976-2000; (933); (2538); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (319); (3194); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (524); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (3129); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (811); (3140); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (1459).

144. - ***Jordanita globulariae*** **(Hübner, 1793)**

Nota - Un esemplare di *'tenuicornis'* di Firenze della collezione Herrich-Schäffer è in realtà *globulariae* (116). È citata una (? *cognata* H.-S.) "le antenne pettinate dei maschi hanno dei rami molto lunghi" Amalfi: San Cataldo 24.V, 10.VI.1931 (1285), che probabilmente è questa specie.

Piemonte: (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1950; (171); (1572); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (410); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1459); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1407); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1926-2000; (110); (3129); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** 1801-1950; 1976-2005; (190); (3429); **Marche:** 1926-2000; (1407); (3129); **Lazio:** 1926-2000; (1407); (3417); **Campania:** 1801-1850; 1976-2005; (70); (3457); **Basilicata:** (1951-1975); (1943); **Calabria:** (1801-1850); (70); **Sicilia:** 1851-1950; (271); (1300).

145. - ***Jordanita subsolana*** **(Staudinger, 1862)** (= *cognata* Rambur,

1858, nec Herrich-Schäffer, 1847)

Nuovo dato - **Sicilia:** Gibilmanna 16.VI.1991 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1926-2005; (1407); (3378); **Alto Adige:** 1851-2000; (275); (3129); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2207); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3129); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (933); (3310); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (3129); **Lazio:** 1851-1950; 1976-2000; (344); (2142); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (2142); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1951-2005; (2923); (3457); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3265); **Calabria:** 1901-2000; (1310); (3129); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (354); (3129).

146. - ***Aglaope infausta*** **(Linnaeus, 1767)**

Piemonte: 1801-1850; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (2362); **Alto Adige:** 1901-1925; (566); **Liguria:** (1801-1850); (114).

147. - ***Zygaena sarpedon*** **(Hübner, 1790)**

Nota - Le citazioni di *Z. sarpedon* per **Lazio** e **Campania** vanno riferite a *Z. punctum.*

Piemonte: 1851-2005; (2603); (3378); **Liguria:** (1851-1900); 1901-2000; (2603); (3183).

148. - **(-)** ***Zygaena contaminei*** **Boisduval, 1834)**

Nota - Le citazioni di *Z. contaminei* per il **Veneto**, l'**Emilia** e la **Sicilia** sono da riferire a *Z. punctum.*

149. - ***Zygaena punctum*** **Ochsenheimer, 1808**

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura 30.VI.1979; Noci (BA) 1.V.1977; Statte 13.V.1968; San Paolo 24.VI.1966, 22.VI.1975; Parco delle Pianelle 10.VI.1968, 24.VI.1976; Monte Camplo 13.VI.1969, 30.VI.1980; gravina di Laterza (TA) 27.V.1976; gravina di Massafra 18.V.1971. **Basilicata:** Fiume Camastra 30.V.1976, 27.V.1975; Pollino: sorgente Acquafredda 10.VI.1982; Belvedere radura di faggeta 16.VII.1980. **Calabria:** Oriolo 20.VI.1982; Pollino: Acquatremola 4.VI.1981; Civita 18.VI.1976 (PRN).

Piemonte: 1851-1900; (114 bis); **Alto Adige:** 1851-1925; (157); (1024); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (367); (3129); **Friuli:** 1976-2000; (3129); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3129); **Liguria:** 1801-1900; 1926-1950; (114); (2621); **Romagna:** 1851-1900; 1976-2000; (262); (3129); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2000; (206); (3129); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2621); **Marche:** 1901-2000; (847); (3129); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (3129); **Arcipelago pugliese:** 1976-2000; (2170);

Basilicata: 1976-2000; (2108); (2621); **Calabria:** 1951-2000; (1825); (2621); **Sicilia:** 1801-2000; (59); (3129).

150. - ***Zygaena corsica*** **Boisduval, 1828**

Nota - La citazione di Zuccarello per **Sicilia:** dintorni di Catania: (106), è molto dubbia; probabilmente è una varietà di *Z. trifolii* (343).

Sardegna: (1801-1850); 1901-2000; (88); (3210); **Arcipelago sardo:** 1851-1900; (290).

151. - ***Zygaena cynarae*** **(Esper, 1789)**

Nota - La citazione per il **Lazio** è da confermare.

Piemonte: 1751-1850; 1901-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (3273); **Trentino:** 1851-2000; (381); (3129); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2621); **Veneto:** 1951-2005; (2014); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (1587); (3129); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (650); (3129); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (262); (3129); **Romagna:** 1926-2000; (1179); (3129); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (448); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2163); **Lazio:** 1801-1850; (73).

152. - **(-)** ***Zygaena laeta*** **(Hübner, 1790)**

Nota - Le citazioni di *Z. laeta* per **Trentino**, **Alto Adige**, **Veneto**, **Venezia Giulia**, **Toscana**, sono da riferire ad altra specie.

153. - **(-)** ***Zygaena brizae*** **(Esper, 1800)**

Nota - Le citazioni di *Z. brizae* per **Valle d'Aosta**, **Piemonte**, **Trentino**, **Alto Adige**, **Venezia Giulia**, **Liguria**, vanno riportate a *Z. vesubiana* (2370). "Pietro Calcara - omissis - cita *Z. lathyri*, cha sarebbe la *brigae* (sic!) Esper, che non esiste in **Sicilia**" (2693). Da notare che *lathyri* Boisduval è sinonimo di *Z. purpuralis* Brünnich, ed è più probabile che a questa specie si riferisse il Calcara.

154. - ***Zygaena vesubiana*** **Le Charles, 1933**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1851-2000; (797); (3129); **Trentino:** 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1900; 1926-1950; (170); (1140); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1140); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (2370); (3183).

155. - ***Zygaena rubicundus*** **(Hübner, 1817)**

Sphinx rubicundus è descritta su esemplari di **Italia centrale** e **meridionale** (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 2, tav. 30, fig. 137) (23*).

Nota - Le citazioni di *Z. rubicundus* per la **Sicilia** vanno riferite a *Z. erythrus* (1069).

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura 20.VI.1980; Mellitto 28.V.1982 (PRN). **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 243.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Colle Calderaio (CS) 1140 m 9.VI.1999; Timpa di San Lorenzo 1000 m 29.VI.1996 (SCL).

Emilia: 1901-1925; (525); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3129); **Toscana:** 1976-2005; (3129); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2621); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (3129); **Lazio:** 1801-2000; (88); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3010); **Molise:** 1976-2000; (2621); (3173); **Campania:** 1851-1950; 1976-2005; (314); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2621); **Basilicata:** 1901-1925; 1951-2000; (733); (2108); **Calabria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (88); (3129).

156. - ***Zygaena erythrus* (Hübner, 1806)** (= *saportae* Boisduval, 1829)

Sphinx erythrus è descritta su esemplari della **Campania:** dintorni del Vesuvio (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 2 (Sphinges): 77, n. 1, Tav. 18, fig. 87) (23*). *Zygaena saportae* è descritta su esemplari di **Sicilia** (61*), (1812).

Nota - È citata con dubbio per l'**Alto Adige:** (170); non è presente nella regione (1038).

Nuovi dati - **Puglia:** Mellitto 11.VI.1981; Pulo di Altamura 30.VI.1979; Torre a Mare ex l. 5.VI.1969; Noci 29.VI.1997; Pianelle 24.VI.1976, 23.VI.1974, 22.VI.1975, 10.VI.1969; Monte Camplo 13.VI.1969. **Basilicata:** Monte Caperino 6.VI, 30.VII.1972, 9.VII.1975, 16.VII.1976; Pietrapertosa 27.VII.1974, 18.VII.1971; fiume Camastra 27.VI.1975, 27.VI.1976; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 26.VI.1976; Sellata: La Maddalena 28.VII.1974; Vulture (PZ) 23.VI.1968; Ofanto 22.VI.1969; Pollino: Fiume Mercure 7.VII.1981; San Severino: Serra Cappellina 6.VII.1981; Noepoli 4.VII.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Pollino: Campotenese 20.VII.1974; Civita 31.V.1972, 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; (414); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (2658); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2621); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3129); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (206); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (2621); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3129); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (23*); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (3129); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3265); **Calabria:** 1801-1850; 1926-2000; (70); (2621); **Sicilia:** 1801-1925; 1976-2000; (61*); (2949).

157. - ***Zygaena minos* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni di *Z. minos* per **Piemonte** e **Liguria** in (114) e quelle per **Campania, Arcipelago campano** e **Puglia,** vanno riferite a *Z. romeo*. Le citazioni di *Z. minos* per il **Trentino** e la **Sicilia** vanno riferite a *Z. purpuralis*. La località Garessio, citata per

la **Liguria:** (2370), è in **Piemonte**. La ssp. *saccarella* è di *Z. osterodensis* e non di *minos* (3031); pertanto le citazioni per la **Liguria** in (2123), (2825) vanno riferite a *Z. osterodensis*.

Piemonte: 1901-1925; (2318); **Lombardia:** 1976-2000; (2370); **Alto Adige:** 1851-1900; 1976-2000; (146); (3273); **Veneto:** 1926-2005; (2621); (3380); **Liguria:** 1901-1925; (880 bis); (2621); **Toscana:** 1851-1900; (190); **Lazio:** 1951-1975; (2318); **Abruzzo:** 1951-2000; (2555); (2621); **Molise:** 1951-2000; (2318); (2621); **Basilicata:** 1976-2000; (2370); **Calabria:** 1976-2000; (2318); (2621).

158. - ***Zygaena purpuralis*** **(Brünnich, 1763)**

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura 30.VI.1979. **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 20.VI.1982. **Calabria:** Pollino: Anticristo 10.VI.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3129); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2318); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2555); **Veneto:** 1851-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3129); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3129); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2621); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (190); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (3129); **Marche:** 1901-2000; (847); (3129); **Lazio:** 1901-2000; (699); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (414); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (72); (3457); **Arcipelago campano**: 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (72); (2108); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (3265); **Calabria:** (1751-1800); 1851-1950; 1976-2000; (18); (2555); **Sicilia:** 1851-2000; (133); (3083).

159. - **(-)** ***Zygaena sedi*** **Fabricius, 1787**

Nota - È citata per il **Veneto:** dintorni di Vicenza (129), (161); identificazione errata.

160. - ***Zygaena orana*** **Duponchel, 1835**

Sardegna: (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (374); (2451); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2374); (3129).

161. - ***Zygaena hylaris*** **Ochsenheimer, 1808**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna:** Barbagia, Ololai (*recte* Ollolai) (114), (319), sono da riferire ad altra specie.

Nuovi dati – **Liguria:** (ssp. *chrysophaea* Le Ch.) Carmo Longan 20.VII.1975; Fontana Povera 18.VI.1976; (ssp. *milae* Storace) Linguegliettа (IM) 4.VII.1976 (CMC, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-2005; (114); (3378); **Liguria:** 1851-2000; (218); (3183).

162. - ***Zygaena fausta*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - È citata per il **Veneto:** (81), (98), (161); mai incontrata nel padovano, probabilmente la *Z. fausta* di Contarini e Disconzi è una varietà di *Z. onobrychis* (204). La *Z. fausta* citata da Tognoli per l'**Emilia** va riferita ad una varietà di *Z. carniolica* (377).

Piemonte: 1801-2005; (114); (3378); **Trentino:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Liguria:** 1851-1900; 1951-2000; (314); (1451).

163. - ***Zygaena carniolica*** **(Scopoli, 1763)** (= *onobrychis* Fabricius, 1794)

Nota - Le segnalazioni per la **Sardegna** di *Z. carniolica* ssp. *sardoa* vanno riferite a *Z. orana*.

Nuovi dati - **Campania:** Napoli 4.VII.1981. **Basilicata:** Noepoli 4.VII.1981; Sellata: La Maddalena 20 e 28.VII.1974; Pietrapertosa 27.VII.1974, 18.VII, 12.VIII.1971; Monte Caperino 16.VII.1976, 9.VII.1975; fiume Camastra 26-27.VI, 9.VII.1975; Ofanto 22.VI.1969; Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Cropani 6.VII.1981; fiume Mercure 7.VII.1981; San Severino 6.VII.1980; Serra Cappellina: San Severino 6.VII.1981. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) (r. calabricola Vrty.) 3.VII.1972; Pollino: Cozzo Vardo 9.VII.1972; Campotenese 9.VII.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3129); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-2000; (6); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3129); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3129); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (2621); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (824); (3129); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1926-2000; (604); (2621); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (3129); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (70); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (72); (3129); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3265); **Calabria:** 1901-2000; (722); (3129); **Sicilia:** 1851-1925; (340); (3129).

164. - ***Zygaena occitanica*** **(de Villers, 1789)**

Nota - La citazione per il **Regno di Napoli:** (70), è certamente errata. La citazione per il **Piemonte:** (797) non è attendibile o la specie si è estinta nella regione (3378). Citata per l'**Emilia:** (377); molto probabilmente è stata confusa con altra specie.

Lombardia: 1926-1950; (1279); **Liguria:** 1851-2000; (2603); (3210).

165. - ***Zygaena loti*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *fulvia*

Fabricius, 1776; *achilleae* Esper, 1780)

Nota - È citata per la **Sicilia:** Termini Imerese (94), Ficuzza (209); forse si tratta di *Z. filipendulae* (2693).

Nuovi dati - **Puglia:** Mellitto 28.V.1982. **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 28.VI.1979; Pollino: San Severino: Serra Cappellina 900 m 6.VII.1981. **Calabria:** Pollino: Anticristo 10.VI.1978; Monte Moschereto 20.VI.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1298); (3144); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (239); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3129); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3129); **Veneto:** 1851-2005; (204); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (650); (3129); **Liguria:** 1801-1850; 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (190); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2621); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2516); **Lazio:** 1901-2000; (733); (2424); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2621); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (742); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (1985); (2963); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3265); **Calabria:** 1951-2000; (2108); (3129).

166. - ***Zygaena oxytropis* Boisduval, 1828**

Zygaena oxytropis è descritta su esemplari di **Piemonte**, **Toscana:** Firenze e **Lazio:** Roma (Essay sur une Monographie des Zygénides: 89, Tav. 5, fig. 7) (53*).

Nuovo dato - **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 8.VI.1980 (PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1901-2005; (53*); (3461 bis); **Veneto:** 1976-2005; (3321); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (53*); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2621); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (928); (3129); **Lazio:** 1801-2000; (53*); (3265); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3312); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1851-2005; (415); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2042); (2621); **Basilicata:** 1951-2000; (1760); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (811); (3129); **Sicilia:** 1851-2000; (928); (3129).

167. - ***Zygaena rhadamanthus* (Esper, 1793)**

Nota - La citazione per la **Campania:** (1388), è certamente errata.

Liguria: (1851-1900); 1901-2000; (188); (1451).

168. - ***Zygaena exulans* (Hochenwarth, 1792)**

Nuovi dati - Piemonte: (ssp. *flavilinea* Tutt) Cuneo: Acceglio 3.VIII.1975; Val di Susa: Piano dei Frati 17.IX.1978 (CMC/PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3129); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (215); (3129); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3129); **Veneto:** 1901-1950; 1976-2000; (1081); (2621); **Liguria:** 1976-2000; (2370); (3183); **Marche:** 1951-2000; (1980); (3129); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (2621); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2819).

169. - **(-)** ***Zygaena nevadensis*** **Rambur, 1866**

Nota - È citata, come *Z. gallica,* per la **Liguria:** dintorni di Genova (880bis); l'esemplare è risultato essere *Z. romeo* (2621). La citazione come *Z. giesekingiana* per la **Liguria:** Val Nervia (1693), probabilmente è dovuta a errata identificazione.

170. - ***Zygaena romeo*** **Duponchel, 1835**

Zygaena romeo è descritta su esemplari della **Sicilia:** Etna, Randazzo (in: Duponchel & Godart, Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France, Suppl. 2: 131, Tav. 12, fig. 1) (46*). *Sphinx orion* è descritta su esemplari di Toscana (100*), (1059).

Nota - *Sphinx orion* è sottospecie di *Z. romeo.*

Nuovi dati - **Puglia:** Canne della Battaglia 10.V.1982. **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 26.VI.1979; Pollino: Madonna del Pollino 23.VII.1979; Cropani 6.VII.1981 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 17.VI.1989, 21.VI.1996 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (218); (3129); **Trentino:** 1851-2000; (393); (3293); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (2695); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1140); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3140); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3129); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3310); **Umbria:** (1976-2000); (3129); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (3129); **Lazio:** 1901-2000; (733); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (699); (3129); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1851-2005; (393); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (72); (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (1829); (2621); **Calabria:** 1851-1925; 1951-2000; (156); (3129); **Sicilia:** 1801-2000; (46*); (3129).

171. - ***Zygaena osterodensis*** **Reiss, 1921**

Nota - La citazione per il **Trentino:** (2475) va riferita a *Z. romeo* (3129).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); **Piemonte:** 1976-2000; (2123); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (3129); **Alto Adige:** 1901-1950; (1386); (2621); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-

2000; (3129); (3140); **Friuli:** 1976-2000; (2621); (3197); **Venezia Giulia:** 1926-1950; 1976-2000; (2621); (3129); **Liguria:** 1976-2000; (2123); (3183).

172. - **(-)** ***Zygaena viciae*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *meliloti* Esper, 1793)

Nota - In **Italia** e **Sicilia** è presente solo *Z. charon* (2891).

173. - ***Zygaena charon*** **(Hübner, 1796)** (= *barnabeica* Reiss, 1958)

Sphinx charon è descritta su esemplari delle Alpi di **Liguria** e **Piemonte** (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 2: 82, n. 18, tav. 4, fig. 21) (23*).

Nuovi dati - **Basilicata:** Serra di Calvello 28.VI.1979. **Calabria:** Sila, Lago Arvo 6.VIII.1965 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3129); **Piemonte:** (1751-1800); 1851-2005; (23*); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (218); (3129); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3129); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (129); (3129); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (650); (3140); **Liguria:** (1751-1850); 1901-1925; 1951-2000; (23*); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (525); (3140); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3129); **Toscana:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (393); (3129); **Umbria:** (1976-2000); (3129); **Marche:** 1976-2000; (3129); **Lazio:** 1901-2000; (733); (3265); **Abruzzo:** 1926-2000; (1387*); (2621); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1801-1950; 1976-2005; (72); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-1975; (72); (2042); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1801-1925; 1976-2000; (70); (2621); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3129).

174. - ***Zygaena lavandulae*** **(Esper, 1783)**

Nota - È citata per il **Regno di Napoli** (70) e la **Campania**: (21*), dati non attendibili.

Piemonte: 1901-1950; (797); (1256); non rinvenuta in epoche successive (3129); **Lombardia:** (1926-1950); (1388); **Liguria:** (1851-1900); 1901-2000; (188); (3183).

175. - **(-)** ***Zygaena dorycnii*** **Ochsenheimer, 1808**

Nota - Le citazioni per il **Friuli** e la **Venezia Giulia:** (73) sono da riferire a *Z. ephialtes*.

176. - ***Zygaena ephialtes*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - La citazione generica per la **Sicilia:** (328) è poco attendibile.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3140); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2621); **Alto Adige:** 1851-2000; (216); (3129); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1801-1900; 1926-2000; (73); (3197); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-

2000; (73); (3129); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3129); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (24); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1901-2000; (604); (2516); **Lazio:** 1901-2000; (733); (2621); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3129); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1901-1925; 1951-1975; (929); (1825); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2621); **Calabria:** 1976-2000; (2621).

177. - ***Zygaena transalpina*** **(Esper, 1782)**

Sphinx filipendulae var. *transalpina* è descritta su esemplari del **Veneto**: monti sopra Verona (Monte Baldo) (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, II: 142, tav. XVI, fig. 1) (9*).

Nuovi dati - **Puglia:** Pianelle 2.VI.1966, 10.VI.1969, 18 e 26.VI.1971, 22.VI.1975, 22.VI.1976, 22.VI.1977. **Basilicata:** Pollino: Belvedere 16.VII.1980, sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 10.VI.1982; Madonna del Pollino 23.VII.1979, Cropani 6.VII.1981, Pollino: Piano Ruggio 23.VII.1979, 16.VII.1980, fiume Mercure 7.VII.1981, Cropani 6.VII.1981; Terranova 19.VII.1982, Noepoli 600 m 4.VII.1981 (PRN). **Calabria:** San Donato di Ninea 8.VII.1990; Carolei: Fiume Busento 300 m 12.VII.1997 (SCL).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-2000; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3129); **Veneto:** 1751-1800; 1851-2005; (9*); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1950; 1976-2000; (125); (3129); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (3129); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1325); (3129); **Toscana:** 1851-2005; (393); (3321); **Umbria:** (1901-1925); 1976-2000; (930); (2142); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (930); (3129); **Lazio:** 1801-2000; (73); (3265); **Abruzzo:** 1801-1925; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1801-1950; 1976-2005; (70); (3457); **Arcipelago campano:** 1901-1925; 1951-1975; (500); (3129); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (70); (3129); **Basilicata:** (1801-1850); 1951-2000; (70); (3265); **Calabria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (88); (3129); **Sicilia:** 1901-1925; 1951-1975; (913); (1767).

178. - **(-)** ***Zygaena hippocrepidis*** **(Hübner, 1799)**

Nota - Le citazioni di *Z. hippocrepidis* per **Piemonte**, **Lombardia**, **Trentino** e **Alto Adige**, vanno riferite a *Z. transalpina*.

179. - **(-)** ***Zygaena angelicae*** **Ochsenheimer, 1808**

Nota - Le citazioni di *Z. angelicae* per **Piemonte**, **Trentino**, **Alto Adige**, **Veneto**, **Liguria**, **Toscana**, **Abruzzo**, **Campania** e **Puglia**, vanno riferite a *Z. transalpina*. La citazione per il **Friuli:** (181) è dubbia.

180. - *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Puglia:** Bisceglie 18.VI.1980; Castellaneta Marina 3.VI.1981. **Basilicata:** Fiume Camastra 1 e 27.VI.1975; Bradano: Santa Lucia 1.VI.1976; Monte Caperino 28.V-8.VI.1972, 26.VI.1976; Bosco di Policoro (MT) 19.VI.1977, 18.VI.1976; Ofanto 22.VI.1969; Miglionico 23.V.1968; Pollino: Piano Ruggio 23.VII.1976; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Belvedere 16.VII.1980; fiume Mercure 7.VII.1981; San Severino 15.IX.1979. **Calabria:** Sila: Fossiata 22.VII.1981; Pollino: Colle del Dragone 16.VII.1980; Campotenese 20.VII.1974; Civita 18.VI.1976, 29.V.1975 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3129); **Piemonte:** 1751-2000; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2695); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-2000; (650); (3129); **Liguria:** 1801-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (2621); **Marche:** 1801-2000; (109); (3129); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312); **Molise:** 1901-1925; 1976-2000; (955); (3164); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (70); (3457); **Arcipelago campano:** 1901-1925; 1976-2000; (505); (2511); **Puglia:** 1926-2000; (1914); (3129); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (70); (3200); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (3128).

181. - *Zygaena lonicerae* (Scheven, 1777)

Nuovi dati - **Umbria:** Bocca Trabaria (PG), 1000 m, 8.VII.1989 (coll. Bertaccini). **Basilicata:** Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2001 (SCR). **Sicilia**: Trapani: Salina Paceco 28.VIII.1998 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3129); **Veneto:** 1851-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (1060); (2621); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (377); (3129); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (206); (3428); **Umbria:** (1976-2000); 1976-2000; (3129); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (3129); **Lazio:** 1901-2000; (699); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (2621); (3173); **Campania:** 1801-1925; 1976-2005; (72); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; (72); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3265); **Calabria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (70); (2621); **Sicilia:** 1801-1925; 1951-2000; (97); (2621).

182. - ***Zygaena trifolii*** **(Esper, 1783)** (= *syracusia* Zeller, 1847)

Zygaena syracusia è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa, penisola di Magnisi (Isis, 40 (4): 301) (109).

Nota - Le citazioni di *Z. trifolii* per l'Italia continentale vanno riportate a *Z. lonicerae* (2370). Sulla presenza di *Z. trifolii* in **Sicilia** i pareri sono discordi; pertanto si riportano i dati bibliografici per esteso. "Possiedo gli undici esemplari di Siracusa ex coll. Bellier e una numerosa serie di Catania ricevuta da Zickert; tutti gli esemplari hanno un colore di fondo più sul verdastro che sul bleu, ma sono tutti *syracusiae*" (842). La specie è presente in **Sicilia**; dati accertati: Capo Faeto (*recte* Capo Feto) (TP); Etna: Catania: Plaia Pineta 18.V.1949; Nebrodi: Monte Soro VII.1934; Palermo; Siracusa 17.V.1844 luogo tipico di *syracusiae* (2621); San Leonardo (SR) 27.V.1963, Capo Feto (TP) (3129); (*trifolii trinacria*) la ab. *punctumnotata* Verity è stata descritta su un maschio di Ficuzza; lectotipo in British Museum (1812); (*lonicerae* ssp. *trinacria* r. *paraustralis* Verity) sintipi (2m) **Sicilia**; (*trifolii trinacria* ab. *punctonotata* Verity) Palermo: Lupo, tipi in coll. Rothschild; (2° gen. *secundogenita* Verity) Catania: spiaggia, olotipo in coll. Turati; (r. *siciliae* Verity) sintipi Palermo; (r. *trinacria* Verity) sintipi Lupo (2m) (2424).

Sicilia: 1801-1900; 1976-2000; (109); (3129).

Fam. Brachodidae

183. - ***Brachodes appendiculata*** **(Esper, 1783)**

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia** e la **Sardegna:** (630); dati poco attendibili.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3273); **Piemonte:** 1801-1850; (1901-1925); (88); (693); **Trentino:** 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1900; 1951-1975; (171); (3273); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (3273).

184. - ***Brachodes powelli*** **(Oberthür, 1922)**

Piemonte: 1976-2000; (3273); **Lazio:** 2001-2005; (3296); **Calabria:** 1901-1925; 1951-1975; (3273); (3296).

185. - ***Brachodes pumila*** **(Ochsenheimer, 1808)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (630) è molto dubbia.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3210); (3273); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; (114); (693); **Alto Adige:** (1851-1900); (172); **Emilia:** 1901-1925; (983); **Toscana:** 1851-1900; (206).

186. - **(-)** ***Brachodes cassandrella*** **(Staudinger, 1859)**

Nota - Le segnalazioni di *B. cassandrella* per l'**Italia** (Emilia, Romagna), sono da riportare a *B. flavescens* (3273).

187. - ***Brachodes flavescens*** **(Turati, 1919)**

Atychia flavescens è descritta su esemplari del **Lazio:** Tivoli e dell'**Emilia:** Sestola (MO) 2.VIII (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, LVIII: 41) (893).

Emilia: 1901-1925; 1976-2000; (893); (3210); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3273); **Toscana:** 1976-2000; (3273); **Umbria:** 1926-1950; (3273); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (893); (3273); **Abruzzo:** 1951-1975; (3273); **Puglia:** 1976-2000; (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3273).

188. - **(?)** ***Brachodes fulgurita*** **(Fischer de Waldheim, 1832)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** e la **Sardegna** (630) vanno confermate.

189. - **(?)** ***Brachodes nana*** **(Treitschke, 1834)**

Chimaera nana è descritta su pochi esemplari di **Sicilia** (Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Erste Abtheilung der Supplement: 97) (73).

Nota - È noto un solo maschio presso il Museo di Berlino etichettato '**Sicilia**' (3273). Citata per l'**Emilia-Romagna:** (1885) ma gli esemplari appartengono a *B. flavescens* (3273).

190. - **(?)** ***Brachodes pusilla*** **(Eversmann, 1844)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** e la **Sardegna:** (630) vanno confermate.

Fam. Sesiidae

191. - ***Tinthia tineiformis*** **(Esper, 1789)** (= *aselliformis* Rossi, 1974)

Sphinx tinaeformis è descritta su esemplari della **Toscana:** Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, Suppl., 2 (2): 9, Tav. 38, fig. 4) (9*). *Sesia aselliformis* è descritta su esemplari della Toscana "Etruria, habitat in silvestribus" (24).

Nota - La citazione generica per la **Sardegna:** (2612), ripresa in (2980), (3015), (3245), (3273), va confermata.

Nuovi dati - **Calabria:** Stalettì (CZ): Copanello, 180 m, 2.VII.1998; Palizzi (RC), 10 m, 7.VI.2004; Corigliano (CS): Cantinelle, 90 m, 12.VII.2004 (SCL). **Sicilia:** Geraci, Castelbuono, Sortino, 1995 (Lastuvka in litt.).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2000; (114); (2674); **Liguria:** 2001-2005; (3273); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (262); **Romagna:** 1951-2005; (2674); (3273); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2000; (9*); (3273); **Marche:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1926-2000;

(2142); (3052); **Campania:** 1976-2000; (3273); **Puglia:** 1976-2000; (2674); (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (2674); (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1801-1925; 1976-2000; (109); (6215); **Sardegna:** (1976-2000); (2612).

192. - **(-)** ***Tinthia brosiformis*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte**, **Toscana** e **Sicilia** vanno riferite a *T. tineiformis*.

193. - ***Pennisetia hylaeiformis*** **(Laspeyres, 1801)**

Nota - I dati per il **Lazio:** Campagna romana e Lido di Roma (2142), (3063), non sono attendibili, in quanto la specie vive solo a quote considerevoli (Bertaccini in litt.).

Nuovi dati - **Lombardia:** Passo del Tonale (BS) VII.1994, sopra Bormio (SO) VII.1993 (Bertaccini in litt.). **Veneto:** Monte Baldo: dintorni Rifugio Telegrafo (VR) VII.1993 (Bertaccini in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2674); (3273); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (3273); **Trentino:** 1851-1900; (273); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (367); (3273); **Friuli:** 1976-2000; (3273); **Liguria:** 1976-2000; (2928); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3310); **Marche:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (2928); (3063); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); (2945); **Basilicata:** 1976-2000; (2674).

194. - ***Sesia apiformis*** **(Clerck, 1759)**

Nuovo dato - **Campania:** Ariano Irpino 4.VI.2003 (leg. Monaco, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1976-2000; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (300); (3273); **Trentino:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3273); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (81); (2674); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3273); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3273); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2000; (110); (3273); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (19); (3310); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1926-2000; (2142); (2674); **Campania:** 1801-1850; 2001-2005; (712); **Puglia:** 1801-1850; (712); **Calabria:** 1976-2000; (3466); **Sicilia:** 1851-1900; (343); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3273).

195. - ***Sesia bembeciformis*** **(Hübner, 1806)**

Nota - La citazione di *S. crabroniformis* Lewin per l'**Emilia:** (1388) probabilmente è da ascrivere a *S. apiformis* L. (= *crabroniformis* Schiff.) (319).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1976-2000; (2674); **Alto**

Adige: 1901-1950; (1038); (1155).

196. - ***Sesia melanocephala*** **Dalman, 1816**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2928); (3273); **Piemonte:** 1851-1900; (218); **Sicilia:** 1951-1975; (3273).

197. - ***Paranthrene tabaniformis*** **(Rottemburg, 1775)** (= *rhingiaeformis* Hübner, 1790)

Nuovi dati -**Sicilia:** Piana degli Albanesi 23.V.1995 23.VI.1996 (1m); Filaga (AG) 800 m ex l. su *Populus* sp. 16-23.V.1995; Salaparuta (TP): Fiume Belice ex l. su *Salix* sp. VI.1994 (PRN). **Arcipelago siciliano:** Isole Eolie: Lipari 7.VI.1997 (MSS, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3273); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1851-1900; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1976-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1951-2000; (110); (2921); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3273); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (14*); (3310); **Lazio:** 1926-2000; (2142); (3273); **Abruzzo:** (1976-2000); (2674); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (3273); **Calabria:** 1976-2000; (2274); (3273); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (357); (3273); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; **Sardegna:** 1976-2000; (3273).

198. - ***Paranthrene insolitus*** **Le Cerf, 1914** (= *novaki* Tosevski, 1987)

Alto Adige: 1976-2000; (2928); (3273); **Friuli:** 1976-2000; (3273); **Emilia:** 1976-2000; (3273); **Romagna:** 1976-2005; (3273); **Toscana:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (2928); (3344); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (3273); **Sicilia:** 1976-2000; (3273); (3344).

199. - ***Synanthedon scoliaeformis*** **(Borkhausen, 1789)**

Nota - La citazione per il **Piemonte** è da confermare (2674).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1851-1900; (218); **Alto Adige:** 1976-2000; (2674); **Veneto:** 1851-1900; (129).

200. - ***Synanthedon spheciformis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1751-1850; 1901-1925; (20); (2674); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3273); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; (81); (268); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3273); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900;

(19); (319); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Lazio:** 1901-1925; 1976-2000; (699); (2142).

201. - ***Synanthedon stomoxiformis*** **(Hübner, 1790)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2928); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2928); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (218); (734); **Trentino:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3273); **Alto Adige:** 1901-1950; (1053); (1475); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2005; (268); (3380); **Friuli:** (1851-1900); (218); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3273); **Liguria:** 1976-2000; (3273); **Marche:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (3344); **Abruzzo:** 1976-2000; (3344).

202. - ***Synanthedon culiciformis*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3273); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (20); (3273); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (164); (2674); **Trentino:** 1976-2000; (2475); (3273); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3159); **Veneto:** 1751-1975; (81); (1943); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (246); (2674); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (171 bis); (3310); **Calabria:** 1976-2000; (2274).

203. - ***Synanthedon formicaeformis*** **(Esper, 1783)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (506), (609), in base a identificazioni errate.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); (3273); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2674); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (3273); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (244); (3273); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (246); (3273); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Toscana:** 1851-1900; (206); **Marche:** 1976-2000; (2882); (3273); **Lazio:** 1951-2000; (2002); (3273); **Abruzzo:** 1951-2000; (1629); (3273); **Molise:** 1801-1850; (712); **Campania:** 1801-1850; (70); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); (2674); **Calabria:** 1976-2000; (2674).

204. - ***Synanthedon polaris*** **(Staudinger, 1877)** (= *rufibasalis* Bartel, 1906)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3159); **Alto Adige:** 1976-2000; (3159).

205. - ***Synanthedon flaviventris*** **(Staudinger, 1883)**

Romagna: 1976-2000; (2516); (3273).

206. - ***Synanthedon andrenaeformis*** **(Laspeyres, 1801)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2000; (3273); **Trentino:** 1976-2000; (2349); (3273); **Alto Adige:** 1976-2000; (2928); (3273); **Veneto:** 1976-2000; (2928); **Friuli:** 1926-2000;

(1528); (3273); **Emilia:** 1976-2000; (2674); (3273); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); (3273).

207. - ***Synanthedon melliniformis*** **(Laspeyres, 1801)** (= *mimus* Le Cerf, 1922)

Piemonte: 1926-1950; (2314); **Lombardia:** 2001-2005; (3273); **Veneto:** 1926-1975; (2674); (3015); **Emilia:** 1976-2000; (2674); (3273); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Toscana:** 1951-1975; (2314); **Marche:** 1901-1925; (968); **Lazio:** 1951-2000; (2674); (3273).

208. - ***Synanthedon myopaeformis*** **(Borkhausen, 1789)** (= *typhiaeformis* Borkhausen, 1789; *mutillaeformis* Laspeyres, 1801)

Sphinx typhiaeformis è descritta su esemplari di **Italia** (16*).

Nuovi dati - **Emilia:** dintorni di Piacenza 6.V.1975 (RBR, PRN). **Campania:** Atena Lucana 1995 (Lastuvka in litt.). **Puglia:** Foggia 26.V.1998; Molfetta: Torre Gavetone 18.IV.1983, 7.IV.1983; Bari VI.1991; Monopoli 15-27.V.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2815); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (3273); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (273); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3273); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3273); **Liguria:** (1801-1850); 1951-1975; (114); (2674); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2338); (3273); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2000; (19); (3273); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (3273); **Marche:** 1976-2000; (2882); (3273); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (2917); **Abruzzo:** (1901-1925); (505); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (72); (3273); **Puglia:** 1901-1925; 1976-2000; (683); (2674); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); **Calabria:** 1926-1950; 1976-2000; (1323); (3273); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3273); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (3273).

209. - ***Synanthedon vespiformis*** **(Linnaeus, 1761)** (= *asiliformis* Rottemburg, 1775; *cynipiformis* Esper, 1782)

Nuovi dati - **Lombardia:** Milano 18.VI.1991. **Alto Adige:** Ladurn (BZ) 8.VII.1994. **Veneto:** Sant'Ambrogio Valpolicella (VR) 5.VII.1997, Monte (VR) V.1999, San Giorgio in Valpolicella (VR) VII-VIII.1996/97. **Friuli:** Lago di Cavazzo VII.1953. **Venezia Giulia:** Jamiano (GO) 14.VI.1994. **Romagna:** Santo Stefano (FC) 3.VII.1988, San Giovanni in Galilea (FC) 10.VI.1986. **Toscana:** Alpi Apuane (MS) 13.VII.1996. **Marche:** Montioli (MC) 8.VIII.1993 (Bertaccini, in litt.). **Puglia:** Putignano (BA) 15-18.VII.1985 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo, 550 m, 9.VI.1992 (SCL). **Sicilia:** Etna: Maletto 1000 m 29.VI.1997; Noto (AG) Bonaccorsi, ex l. su mandorlo (BLL/RSS).

Piemonte: 1751-1850; (26); (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (298); (505); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1975; (390); (1787); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1900; (110); (218); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2000; (19); (206); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (738); (3268); **Campania:** 1926-1950; (1285); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (2923); **Calabria:** 1976-2000; (3273); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (993); **Sardegna:** 1851-1925; 2001-2005; (301); (3273).

210. - ***Synanthedon codeti*** **(Oberthür, 1881)**

Sardegna: 1976-2000; (2674); (3273).

211. - ***Synanthedon conopiformis*** **(Esper, 1782)** (= *syrphiformis* Hübner, 1796; *nomadaeformis* Laspeyres, 1801)

Nota - È citata con dubbio per la **Calabria:** (156). È rìportata come citata da (Hübner, 1796) per la **Sardegna:** (3273). Per l'Italia è stato riscontrato un solo esemplare certo di **Sicilia:** (2674).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3273); **Lombardia:** 1901-1925; (505); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (3273); **Veneto:** 1851-1900; (204); (268); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; (24); (190); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 2001-2005; (3268); **Campania:** 1801-1900; 1976-2000; (70); (3344); **Sicilia:** 1901-1925; 2001-2005; (993); (3273).

212. - ***Synanthedon tipuliformis*** **(Clerck, 1759)** (= *salmachus* Linnaeus, 1758; *tipula* Retzius, 1783)

Nota - Le citazioni di *S. tipuliformis* per **Emilia**, **Romagna** e **Campania** su *Diospyrus kaki* L. Fil. probabilmente vanno riferite a *S. tenuis* Butler, dell'Asia orientale, importata accidentalmente, vivente appunto su *D. kaki* (2612). Le citazioni di *S. tipuliformis* per **Emilia**, **Romagna**, **Toscana**, **Marche**, **Lazio**, **Abruzzo**, **Campania**, **Puglia**, **Basilicata**, **Sicilia**, **Sardegna** vanno riportate a *S. spuleri*, molto simile a *S. tipuliformis* e molto diffusa in Italia (2674). In **Romagna** nel 1997, oltre che *S. spuleri*, è stata catturata anche *S. tipuliformis* (3075). La specie su *Diospyros kaki* è *S. spuleri* (3095).

Piemonte: (?) (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (?) (1851-1900); (?) (1926-1975); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** (?) (1926-1950); 1976-2000; (1106); (2966); **Alto Adige:** (?) (1851-1925); 1976-2000; (273); (3273); **Veneto:** (?) (1751-1900); (?) (1926-1950); (10); (1681); **Friuli:** (?) (1926-1950); 1976-2000; (1425); (3273);

Venezia Giulia: (?) (1901-1925); 1976-2000; (1060); (3273); **Liguria:** 1976-2000; (3273); **Romagna:** 1976-2000; (3075).

213. - ***Synanthedon spuleri*** **(Fuchs, 1908)** (= *schwarzi* Kralicek & Povolny, 1977)

Nota - È citata genericamente come *S. tipuliformis* per la **Sardegna:** (1246), sola citazione per l'isola, poco attendibile.

Nuovi dati - **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola 4.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2674); (3145); **Lombardia:** 1976-2000; (2674); **Veneto:** 1976-2000; (2674); **Liguria:** 1976-2000; (2674); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1926-2000; (262); (2338); **Romagna:** 1926-2000; (1246); (3273); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2882); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3052); **Abruzzo:** 1951-2000; (1629); (2674); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1951-1975; (1983); (2049); **Puglia:** 1951-1975; (1549); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); **Calabria:** 1976-2000; (2674); (3273); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (354); (3273).

214. - ***Synanthedon loranthi*** **(Králicek, 1966)** (= *cryptica* Kralicek & Povolny, 1977)

Alto Adige: 1976-2000; (3273); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

215. - ***Synanthedon cephiformis*** **(Ochsenheimer, 1808)** (= *gaderensis* Kralicek & Povolny, 1977; *laspeyres* Heppner & Duckworth, 1981)

Nota - È citata per **Trentino**: (1053), **Venezia Giulia**: (1060), **Marche:** (2085), (2883) e **Lazio:** (2142). Non presente nelle collezioni esaminate; forse i dati per queste regioni sono da attribuire a *S. spuleri*, molto simile (2674).

Alto Adige: 1851-1925; (366); (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3273).

216. - ***Bembecia hymenopteriformis*** **(Bellier, 1860)**

Sesia hymenopteriformis è descritta su esemplari della **Sicilia:** monti attorno a Palermo, Monte Cuccio (Bulletin de la Société entomologique de France, 8: 681, Tav. 12, fig. 34) (147).

Lazio: 1976-2000; (3015); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); **Molise:** 1976-2000; (3273); **Campania:** 1976-2000; (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3273); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (147); (3344); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3055); (3226).

217. - ***Bembecia ichneumoniformis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *rhagioniformis* Hübner, 1806; *albanica* Rebel, 1910)

Nuovi dati - **Puglia:** Cisternino 11.VIII.1988. **Calabria:** Paterno Calabro 27.VII.1989 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2674); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (2674); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (366); (3024); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (81); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (2674); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2674); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3273); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; (24); (206); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (3015); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3273); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (699); (3052); **Abruzzo:** 1976-2000; (2674); (3063); **Molise:** 1976-2000; (3273); **Puglia:** 1976-2000; (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3273); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; (97); (3015); **Sardegna:** 1851-1900; 1976-2000; (301); (3273).

218. - ***Bembecia albanensis*** **(Rebel, 1918)** (= *kalavrytana* Sheljuzhko, 1924)

Nuovi dati - **Calabria:** Sila: Lago Ariamacina 1300 m 11.VIII.1996 (SCL). **Sicilia:** Piana degli Albanesi (PA) 800 m 23.VI.1996 (1m) (PRN).

Piemonte: 1976-2005; (3273); (3378); **Veneto:** 1976-2005; (3273); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (2674); (3273); **Emilia:** 1976-2000; (3273); **Romagna:** 1976-2000; (3273); **Toscana:** 1976-2000; (3273); **Marche:** 1976-2005; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (2674); (3052); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); **Puglia:** 1976-2000; (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3273); **Sicilia:** 1976-2000; (3273); **Sardegna:** 1976-2000; (2674); (3273); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2674).

219. - ***Bembecia scopigera*** **(Scopoli, 1763)** (= *ophioniformis* Hübner, 1813; *systrophaeformis* Hübner, 1813)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1926-1950; (2674); **Alto Adige:** (1976-2000); (2973); **Liguria:** 1951-1975; (2674); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Toscana:** 1976-2000; (2516); (3273); **Umbria:** 1976-2000; (2928); (3273); **Marche:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (3273); (3344); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); (3063).

220. - ***Bembecia iberica*** **Spatenka, 1992**

Bembecia iberica è descritta su esemplari di Spagna: Sierra de Gudar, Alcala, Francia, Corsica (Alexanor, 17 (7): 429) (2751).

Nota - È riportata nel testo anche per "Angers, Italien (**Toscana**)" a p. 432, ma nella cartina è indicata la **Liguria occidentale**. Spatenka ha determinato un esemplare conservato nel museo di Parigi etichettato "**Toscana**" (2928).

Liguria: 1926-1950; 1976-2000; (2928); (3273); **Toscana:** (1951-

1975); (2928); **Sardegna:** (1976-2000); (3245); (3273).

221. - **(-)** ***Bembecia megillaeformis*** **(Hübner, 1813)** (= *masellaeformis* Ragusa, 1923)

Nota - È citata, probabilmente per errata ortografia, una *Dipsosphecia masellaeformis* Hübner: (993). Le citazioni di *B. megillaeformis* per l'**Umbria** e il **Lazio** sono errate; *megillaeformis* è una specie estranea alla fauna italiana (3052); i dati sono da riferire a *B. ichneumoniformis* (3273).

222. - ***Bembecia sirphiformis*** **(Lucas, 1849)** (= *astragali* de Joannis, 1909)

Liguria: 1951-1975; (3273); **Emilia:** 1976-2000; (3273); **Romagna:** 1976-2005; (3012*); (3273); **Toscana:** 1976-2000; (3015); **Marche:** 2001-2005; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (3273).

223. - ***Bembecia flavida*** **(Oberthür, 1890)**

Sicilia: 1976-2005; (3015); (3273).

224. - ***Bembecia himmighoffeni*** **(Staudinger, 1866)** (= *baumgartneri* Spatenka, 1992)

Nota - La citazione per il **Lazio** non è attendibile (3052).

Piemonte: (1976-2000); (3015); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (683); (3273); **Emilia:** 1976-2000; (3273); **Romagna:** 1976-2000; (3273); **Umbria:** 1926-1950; 1976-2000; (2566); (2928); **Lazio:** 1976-2000; (2142); (2204); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); (3273); **Molise:** 1976-2000; (3273); **Puglia:** 1976-2000; (3273).

225. - ***Bembecia uroceriformis*** **(Treitschke, 1834)** (= *monedulaeformis* Rambur, 1866; *lecerfi* Oberthür, 1909)

Sesia odyneriformis è descritta su esemplari di **Sardegna**: monti estate (114).

Nota - *Sesia odyneriformis* è ritenuta sinonimo di *B. uroceriformis*: (114 bis). Non è stata trovata conferma dei reperti segnalati da Ghiliani con il sinonimo di *odyneriformis* per la **Sardegna** (2674).

Piemonte: 1851-1900; 1976-2000; (293); (3273); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (1038); (3273); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (1053); (2014); **Veneto:** 1976-2005; (2674); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3273); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3273); **Liguria:** 1976-2000; (3273); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (246); (3273); **Romagna:** 1976-2000; (3273); **Toscana:** 1976-2000; (3273); **Marche:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (2928); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (3015); (3273); **Campania:** 1976-2000; (3273); **Puglia:** 1976-2000; (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (2674); (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1801-1900; 1976-2000; (109); (3273); **Sardegna:** 1851-1900; 1976-2000; (301); (3273).

226. - **(-)** ***Pyropteron sicula*** **Le Cerf, 1922**

Pyropteron chrysidiformis var. *sicula* è descritta su esemplari di **Sicilia** (968).

Nota - *P. sicula* è buona specie (2752), (2891), (2917); è ssp. di *P. chrysidiformis* (3245). Ci atteniamo a quest'ultima opinione.

227. - ***Pyropteron chrysidiformis*** **(Esper, 1782)** (= *chalcidiformis* Hübner, 1806; *chalcocnemis* Staudinger, 1856; *rondoui* Siépi, 1909; *lecerfi* Oberthür, 1909)

Nuovi dati - **Calabria:** Donnici; Maierato: Lago Angitola 40 m 5.VII.1999; Santa Caterina dello Ionio (CZ) 1995 (SCL). **Sicilia:** Madonie: Mandanici; Antillo; Francavilla; Novara; Cerami; Nicosia; Gangi; Etna: Monte Arso; Castelbuono; Piana degli Albanesi; Prizzi; Sortino 1995 (Lastuvka in litt.).

Piemonte: (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (3015); **Trentino:** 1901-1925; (734); (1053); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3273); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3273); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3273); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3273); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1951-2005; (24); (3310); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (3273); **Lazio:** 1851-2005; (699); (3417); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (2520); (3063); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1900; (72); (712); **Puglia:** (1751-1800); 1976-2000; (15); **Basilicata:** 1976-2000; (3467); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (144); (3273); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (3015).

228. - **(-)** ***Pyropteron minianiformis*** **(Freyer, 1843)**

Nota - È citata per il **Lazio:** Terminillo (1684); forse la citazione di Zangheri va riferita a *P. siculum* (2612); non si hanno altri dati per l'**Italia**.

229. - ***Pyropteron doryliformis*** **(Ochsenheimer, 1808)** (= *braconiformis* Ghiliani, 1852)

Sesia braconiformis è descritta su due femmine di **Sardegna**: interno dell'isola estate (114). *Sesia braconiformis* è descritta su due femmine di Sardegna: interno dell'isola estate (144). *Sesia icteropus* e *Sesia schmidtii* sono descritte su esemplari della **Sicilia:** Siracusa: fiume Anapo (1064).

Nota - *Sesia icteropus* Zeller, 1847 (= *Sesia schmidtii* Zeller, 1847) è ssp. di *P. doryliformis*. La var. *teriolensis*, descritta su un esemplare dell'**Alto Adige:** Bolzano, area al di fuori dell'areale noto per *S. doryliformis*, potrebbe essere dovuta a errore (2917). Le citazioni per l'Italia settentrionale: **Piemonte:** (797), **Trentino:** (218), (1184), **Alto Adige:** (1053), (3015) ed **Emilia:** (525), sono poco attendibili (3273). La citazione per la **Sardegna** va confermata.

Nuovi dati - **Sicilia:** (ssp. *icteropus* Z.) Madonie ex coll. Failla (det. Lastuvka); (ssp. *icteropus* Z.) Francavilla; Gangi; Sortino; Piana degli Albanesi; Castelbuono; Alia 1995 (Lastuvka in litt.).

Puglia: 1951-1975; (3015); **Basilicata:** 1976-2000; (2674); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3273); **Sardegna:** (1801-1850); (114).

230. - ***Pyropteron triannuliformis* (Freyer, 1845)** (= *braconiformis* Herrich-Schäffer, 1846; *pungeleri* Spatenka, 1987)

Nuovo dato - **Sicilia:** Etna: Randazzo 1995 (Lastuvka in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2928); (3273); **Piemonte:** 1976-2000; (3273); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1926-1950; (1943); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (3273); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (3015); **Basilicata:** 1976-2000; (2674); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (993); (3273).

231. - ***Pyropteron meriaeformis* (Boisduval, 1840)** (= *corsica* Staudinger, 1856)

Toscana: 1851-1900; (228); (344); **Umbria:** 1976-2000; (2674); **Lazio:** 1901-2000; (2142); (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (3273); **Calabria:** 1901-1925; (833); (1013); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (573); (3273); **Sardegna:** 1901-1950; 1976-2000; (781); (3273).

232. - ***Pyropteron muscaeformis* (Esper, 1783)** (= *philanthiformis* Laspeyres, 1801; *aestivata* Kralicek, 1969)

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (97) è molto dubbia.

Piemonte: 1751-1850; 1901-1925; 1976-2000; (20); (3378); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2521); **Friuli:** 1851-1900; (174); **Lazio:** 1926-2000; (2142); (3273); **Abruzzo:** 1976-2000; (2674); (3273).

233. - ***Pyropteron leucomelaena* (Zeller, 1847)** (= *cyrnea* Le Cerf, 1920)

Nota - Le citazioni generiche per la **Sardegna:** (2255), (2980), (3015), (3245), attendono conferma.

Nuovi dati - **Campania:** Atena Lucana (SA). **Sicilia:** Francavilla; Novara; Madonie: Castelbuono; Sortino 1995 (Lastuvka in litt.).

Piemonte: 1976-2000; (2674); **Veneto:** 1851-1900; (204); **Liguria:** 2001-2005; (3273); **Emilia:** 1976-2000; (3273); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Umbria:** 1976-2000; (2928); **Marche:** 1976-2000; (3015); (3273); **Lazio:** 1976-2000; (2674); (3273); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); (3273); **Campania:** 1976-2000; (3273); **Puglia:** 1976-2000; (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (2674); **Calabria:** 1976-2000; (2566); (3273); **Sicilia:** 1801-1925; 1976-2000; (109); (3273); **Sardegna:** (1976-2000); (2612); (3245).

234. - ***Pyropteron affinis* (Staudinger, 1856)**

Sesia affinis è descritta su esemplari dell'**Alto Adige:** Bolzano e Francia meridionale (Entomologische Zeitung, Stettin, 17 (9/10): 278) (127).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2928); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2000; (188); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2674); **Trentino:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1787); **Alto Adige:** 1851-1900; 1951-2000; (127); (3273); **Veneto:** 1901-1925; 1976-2005; (1038); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3273); **Emilia:** 1951-1975; 2001-2005; (1781); (3273); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Marche:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2000; (2674); **Abruzzo:** 1976-2000; (2674); (3273); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3273); **Calabria:** 1951-2000; (2274); (3273); **Sicilia:** (1851-1900); (354).

235. - ***Chamaesphecia mysiniformis*** **(Boisduval, 1840)**

Liguria: 1976-2005; (2928); (3273).

236. - ***Chamaesphecia chalciformis*** **(Esper, 1804)** (= *prosopiformis* Ochsenheimer, 1808)

Nota - "È citata di **Sicilia** nel Catalogo Staudinger e nel Seitz. Ne posseggo un solo esemplare gentilmente cedutomi dal signor Le Cerf, senza altra precisa indicazione che 'Sicile' " (993); citazione molto dubbia.

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (2658); **Veneto:** 1976-2000; (2674); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1976-2000; (110); (2674).

237. - ***Chamaesphecia schmidtiiformis*** **(Freyer, 1836)**

Nota - Le segnalazioni per la **Sicilia** di *C. chalcidiformis* v. *schmidtii* Frr., *chalcidiformis* v. *schmidtiiformis* e di *schmidtiformis*, vanno riferite a *Pyropteron doryliformis*.

Trentino: 1901-1925; (2917); (2674); **Veneto:** 1976-2005; (3273); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (3273).

238. - **(-)** ***Chamaesphecia anthrax*** **Le Cerf, 1916**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (2980). È riportata in (3015) come infeudata a *Nepeta tuberosa* L. in **Sicilia** nel testo, ma non è presente nell'elenco delle specie e nella cartina. Gli esemplari siciliani sono in realtà *C. maurusia* (3273).

239. - ***Chamaesphecia maurusia*** **Püngeler, 1912**

Sicilia: 1976-2005; (3001); (3273).

240. - **(-)** ***Chamaesphecia alysoniformis*** **(Herrich-Schäffer, 1846)**

Nota - Nella collezione Costa presso il Museo Zoologico dell'Università di Napoli sono presenti frammenti di un esemplare etichettato "*alysoniformis*" della **Campania**: Persano (Battipaglia, SA) (712); è citata anche per la **Calabria:** (277); segnalazioni molto dubbie. Non si

hanno altri dati per l'**Italia**.

241. - ***Chamaesphecia aerifrons*** **(Zeller, 1847)**

Sesia aerifrons è descritta su esemplari della **Sicilia:** dintorni di Siracusa: Convento dei Cappuccini, fiume Anapo, Tempio di Giove, Cassibile (Isis, 40 (6): 415) (109).

Nuovi dati - **Sicilia:** Novara di Sicilia; Castelbuono; Sortino; Piana degli Albanesi 1995 (Lastuvka in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); (3273); **Piemonte:** 1976-2005; (3273); **Alto Adige:** 1976-2000; (2928); **Veneto:** 1976-2005; (3273); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3273); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3273); **Liguria:** (? 1851-1900); 2001-2005; (218); (3273); **Emilia:** 1976-2000; (2674); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3273); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (3273); **Marche:** 1976-2000; (2142); (2882); **Lazio:** 1901-2000; (699); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2674); (3063); **Campania:** 1976-2000; (3273); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); (3273); **Calabria:** 1976-2000; (3273); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (2674); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (3273).

242. - ***Chamaesphecia osmiaeformis*** **(Herrich-Schäffer, 1848)** (= *stelidiformis* Zeller, 1847 nec Freyer, 1836)

Sesia osmiaeformis è descritta su esemplari della **Sicilia** (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 2: 79, Tav. 9, fig. 52) (100*).

Calabria: 1901-1925; 1976-2000; (586); (3015); **Sicilia:** (1751-1800); 1801-1950; 1976-2000; (109); (3344); **Sardegna:** 1976-2000; (3273).

243. - **(-)** ***Chamaesphecia ramburi*** **(Staudinger, 1866)**

Nota - È citata per la **Toscana:** Livorno, dato molto dubbio (3015).

244. - ***Chamaesphecia doleriformis*** **(Herrich-Schäffer, 1846)**

Nuovo dato - **Puglia:** Triggiano (BA) 9.VII.1980 (PRN).

Venezia Giulia: 1951-1975; (3015); **Emilia:** 1976-2000; (2965); **Romagna:** 1976-2000; (2965); (3273); **Toscana:** 1976-2000; (3273); **Umbria:** 1976-2000; (2674); **Lazio:** 1926-2000; (2674); (3273); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928); (3063); **Campania:** 1976-2000; (3273); **Puglia:** 1976-2000; (3273); **Basilicata:** 1951-1975; (2917).

245. - ***Chamaesphecia thracica*** **Lastuvka, 1983**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (2980); non risulta presente nell'isola (3273).

Puglia: 1951-2000; (2274); (3273); **Basilicata:** 1976-2000; (3273); (3344).

246. - ***Chamaesphecia dumonti*** **Le Cerf, 1922** (= *similis* Lastuvka, 1983)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); (3273); **Piemonte:** 1976-2005; (3273); (3378); **Alto Adige:** 1976-2000; (3273); **Veneto:** 1976-2005; (2674); (3380); **Emilia:** 1976-2000; (2674); **Romagna:** 1976-2000; (3273); **Lazio:** 1976-2005; (3344).

247. - **(?) *Chamaesphecia annellata* (Zeller, 1847)** (= *ceriaeformis* Lederer, 1853, nec Lucas, 1849)

Nota - Le citazioni di *C. annellata* per l'**Italia settentrionale** e **centrale** probabilmente sono da riportare a *C. dumonti*; la segnalazione per la **Puglia:** (2274) è da riferire a *C. thracica* (3273)

Valle d'Aosta: (?) 1976-2000; (2471); **Alto Adige:** (1851-1900, estinta); (2973); **Veneto:** (?) 1956-2000; (1787); (2674); **Emilia:** (?) 1976-2000; (2674); **Romagna:** (?) 1956-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (?) 1851-1900; (206); **Lazio:** (?) 1926-1950; (2142).

248. - ***Chamaesphecia staudingeri* (Failla-Tedaldi, 1890)**

Sesia staudingeri è descritta su esemplari della **Sicilia:** Madonie: Miliuni (Castelbuono) (1m) e Ficuzza stazione (1m, 1f) (Il Naturalista Siciliano, 10 (2-3): 28, Tav. 1, Fig. 1) (360).

Sicilia: 1851-1925; (360); (3273).

249. - ***Chamaesphecia masariformis* (Ochsenheimer, 1808)** (= *odyneriformis* Herrich-Schäffer, 1846; *loewii* Zeller, 1847)

Sesia loewii è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa (109),

Alto Adige: 1851-1900; (170); **Veneto:** 1951-1975; (3273); **Lazio:** 1926-2000; (2674); (3273); **Campania:** 1851-1900; (218); **Puglia:** 1976-2000; (2923); **Basilicata:** 1976-2000; (2674); **Sicilia:** 1801-1925; 1976-2000; (109); (3273).

250. - ***Chamaesphecia bibioniformis* (Esper, 1800)** (= *philanthiformis* Herrich-Schäffer, 1846; *myrsinites* Pinker, 1954)

Nota - La citazione per il **Friuli** (Barajon, 1953) va confermata (2674).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2928); (3273); **Piemonte:** 1976-2000; (3273); **Alto Adige:** 1951-2000; (1572); (3273); **Veneto:** 1951-1975; (3015).

251. - ***Chamaesphecia anthraciformis* (Rambur, 1832)** (= *foeniformis* Herrich-Schäffer, 1846; *oryssiformis* Herrich-Schäffer, 1846; *seitzi* Püngeler, 1905; *reisseri* Capuse, 1973)

Toscana: (1926-1950); (1388); **Arcipelago toscano:** 1851-1900; (3273); (?) **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1976-2000; (3273); **Campania:** 1976-2000; (3344); **Puglia:** 1901-1925; (712); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (3344); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (247); (3273); **Sardegna:** (1751-1800); (1851-1900); 1976-2000; (100*); (3273).

252. - ***Chamaesphecia palustris* Kautz, 1927**

Romagna: 1976-2000; (2335); (2643).

253. - ***Chamaesphecia euceraeformis*** **(Ochsenheimer, 1816)** (= *stelidiformis* Freyer, 1836; *doleriformis* Herrich-Schäffer, 1846; *icteropus* Herrich-Schäffer, 1851)

Nota - Le citazioni per la **Sicilia:** (109), (343), probabilmente vanno riferita a *Pyropteron doryliformis icteropus* Z.

Piemonte: 1851-1925; 1976-2000; (127); (3273); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (1055); (3273); **Friuli:** (1851-1900); (218); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (3015); **Puglia:** 1976-2000; (2274); (3273).

254. - ***Chamaesphecia leucopsiformis*** **(Esper, 1800)**

Nota - La citazione per l'**Alto Adige:** dintorni di Bolzano (206) è poco attendibile (3273). La citazione per la **Toscana:** fra Livorno e Pisa (206) è errata (2674).

Lombardia: 1976-2000; (2674); **Abruzzo:** 1976-2000; (2928).

255. - ***Chamaesphecia empiformis*** **(Esper, 1783)**

Nuovi dati - **Lombardia:** lungo il Ticino in provincia di Pavia, Cremonese, Passo del Tonale (BS). **Veneto:** dintorni di Arabba (BL), Ficarolo (RO). **Friuli:** Lago di Cavazzo (UD), Cave di Predil (UD). **Venezia Giulia:** Carso triestino e goriziano, comune (tutti Bertaccini, in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1976-2000; (26); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3273); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; (1951-1975); (170); (1184); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1976-2000; (98); (3273); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3273); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3273); **Liguria:** 1976-2000; (2674); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (3273); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (190); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (2928); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3273); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (699); (2928); **Abruzzo:** (1851-1900); 1976-2000; (344); (3063).

256. - **(?)** ***Chamaesphecia tenthrediniformis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *muscaeformis* Borkhausen, 1789)

Nota - Le citazioni di *C. tenthrediniformis* per **Piemonte**, **Lombardia**, **Alto Adige**, **Veneto**, **Liguria**, **Romagna** e **Lazio** vanno riportate a *C. empiformis*, essendo infeudata a *E. cyparissias* L. (2674); secondo Pühringer alcuni esemplari rinvenuti da Rössler a Laces (BZ) e nell'area del Sonnenberg (BZ) potrebbero essere delle *C. tenthrediniformis* (3273).

257. - **(-)** ***Chamaesphecia astatiformis*** **(Herrich-Schäffer, 1846)**

Nota - Le citazioni per il **Lazio:** (2142), (2204), non sono attendibili,

trattandosi di specie estranea alla fauna italiana (3052).

Fam. Cossidae

258. - ***Cossus cossus*** **(Linnaeus, 1758)** (= *ligniperda* Fabricius, 1794)

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA) 11.IV.1986; Battipaglia (SA): Torre Lama 10-17.VIII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Incoronata (FG) 4.VIII.1992; Gravina in Puglia 12.VII.1990. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 18.V.1979, 18.VI.1983; Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Terranova 18.VI.1982, 18.VII.1982; Rotonda 5.VII.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978 (PRN); Rende (CS) 17.VI.1983; Pollino: Frascineto 25.VII.1979 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1851-1850); 1851-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (253); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1588); **Liguria:** (1801-1850); (1926-1950); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3429); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1801-1900; 1951-2000; (99); (1484); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); **Puglia:** 1951-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (2949); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1975; (114); (1976).

259. - ***Lamellocossus terebra*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni generiche per il **Trentino**: (1388), (2732) sono da riferire all'**Alto Adige**.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Lombardia:** 1976-2000; (3007); **Alto Adige:** 1901-2000; (812); (3293); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Marche:** 1851-1900; (385); **Calabria:** 1976-2000; (2274).

260. - ***Parahypopta caestrum*** **(Hübner, 1808)**

Nota - È citata per l'**Arcipelago siciliano:** Isola di Ustica (1198); non presente a Ustica, bensi a Monreale (343).

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura 30.VI.1979; Polignano 15-21.VI.1978; fiume Lato 22.VI.1991; Mar Piccolo 22.V.1982; Castellaneta Marina 10-14.VII.1980; Ceglie Messapico 7.VII.1983

(PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 28.V.1988 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 27.VI.1979, 5.VII.1983; Montalbano 12.V.1983 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 4.VI.1981; Oriolo 9.VI.1975; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN); Verzino: Fiume Lese 150 m 14.VI.2003; Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003 (SCL). **Sicilia:** Altavilla Milicia: Valle del Corvo 5.VIII.1978; Contrada Traversa 30.VII.1978 (PRN).

Veneto: 1851-1900; 1951-2000; (268); (3007); **Friuli:** 1951-1975; (1588); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-2000; (466); (3007); **Liguria:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3183); **Emilia:** (1926-1950); 1976-2000; (1165); (3007); **Romagna:** 1851-2005; (1198); (3465 bis); **Toscana:** 1951-2005; (1614); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1388); (3007); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); **Puglia:** 1951-2005; (2108); (3439); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1976-2005; (2270); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2005; (97); (3128).

261. - **(-)** ***Catopta thrips*** **(Hübner, 1818)**

Nota - È citata per la **Puglia:** (2108) su segnalazione di Hartig; probabile errore di identificazione o presenza accidentale.

262. - ***Dyspessa aculeata*** **Turati, 1909**

Dyspessa aculeata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Ficuzza (Il Naturalista Siciliano, 21, N. S. Vol. I (1-8): 121) (622).

Nota - È riportata come presente in **Calabria**; non risultano segnalazioni per la regione.

Puglia: 1976-2000; (3007); **Basilicata:** 1976-2000; (3007); **Calabria:** (1976-2000); (2732); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (357); (3007).

263. - ***Dyspessa ulula*** **(Borkhausen, 1820)** (= *pantherina* Hübner, 1790; *hepialina* Hübner, 1792)

Phalaena Bombyx hepialina è descritta su esemplari della **Toscana:** Firenze (14*).

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). Le citazioni per la **Sicilia** vanno riportate a *D. aculeata* (3007).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 8.VI.1988 (GRL). **Campania:** Serino (AV), 600 m, 7.VII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** gravina di Riggio 18.V.1990; Gravina in Puglia; Bosco di Pulicchie 28.V.1980. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 11.V.1985; Pollino: Cropani 6.VI.1981; Rotonda 8.V.1981; Rotonda: fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Calabria: Oriolo 9.VI.1978; Pollino: Castrovillari 10.VI.1978 (PRN); Lago di Tarsia 13.V.1999; Copanello 15.V.1998 (SCL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (734); (1609); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (14*); (3429); **Arcipelago toscano:** 1951-2000; (2710); (3138); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2945); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2729); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2108); (3007).

264. - **(-)** ***Stygia australis*** **Latreille, 1803**

Nota - È citata come presente in **Liguria:** (188), probabilmente per la presenza nelle Alpi Marittime francesi. Non risultano altre citazioni per l'**Italia**.

265. - ***Stygioides colchica*** **(Herrich-Schäffer, 1851)** (= *tricolor* Lederer, 1858)

Nota - Le segnalazioni di precedenti autori confermate da Daniel, 1954/55 per l'**Italia centrale** non sono accettate nella monografia di Freina & Witt, 1990. La distribuzione accertata è limitata alla Grecia. La citazione della specie per il **Lazio:** (894) e per la **Puglia:** (355) sono molto dubbie (2891). Nella raccolta Dannehl esiste un maschio etichettato "Campagna Romana 13.V"; il maschio di *S. psychidion* riportato come catturato a Tivoli potrebbe essere lo stesso esemplare (3007). Citata anche per la **Sicilia:** Madonie: Carbonara (determinata da Milliére come *Psyche muscella*); secondo Ragusa si tratta di questa specie, anche se è difficile distinguerla con certezza dalla congeneri *aethiops* Stgr., *tricolor* Led. e *psychidion* H.-S. (387).

Romagna: 1976-2000; (3007); **Calabria:** 1976-2000; (3007).

266. - ***Zeuzera pyrina*** **(Linnaeus, 1761)** (= *aesculi* Linnaeus, 1767)

Nuovi dati - **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Roccadaspide (SA) 11.IV.1986; Serino (AV) 27.VII.1985; Battipaglia (SA): Torre Lama 10-27.VIII.1984, 1 e 24.VII.1987 (RTN, PRN); Scafati (SA) 21-25.VII.1983; Vesuvio: Osservatorio 10.V.1988 (SNN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 6.VIII.1977; Ruvo di Puglia 28.VI.1999; Bari 20.VI.1980; Conversano 20.VI.1982; Parco delle Pianelle 29.VI, 1.VII, 4.VIII.1970, 18.VI.1971; San Paolo 10.VI-4.VIII.1971; gravina di Petruscio 12.VIII.1983; gravina di Riggio

19.IX.1991; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Francavilla Fontana VIII.1969; Veglie: Torre Lupomonaco 10.VII.1974; Torre Guaceto 20.IX.1979 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 11.VIII.1986, 10.VII.1987; Gallipoli (LE) 10.IX.1986; Otranto 21.VI.1999 (PRT, PRN). **Basilicata:** Ferrandina 5.VII.1983; Bradano: Santa Lucia 1.VI.1976, 18 e 23.V.1977; Bosco di Policoro (MT) 13.V, 19.VII.1977, 14.VI.2000; fiume Camastra 12-27.VI, 9.VII, 31.VII.1975, 1.VI-16.VII.1976, 15.VI.1977; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Sellata: La Maddalena 15.VII.1977; Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980, 3.VI.1981; Rotonda 23.VII.1979, 16-17.VII, 16.VIII.1980, 8.VI.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Cropani 6.VI.1981; Terranova 19.VI, 22.VII.1982; fiume Mercure 20.VI.1982 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Sersale (CZ) 13-20.VII.1985; Pollino: Monte Moschereto 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (freuente); Vallone Colloreto 6.VI.1981 (PRN); Verzino: Fiume Lese 150 m 14.VI.2003; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 11.VI.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2308); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; (1951-1975); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (772); (3443); **Abruzzo:** 1951-2005; (2429°); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3007); **Campania:** 1851-1900; 1926-2000; (233); (3019); **Puglia:** 1901-2000; (990); (2640); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1926-2005; (156); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (71*); (3128); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2710).

267. - ***Phragmataecia castaneae*** **(Hübner, 1790)** (= *arundinis* Hübner, 1803)

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 1 e 24.VII.1987 (RTN, PRN). **Puglia:** Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Calabria:** Laghi La Vota (CZ) 7.VI.1997 (SCL).

Piemonte: 1851-1900; 1976-2000; (218); (2957); **Lombardia:** 1976-2000; (2591); (3007); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3241); **Veneto:** (1926-1950); 1951-2000; (1165); (3250); **Friuli:** (1976-2000); (2732); **Venezia Giulia:** 1976-

2000; (3007); **Liguria:** (1926-1950); (1165); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3099); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2000; (3007); (3365); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (3007); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (2923); **Puglia:** 1976-2000; (2274); (3065); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (3007); **Calabria:** 1976-2000; (2201); (2923); **Sicilia:** 1976-2000; (2949); (3320); **Sardegna:** 1951-1975; (1975).

Fam. Thyrididae

268. - ***Thyris fenestrella*** **(Scopoli, 1763)** (= *fenestrina* Denis & Schiffermüller, 1775; *marica* Cyrillus, 1787)

Sesia marica è descritta su esemplari della **Campania**: Camiliani (? Camigliano, CE) (15).

Nuovi dati - **Lombardia:** Bernata ticinese (MI) 26.V.1981 (PRN). **Liguria:** (f. *nigra* B.-Haas) Capo Mele (SV): Andora 4.VII.1979 (CMC, PRN). **Puglia:** (f. *nigra* B.-Haas) Pulo di Altamura 20.VI.1978 (PRN). **Basilicata:** (f. *nigra* B.-Haas) Pollino: Cropani 6.VII.1981; Cersosimo 6.VI.1981 (PRN). **Calabria:** (f. *nigra* B.-Haas) Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1986; Monte Cerviero: Acquatremola 4.VI, 4.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (2342); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (2029); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2000; (19); (3428); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1801-1850; 1976-2000; (70); (2945); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1751-1850; 1901-1925; (15); (1047); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (72); (2108); **Basilicata:** (1801-1850); 1951-2000; (70); (2108); **Calabria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (70); (833); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (271); (2710); **Sardegna:** 1901-1925; (841); (886).

Fam. Lasiocampidae

269. - ***Poecilocampa populi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per il **Friuli** va confermata, non risultano segnalazioni per la regione. Le segnalazioni di *P. populi* per la **Sicilia** vanno riferite a *P. alpina*.

Nuovo dato - **Toscana:** Arezzo 8 e 21.XII.1994 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1571); (2894); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** (1976-2000); (2732); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2894); **Liguria:** 1976-2000; (2553); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (298); (2894); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1976-2000; **Marche:** 1976-2000; (2894); **Basilicata:** 1976-2000; (2274).

270. - ***Poecilocampa alpina* (Frey & Wullschlegel, 1874)** (= *canensis* Millière, 1875)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 25.XII.1988, 9 e 19.XII.1989, 29.XII.1990; Arezzo 29.XI.1980, 9.XI, 14 e 15.XII.1989, 30.XII.1990 (GRL). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 24-30.XI.1985, 3-11.I, 17-19.IX.1986. **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 1.XI.1981; Timpone Castellana 9.XI.1979 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 23.XI.1997 (SCL). **Sicilia:** Ficuzza 28.XII.1988, 9.I.1989; Gibilmanna 27.I.1988; Piano Colla 4.XII.1982; Mandria del Conte 1300 m 4.XII.1982 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1951-1975); 1976-2005; (1551); (3378); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (239); (2894); **Veneto:** 1976-2000; (2894); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (1571); (2894); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2894); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2145); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (1551); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (1839); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2894); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (2108); (2949).

271. - ***Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.X.1986, 26.X.1987; Molinelli (AR) 12 e 20.X.1987 (GRL). **Campania:** Serino (AV), 600 m, (AV), 600 m, 16.IX.1984, Battipaglia (SA): Cioffi 16.X.1980, 25.X.1982 (RTN, PRN). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 8-18.X.1985; gravina di Petruscio 12.X.1991. **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 30.IX.1983; Pollino: Terranova 8-11.X.1983 (PRN). **Calabria:** Sila: Silvana Mansio 1400 m 4.IX.2000 (SCL). **Sicilia:** Etna: Linguaglossa 29.IX.1992 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-

2000; (218); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (400); (3380); **Friuli:** (1976-2000); (2894); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (1546); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (298); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2829); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (298); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2274); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (298); (3083).

272. - ***Eriogaster lanestris*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Bellon (Sarre) 1450 m 13-30.VII.1994. **Alto Adige:** Val Senales 1000 m ex l. 14.VI.1986. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.III.1988, II.1984 ex l. (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1900); (20); (243); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2894); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2894); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-2000; (170); (1958); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1943); **Friuli:** 1976-2000; (2894); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (2732); **Liguria:** (1851-1900); (319); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (262); (1781); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2829); **Toscana:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (807); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); **Puglia:** 1951-1975; (2108); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3399).

273. - ***Eriogaster arbusculae*** **Freyer, 1849**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2894); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (218); (2894); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; (3129).

274. - ***Eriogaster rimicola*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per il **Trentino:** (1388), ripresa in (2732), va riferita all'**Alto Adige**.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.X.1986, 22.X.1987, 20.XI.1989, 13.XI.1994, 20.X.1994; Molinelli 10.XI.1986 (GRL). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 30.IX.1983; Albano scalo 30.X.1971; Pollino: Lago Duglia 1.XI.1981, 9.X.1983; sorgente Acquafredda 10.XI.1981; Timpone Castellana 9.XI.1979; Terranova 1.XI.1981, 8-11.X.1983; Rotonda 9.XI.1979, 16.XI.1980 ; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; Cropani 1.XI.1981 ; fiume Mercure

13.XI.1983 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 3.XI.1995 (SCL).

Piemonte: 1976-2000; (3129); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-1950; (1279); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** (1926-1950); (1388); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (218); (935); **Liguria:** 1976-2000; (2553); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (262); (1551); **Toscana:** 1926-1950; 1976-2005; (1821); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1951-2000; (1821); (2142); **Abruzzo:** 1951-2000; (1821); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Puglia:** 1951-1975; (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (573); (3247).

275. - ***Eriogaster catax*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Gli esemplari di *E. catax* citati per l'**Emilia:** (262), citazione ripresa in (1388) e (2732), sono *E. rimicola* (687).

Nuovi dati - **Piemonte:** Caselette (TO) ex o. 26.VII.1990 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 15.IV.1979, 26.X.1990 ex l., Molinelli 3.XI.1991 ex ovo (GRL). **Lazio:** Montemonaco (VT) 200 m 13.XI.1986 (PRN).

Piemonte: 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (2014); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1801-1850; 1926-2005; (367); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** (1926-1950); (1388); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2829); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (406); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2516); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Puglia:** 1951-1975; (2108); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2274).

276. - ***Malacosoma neustria*** **(Linnaeus, 1758)** (= *unicolor* Cyrillus, 1787)

Bombyx unicolor è descritta su esemplari di Japygia (**Puglia**) (15).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 23.VI.1976; Molinelli (AR) 20.VI.1988, 6.VII.1989. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 15.VI.1974; Foligno 22.VI.1981 ex l. (GRL). **Puglia:** pulo di Altamura 30.VI.1979; Ceglie (BA) 22.VI.1977; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1996. **Basilicata:** Lagonegro 13.VII.1980; Nemoli 17.VII.1979; Lago Sirino 13.VII.1984; Pollino: sorgente Acquafredda 30.VI, 8.VII.1981, 10-16.VIII.1980; Lago Duglia 18.VII.1982; Rotonda 29.VI.1981, 20.VI.1982, 23.VII.1979; Rotonda: Valli 18.VII.1980 ; San Severino 7.VII.1981; fiume Mercure 20.VI.1982; Terranova 3.VI.1981, 18.VII.1982, 20.VI.1983 (PRN); Cropani 6 e 8.VI, 6.VII.1981; Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Calabria: Aspromonte: Gambarie (RC) 3.VII.1972; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Vallone Colloreto 6.VI.1981 (PRN). **Sicilia:** Ficuzza 20.VI.1969, 18.VII.1980; Giacalone 26.IX.1975 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-1925; 1951-2000; (79*); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2599); **Umbria:** 1951-2000; (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (421); (2945); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1851-1900; (1951-1975); (298); (1827); **Puglia:** (1751-1800); 1851-2000; (15); (2230); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (70); (3204); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (126); (2860); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3416).

277. - ***Malacosoma castrensis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pondel 9.VII.1973, 14.VII.1978; Pré St. Didier 1.VII.1976; Cogne 12.VII.1988 (GRL). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 8.VI.1981, 24.VI.1983 (GRL). **Marche:** Monti Sibillini: Monte Prata 1400 m 12.VII.1985 (GRL). **Basilicata:** Monticchio 12.VII.1984. **Calabria:** Campotenese 17.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: (1801-1850); 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (164); (2362); **Trentino:** 1851-1925; (171); (1038); **Alto Adige:** 1851-1925; (157); (1038); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (38); (2469); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (603); (2894); **Liguria:** (1976-2000); (2732); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2894); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2469); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2923).

278. - ***Malacosoma franconica*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per la **Valle d'Aosta:** (114), il **Piemonte:** (20), (114) e l'**Alto Adige:** (2732), probabilmente sono da riferire a *M. alpicola*. La citazione generica per la **Venezia Giulia:** (2732) va

confermata.

Nuovi dati - **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 11.VII.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 14.VI.1988 ex l. (GRL). **Calabria:** Sila: Angaro 1200 m 16.VI.1997 (SCL). **Sicilia:** Madonie V.1982 ex l.; Piano Battaglia 10.VII.1991, 20.VI.1992 ex l. (GRL). **Sardegna:** Ploaghe 30.V.1994 (Luciano in litt.).

Lombardia: 1901-1925; (220); (1053); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (231); (3293); **Liguria:** (1801-1900); 1976-2000; (114); (3007); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (262); (2894); **Toscana:** 1951-2005; (2469); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3052); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2894); **Basilicata:** 1951-1975; (2108); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (945); (1013); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (73); (3320); **Sardegna:** 1851-2000; (301); (2894).

279. - ***Malacosoma alpicola*** **Staudinger, 1870**

Malacosoma alpicola ssp. *calabrica* è descritta su esemplari della Calabria: Monte Martinello (945).

Nota - *M. alpicolum* ssp. *calabricum* è sinonimo di *M. franconicum* (2469).

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Gran San Bernardo 2280 m VIII.1994 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (114 bis); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; (231); (1055); **Friuli:** 1926-2000; (1493); (2894); **Liguria:** 1976-2000; (2894).

280. - ***Lasiocampa trifolii*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *medicaginis* Borkhausen, 1793)

Nota - È citata come presente in tutto il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.IX.1982, 10.IX.1987 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 30.X.1983; Portici 21.IX.1983; Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986; Serino (AV), 600 m, (AV), 600 m, 25.VIII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Vieste IX.1979; Palazzo d'Ascoli Satriano 4.X.1985; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 17-19.IX.1986; Pianelle 25.IX, 6 e 11.IX.1970, 11.IX.1971, 25.VIII.1973; San Paolo 2-23.IX.1971, 15-18.IX.1971, 7.IX.1970; Monte Camplo 1.IX, 1.X.1973; gravina di Massafra 12.IX, 24-26.IX, 28.IX.1971; gravina di Laterza (TA) 25.IX.1976, 18-28.IX.1992; Lido Silvana 20.IX.1967, 15.IX.1967; Torre Guaceto 24.IX.1976, 1.X.1977, 26.IX.1978, 20.IX.1979 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 25.IV, 18.V.1986, 14.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 18.IX, 11.IX.1976; Bosco di Policoro (MT) 21.IX.1979, 6.X.1981; fiume Camastra 28.VIII.1975; Monte Caperino 24.VIII, 5.IX.1973 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR);

Pollino: Piano Ruggio 14.IX.1979; Timpone Castellana 13.IX.1979; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Rotonda 10-11.IX.1977, 14-16.IX.1979, 1-4.IX.1981, 28.IX.1979, 16.VIII, 15.IX.1980; Terranova 11.VIII.1980, 25.IX.1981; Scanzano 31.VII.1982; San Severino 15.IX.1979. **Calabria:** Sersale (CZ) 19.X.1985; Cosenza 12.X.1983; Pollino: Campotenese 17.VI.1981, 14.IX.1991; Monte Moschereto 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN). **Sicilia:** (ssp. cocles) Piana degli Albanesi 28.X.1980, 23.VII.1987, 16.X.1990; Giacalone 23.IX.1972, 26.IX.1987; Ficuzza 31.VIII.1981, 25.X.1988, 20 e 25.IX.1989, 7.X.1990; Mandria del Conte 12 e 21.IX.1979, 1.X.1994 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (319); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1741); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2488); **Marche:** 1801-1900; 1951-2005; (109); (3409); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1926-2005; (1398); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (811); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (1970).

281. - ***Lasiocampa quercus*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Sardegna** sono da confermare, potrebbero riferirsi a *L. trifolii*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 9.VII.1983; Monte Moro 3.VII.1983 (GRL); Caselette (TO) ex o. 10.VI.1990 (CMC, PRN). **Campania:** Torre del Greco 10.VI.1955 (PRN). **Puglia:** Gargano: San Giovanni Rotondo 30.IX.1997; Polignano 19, 23 e 27.IX.1978; Pulo di Altamura 25 e 29.VIII.1978; Bari 10-20.IX.1980, 5.VI.1980 ex l.; gravina di Laterza (TA) 4.VI.1992; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Latiano (BR) 98 m 28.VII.1998. **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 22.VII.1977; Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980; Rotonda 8.VIII, 1-4.IX.1981, 9.VIII.1980. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola 4.VII.1981 (PRN). **Sicilia:** Palermo città 24.IX.1979, 6.X.1990; Busambra 15.VIII.1981; Piana degli Albanesi 25.VIII.1980; Giacalone 27.VIII.1973, 13.IX.1984, 31.VIII e 14.IX.1987, 26.IX.1982; Ficuzza 31.VIII.1972, 30.VIII.1978, 9.VIII.1980,

13.IX.1986, 20.IX.1989, 21.VIII.1993; Gibilmanna 14.IX.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2784); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2695); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1976-2000; (421); (3138); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1801-1900; 1951-2000; (109); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-2005; (817); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1801-1850; 1901-1975; (99); (1183); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1851-1925; 1976-2000; (277); (2206); **Sicilia:** 1801-2000; (94); (2860); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); (114), (1169).

282. - ***Macrothylacia rubi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 7.VII.1983 (GRL). **Liguria:** Conna (SV) 300 m 29.V.1982 (CMC, PRN). **Emilia:** dintorni Piacenza 20.V.1959, V.1963 (RBR, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 11.VI.1972, 25.V.1983, 27.IV.1987, 22.V.1989, 13.VI.1991 (GRL). **Abruzzo:** Aquila: Val Sansone 1500 m 4.VII.1976 (GRL). **Molise:** Pesche 23.V.1982 (GRL). **Campania:** San Gregorio Matese (CE) 1100 m 10.VII.1995 (DMR, PRN). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Lago Duglia 6.VI.1981, 18.VI.1982; Timpone Castellana 9.V.1981; Casa del Conte 18.VI.1982; Rotonda 3 e 26.V.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Campotenese 17.VI.1981; Sila: Camigliatello 15-25.VI.1978 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 25.V.1995 (SCL). **Sicilia:** Santo Stefano Camastra 18.V.1983 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1901-1925; 1976-2000;

(1013); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206); **Sicilia:** (1801-1850); 1976-2000; (94); (2949).

283. - ***Streblote panda* Hübner, 1820** (= *repanda* Hübner, (1819) 1796)

Nota - L'individuo figurato da (Hübner, 1819) sotto il nome di *Bombyx repanda* è stato catturato nel **Lazio:** dintorni di Roma (67).

Nuovo dato - Isola di Pantelleria 26.V.2003, femmina in fase di ovideposizione su ombrellifera (leg. Massa, PRN).

Lazio: 1801-1850; (67); **Arcipelago siciliano:** 1976-2005; (3055).

284. - ***Pachypasa otus* (Drury, 1773)**

Nota - Le citazioni per **Friuli** e **Venezia Giulia:** (2732) derivano dalle segnalazioni per l'Istria (2894); non è ancora segnalata in queste regioni. In **Puglia**, **Calabria** e **Sicilia** probabilmente estinta (2620). In realtà è una specie in espansione; nella pineta costiera ionica è meno frequente negli ultimi anni probabilmente in seguito a ripetute distribuzioni di BT per una infestazione di *T. pityocampa*.

Nuovi dati - **Puglia:** dintorni di Bari 3.VIII.1966; Castellana Grotte 1982 larve su *Quercus* sp., 2.VIII.1997; San Pancrazio (LE) 29.VII.1986; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 22-24.VII.1986; Ruvo di Puglia 10.VIII.1998; Foresta di Mercadante (BA) 30.VII.1999; Castellaneta Marina (TA) ex p. 10.VIII.1979, 25.VII-12.VIII.1980, E.VII-A.VIII.1998-2004, esemplari isolati sotto i lampioni stradali; nel 2000 numerosi bruchi sui cipressi dei cimiteri di Modugno (BA) e Castellana Grotte (BA). **Calabria:** Verzino (Catanzaro) larva matura 20.V.1993.

Toscana: 1951-2000; (2616); (3171); **Campania:** 1901-1925; (990); **Puglia:** 1901-2005; (1146); (2894); **Basilicata:** 1851-1925; 1976-2000; (229*); (2620); **Calabria:** 1851-1925; 1976-2000; (159); (2894); **Sicilia:** 1851-1900; ex (208); (1340).

285. - **(-)** ***Pachypasa limosa* (de Villers, 1827)**

Nota - È citata come probabilmente presente in **Liguria:** (218), in quanto diffusa nelle Alpi Marittime francesi. Non risultano altre citazioni per l'**Italia.**

286. - ***Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Bellon (Sarre) 1450 m 29.VII.1993, 15.VII.1994; Pré St. Didier 10.VII.1976; Aymavilles 25.VII.1989 (GRL). **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora ex l. 26.VI.1969, 12-21.IX.1991 (CMC, PRN). **Romagna:** Roncadello Forlì 5.IX.1985, 24.VIII.1991, 2.IX.1991 (GRL). **Calabria:** Lago Arvo 12.VII.1998 (5 ess.), 26.VI.1999 (1 es.) (SCL). **Sicilia:** Etna N: Linguaglossa 2 e 6.VII.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1901-1925;

2001-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1801-1900; 1926-2000; (79*); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (244); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (400); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (175); (5204 **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1430); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (319); (3183); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3462); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (3044); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3268); **Abruzzo:** 2001-2005; (3280); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); **Calabria:** 1951-2000; (2206); (2274); **Sicilia:** 1976-2000; (2949); (3247).

287. - ***Euthrix potatoria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per l'**Italia meridionale** (683) è certamente errata. Le citazioni per l'**Emilia:** (262), le **Marche:** (385) e la **Toscana:** (19), (218), sono dovute probabilmente ad errata identificazione (2620).

Valle d'Aosta: 1801-1850; (114); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; (114); (797); **Lombardia:** 1801-1925; (44); (820); **Trentino:** 1901-1925; (1184); **Alto Adige:** 1851-1950; (273); (1055); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Friuli:** 1976-2000; (2894); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650).

288. - ***Cosmotriche lunigera*** **(Esper, 1783)** (= *lobulina* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È riportata genericamente come presente in **Piemonte** e **Venezia Giulia**; non risultano segnalazioni per queste regioni.

Piemonte: (1976-2000); (2732); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (2894); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (2732).

289. - ***Phyllodesma ilicifolia*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; (20); (797); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (164); (820); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1681); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183).

290. - ***Phyllodesma tremulifolia*** **(Hübner, 1810)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 19.VI.1977 (GRL); Poggio di Carasco (Val Curone, AL) 300 m 11.VII.1981, 3.VII.1982 (CMC, PRN). **Liguria:** Col di Nava 12.VI.1985 (GRL). **Emilia:** San Benedetto in Querceto (BO), 350 m, 12.V.1991 (coll. Bertaccini). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.VII.1973, 16.VII.1976, 16.VII.1979, 15 e 25.V.1987 (GRL). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 22.VI.1986 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Rotonda 13.V.1983 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 8.IV.1983, 2.V.2001, 9.VII.2001 (SCR).

Sicilia: Mandria del Conte 12.IX.1971 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2964); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (1820); (2469); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2894); **Romagna:** 1976-2000; (2423); (3062); **Toscana:** 1951-2005; (2196); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2142); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2894); **Sicilia:** 1951-2000; (2894).

291. - ***Gastropacha quercifolia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.VII.1975 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 17.VI.1997 (SCR). **Puglia:** Locorotondo 15.VII.1992; Pianelle 29.VI-31.VII, 4.VIII.1970, 18.VI, 11 e 21.IX.1971; San Paolo 6.VII-24.VII.1969, 21.IX.1971, 21.IX.1979; Monte Camplo 1.IX.1973; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Porto Cesareo 13.VI.1969; Veglie: Torre Lupomonaco 13-18.VI.1961; Latiano (BR) 98 m 5.VIII.1998 (PRN); gravina di Laterza (TA) 25.IX.1976, 16.VI.1999; Fiume Lato 22.VI.1991 (NRD). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 1.VI, 29.VIII, 18.IX.1976, 23.V.1977; Bosco di Policoro (MT) 19.VI.1977, 6.X.1981, 14.VI.2000; fiume Camastra 11.VIII.1975, 16 e 27.VI, 9.VII, 31.VII.1975, 16.VII.1976, 15.VI.1977; Pietrapertosa 12.VIII.1971; Monte Caperino 27.VII.1974; Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Timpone Castellana 22.VII.1979; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Terranova 3.VI.1981. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978 (PRN); Verzino: Fiume Lese 150 m 14.VI.2003 (1 es.) (SCL). **Sicilia:** Marsala VIII.1960; Bolognetta 17.VI.1972, 30.VI.1976; Gibilmanna 17.VI.1972; Ficuzza 28.VI.1981, 6.IX.1988; Giacalone 14.VI.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (79*); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2342); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3310); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1741); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1976-2005; (772); (3386); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1398); (2429°); **Molise:**

1976-2000; (3173); **Campania:** (1976-2000); (2894); **Puglia:** 1926-2000; (1776); (2938); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (3347); (3468); **Sicilia:** (?) (1801-1850); 1851-1900; 1926-2005; (37*); (2860); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2249); **Arcipelago sardo:** 1851-1900; (320).

292. - ***Gastropacha populifolia*** **(Esper, 1782)**

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1901-2000; (464); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); **Veneto:** 1926-1975; (2014); (2051); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2894); **Liguria:** (1926-1950); (1388); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3007); **Romagna:** 1901-1925; (1010); **Toscana:** 1976-2000; (2196); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); (2528).

293. - ***Odonestis pruni*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Trentino:** Levico 26.VI.1974 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB), 2 m, 10 e 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 2-27.VIII.1984 (RTN, PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo, 550 m, 11.VI.1995 (SCL).

Piemonte: 1751-1850; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (566); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (935); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (583); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (406); (3462); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1976-2000; (2923); **Puglia:** 1951-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2923); (3347); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (802); (3247); **Sardegna:** 1926-1950; (1338).

Fam. Endromididae

294. - ***Endromis versicolora*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.III.1989 (GRL).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1975; (767); (1958);

catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** (1976-2000); (2894); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (2894); **Liguria:** 1951-2000; (2410); (3183); **Emilia:** (1976-2000); (2894); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2894); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (1939); (2643); **Lazio:** 1951-2000; (1939); (2002); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); **Calabria:** 2001-2005; (3401).

Fam. Saturniidae

295. - ***Aglia tau*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Torino 29.III.1986. **Toscana:** Arezzo 23.IV.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: (1976-2000); (2894); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (812); (3293); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (400); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (392); (1852); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (2894); **Liguria:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2894); **Emilia:** 1976-2000; (2894); (3007); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3310); **Toscana:** 1926-1950; 1976-2005; (1788); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2894); (3158).

296. - ***Saturnia pyri*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 19 e 26.V.1983 (RTN, PRN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gargano: Peschici 30.IV.1978; Pulo di Altamura 4.V.1979; Pianelle 19.V.1969, 29.IV.1970, 21.V.1971, 19.IV.1972; Monte Camplo 13.IV.1975; gravina di Laterza (TA) 27.V.1976; gravina di Petruscio 23.IV.1983; Villa Castelli 15.V.1975. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 7 e 28.IV.1985; Bosco di Policoro (MT) 24.IV.1977, 24.IV.1978; fiume Camastra 29.V.1976; Calciano scalo 22.IV.1976, 28.III.1977; Albano scalo 12.IV.1978; Grassano scalo 28.III.1977; Trivigno scalo 18.IV.1977; Brindisi di Montagna 28.III.1977; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980, 9.VI.1981; Rotonda 7.VI.1980, 13. e 17V.1982, 8 e 26.V.1981; Rotondella 5.V.1978; Terranova 18.IV-10.V.1983 (PRN). **Calabria:** Longobucco 800 m 25.IV.2003 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (392); (1528); **Venezia Giulia:**

1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (2346); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1877); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (421); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1398); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (99); (1285); **Puglia:** 1901-2000; (921); (2575); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 2001-2005; (156); (695); **Sicilia:** 1701-1950; 1976-2005; (1); (3247); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; 1951-1975; (781); (1976).

297. - **(-)** ***Saturnia pavonia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni di *S. pavonia* per l'Italia, la **Sicilia** e la **Sardegna** vanno riferite a *S. pavoniella*.

298. - ***Saturnia pavoniella*** **(Scopoli, 1763)**

Nuovi dati - **Umbria:** larve lungo la SS 452 a 4-5 km da Gubbio (Bertaccini in litt.). **Campania:** Scafati (SA) 21-25.IV.1983, Battipaglia (SA): Cioffi 29.III, 13.IV.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Bari 25.III.1982; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 3.IV.1989; Pianelle 31.III, 12.IV.1971; San Paolo 5.IV.1968, 12.III.1972. **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 29.III.1970, 31.III.1972; Grotticelle 28.III.1974, 12.IV.1978; Pietrapertosa 5.IV.1976; fiume Camastra 2.III.1976; Brindisi di Montagna 28.III.1977; Rifreddo (PZ) 7.V.1984; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981; Rotonda 4.IV.1981 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 5.IV.1988 (SCL). **Sicilia:** Etna: Linguaglossa ex o. 25.IV.1986; Castrogliastra IV.1947; Marsala 27.III.1968; Giacalone 2.IV.1989; Ficuzza 12.III.1983, 30.IV.1990 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3336); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1925; (392); (935); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2894); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3164); **Campania:** 1801-1950; 1976-2000; (70); (1869); **Arcipelago campano:** 1851-1925; (783 bis); (2362); **Puglia:** (1801-1850); 1926-2000; (70); (2108); **Basilicata:**

1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (2232); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (94); (2949); **Sardegna:** 1951-1975; (1589).

299. - ***Saturnia spini*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per la **Lombardia:** (164) e la **Puglia:** (70), (218) sono da riferire a *S. pavoniella*. "A meno che gli esemplari non portino cartellini di località falsi, sono noti alcuni reperti della specie per il **Trentino**" (2930), probabilmente gli esemplari sono quelli citati da Hartig, che li catturò in Val Venosta: Silandro (**Alto Adige**).

Veneto: 1801-1900; (98); (487); **Alto Adige:** 1926-1950; (1184).

300. - ***Perisomena caecigena*** **(Kupido, 1825)**

Nota - La citazione per il **Veneto** è dubbia: (2732). In (2469) è riportata per la **Sicilia:** nel testo, ma non nella cartina; probabile errore (2894). "Parrebbe che una vecchia citazione per l'**Abruzzo:** (622), di per sè molto dubbia, sia stata ulteriormente fraintesa da autori non di lingua italiana, dando luogo ad una recente segnalazione per la **Sicilia**" (2930).

Veneto: (1926-1950); (1388); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-2000; (298); (2894).

301. - ***Antherea yamamai*** **(Guérin-Méneville, 1861)**

Nota - È stato tentato l'allevamento in **Lombardia a** Cassolnovo (Vigevano) nel 1865 (162) e l'acclimatazione fra Alzate e Cantù nel 1870 (470), nel **Veneto a** Padova alla fine del 1800 (487) ed a Cologna Veneta nel 1892 (487), in **Toscana:** ad Arezzo dal Brizzolari, fallito (487); su Quercia da Piccioli di Firenze (169), in **Umbria:** da Francesconi di Perugia (169), in Campania da Costa A. (160 bis), senza risultati positivi. In **Venezia Giulia** e **Friuli:** è giunta dall'Istria, dove è acclimatata da tempo.

Nuovo dato - **Friuli:** Taipana, 500 m, 30.VIII.1987, ex oco 7.VI.1988 (CMC, PRN).

Friuli: 1951-2000; (1968); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1900; 1976-2000; (162); (2894).

302. - **(-)** ***Antherea pernyi*** **(Guérin-Méneville, 1855)**

Nota - È stata tentata l'acclimatazione in **Lombardia,** fra Alzate e Cantù nel 1870, ma è fallita (470); non fa parte della fauna italiana.

303. - ***Samia cynthia*** **(Drury, 1773)**

Nota - Nella cassetta entomologica allestita alcuni anni fa da uno studente della Facoltà di Agraria di Bari erano presenti un esemplare di *Samia cynthia* Drury ed uno di *Acanthobrahmaea europaea* Htg. che, a esame superato brillantemente, ha assicurato di aver catturato in **Puglia**, nel territorio di Peschici sul Gargano. La presenza delle piante alimentari e la vicinanza delle regioni in cui le due specie sono

presenti farebbe propendere per ritenere validi tali dati. Da ricercare in tale area.

Piemonte: 1851-1925; 1951-2005; (169); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (124); (3123); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (566); (2475); **Alto Adige:** 1926-2000; (167); (2325); **Veneto:** 1851-2005; (161); (3380); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3123); **Liguria:** 1976-2000; (3123); **Emilia:** 1951-2000; (1781); (3205); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (124); (3310); **Marche:** 1976-2000; (2882).

Fam. Lemoniidae

304. - ***Lemonia dumi*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - È riportata genericamente come presente in **Lombardia** e **Veneto**; non risultano segnalazioni per queste regioni.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); **Piemonte:** 1801-1900; 1976-2000; (114); (3007); **Lombardia:** (1976-2000); (2732); **Trentino:** 1851-1925; (170); (1053); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1184); **Veneto:** (1926-1950); (1388); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (218); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2894).

305. - ***Lemonia taraxaci*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Puglia:** Canosa 15.X.1995; Trinitapoli 6.X.1983; Valenzano 20.X.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 3-13.X.1985, 30.IX.1986; gravina di Riggio 22.X.1990; Torre Guaceto 26.IX.1978. **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 12.IX, 14.IX.1979 ; Timpone Castellana 13.IX.1979, 5.X.1980; Lago Duglia 9.X.1983; Fiume Mercure 6.X.1980; Terranova 25.IX.1981, 8-11.X.1983; San Severino 15.IX.1979; Rotonda 18.IX.1979, 5-6.X.1980. **Calabria:** Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Sersale (CZ) 19.X.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Campotenese 14.IX.1991; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN). **Sicilia:** Madonie: Mandria del Conte 1.X.1994 (GRL).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1975; (218); (2014); **Trentino:** 1976-2000; (2894); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (2894); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2894); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1551); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Puglia:** 1951-2000; (2108);

(3065); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206); (3173); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3083).

Fam. Brahmaeidae

306. - ***Acanthobrahmaea europaea*** **(Hartig, 1963)**

Bramaea (sic!) *europaea* è descritta su un esemplare della **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) (Bollettino dell'Associazione romana di Entomologia, 18: 5) (1715).

Nota - È probabile la sua presenza in **Puglia:** nel territorio di Peschici sul Gargano (vedi *S. cynthia*).

Nuovi dati - **Campania:** Aquilonia scalo (AV) 28.III.1977, 30.III, 12.IV.1978 (PRN); Aquilonia Scalo (AV) 6.IV.1988 (Bertaccini in litt.).

Campania: 1976-2000; (2732); **Basilicata:** 1951-2000; (1715); (3407).

Fam. Sphingidae

307. - ***Marumba quercus*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È riportata genericamente per la **Sardegna:** (2980); non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 16.VII.1973, 1.VIII.1976 (GRL). **Liguria:** Andora 24.VI.1987 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 2.VII.1973, 30.VI.1975, 12.VI.1981, 15 e 21.V, 3.VII.1987; Molinelli (AR) 17.VII.1986 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 22.IX.1998, Roccadaspide (SA) 22.VI, 28.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 12.VI.1982; Locorotondo 20.VIII.1992; Ostuni 15.VIII.1991; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1996; Pianelle 26.VII.1982 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Pollino: Rotonda 16.VII.1980, 14 e 16.IX.1979; Cropani 6.VI.1981; San Severino 7.VII.1981 (PRN); Calanchi di Ferrandina 12.VII.1983; Monte Caperino 10.VIII.1983 (ADD); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 27.VII.1985; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN); Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003 (SCL). **Sicilia:** Nebrodi: San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL); Ficuzza VIII.1969, 18.VII.1980, 2.VIII.1991, 14.VII.1992; Piana degli Albanesi 28.VI.1979, 10.VII.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (566);

(1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1926-2000; (110); (2988); **Romagna:** (1851-1900); 1951-2000; (319); (2643); **Toscana:** 1851-1900; 1926-2005; (190); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3129); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (218); **Puglia:** 1951-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2201); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (3083).

308. - ***Mimas tiliae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Val di Nava 370 m 12.VI.1985; Valdieri 12.VI.1985; Val Bognanco (VB) 20.VII.1977. **Venezia Giulia:** Staranzano (GO) ex ovo 7-25.IV.1997 (PRN). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 4.VIII.1969, 20.VIII.1970. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.VI.1976, 3 e 12.VII.1979, 15 e 25.V.1987. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 8.VI.1982 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 10 e 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Serino (AV) 30.VI, 19.VII, 11 e 18.VIII.1984; Battipaglia (SA): Cioffi 12.V.1983, 10.V.1984, Torre Lama 3.VIII.1984, 1, 22 e 24.VII.1987; Eboli 4.V.1983 (RTN, PRN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Lago Sirino 4.VI.1989; Rifreddo (PZ) 12.VI.1984; vetta del Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.193; Monticchio 750 m 30.IV.1983; Pollino: sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Timpone Castellana 6.VI.1980; Lago Fondo 1700 m 15.V.1983; San Severino 7.VII.1981; Rotonda 10.VI.1978; Terranova 3.VI.1981, 19.VI.1982, 18.V.1983; fiume Mercure 20.VI.1982, 18.V.1983; Cropani 8.VII.1981 (PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 6.VII-24.VIII.1985 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1926-2000; (1398); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (70); (1350);

Puglia: 1976-2000; (2894); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2949).

309. - ***Smerinthus ocellata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 4.VII.1976 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 10 e 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 3-17.VIII.1984 (RTN, PRN). **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 19.VII.1977, 5.V.1978; Trivigno scalo 30.V.1976; Pollino: sorgente Acquafredda 3 e 19.VI.1982; Casa del Conte 8.VI.1982; Lago Duglia 19.VI.1982; fiume Mercure 8.VI.1980, 8.V.1981, 20.VI.1982, 16.V.1983; Rotonda 10.VI.1978, 12.V.1979, 21.VI.1980, 8.V, 8.VI, 25.VIII.1981, 13.V, 17.VI.1982; San Severino 7.VII.1981; Terranova 19.VI.1982; Cropani 6.VI.1981 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 3.VIII.1985 (RTN, PRN). **Sicilia:** Altavilla Milicia: Valle del Corvo 3.VIII.1978 (PRN); Palma di Montechiaro 20.V.1993; Ficuzza 10.VI.1988, 10.VI e 10.VII.1991 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (2780); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1024); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (81); (3068); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (2894); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1926-2005; (1398); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (70); **Puglia:** 1976-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2201); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (2949); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (2249).

310. - ***Laothoe populi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna,** non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Cogne 13.VII.1982; Bellon (Sarre) 1450 m 16-30.VII.1996 (GRL). **Piemonte:** Sestriere 2000 m 28.VI.1983 (PRN). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 4.VIII.1970, 4.VIII.1971. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.VI.1974, 7.VI.1982 (GRL). **Molise:** Pesche (IS) 23.V.1982 (GRL); Petacciato (CB) 2 m 3 e 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Serino (AV) 30.VI.1984; Battipaglia (SA): Cioffi 21.IV.1983, 12 e 19.V.1983, 7 e 28.VII.1983, 1.III.1984,

Torre Lama 2-27.VIII.1984, 1 e 15.IX.1988 (RTN, PRN). **Basilicata:** Calanchi di Ferrandina 12.VII.1983; Pollino: Terranova 31.V.1983; Fiume Mercure 16.V.1983; Rotonda: fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 18.V.1996 (SCL). **Sicilia:** Contrada Traversa 20.VII.1978 (PRN); Nebrodi: San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL); Ficuzza VIII.1969, 25.IX.1979, 9.VIII.1980, 31.VIII.1981, 6.IX.1988; Giacalone 23.VIII.1974; Partinico 19.V.1998 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (6); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2784); **Trentino:** 1851-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-2000; (812); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** (1901-1925); 1951-2005; (699); (3386); **Abruzzo:** 1926-2005; (1398); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1976-2000; (2923); **Puglia:** 1976-2000; (2108); (2923); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2923); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3247); **Sardegna:** (1976-2000); (2894); (2930).

311. - **(-)** ***Laothoe amurensis*** **(Fisher de Waldheim, 1830)** (= *tremulae* Boisduval, 1828, nec Borkhausen, 1793)

Nota - Le citazioni di *L. populi* var *tremulae* per la **Lombardia:** (164), (218), (319) sono da riferire a *L. populi*.

312. - ***Agrius convolvuli*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 23.IX.1972 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 8.IX.1987; Scafati (SA) 9.VI, 21-25.VII, 21-25.VIII.1983; Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 6.VIII.1977; Bitonto 21.VI.1982; Pulo di Altamura 25.VIII.1978, 29.V, 30.VI.1979; Locorotondo 18.VII.1992; Triggiano 27.VI.1982; Parco delle Pianelle 3.VII.1970, 4.VI, 25.VII.1971, 2.IX.1972, 22 e 25.VIII.1973; San Paolo 3.VII.1970, 4.VI, 25.VII.1971; Monte Camplo 9.VIII.1970, 30.IX.1973, 2.IX.1975; gravina di Petruscio 18.VIII.1983, 10.VII.1985; gravina di Massafra 24 e 26.IX.1971; gravina di Laterza (TA) 27.V, 24.VII.1976; Villa Castelli 15.V.1975; Veglie: Torre Lupomonaco M.VI-M.VII.1961; Gargano: Foresta Umbra 20.VIII.2005 (PRN); Fiume Lato 22.VI.1991 (NRD). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 18.IX.1976, 3.VII.1976; Pietrapertosa 9.VIII.1983; Camastra

31.VII.1975; Lago Duglia 15.VI.1983; Piano Ruggio 19.VI, 23.VII.1976; Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 13.IX.1979, 6.VI.1980; Cropani 6.VI.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 7.X.1980 (PRN); Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 26.VIII.2001 (SCL). **Sicilia:** Giacalone 27.VIII.1973; Ficuzza 25.IV.1974; Etna N: Linguaglossa 25.VIII.1981; Ribera 300 m 9.IX.1995; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 3.VIII.1978 (GRL); Trapani: Salina Paceco 28.VIII.1998 (PRN). **Arcipelago siciliano:** : Isola di Pantelleria 4.X.1986 (leg. Massa, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2559); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1701-1750, 1801-2000; (2*); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1089); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (216); (3024); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3411); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (2516); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2005; (1398); (3356); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (99); (2940); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); (2732); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (421); (3347); **Sicilia:** 1701-1900; 1926-1950; 1976-2000; (1); (2949); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (330); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2249).

313. - ***Acherontia atropos*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Torre del Greco 10.V.1957 ex l. su melanzana. **Puglia:** Pulo di Altamura 25.VIII.1978, 28.VII.1983; Bari: Campus 19.VIII, 10-15.IX.1980; Polignano 11.VII.1978; Fiume Lato 12.VIII.1991; gravina di Riggio 19.IX.1991; gravina di Petruscio 18.VIII.1983; Otranto 2.VII.1999. **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 6.VI.1980; San Severino 15.IX.1979. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 7.X.1980. **Sicilia:** Sperlinga 12.IX.1959; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 3.VIII.1978, 15.X.1996 (tutti, PRN). Ciminna (PA) larva su olivo 18.VIII.1953 (coll. I.E.P.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1851-1925); 1926-1950; 1976-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (1901-1925);

(392); (935); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (110); (3205); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3310); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 2001-2005; (895); (1044); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3417); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (699); (2142); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1926-2000; (99); (2940); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (2511); **Puglia:** 1926-2000; (1658); (2924); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (3256); **Sicilia:** 1701-1950; 1976-2000; (1); (2949); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; (349); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (114); (2110).

314. - ***Sphinx ligustri*** **Linnaeus, 1758**

Nuovi dati - **Puglia:** Castellaneta Marina, 5 m, 20.VIII.1999 (PRN). **Calabria:** Monte Moschereto, 1000 m, 29.VI.1996 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1851-1900); 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (262); (1835); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2894); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3129); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1951-2000; (1776); **Basilicata:** 1976-2000; (2923); **Calabria:** (1976-2000); (2469); **Sicilia:** 1851-1925; (144); (1340); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3189).

315. - ***Hyloicus pinastri*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 13.VI.1985 (GRL); Moncalieri (TO) 10.VII.1970 (GLL, PRN). **Sicilia:** Etna N: Linguaglossa 6.VII.1987, 19.VI.1989; Etna N: Montescavo 1600 m 23.VII.1992; Etna N: Galvarina 1800 m 22.VII.1992 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2659); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1951-2005; (1885);

(3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (190); (3310); **Marche:** 1851-1900; (385); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Molise:** 1976-2005; (3156); (3447); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); **Calabria:** 1976-2000; (2142); (2274); **Sicilia:** 1976-2000; (2532); (3247); **Sardegna:** 1901-1925; (841); (886).

316. - ***Hemaris tityus*** **(Linnaeus, 1758)** (= *variegata* Müller, 1766; *bombyliformis* Ochsenheimer, 1808; *scabiosae* Zeller, 1869)

Sphinx variegata è descritta su esemplari del **Piemonte**: Torino: colle dei Cappuccini e fiume 'Duriam' (Dora Riparia) (6).

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna:** (2932); probabilmente da riferire a *H. fuciformis*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Varallo Sesia 20.VIII.1998; Novara: Alpe Devero 1500 m 6.VII.1998 (CMC, PRN). **Alto Adige:** Zirog 20.VII.1991. **Toscana:** Potì (AR) 20.VII.1985 (GRL). **Calabria:** Sila, Fossiata 28.V.1979. **Sicilia:** Madonie, Piano del Faggio 1450 m 31.V.1998 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; (260); (1238); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (1572); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (2795); **Friuli:** 1851-1975; (181); (2051); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2894); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2894); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (190); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (2945); **Puglia:** 1976-2000; (2894); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1976-2000; (2894); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (144); (3320).

317. - ***Hemaris fuciformis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) 16-26.VII.1971 (CMC, PRN). **Toscana:** Potì (AR) 20.V.1985. **Abruzzo:** Gran Sasso 25.VIII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (157); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (2894); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; (110); (246); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2142); **Abruzzo:** 1901-1925;

1976-2000; (699); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** 1976-2000; (3466); **Calabria:** 1976-2000; (2894); **Sicilia:** 1851-1900; (144); (343); **Sardegna:** (1976-2000); (2469).

318. - ***Hemaris croatica*** **(Esper, 1800)**

Venezia Giulia: 1976-2000; (2894).

319. - ***Macroglossum stellatarum*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Serino (AV) 22.IX.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Fiume Lato 14.X.1991 (NRD); Ruvo di Puglia 4.VI.1982; Trani V.1983; Bari: Campus 6.VI.1979, 5.X.1980, 10.I.1983; Triggiano 19.V.1983; Pianelle 4.VI, 26.VIII.1971, 6.VII.1967, 20.VI.1969, 16.VIII.1973; San Paolo 10.VI.1968, 10.VI.1966; Monte Camplo 3.VI.1967, 30.IX, 10.X.1973; gravina di Petruscio 18.VIII.1983; gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992; Faggiano 3.VI.1967, 3.III.1968, 7.VI.1968; Torre Guaceto 5.X.1977, 26.IX.1978. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 3.XI.1980; fiume Camastra 9.VII.1975; Sellata: La Maddalena 21.X.1979; Monte Vulture (PZ) 16.VII.1968; Tiera scalo 28.III.1977; Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Terranova 11.VIII.1980, 11.X.1983; Cropani 25.IX.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979 (PRN); Sersale (CZ) 20.X.1985; Umbriatico 10.VII.1982 (RTN, PRN); Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 22.VIII.2001 (SCR). **Sicilia:** Mandria del Conte 28.X.1989; Palermo 24/9 e 1.X.1979; Sambuca di Sicilia 27.VIII.1959; Conteranieri 1.V.1988 (GRL). **Arcipelago siciliano**: Isola di Pantelleria 3 e 5.X.1986 (leg. Massa, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (1044); (3275); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3443); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1901-2000; (811); (2091); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (2511); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (468); (2108); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (32); (3200); **Sicilia:** 1701-2000; (1); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (330); (3226); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (114); (2249).

320. - ***Daphnis nerii*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna:** (2980); non si hanno altri dati per l'isola.

Piemonte: 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-1950; 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (211); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2000; (81); (2894); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (413); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; (114); (419); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2894); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; (19); (190); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Lazio:** 1851-1950; 1976-2000; (344); (3123); **Campania:** 1901-1925; (1013); **Puglia:** 1976-2000; (2923); (2963); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (309); (2894).

321. - ***Proserpinus proserpina*** **(Pallas, 1772)**

Nota - La citazione per la **Puglia:** Orto Agrario della Società Economica di Terra d'Otranto (70), è da confermare.

Nuovi dati - **Liguria:** Stellanello (SV) ex o. 9.VI.1993; Andora (SV) 9.VI.1995 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.V.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (2894); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2894); (3037); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (699); (3052); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); **Puglia:** (1801-1850); (70); **Basilicata:** 1976-2000; (2142); (3298); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3320).

322. - ***Hyles euphorbiae*** **(Linnaeus, 1758)** (= *exulae* Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni per la **Sardegna:** (331), (2732) vanno riferite a *H. dahlii*.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 30.VI.1976 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 1-5.IX.1983 (SNN). **Puglia:** Zapponeta 18.V.1979; Mellitto 16.V.1979; Pulo di Altamura 25.VIII.1978, 4.V, 29.V.1979; Parco delle Pianelle 19.V.1969; San Paolo 14.V, 3.VIII.1969, 21.V.1971, 14.V.1968; gravina di Massafra 19.IV.1972, 4.V.1972; gravina di Ginosa 28.V.1980; gravina di Laterza (TA) 27 e 29.V.1976, 22.V.1983; Monte Camplo 2.IX.1975; Lido Silvana 24.VIII.1968; Case Arse 14.V.1967; fiume Lato 22.VI.1991; Villa Castelli 15.V.1975; Torre Guaceto 26.IX.1978; Porto Cesareo (LE):

Serra degli Angeli 2 m 10.VIII.1996 (PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 23.V.1977; Metaponto: San Marco 19.V.1985; Bosco di Policoro (MT) 13.V, 19.VI.1977; Pollino: Piano Ruggio 18.VI, 23.VII.1976, 22.VII.1979; Timpone Castellana 13.IX.1979, 9.V.1981, 17.VII.1983; fiume Mercure 7.VII.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Civita 20.IV, 29.V.1974 (PRN). **Sicilia:** Piano Colla 31.VIII.1973; Licata 7.VI.1989 ex l.; Madonie: Mandria del Conte 1.X.1994 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1900; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2342); **Alto Adige:** 1851-1975; (239); (2469); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1801-2000; (70); (3052); **Abruzzo:** (1901-1925); 1951-2005; (1044); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (1013); (1350); **Arcipelago campano:** 1851-1900; 1926-1950; (327); (1139); **Puglia:** 1801-1850; 1926-2000; (70); (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (70); (2232); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (109); (3278); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1926-2000; (223); (476).

323. - ***Hyles dahlii*** **(Geyer, 1828)**

Sphinx dahlii è descritta su esemplari della **Sardegna:** Cagliari (in Hübner, Sammlung europäischer Schmetterlinge, Sphing., Tav. 36, fig. 161-164) (23*).

Nota - Le citazioni per la **Lombardia:** (164) ed il **Trentino:** (1184) sono molto dubbie.

Arcipelago toscano: 1976-2000; (3129); (3138); **Sardegna:** 1801-2000; (23*); (2906); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

324. - ***Hyles gallii*** **(Rottemburg, 1775)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria:** (2732) e la **Sardegna:** (2980) sono molto dubbie. La citazione per l'**Emilia:** (246) va riferita a *H. hippophaes* (377). Le citazioni per **Toscana, Puglia, Calabria** e **Sicilia** vanno riferite a *H. euphorbiae*.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1851); 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (164); (550); **Trentino:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (401); (1958); catturata dopo il 1970

(2973); **Veneto:** 1801-1900; (98); (161); **Friuli:** 1851-1900; (392).

325. - ***Hyles nicaea*** **(de Prunner, 1798)**

Sphinx nicaea è descritta su esemplari di Nice en Provence IX (Lepidoptera Pedemontana: 86) (26).

Nota - In (2469) erroneamente è riportato il **Piemonte** come luogo tipico. La citazione generica per la **Sardegna** è da confermare.

Piemonte: 1801-1850; (114); (2410); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3007); **Sardegna:** (1976-2000); (2469).

326. - ***Hyles vespertilio*** **(Esper, 1783)**

Sphinx vespertilio è descritta su esemplari del **Veneto:** dintorni di Verona (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 2: 178, Tav. XXII, fig. 4) (9*); (3144).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 2.VII.1976. **Piemonte:** Noasca 10.VII.1973. **Trentino:** Lago di Cavedine 400 m VIII.1990 (GRL). **Marche:** Valle di Ussita (MC) 1000 m 2.VI.1979; Monti Sibillini: Forca di Gualdo 1400 m ex l. 2.VII.1980 (TBL, PRN). **Abruzzo:** Gran Sasso 20.VI.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (9*); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (246); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2894); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2000; (19); (2447); **Marche:** 1951-2000; (1980); (2643); **Lazio:** 1951-2005; (2142); (3419); **Abruzzo:** 1976-2000; (2894).

327. - ***Hyles hippophaes*** **(Esper, 1789)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; (736); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3378); **Trentino:** 1901-1950; (812); (1231); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1950; (170); (2469); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3007); **Emilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; (1010); **Toscana:** 1851-1900; (190); (206).

328. - ***Hyles livornica*** **(Esper, 1780)**

Sphinx livornica è descritta su esemplari della **Toscana:** Livorno (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 2 (1): 83, Tav. VIII, fig. 4) (9*); (3144).

Nuovi dati - **Campania:** Scafati (SA) 21-25.V.1983 (SNN); Battipaglia (SA): Cioffi 5 e 26.V.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 6.VIII.1977; Terlizzi 4-25.V.1978; Pulo di Altamura

28.V.1979; San Giorgio (BA) 14.V.1983; Parco delle Pianelle 26.VII.1970; San Paolo 16 e 23.VI.1969; gravina di Laterza (TA) 7 e 27.V, 24.VII.1976; Monte Camplo 18.V.1975; Fiume Lato 22.VI.1991; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Villa Castelli 15.V.1975 (PRN); Veglie: Torre Lupomonaco M.VI-M.VII.1961 (Hartig in litt.); Gallipoli (LE): Baia Verde 9-14.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 1.VI, 3.VII, 29.VIII.1976; calanchi di Ferrandina 12.VII.1983; Metaponto: San Marco 8 e 22.IV, 11.V.1983; Bosco di Policoro (MT) 19.VII.1977; Monte Caperino 10.VIII.1983; Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980, 27.III, 9.V, 6.VI.1981 ; Belvedere 16.VII.1980 ; sorgente Acquafredda 3.VI, 19.VI.1982; Piana San Francesco 14.VIII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Piano Ruggio 19.VI, 22.VII.1976, 18.VII.1977, 22.VII.1979; Rotonda 23 e 26.VII.1979, 7.VI.1980, 18.V, 7.VII.1981; Terranova 19.VI.1982; San Severino 7.VII.1981, 23.VII.1982; Cropani 6.VI.1981. **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980, 4.VI, 20.VII.1981; foce torrente Coserie 20.VII.1981; Santo Stefano di Rogliano 5-10.VII.1981; Pollino: Acquatremola 4.VII.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Vallone Colloreto 6.VI.1981; Frascineto 25.VII.1979 (PRN); Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 27.VIII.2001 (SCR). **Sicilia:** Piano Colla 22.VII.1979; Ficuzza 28.V.1973; Giacalone 31.V.1976, 1.V.1987; Palermo 11.V.1988; Piana degli Albanesi 11.IV.1980; Partanna 19.III.1977; Etna N: Linguaglossa 2.VII.1981 (GRL); Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (9*); (3321); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (946); (3419); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (421); (3356); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (99); (1183); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (97); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (223); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2478); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

329. - ***Deilephila elpenor*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 1.VIII.1976. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.V.1982, 3.VI.1988; Molinelli (AR) 23.V.1988 (GRL). **Marche:** Abbazia di Fiastra 17.V.1966; Montemonaco 10.VI.1973 (TBL, PRN). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 12.V, 7 e 28.VII.1983, 17.VIII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Grottaglie 12.VII.1990; Otranto 1.V.1999. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 11.V.1983, 19.V.1985; Pollino: Rotonda 26.V.1981, 9.VII.1980, 14.IX.1979, 16.V.1983; fiume Mercure 20.VI1982. **Calabria:** foce torrente Coserie 20.VII.1981 (PRN). **Sicilia:** Nicolosi 25.VI.1984; Piana degli Albanesi 7.VIII.1980; Misilmeri 24.V.1984; Giacalone 7.VIII.1972, 31.V, 27.VII, 29.VIII.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 2001-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2000; (10); (3068); **Friuli:** 1851-1975; (392); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (2346); **Romagna:** 1951-2005; (1835); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2593); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (233); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2108); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 1976-2005; (2732); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (3128); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (114); (2249).

330. - ***Deilephila porcellus*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna,** non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 4.VII.1983; Valdieri 13.VI.1985; Val Bognanco (VB) 16 e 21.VI.1977 (GRL); Sestriere 2000 m 28.VI.1983 (PRN). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 4.VI.1970, 1.VIII.1970. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.VII.1973, 12.VI.1981, 23 e 29.V.1982, 28.IV.1984, 26.V.1987; Molinelli 12.V.1986; Sandolo (AR) 4.VI.1988. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 8.VI.1982 (GRL). **Basilicata:** Lago Sirino 22.VI.1980, 4 e 14.VI.1981; Pollino: Terranova 31.V.1983 (PRN). **Calabria:** Lago Arvo 26.VI.1999 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800;

(1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (6); (3414); **Lombardia:** 1801-1925; 1951-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (157); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1951-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Puglia:** 1976-2000; (2923); (3129); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206); (2894); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (209); (2949); **Sardegna:** (1976-2000); (2469); (2930).

331. - ***Hippotion celerio*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni generiche per il **Trentino**: (1388), (2732) sono da riferire all'**Alto Adige**.

Nuovi dati - **Sicilia:** Ficuzza 15.X.1990; Riserva Naturale Zingaro 20.III.1997; Trapani: Salina Paceco 25.XI.1998; Collesano 15.IX.1999 ex l. su Avocado (PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (736); (2732); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; (20); (910); **Lombardia:** 1851-1925; (260); (550); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3384 bis); **Emilia:** 1851-1900; 1926-1950; (377); (1235); **Romagna:** 1976-2000; (2894); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (190); (3062); **Marche:** 1976-2000; (3007); **Lazio:** 1976-2000; (2615); (2894); **Calabria:** 1951-1975; (2274); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (2949); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; (330); **Sardegna:** 1851-1925; 1951-1975; (331); (2078).

332. - **(?)** ***Theretra alecto*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata solo per la **Sicilia:** un esemplare raccolto a Catania (Etna) da Piazza (97), dato poco attendibile o presenza accidentale.

Fam. Axiidae

333. - ***Axia margarita*** **(Hübner, 1813)**

Nota - È citata genericamente per la **Toscana**; non risultano segnalazioni per questa regione.

Piemonte: 1801-1900; 1976-2000; (114); (3384 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (3007); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-1975; (650); (1787); **Liguria:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3384 bis); **Toscana:** (1976-2000);

(2732).

Fam. Bombycidae

334. - (-) ***Bombyx mori*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È elencata fra le specie della fauna italiana; ciò è inammissibile, in quanto non risulta acclimatata, neanche in altre Nazioni europee, dove un tempo la bachicoltura era ampiamente diffusa. Peraltro, non si tratta di una specie naturale, bensì del risultato di secoli di selezioni artificiali al punto che oggi non si conosce più la forma originaria. Ammettendo *B. mori* nella fauna italiana si dovrebbero ammettere anche tutte le specie esotiche allevate in Italia, dall'*Attacus atlas* alle *Morpho*.

Fam. Castnidae

335. - ***Paysandisia archon*** **(Burmeister, 1880)**

Nota - Introdotta recentemente con l'importazione di palme di grandi dimensioni, sta espandendo con grande rapidità il proprio areale.

Marche: 2001-2005; (3396); (3467); **Campania:** 2001-2005; (3325); **Puglia:** 2001-2005; (3445).

Fam. Hesperiidae

336. - ***Erynnis tages*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). Citata per la **Sicilia:** (97), (635), ma è considerata assente nell'isola (1363), (3049).

Nuovi dati - **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 18.IV.1977; fiume Camastra 1.V, 9.VII.1975; Monte Vulture (PZ) 10.VI.1972, 5.VIII.1960; Noepoli 600 m 4.VII.1981; Pollino: Fonte di Rummo 29.V.1975; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Viggianello 29.V.1979. **Calabria:** Oriolo (CS) 400 m 20.VI.1982; Sila: Fossiata 20.V.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (253); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (603); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3371); **Umbria:**

1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (109); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2000; (15); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1285); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1976-2005; (2093); (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (32); (3304).

337. - ***Carcharodus alceae*** **(Esper, 1780)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Levano 700 m 14.VI.1998; Aquara (SA): Ponte Calore 120 m 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Lucera (FG) 20.VIII.1990; Bari 15.X.1991; fiume Tara 16.VIII.1974, 20.VI.1973. **Basilicata:** Monte Caperino 26.VIII.1973; fiume Camastra 1.V.1975, 28.VIII.1975; Monte Vulture (PZ) 9.VIII.1968; Pollino: Madonna del Pollino 23.VII.1979; fiume Mercure 7.VII.1981. **Calabria:** Sila: Camigliatello 30.VI.1991; Pollino: Civita 19.VII.1974, 24.VII.1977, 20.V.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1976-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (439); (2995); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1013); (935); **Liguria:** 1926-2000; (668); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1926-2005; (214); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (2377); (3108); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3138); **Umbria:** 1851-1925; (359); (627); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3417); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1363); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1183); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (658); (3311); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1013); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3233); **Sardegna:** 1851-2005; (278); (3440); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

338. - ***Carcharodus lavatherae*** **(Esper, 1783)** (= *alceae* Fabricius, 1793)

Nota - È citata per il **Regno di Napoli** (70). Per la **Puglia** non risultano dati certi, se non riferimenti in distribuzioni generiche, poco attendibili, in testi divulgativi (3187), (3274). Manca in **Sardegna** (1363). La presenza in **Sicilia** va confermata.

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1860); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2005; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1856); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197);

Liguria: 1901-2000; (658); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (2485); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3077); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (177); (3371); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (3077); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (3265); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (681); (3010); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (658); (3457); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2202); **Calabria:** 1951-1975; (2202); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (147); (2178).

339. - ***Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847)** (= *altheae* Hübner, 1803; *alchymillae* Hemming, 1936)

Hesperia floccifera è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa e del **Lazio:** Roma, fra Porta San Giovanni e San Paolo (Isis, 40 (4): 286) (109).

Nota - È citata per la **Sardegna:** (2250); presenza in **Sardegna** molto dubbia (3049), (3241).

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 9.VII.1975; Senise (PZ) 3.V.1981; Pollino: Piano Ruggio 20.VI.1982; Viggianello 10.VI.1978. **Calabria:** Pollino: Civita 25.VII.1979, 29.V.1975; Monte Moschereto 7.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2485); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2005; (204); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1363); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3186); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3077); **Toscana:** 1851-2005; (206); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); (3315); **Umbria:** 1901-1925; (681); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (3077); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3265); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3010); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (1658); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2038); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (833); (3304); **Sicilia:** 1801-1900; 1976-2000; (97); (2706).

340. - ***Carcharodus baeticus* (Rambur, 1839)** (= *marrubii* Rambur, 1840)

Nota - È citata con dubbio per l'**Emilia:** (262). Citata per la **Sardegna:** (781), (1970), non riportata per l'isola in (2892).

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura (BA) VI ex l. (Bertaccini in litt.); gravina di Riggio 20.VIII.1991. **Calabria:** Monte Moschereto 22.VII.1979, 17.VII.1980, 7.VII.1981 (PRN).

Piemonte: 1901-1950; (1080); (1166); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Toscana:** 2001-2005; (3423); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (933); (2485); **Lazio:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2093); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3010); **Campania:** 1926-1950; (1183); **Puglia:** 1976-2005; (2202); (3397); **Calabria:** 1951-2000; (2077); (2093); **Sicilia:** 1851-1900;

1926-2000; (126); (2089).

341. - ***Spialia sertorius*** **(Hoffmannsegg, 1804)** (= *sao* Hübner, 1801; *eucrate* Ochsenheimer, 1808; *hibiscae* Hemming, 1936)

Nota - In **Sicilia** è sostituita da *S. orbifer* (1995). In **Sardegna** è *therapne* (1363); peraltro in (1995) è citata come presente nell'isola; da confermare.

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 29.V, 1.VI, 28.VIII.1975; Pollino: Viggianello 10.VI.1978, 6.VI.1979; Cersosimo 400 m 6.VI.1981; Terranova 16.V.1983. **Calabria:** Castiglione Cosentino 25.V.1978; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 6.VI.1980; Civita 29.V.1975, 20.V, 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-1950; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (368); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2503); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-2005; (204); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (935); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1950; (114); (3183); **Emilia:** (1851-1900); 1901-2005; (262); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (177); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (2251); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1851-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (109); (3417); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (344); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (811); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1951-2000; (2038); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1901-2005; (811); (3304).

342. - ***Spialia orbifer*** **(Hübner, 1823)** (= *eucrate* Treitschke, 1831)

Nota - In Italia *S. orbifer* è presente solo in **Sicilia**; le citazioni per le altre regioni vanno riferite a *S. sertorius* (2892).

Sicilia: (1801-1850); 1851-2000; (97); (2706).

343. - ***Spialia therapne*** **(Rambur, 1832)**

Sardegna: (1801-1900); 1901-2005; (114); (3440).

344. - ***Muschampia proto*** **(Ochsenheimer, 1808)**

Nota - Le citazioni per il **Trentino:** (654*), la **Toscana:** (206) e le **Marche:** (385) sono poco attendibili.

Nuovi dati - **Basilicata:** bosco di Timmari (MT) 17.IX.1984; fiume Camastra 29.IX.1975; Pollino: Piano Ruggio 23.VIII.1975 (PRN); Ofanto: Masseria Parasacco (PZ) 18.VIII.1970 (Capello in litt.). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 700 m 17.VII.1980, 4.VII.1981 (PRN).

Abruzzo: 1951-1975; (1581); **Puglia:** 1901-2000; (1363); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (2100); **Calabria:** 1951-2005; (2038); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (355); (3233).

344 bis - (-) (***Muschampia tessellum*** **(Hübner, 1803)**

Nota - È citata per la **Lombardia:** (125 ter), l' **Alto Adige:** (?) Bozen: Gries (170) e l' **Abruzzo:** (?) (Costa), ma potrebbe essere o *M. proto* o *P. carthami* (218), (319). Si ritiene che tali citazioni siano da riferire a *P. carthami* che fra i sinonimi annovera anche *tessellum* Ochs.

345. - ***Pyrgus carthami* (Hübner, 1819)** (= *fritillarius* auct. nec Poda, 1761; *tessellum* Ochsenheimer, 1807)

Nota - La presenza in **Romagna, Toscana** e **Sicilia** è da confermare.

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Cozzo Vardo 9.VII.1972. **Calabria:** Sila: Camigliatello 27.VII.1970, 20.VI.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (453); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2691); **Veneto:** 1851-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1363); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1099); (3183); **Romagna:** (1851-1900); (319); **Toscana:** 1851-1900; (206); **Umbria:** 1901-1950; (627); (902); **Marche:** 1901-2000; (933); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2651); **Abruzzo:** (1801-1850); 1851-2000; (70); (2142); **Campania:** 1926-1950; (1285); **Puglia:** 1951-1975; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (933); (1745); **Sicilia:** 1851-1925; (144); (832).

346. - ***Pyrgus sidae* (Esper, 1782)**

Nuovi dati - **Puglia:** San Paolo (TA), Orimini 25.V.1976/77. **Basilicata:** Pietrapertosa 15.VI.1977; fiume Camastra 29.V.1975 (PRN).

Piemonte: 1901-2005; (1099); (3461 bis); **Trentino:** 1901-1950; (566); (1363); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; (170); (566); **Veneto:** 1976-2000; (2192); (3049); **Friuli:** (1976-2000); (2054); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (1057); (3183); **Emilia:** 1901-1950; (501); (3049); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (3077); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (177); (3371); **Marche:** 1926-1975; (1363); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3049); **Abruzzo:** 1901-1950; 1976-2000; (664); (2945); **Molise:** 1976-2000; (2142); **Campania:** 1976-2005; (3265); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2485); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (2077); **Calabria:** 1976-2000; (2100).

347. - ***Pyrgus andromedae* (Wallengren, 1853)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1949); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 2001-2005; (375); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (231); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (424); (2211); **Alto Adige:** 1851-1950; (231); (1363); **Veneto:** 1926-2000; (1363); (2180); **Friuli:** 1851-1900; 2001-2005; (174); (3423).

348. - ***Pyrgus cacaliae* (Rambur, 1839)**

Nota - La citazione per la **Liguria** è da confermare. La citazione per il **Lazio:** Monte Autore (664), è errata (1363). La citazione per la

Toscana: Abetone (177), di una specie diffusa nella cerchia alpina è certamente errata.

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1926-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1975; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (215); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (424); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1851-1975; (244); (2995); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** (1801-1850); (114).

349. - **(-)** ***Pyrgus centaureae*** **(Rambur, 1839)**

Nota - La citazione per il **Friuli:** (174) va riferita a *P. andromedae* (410). La specie non è presente in Italia.

350. - ***Pyrgus malvae*** **(Linnaeus, 1758)** (= *alveolus* Hübner, 1775)

Nota - In **Italia** *P. malvae* è presente solo nelle regioni nordorientali, tutte le altre citazioni per l'Italia continentale e la **Sicilia** vanno riferite a *P. malvoides*. Le citazioni per la **Sardegna** probabilmente vanno riferite a *S. theraphne*; l'unico Pyrgus della **Sardegna** è *P. armoricanus* (3423). Per il **Veneto** si ha un solo esemplare certo di Sappada, 1200 m, 1926: (1363).

Veneto: 1926-1950; (1363); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (1795).

351. - ***Pyrgus malvoides*** **(Elwes & Edwards, 1897)** (= *fritillum* Rambur, 1842 nec Hübner, 1775)

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 1.V.1976; Pollino: Fonte di Rummo 29.V.1975 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (453); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1801-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (181); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (109); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (109); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-1850; 1901-2000; (109); (3265); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1363); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (2661).

352. - ***Pyrgus serratulae*** **(Rambur, 1839)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (196) è errata (832).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1851-1950; 1976-2005; (375); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-

2000; (215); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-2000; (244); (2995); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Liguria:** 1951-2000; (2054); (3183); **Toscana:** 1951-1975; (3383); **Marche:** 1901-2000; (933); (2485); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2651); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (314); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1976-2000; (3265).

353. - ***Pyrgus onopordi*** **(Rambur, 1839)**

Nota - Le segnalazioni di *P. onopordi* per la **Sicilia** vanno riferite a *P. armoricanus*; la citazione per la **Sardegna:** (809) è errata (1363).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1363); (3145); **Piemonte:** 1901-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1901-1950; 1976-2000; (809); (3393); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (424); (2774); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (796); (2973); **Veneto:** 1901-2000; (809); (2180); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1950; (809); (1363); **Romagna:** 1901-2005; (1050); (3429); **Toscana:** 1901-1950; 1976-2005; (809); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1951-1975; (809); (2085); **Marche:** 1901-2000; (895); (3077); **Lazio:** 1901-2000; (664); (3265); **Abruzzo:** 1851-1950; 1976-2000; (344); (2945); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2944); **Basilicata:** 1951-1975; (1658); (2100); **Calabria:** 1901-1950; 1976-2005; (1050); (3304).

354. - ***Pyrgus carlinae*** **(Rambur, 1839)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia:** (501) e l'**Abruzzo:** (809) sono probabilmente errate.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-2005; (737); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3393); **Trentino:** (1901-1925); 1926-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** (1901-1925); (566); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

355. - ***Pyrgus cirsii*** **(Rambur, 1839)** (= *fritillum* Hübner, 1775)

Nota - Le citazioni di *P. cirsii* per l'Italia sono dubbie (1795). *P. cirsii* è presente solo nell'estremo ponente ligure (3423); le altre citazioni per l'**Italia continentale**, la **Sicilia** e la **Sardegna** sono errate, da riferire ad altre specie.

Liguria: (1801-1850); 1900-1925; 1976-2000; (114); (3183).

356. - ***Pyrgus armoricanus*** **(Oberthür, 1910)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Tempone Zerrillo 630 m 7.VI.1998, Levano 700 m 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 1.V, 28.IX.1975 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2365); (3145); **Piemonte:** 1901-1950; 1976-2005; (797); (3378); **Lombardia:** 1901-2005; (809); (3270);

Trentino: 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1901-1950; (1038); (1363); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2000; (1681); (2180); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (935); (1363); **Liguria:** 1901-1950; 1976-2000; (809); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (377); (3105); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3077); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (809); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (872); (3315); **Marche:** 1901-2000; (809); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (809); (3265); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (809); (3010); **Campania:** 1976-2005; (3265); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2038); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (2941); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (357); (2706); **Sardegna:** 1901-2005; (792); (3440); **Arcipelago sardo:** 2001-2005; (3440).

357. - ***Pyrgus alveus*** **(Hübner, 1803)**

Nota - Le citazioni di *P. alveus* per **Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata** e **Calabria** vanno riportate a *P. centralitaliae*, quelle per la **Sicilia** ad altra specie. La citazione per la **Sardegna:** (290) è dubbia. Nella cartina in (3423) non è indicata per il **Piemonte** meridionale e la **Liguria**.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (390); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (239); (2691); **Veneto:** 1851-2000; (129); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (174); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

358. - ***Pyrgus accreta*** **(Verity, 1925)**

Piemonte: 1926-2005; (1153); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2284).

359. - ***Pyrgus centralitaliae*** **(Verity, 1920)**

Hesperia alveus r. *centralitaliae* è descritta su esemplari delle **Marche:** Monti Sibillini (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 32 (1): 4) (902).

Nota - È indicato come luogo tipico **Marche:** Bolognola 1100-1400 m (olotipo r. *centralitaliae*), (1363). La citazione (*alveus* v. *fritillum*) provincia di Cuneo: (359), potrebbe essere riferibile a *P. centralitaliae*, che nelle Alpi occidentali è simpatrico con *P. alveus* (Balletto in litt.). A questa specie vanno riferite le segnalazioni per la penisola di *P. alveus, P. fritillum* e/o *P. alveus fritillum* quando sono citati come specie distinta da *P. malvae*. Le citazioni per la **Calabria** e la **Sicilia** sono da confermare.

Romagna: (1901-1925); 1976-2000; (1010); (2185); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (206); (3062); **Umbria:** 1801-1850; 1901-1950; (109); (1363); **Marche:** 1901-2000; (809); (1363); **Lazio:** 1801-1925;

1951-2000; (109); (2651); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (2945); **Campania:** 1901-1950; (1013); (1350); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2202); **Calabria:** 1851-1900; (277); **Sicilia:** 1801-1900; (109); (343).

360. - ***Pyrgus foulquieri* (Oberthür, 1910)** (= *bellieri* Oberthür, 1910)

Nota - La citazione per la **Lombardia:** (1610) è dubbia, non sono presenti esemplari nella collezione dell'autrice (3393). La citazione per l'**Alto Adige:** (1050) è errata (1052). Le citazioni di *P. foulquieri/bellieri* per **Toscana, Marche, Lazio** e **Abruzzo** vanno riferite a *P. picena*.

Piemonte: 1901-2005; (1080); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2284); (3183).

361. - ***Pyrgus picena* (Verity, 1920)**

Hesperia foulquieri r. *picena* è descritta su esemplari delle **Marche:** Monti Sibillini (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 32 (1): 4) (902).

Toscana: 1901-1925; (809); **Marche:** 1901-2000; (847); (2485); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2144); (2651); **Abruzzo:** 1901-2000; (809); (2429°); **Campania:** 1951-1975; (1949).

362. - ***Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928)**

Nota - È citata per la **Lombardia:** (3078). Non è segnalata per la Lombardia in (1122), (1949), (3049) e nella cartina ingrandita a p. 97 di (3078) non sono indicate località per questa regione.

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1363); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1951-2005; (809); (3393); **Trentino:** 1976-2000; (2475); (2503); **Alto Adige:** 1901-1975; (1024); (3393); **Veneto:** 1976-2000; (3049).

363. - ***Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Domodossola 7.VII.1968 (GLL, PRN). **Lazio:** Anticoli Corrado 29.VI.1968; Greggio 2.VI.1969 (PRN).

Piemonte: 1751-1800; 1851-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3270); **Trentino:** 1851-1900; (1053); (3049); **Alto Adige:** 1851-1950; (157); (1363); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (161); (2659); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (375); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (3049); **Emilia:** 1951-2000; (2201); (3186); **Romagna:** 1851-1900; 1976-2000; (2185); (3077); **Toscana:** 1951-2005; (1764); (3372); **Marche:** 1951-2000; (1939); (2643); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2651); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3265).

364. - ***Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771)**

Nota - La citazione per la **Toscana** è da confermare.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (453); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (1053); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1801-2000; (81); (2659); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (181); (3197); **Liguria:** 1951-2000; (2135); (2284); **Emilia:** 1976-2000; (2988); **Toscana:** (1751-1800); (24).

365. - **(-)** ***Carterocephalus silvicolus*** **(Meigen, 1829)**

Nota - La citazione di *C. silvicolus* per il **Piemonte:** (26) è da riferire a *C. palaemon* (1363).

366. - ***Thymelicus lineola*** **(Ochsenheimer, 1808)**

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (114), ripresa anche in (2250) è errata; non esiste in **Sardegna:** (3423).

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Tempone Zerrillo 630 m 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Pollino: Monte Cerviero: Acquatremola 1.VI.1981; Terranova 4.VII.1981; Cersosimo 9.VI.1978. **Calabria:** Oriolo fiumara 21.VI.1981, 9.VI.1978; Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (14); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (215); (2457); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1851-2005; (204); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (364); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (214); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (437); (3371); **Umbria:** 1901-1925; (627); (681); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (2429°); **Molise:** 1976-2005; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (99); (3265); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3233).

367. - ***Thymelicus sylvestris*** **(Poda, 1761)** (= *flava* Brünnich, 1763; *thaumas* Hufnagel, 1766; *linea* Müller, 1766)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2774); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1950; (181); (1425); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (3105); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2000; (1010); (3062); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3371); **Arcipelago**

toscano: (1951-1975); (1795); **Umbria:** 2001-2005; (3423); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3312); **Molise:** 1951-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1350); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1951-2000; (1845); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1851-2005; (277); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (3233).

368. - ***Thymelicus acteon*** **(von Rottemburg, 1775)** (= *heydeni* Plötz, 1884)

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (1589) è molto dubbia (3148).

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998, Roccadaspide (SA): Levano 700 m 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Calabria:** Pollino: Civita 31.VII.1972, 22.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 19.VII.1974, 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (1363); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1925; (171); (1053); **Alto Adige:** 1851-1900; (171); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-1975; (161); (2995); **Venezia Giulia:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2000; (262); (3186); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2485); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (177); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (872); (2251); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3010); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); (3265); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2005; (921); (3311); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3233).

369. - ***Hesperia comma*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 29.IX.1975; Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980. **Calabria:** Sila: Botte Donato 13.VIII.1967; lido di Rossano (CS) 24.VII.1985 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1926-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2005; (125 ter); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (352); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (650); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2000; (110); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1801-1850; (109);

Marche: 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (2651); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (3312); **Campania:** 1976-2005; (2162); (3457); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (2093); **Calabria:** 1951-2005; (2093); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1975; (97); (2095).

370. - ***Ochlodes venata*** **(Bremer & Grey, 1857)** (= *sylvanus* Esper, 1779)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Acquaviva delle Fonti 31.V.1981; Santeramo 17.V.1998 (PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 26.VI, 9.VII.1975; Cersosimo 9.VI.1978; Pollino: Belvedere, radura di faggeta 16.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3279); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1363); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2000; (1010); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (1013); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1851-2005; (277); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3233).

371. - ***Gegenes pumilio*** **(Hoffmannsegg, 1804)** (= *pygmaeus* Cyrillus, 1787; *aetna* Boisduval, 1840; *lefebvrei* Rambur, 1842)

Papilio pumilio è descritta su esemplari della **Campania:** Napoli (in Illiger, Magazin für Insektenkunde, 3: 202) (28). *Papilio pygmaeus* è descritta su esemplari della **Campania:** Amalfi, Stabia (15). *Philoodes lefebvrei* è descritta su esemplari della **Campania:** Napoli (82*); (1203). *Hesperia aetna* è descritta su esemplari di **Sicilia** (88).

Nota - In **Liguria** la specie è estinta (Balletto in litt.). La citazione per l'**Emilia** di *G. lefebvrei* Rambur (1235) è riportata come *G. pumilio* in (1363) ma è da riferire a *G. nostrodamus*.

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Genzano, 330 m, 4.VII.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Gargano: Manaccore di Peschici 2.IX.1974 (Cameron-Curry in litt.). **Calabria:** Pollino: Civita 13.VI.1972, 25.VII.1979, 25.VIII.1975; Monte Moschereto 22.VII.1979 (PRN).

Liguria: 1926-1950; ex (1442); (2791); **Toscana:** 1801-1950; 1976-2005; (73); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-1975; (177); (1740); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-2000; (664); (3418); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (3025); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1751-1800; 1851-1900; 1926-2005; (15); (3457); **Puglia:** 1951-2005; (2202); (3311); **Basilicata:** 1951-1975; (1658); (2077); **Calabria:** 1801-1850; 1926-2005; (70); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (59); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (109); (3055); **Sardegna:** (1851-1900); 1976-2000; (1363); (3440); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

372. - ***Gegenes nostrodamus*** **(Fabricius, 1793)**

Nota - Le segnalazioni di *G. nostrodamus* per l'**Arcipelago toscano**: Isola d'Elba vanno riferite a *G. pumilio* (1203). È confermata per l'Isola d'Elba (3423). La citazione per la **Sardegna**: (2791) è errata; si basa su due femmine non distinguibili da quelle di *G. pumilio* (3465).

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Riggio 19.IX.1991 (PRN); Leuca: Lido Marini 17.VIII.1977 (Villa in litt.).

Piemonte: 1926-1975; (1676); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (2620); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1235); (3186); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3418); **Toscana:** 1901-1950; (627); (2620); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2251); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** (? 1851-1900); 1976-2000; (385); (2643); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2620); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-1975; (658); (1753); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2005; (921); (3418); **Basilicata:** 1951-1975; (1753); (2202); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (54); (3158); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2706).

Fam. Papilionidae

373. - **(-)** ***Zerynthia rumina*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Esiste nel museo naturalistico di Pinerolo (Torino) un esemplare dato per catturato in **Italia**, ma potrebbe trattarsi di un errore (3187).

374. - ***Zerynthia polyxena*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *aristolochiae* de Prunner, 1798; *creusa* Meigen, 1828)

Papilio aristolochiae è descritto su esemplari del **Piemonte** "in ditione Exiliana (Exilles) frequentiis" (26)

Nota - In **Trentino,** nel comprensorio Gardesano non è rinvenuta dagli anni '60 (2995) e in **Alto Adige** non risultano catture recenti (2973); probabilmente estinta in tali regioni.

Nuovi dati - **Puglia:** Cagnano Varano 4.V.1985; Locorotondo 2.V.1991. **Basilicata:** Salandra 15.V.1975; Pietrapertosa 15.IV.1975; fiume

Camastra 1.IV.1976; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980. **Calabria:** Pollino: Civita 20 e 25.IV.1975, 20.V.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (1138); (3393); **Trentino:** 1851-1900; (1951-1975); (211); (2995); **Alto Adige:** 1851-1925; (566); (1787); **Veneto:** 1801-2000; (98); (2798); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (603); (2744); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (1820); (2199); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1975; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1951-2000; (3059); (3186); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3383); **Arcipelago toscano:** 1926-1950; (1210*); **Umbria:** 1976-2005; (3196); (3432); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3180); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** (1751-1800); 1801-2005; (21*); (3457); **Puglia:** (1801-1850); 1926-2000; (70); (2798); **Basilicata:** 1951-2000; (1974); (3265); **Calabria:** 1756-1800; 1901-2005; (13); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (145); (3087).

375. - **(-)** ***Archon apollinus*** **(Herbst, 1798)**

Nota - È citata per l'**Abruzzo:** "il prof. Petagna mi ha assicurato che si trova negli Abruzzi a fine giugno" (48), la **Sicilia:** (31) e la **Sardegna:** (31); citazioni errate, è presente solo in Europa orientale.

376. - ***Parnassius mnemosyne*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Estinta nel **Tirolo meridionale** (2973). La citazione per la **Puglia:** Gargano (70), è da confermare. Le citazioni per la **Sardegna:** (841), (886) sono dubbie; non presente nell'isola (3148).

Valle d'Aosta: (1751-1800); 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; (26); (2365); **Piemonte:** (1801-1800); 1851-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-1925; (157); (1038); **Veneto:** 1801-2000; (98); (2659); **Friuli:** 1851-1975; (174); (2199); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-2000; (893); (2743); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (3059); (3429); **Toscana:** (1851-1900); 1901-2005; (177); (3321); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (960); (3196); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (933); (2643); **Lazio:** 1851-2000; (359); (2199); **Abruzzo:** 1801-1900; 1926-2000; (70); (2819); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1976-2005; (2142); (3457); **Basilicata:** 1801-1850; 1926-2000; (70); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (97); (2671).

377. - ***Parnassius phoebus*** **(Fabricius, 1793)** (= *delius* Esper, 1800)

Papilio delius è descritto su esemplari "der das Wallis von Piemont scheidet" (9)

Nota - Il tipo di *Papilio delius* è di Col Ferret "der das Wallis von Piemont scheidet" (940). La presenza in **Friuli** va confermata. Nel **Veneto:** (Veronese) non più rinvenuta dal 1970 (2180). Citata per la **Calabria:** (70), ma gli esemplari etichettati *P. delius* della collezione Costa sono *P. apollo pumilus* (712).

Valle d'Aosta: 1751-1800; 1901-2000; (9*); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (146); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2796); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2180); **Friuli:** 1851-1900; (352); (392).

378. - ***Parnassius apollo*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1851-2005; (426); (3383); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (2362); (3218); **Trentino:** 1851-2005; (171); (3383); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2574); **Veneto:** 1801-2000; (98); (2995); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2065); (2485); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2000; (246); (3059); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3321); **Umbria:** 1951-1975; 2001-2005; (1750); (3432); **Marche:** 1901-1975; (828); (2093); **Lazio:** 1901-2000; (1225); (2651); **Abruzzo:** 1801-2000; (344); (2620); **Molise:** 2001-2005; (3259); **Calabria:** (1751-1800); 1801-2000; (21*); (2321); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (86*); (2583).

379. - ***Iphiclides podalirius*** **(Linnaeus, 1758)**

Papilio podalirius è descritta su citazioni precedenti, fra cui in primis quella di Ray del 1710, che illustra esemplari della **Toscana:** porto di Livorno (Systema Naturae, (ed. X), I: 463) (4*); (2045).

Nota - È citata per la **Sardegna**, ma non è stanziale nell'isola (3148). È presente in **Sardegna**, probabilmente per introduzione accidentale; un maschio fresco è stato catturato a Oristano (3465).

Nuovi dati - **Campania:** Torre del Greco VI-VIII.1952/56 (PRN); Vesuvio Osservatorio VII.1956 (SNN); Faito VII-VIII.1952/56; Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'Elice 350 m 6.VI.1998; Roccadaspide (SA): Casalotti 200 m 21.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Otranto 1.VI.1999. **Basilicata:** fiume Camastra 25.VIII.1975; Cersosimo 9.VI.1978; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; Terranova 4.VII.1981, 15.V.1983. **Calabria:** Oriolo (CS), 300-450 m, 9.VI.1978, 21.VI.1981; Corigliano (CS): Piana Caruso, 750-900 m, 9.V.1981; Pollino: Colle del Dragone (CS), 1400-1600 m, 16.VII.1980; Civita (CS), 450 m, 19.VII.1974, 20.IV.1975, 22.VII.1979; torrente Raganello (CS), 50-150 m, 19.VII.1979; Monte Moschereto (CS), 700-1000 m, 22.VII.1979 (PRN). **Sicilia:** Solanto 15.VII.1983, 2.VIII.1998, 22.VII.2001; Altavilla Milicia: Valle del Corvo; Marsala 16.VIII.1968; Racalmuto IV.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (398); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (603); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (4*); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-2000; (623); (3131); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (102); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3383); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1756-1800); 1851-1925; 1951-2005; (13); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (101); (3383); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-1925; (43); (3464).

380. - ***Papilio machaon*** **Linnaeus, 1758**

Nuovi dati - **Campania:** Vesuvio Osservatorio VII.1956; Faito V-VIII.1952/56; Torre del Greco V-VIII.1952/58; Battipaglia (SA) VII.1958 (PRN); Castel San Lorenzo (SA): Genzano 330 m 4.VII.1998; Roccadaspide (SA): Casalotti 200 m 21.VI.1998; Aquara (SA): Ponte Calore 120 m 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 27.VI, 1.VII.1975; Pollino: Piano Ruggio 17.VII.1978; Madonna del Pollino 23.VII.1979; Rotonda 20.VII.1975; Terranova 4.VII.1981, 21.IX.1981; Cropani 12.VII.1976. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; torrente Raganello 5.VII.1979. **Sicilia:** Menfi 20.IX.1995; Punta Raisi 5.V.1980; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 5.VIII.1978; Solanto 24.VII.1986, 5.VIII.1995 (PRN); Madonie 28.IX.1960; Augusta 12.VII.1962 (GRL).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2574); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (603); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3383); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3383); **Arcipelago toscano:** 1901-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); (3025); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** (1751-1800); 1801-1850; 1901-2005; (21*); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1900; 1926-2000; (91); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1756-1800); 1851-1925; 1951-2005; (13); (3383);

Sicilia: 1701-2005; (1); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1801-1925; 1951-2000; (95); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3440); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; 1976-2005; (781); (3440).

381. - ***Papilio hospiton*** **Géné, 1839**

Papilio hospiton è descritta su esemplari della **Sardegna:** Tortoli, Barbagia di Ollolai vicino Gavoi A.VI, monti fra Ovodda e Desulo (Memorie della Regia Accademia delle scienze di Torino, Ser. 2, vol. 1, Fasc. 2: 83) (85).

Sardegna: 1801-2005; (85); (3148).

382. - ***Papilio alexanor*** **Esper, 1800**

Nota - In **Sardegna** non è stanziale, solo esemplari migranti (3148).

Piemonte: 1901-2000; (714); (3183); **Liguria:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (3183); **Calabria:** 1901-1950; 1976-2000; (1013); (2532); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1068); (2620).

Fam. Pieridae

383. - ***Leptidea sinapis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Basilicata:** Noepoli 4.VII.1981; fiume Camastra 1.V, 27.VI.1975, 29.V.1976, 11 e 28.VIII.1975; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1978; Laghi di Monticchio 12.VI.1967; Pollino: Piano Ruggio 19.VI.1976; sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; San Severino 5.VII.1981; Terranova 16.V.1983, **Calabria:** Gambarie 6.VIII.1971; Oriolo fiumara 21.VI.1981; Sila: Fossiata 20.V.1979; Pollino: Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3284); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (650); (3383); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3152); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2000; (1010); (2485); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-2000; (623); (3056); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-2005; (811); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1926-2005; (1206); (3274); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** (1851-1900); 1901-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (2844);

Sardegna: (1851-1900); 1901-2005; (278); (3440); **Arcipelago sardo:** 1976-2005; (2960); (3440).

384. - ***Leptidea reali*** **Reissinger, 1989**

Nuovo dato - **Friuli:** Sappada (Balletto in litt.)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2981); (3184); **Piemonte:** 1976-2005; (3286); **Lombardia:** 1976-2000; (2981); **Alto Adige:** 1976-2000; (2981); (3184); **Veneto:** 1976-2000; (3284); **Friuli:** 1976-2000; (3184); (3284); **Liguria:** 1976-2000; (3183); (3286).

385. - ***Leptidea duponcheli*** **(Staudinger, 1871)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte**, vanno confermate. "Citata come *L. lathyri* Dup. per **Lazio:** Roma e **Sardegna:** Novara, da Rühl, se non si tratta di uno dei soliti errori dovuti alla confusione con la ab. *lathyri* di *sinapis*" (1411).

Piemonte: 1851-1925; (361); (736); **Liguria:** (1851-1900); 1926-1975; (355); (2017).

386. - ***Leptidea morsei*** **Fenton, 1881**

Venezia Giulia: 1901-1925; (3383).

387. - ***Anthocharis cardamines*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pietrapertosa 15.IV.1975; Salandra 14.IV.1975; Pollino: Terranova 15.V.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (453); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (364); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (707); (3383); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (114); (3383); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3131); **Umbria:** 1901-1925; 1951-1975; (627); (1996); **Marche:** 1901-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1411); (3312); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano**: 1851-1925; (259); (783 bis); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (3274); **Arcipelago pugliese:** 1926-1950; (1415); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (94); (3290); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3440).

388. - **(-)** ***Anthocharis belia*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - Le segnalazioni di *A. belia* per **Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Lazio** e **Puglia** vanno riferite a *A. euphenoides*. La citazione per l'**Arcipelago campano**: Isola di Capri: (783 bis)

probabilmente è da riferire a *A. cardamines*. *A. belia* vive solo in Nord Africa.

389. - ***Anthocharis euphenoides*** **Staudinger, 1869**

Nota - Citata per la **Toscana:** (206), (177); probabile errore di Mann, o estinta (1411). Molto dubbia la citazione per la **Puglia:** foreste marittime di San Cataldo (70). Le citazioni per il **Veneto:** (98), (161), (367) e l'**Emilia:** (110), sono poco attendibili.

Piemonte: 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1926-1950; (1411); (1989); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (2548); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1951-2000; (1989); (2145); **Lazio:** 1901-2000; (736); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (2328); **Basilicata:** 1976-2000; (2954); **Calabria:** 1801-1850; 1951-2000; (54); (3087).

390. - ***Anthocharis damone*** **Boisduval, 1836**

Anthocharis damone è descritta su esemplari di **Sicilia** (Species général des Lépidoptères, I: 564) (77*).

Nota - È stata rinvenuta in **Calabria** anche sul Massiccio del Pollino (3355).

Calabria: 1901-2005; (1013); (3355); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2005; (77*); (3290).

391. - **(-)** ***Euchloë belemia*** **(Esper, 1799)**

Nota - Le citazioni di *E. belemia* per la **Sardegna** vanno riferite a *E. insularis*.

392. - ***Euchloe crameri*** **Butler, 1869** (= *simplonia* Freyer, 1828; *occidentalis* Verity, 1908)

Nota - Le citazioni di *E. belia, E. ausonia crameri, E. crameri* e *E. simplonia* Frr. per **Veneto, Toscana, Arcipelago toscano, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria** e **Sicilia** vanno riferite a *E. ausonia*; quelle per la **Sardegna** a *E. insularis*. *E. crameri* è presente solo in Italia nord-occidentale.

Piemonte: 1801-1850; 1901-1975; (114); (3378); **Lombardia:** 1926-1950; (1137); (1411); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3378); **Emilia:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (262); (3205).

393. - ***Euchloë simplonia*** **(Freyer, 1829)** (= *marchandae* Geyer, 1832)

Nota - Le citazioni di *E. simplonia* per il **Trentino** e l'**Alto Adige** vanno riferite a *P. callidice* Esp. (1038). Le citazioni per la **Romagna** e la **Toscana** vanno riferite a *E. ausonia*.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (721); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-

1975; (3393).

394. - ***Euchloë ausonia*** **(Hübner, 1804)** (= *romana* Calberla, 1887)

Papilio ausonia è descritta su esemplari dell'**Italia settentrionale** (Sammlung Europäischer Schmetterlinge, 1: Tav. 113, fig. 582-583, Tav. 83, fig. 416) (23*); (1908).

Nota - È citata per l'**Alto Adige:** (172), molto dubbia (170). Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite a *E. insularis*.

Nuovi dati - **Puglia:** Mellitto 27.IV.1980; Gravina in Puglia 6.V.1980. **Basilicata:** Pietrapertosa 2.V.1975; Salandra 15.IV.1975; fiume Camastra 1.V.1975, 1.IV, 29.V.1976; Cersosimo 9.VI.1978. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Corigliano: Piana Caruso 27.III, 9.V.1981; Pollino: Civita 20.IV.1975, 24.V.1979, 6.VI.1980; Monte Moschereto 8.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (453); (2750); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** (1926-1950); (1137); **Veneto:** 1901-1950; 1976-2000; (1137); (2180); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (2153); **Emilia:** 1801-1925; (110); (687); **Romagna:** 1851-1925; 1951-2000; (2516); (3077); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (872); (3131); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (355); (3265); **Abruzzo:** 1951-2000; (1547); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (102); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1801-1850; 1926-2005; (70); (3274); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (2038); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (1006); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3290).

395. - **(-)** ***Euchloë tagis*** **(Hübner, 1804)**

Nota - Le citazioni di *E. tagis* per il **Piemonte,** la **Liguria** e la **Toscana** vanno riferite a *E. bellezina*. Le citazioni per la **Sicilia** a *E. ausonia*, sola specie presente nell'isola.

396. - ***Euchloë bellezina*** **(Boisduval, 1829)**

Nota - Le località liguri citate per *E. tagis* ssp. *bellezina* B. in (3183) sono in realtà in provincia di Cuneo, nel versante piemontese. Le segnalazioni di *E. tagis bellezina* per la **Sicilia** vanno riferite a *E. ausonia*, quelle per la **Sardegna** a *E. insularis*.

Piemonte: 1951-2000; (2135); (2836); **Toscana:** 1976-2000; (2771); (3229).

397. - ***Euchloë insularis*** **(Staudinger, 1861)**

Sardegna: (1801-1850); 1851-2000; (712); (3148); **Arcipelago sardo:** 2001-2005; (3440).

398. - ***Aporia crataegi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna**, sono ritenute dubbie (2447), (3049); peraltro è riportata come dannosa a Pero, Melo e Susino (1169), piante su cui è infeudata questa specie, non appetite dalle altre Pieridi.

Nuovi dati - **Campania:** Torre del Greco 10.VI.1954 (PRN); Roccadaspide (SA): Forma, 850 m, 13.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Pulo di Altamura 30.V.1977; gravina di Riggio 18.V.1990; gravina di Petruscio 13.V.1991. **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 18.VI.1969; fiume Camastra 27.VI-2.VII.1975; Pollino: Piano Ruggio 19.VI, 22.VII.1979, 6.VII.1981; Terranova 4.VII.1981. **Calabria:** fiumara di Oriolo 21.VI.1982; Pollino: Acquatremola 4.VII.1981; Civita 28.V.1975 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1411); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3383); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1801-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1851-1900; 1926-2005; (259); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1756-1800); 1901-2005; (13); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3247); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-1950; (278); (1169).

399. - ***Pieris brassicae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice, 350 m, 6.VI.1998, Genoano, 330 m, 4.VII.1998; Roccadaspide (SA): Levano, 700 m, 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Locorotondo 28.VII.1992; gravina di Petruscio 31.V.1991; gravina di Riggio 20.VIII.1991; Castellaneta Marina 20.VIII.1999, 10.VIII.2002. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 24.IV.1985; Bosco di Policoro (MT) 19.VI.1977; Monte Vulture (PZ) 23.VI.1969; Pollino: sorgente Acquafredda 19.VII.1982; Madonna del Pollino 23.VII.1979; Terranova 4.VII.1981; Cropani 8.VII.1981. **Calabria:** Gambarie (RC) 8.VIII.1971 (abbondante, migrazione); Corigliano: Piana Caruso, 750-900 m, 9.V.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979. (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (105*); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (650); (2548);

Liguria: (1801-1850); 1851-2005; (114); (3383 **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3277); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (623); (3275); **Umbria:** 1851-1925; 1951-1975; (359); (1478); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); (3025); **Abruzzo:** 1901-2000; (548); (3305); **Molise:** 1901-1925; 1976-2000; (1013); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (55); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2519); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (468); (2673); **Arcipelago pugliese:** 1901-1950; (556); (1415); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1851-1900); 1901-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (86*); (3290); **Arcipelago siciliano:** 1801-1900; 1951-2000; (107*); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; 1976-2005; (781); (3440).

400. - ***Pieris mannii*** **(Mayer, 1851)**

Nota - La segnalazione per la **Sardegna:** (2250) va riferita a *P. rapae* (2598). Un maschio dalle caratteristiche molto simili a questa specie è stato catturato in **Sardegna:** Burcei il 24.VI.1989; necessitano ulteriori ricerche nella zona, anche perché rcentemente la specie è stata rinvenuta in Corsica (3465).

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Casalotti 200 m 21.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Gargano: San Marco in Lamis 24.VI.1996 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (644); (3145); **Piemonte:** 1851-2005; (534); (3378); **Lombardia:** 1901-2005; (550); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (566); (2995); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1975; (170); (1912); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1411); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (603); (3383); **Liguria:** 1901-1950; 1976-2000; (888); (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (525); (3205); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2485); **Toscana:** 1851-2005; (437); (3383); **Arcipelago toscano:** 1901-1975; (623); (3056); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (807); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); (3025); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (700); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-2005; (945); (3457); **Arcipelago campano:** 1901-1925; 1976-2000; (783 bis); (3179); **Puglia:** 1926-2005; (2403*); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (2100); (3298); **Calabria:** 1901-2005; (811); (3304); **Sicilia:** (1851-1900); 1901-2005; (488); (3290); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519); (3290).

401. - ***Pieris rapae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 24.IV.1977; fiume Camastra 18.VIII.1975, 29.IX.1975; Sellata: La Maddalena 28.VII.1974; Cersosimo 6.VI.1981; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; Timpone Castellana 6.VI.1980; Fonte di Rummo 29.V.1975; fiume Mercure 8.VI.1980; Terranova 4.VII, 25.IX.1981, 16.V.1983; Cropani 6.VI, 6.VII.1981. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979, 30.VI.1991; Fossiata 22.VII.1981; Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979, 17.VII.1980; Acquatremola 4.VII.1981; Civita 7 e 20.IV, 25.VIII.1975, 20.V, 22.VII, 15.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3024); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (466); (3383); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (2516); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-2005; (623); (3275); **Umbria:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Abruzzo:** 1801-1850; 1901-2000; (70); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (70); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (2519); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (468); (3274); **Arcipelago pugliese:** 1901-1950; (556); (2403*); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1801-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (37*); (3290); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (2734 (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2005; (2960); (3440).

402. - ***Pieris ergane*** **(Geyer, 1828)** (= *narcaea* Freyer, 1828)

Pontia narcaea è descritta su esemplari della Dalmazia e della **Toscana:** Firenze (6923*).

Nota - Nei dintorni di Firenze certamente non esiste (1411). La ssp. *minor* Costa è stata descritta su esemplari di **Toscana** (2581). Stefanelli riconosce errata la segnalazione per i dintorni di Firenze (218). Le citazioni generiche per la **Sicilia:** (3187), (3230), sono certamente errate. La citazione per l'**Emilia:** (246) non è attendibile. Rinvenuta recentemente in **Toscana**: (3462 bis).

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979, 8.VI.1980, 20.VI.1982 (PRN).

Piemonte: (1851-1900); 1926-1950; 1976-2005; (361); (3378); **Lombardia:** 1901-2000; (550); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (424); (2995); **Alto Adige:** 1851-1900; 1926-1950; (170); (1572); **Veneto:** 1951-2000; (1656); (2180); **Friuli:** 1851-2000; (352); (2620); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (671); (3383); **Liguria:** 1926-1950; (1198); **Romagna:** 1976-2000; (246); (3186); **Toscana:** (?) (1851-1900); (?) (56*); 2001-2005; (3462 bis); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (847); (3077); **Lazio:** 1851-2000; (576); (3265); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3010); **Molise:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (70); (3259); **Campania:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1976-2000; (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3298); **Calabria:** 1801-1900; 1951-2000; (70); (3157).

403. - ***Pieris napi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). Citata per la **Sardegna:** (1589), (2250); in **Sardegna** non stanziale, possibile esemplari immigrati (3148). Di recente ha fatto scalpore l'annuncio della presenza della specie nell'Isola dell'Asinara, ma una visita nell'isola del giugno 2004 non ha confermato tale segnalazione (3465).

Nuovi dati - **Basilicata:** Salandra 15.IV.1975; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1975 CC; Pollino: Piano Ruggio 19.VI.1976 C; Madonna del Pollino 23.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1851-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3383); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (623); (3275); **Umbria:** 1901-1925; 1951-1975; (627); (1996); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3305); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-2005; (1013); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265); **Puglia:** 1926-2005; (1415); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (37*); (3290); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519).

404. - ***Pieris bryoniae*** **(Hübner, 1806)**

Nota - Le citazioni di *P. bryoniae* per la **Toscana:** (3383), l'**Abruzzo:** (2309*) e la **Sicilia:** (343), vanno riferite a *P. napi*.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (453); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (215); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:**

1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-2000; (161); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (352); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

405. - ***Pieris callidice*** **(Hübner, 1800)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Ferret 16.VIII.1958 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (215); (3073); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1851-2000; (161); (2995); **Friuli:** 1851-1925; (352); (935); **Liguria:** 1976-2000; (2124).

406. - ***Pieris daplidice*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - In **Italia** la presenza di *P. daplidice* è stata accertata in **Sardegna** e nel tratto della **Liguria occidentale** che va dal confine di Stato sino ad oltrepassare lo spartiacque dell'Appennino savonese nella provincia piemontese di Alessandria (3378); nel resto d'Italia e Sicilia è *P. edusa* (2892).

Piemonte: 1751-1800; 1851-1950; (20); (3378); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3378); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2005; (43); (3440); **Arcipelago sardo:** 1976-2005; (2960); (3440).

407. - ***Pieris edusa*** **(Fabricius, 1777)** (= *daplidice* auct.)

Nota - La citazione di *P. edusa* per la **Sardegna:** (3056) va riferita a *P. daplidice*.

Nuovi dati - **Puglia:** Orta Nova (FG) 20.VII.1991; Mellitto (BA) 27.IV.1980; Ostuni (BR) 14.VII.1991. **Basilicata:** Matera 1.VI.1991; Cancellara (PZ) 31.VII.1968; fiume Camastra 29.IX.1975, 29.VII.1976; Pollino: Terranova 25.IX.1981. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979. **Sicilia:** Racalmuto IV.1981; Marsala 20.VI.1989 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-1950; 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650); (1480); **Liguria:** (1901-1925); 1976-2000; (888); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-2000; (344); (3315); **Umbria:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); (3025); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3010); **Molise:** 1976-2005; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3274); **Arcipelago pugliese:** 1901-1950; (556); (1415); **Basilicata:** 1951-

2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1851-2005; (277); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3290); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (3226).

408. - **(-)** ***Catopsilia florella*** **(Fabricius, 1775)**

Nota - "È stata osservata da Mr. White una migrazione dall'Italia alla **Sicilia** sullo stretto di Messina il 29.VII.1936; nessun esemplare si è posato sulla nave, erano circa delle stesse dimensioni di *C. florella* ma più giallastri; gli individui osservati erano molto simili alle femmine di *Gonepteryx cleopatra* ma nessuno aveva il caratteristico colore arancione dei maschi" (1304); certamente non è questa specie, lo stesso autore nel titolo dice che sembra essere *C. florella* ("appeared to be *Catopsilia florella* Fab.").

409. - ***Colias phicomone*** **(Esper, 1780)**

Nota – È citata per la Toscana: (24), ma sono esemplari di *C. edusa* (437). La citazione per la Campania: (70) va riferita a *C. croceus*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Valthules (TO) 1750 m 4.VIII.1977; Accelio (CN) 29.VII.1975 (CMC, PRN). Marmolada 16.VII.1969; San Nicolo (TN) 23.VII.1973; Passo San Pellegrino 28.VII.1973 (GRL).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (218); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (215); (2870); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (129); (2995); **Friuli:** 1926-1975; (1411); (2313); **Liguria:** 1951-2000; (2017); (3183).

410. - ***Colias palaeno*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - Le citazioni per il **Veneto:** (98), (161), (204), (367), (1081), probabilmente vanno riferite a *C. hyale* (319). Le citazioni per **Toscana, Campania** e **Calabria** vanno riferite a *C. alfacariensis*. La citazione per la **Sardegna:** (43) è da riferire a *C. croceus*.

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1926-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1900; 1926-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (231); (2691).

411. - ***Colias croceus*** **(Geoffroy, 1785)** (= *edusa* Fabricius, 1787)

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998; Roccadaspide (SA): Tuono 400 m 7.VI.1998, Cavallo 400 m 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Sicilia:** Grottarossa 12.V.1988; Cefalù (PA) 3.VI.1988; Madonie: Piano del Faggio 1450 m 31.V.1998 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2563); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3279); **Friuli:** 1851-2000; (364);

(3197); **Venezia Giulia:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-2005; (966); (3275); **Umbria:** 1801-1925; 1951-1975; (109); (1996); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); (3025); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (70); (3457); **Arcipelago campano:** 1851-1900; 1951-2000; (259); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (468); (3274); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; 1951-1975; (556); (1988); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1851-2005; (277); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (2661); **Arcipelago siciliano:** 1801-1900; 1951-2000; (107*); (3226); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; 1976-2005; (781); (3440).

412. - **(-)** ***Colias myrmidone*** **(Esper, 1780)**

Nota - Le citazioni di *C. myrmidone* per l'**Italia** (Alto Adige, Venezia Giulia, Marche, Puglia) vanno riportate a *C. croceus*; *C. myrmidone* non fa parte della fauna italiana (1411).

413. - **(-)** ***Colias chrysotheme*** **(Esper, 1781)**

Nota - Le citazioni di *C. chrysotheme* per l'**Italia** (Alto Adige, Venezia Giulia, Toscana, Marche) vanno riportate a *C. croceus*; *C. chrysotheme* non fa parte della fauna italiana (1411). Citata per la Venezia Giulia: Trieste: Miramare (manoscritto Vogel, anteriore al 1886) (1060); Maramare, catturata dal Sig. Palisas (393 bis); la citazione in (1060) è dubbia, mentre quella in (393 bis) è certa, ma probabile presenza accidentale.

414. - ***Colias hyale*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Specie confusa con *C. australis*; le citazioni per l'**Italia settentrionale** vanno in parte verificate, peraltro per tutte le regioni sono riportati alcuni dati come accertati. Le citazioni per l'Italia centrale, meridionale e insulare vanno riportate a *C. alfacariensis*. Le citazioni per la **Liguria:** (114), (1894) sono dubbie; non presente nella regione (3423). Per l'**Arcipelago toscano**: Isola d'Elba (Marina di Campo) e la **Sicilia** (Taormina) sono segnalati due esemplari accertati (1933). Non fa parte della fauna italiana secondo (3049).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1851-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (146); (1933); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-2000; (10); (2659); **Friuli:** 1851-1975; (1976-2000); (364); (2516); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (109); (2248); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1951-2000; (3077); (1933);

Arcipelago toscano: 1951-1975; (1933); **Sicilia**: 1951-1975; (1933).

415. - ***Colias alfacariensis* Ribbe, 1905** (= *australis* Verity, 1911)

Nota - *C. alfacariensis* sarebbe presente in **Sicilia:** (3049), ma non si hanno altre segnalazioni, pertanto la sola specie presente nell'isola è *C. croceus*. Citata per la **Sardegna:** (43), (1589); manca in **Sardegna:** (3049); le citazioni probabilmente sono da riferire a *C. croceus*.

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1411); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-2005; (321*); (3454); **Trentino:** 1926-2000; (1411); (3293); **Alto Adige:** (1901-1925); 1951-2000; (1053); (3383); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1411); (1933); **Venezia Giulia:** 1926-2000; (1411); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3059); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1933); (3315); **Umbria:** 1851-1925; 1951-1975; (359); (2085); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (576); (3268); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312); **Molise:** 1951-2000; (1933); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1926-2005; (1415); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3298); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2000; (70); (3157).

416. - ***Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 24.IV.1977; Pietrapertosa 15.IV.1975; Monte Caperino 9.VII.1975, 16.VII.1976; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 15.VII.1977; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980; Fonte di Rummo 9.VII.1972; Lago Duglia 18.VI.1982. **Calabria:** Sila: Camigliatello 20.VI.1970; Pollino: Acquatremola 4.VII.1981; Civita 19.VII.1974, 20.IV.1975, 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1926-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3024); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (364); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1411); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3383); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3429); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3315); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3265); (3259); **Campania:** (1751-1800); 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (21*); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (102); (2511); **Puglia:** (1801-1850); 1926-2005; (70); (3274); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** (1851-

1900); 1901-1925; 1951-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; (97); (1725); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (1970).

417. - ***Gonepteryx cleopatra*** **(Linnaeus, 1767)**

Rhodocera cleopatra var. *italica* è descritta su esemplari di **Italia** e Dalmazia (282).

Nuovi dati - **Puglia:** Locorotondo (BA) 18.VII.1992; Mottola (TA): gravina di Petruscio 23.IV.1983, 10.VII.1985, 21.VI, 14.VIII.1991; Grottaglie (TA): gravina di Riggio 18.V.1990, 20.VIII.1991; gravina di Ginosa (TA) 28.V.1980; Castellaneta Marina (TA) IV-VIII.1995/2004 (PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena IV-VIII.1974-1979; Pollino: Rotonda 29.III.1981; Terranova 4.VII.1981 (PRN).

Piemonte: 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2005; (1238); (3373); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (566); (1787); **Veneto:** 1801-1975; 2001-2005; (98); (3373); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1751-1850); 1851-2000; (26); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1625); (3037); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2377); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (24); (3277); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3131); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1801-2000; (102); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); **Abruzzo:** 1901-1950; 1976-2000; (681); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1751-1850; 1901-2005; (15); (3457); **Arcipelago campano: 1901-1925;** 1951-2000; (783 bis); (3265); **Puglia:** (1801-1850); 1901-2005; (109); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2038); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1013); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (94); (3290); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2005; (43); (3373); **Arcipelago sardo:** 1976-2005; (2960); (3440).

Fam. Riodinidae

418. - ***Hamearis lucina*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per la **Puglia:** (1206) va confermata (3397). È citata per la **Sardegna:** (841), (886); presenza in **Sardegna** molto dubbia (3148); manca in **Sardegna:** (3049).

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Caperino 2 e 9.VI.1972; Pietrapertosa 15.VI.1977 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (453); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (105*); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2691); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650);

(2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2000; (110); (2485); **Toscana:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (177); (3371); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (3196); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (64); (2651); **Abruzzo:** 1901-1950; 1976-2000; (616); (3180); **Campania:** 1851-1925; 1976-2005; (218); (3457); **Puglia:** 1926-1950; (1206); **Basilicata:** 1951-1975; (2038); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (355); (2844).

Fam. Lycaenidae

419. - ***Lycaena phlaeas*** **(Linnaeus, 1761)**

Nuovi dati - **Campania:** Torre del Greco 1.VI.1959 (PRN); Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998, Genzano 330 m 4.VII.1998; Roccadaspide (SA): Tuono 400 m 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 8.VII.1975; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3224); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-2000; (1044); (3315); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (3025); **Abruzzo:** 1901-2000; (611); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (2511); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3311); **Arcipelago pugliese:** 1901-1950; (556); (1415); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3291); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (223); (2519); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960); (3440).

420. - **(-)** ***Lycaena helle*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Estinta in Italia settentrionale (2892, agg.). È citata come *L. helle* o *L. amphidamas* per il **Piemonte:** "nella collezione Stefanelli conservata alla Specola vi è una coppia della forma *leonia* con la località **Piemonte**" (1392), probabile confusione con *Thersamonia*

thersamon (1736); la **Lombardia:** montagna (164); Bergamo (2362); il **Trentino:** Cembratal, Bleggio (1038); l'**Alto Adige:** Brixen (170); Ritten, Brixen (1038). La citazione per le **Marche:** (385) è errata. Nella recentissima Checklist e distribuzione della Fauna italiana (3423) sono indicate nella cartina tre località lungo la valle dell'Isarco in **Trentino** e **Alto Adige** ed una in **Piemonte:** in provincia di Alessandria, ma non è chiarito se si riferiscono a nuovi dati o a località dove la specie era segnalata in passato. Nella Checklist la specie non è riportata, pertanto si ritiene valida la seconda ipotesi.

421. - ***Lycaena dispar*** **(Haworth, 1803)**

Nuovo dato - **Veneto:** Isola della Scala (VR) 21.VIII.1977. **Basilicata:** Pollino: Madonna del Pollino 23.VII.1979 (PRN).

Nota - È citata per la **Sardegna:** (841), (886); presenza in **Sardegna** molto dubbia (3148). Nel **Lazio** probabilmente è estinta. La citazione per la **Campania:** (1388) non è attendibile.

Piemonte: 1851-2005; (375); (3317); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2005; (260); (3461 bis); **Trentino:** 1901-1950; (1184); (1485); **Alto Adige:** 1901-1975; (593); (1787); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (431); (3279); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2620); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2248); **Emilia:** 1851-1900; 1926-2005; (495); (3425); **Romagna:** 1926-2000; (1392); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1851-1900; 1926-2000; (736); (3383); **Lazio:** 1901-1925; (495); (2192); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2154); **Calabria:** 1976-2000; (2650).

422. - ***Lycaena virgaureae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per la **Puglia:** (3274) non è attendibile.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (300); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-1900; 1926-1975; (10); (2180); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (364); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2000; (110); (3383); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2255); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3383); **Umbria:** 1851-1900; (359); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (933); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (2651); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (359); (3265); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2154); **Calabria:** 1976-2000; (3157).

423. - ***Lycaena tityrus*** **(Poda, 1761)** (= *xanthe* Fabricius, 1787 nec 1775; *dorilis* Staudinger et auct.)

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (359) non è attendibile.

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 20.IX.1968; fiume Camastra 6.X.1980; Noepoli (PZ) 600 m 4.VII.1981; Pollino: Belvedere

16.VII.1980; Piano Ruggio 22.VII.1979; Cropani 23.IX.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (359); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (105*); (3270); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (268); (3035); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2248); **Liguria:** 1901-1950; 1976-2000; (1485); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (681); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (319); (3457); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2005; (1415); (3468); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (2093); **Calabria:** 1851-2005; (277); (3423); **Sicilia:** 1851-1925; (144); (832).

424. - ***Lycaena subalpina*** **Speyer, 1851** (= *xanthe* Fabricius, 1775 nec 1787)

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (319); (3224); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:** 1851-1975; (146); (2722); **Veneto:** 1851-1950; 1976-2000; (129); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (410); (3224); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (246); (3136); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (437); (3136).

425. - ***Lycaena alciphron*** **(Rottemburg, 1775)** (= *hipponoë* Bergstrasser, 1779)

Nuovi dati - **Campania:** Monte Faito 27.VII.1954. **Basilicata:** Monte Vulture 23.VI.1969, 16.VI.1968. **Calabria:** Sila, Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; Fago del Soldato 22.VIII.1954, 26.VI.1956; Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola 4.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (132); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (129); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (410); (3197); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (1976-2000); (214); (3059); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3186); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3371); **Umbria:** 1951-1975; (1996); (2142); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (856); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3052); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3180); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3265); **Campania:** 1901-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1926-1950; (1206); (1415); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (833); (3304); **Sicilia:** 1801-2000;

(97); (2554).

426. - ***Lycaena hippothoë*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - Nella penisola è sostituita da *L. italica* (2892); pertanto le citazioni di *L. hippothoe* per **Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania** e **Basilicata** vanno riportate a *L. italica*. Anche le vecchie citazioni per la **Liguria:** (*eurydice* Hb. e *chryseis* D. & S.) (114) e per l'**Emilia-Romagna:** (*hippothoe eurydice* Hb.) Fiumalbo (MO): Pozze (262) sono con molta probabilità da riferire a *L. italica*. Le citazioni di *L. hippothoë* var. *eurybia* o var. *eurydame* per **Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige** e **Veneto** vanno riferite a *L. eurydame*; la vera *hippothoe* è presente solo nel settore nord-orientale (3423). Le citazioni per la **Sardegna:** (841), (886) sono errate (3148). Per *L. hippothoe* è indicato anche un sito in **Alto Adige:** (in corrispondenza del Passo dello Stelvio) (3423).

Alto Adige: 2001-2005; (3423); **Friuli:** 1851-1900; 1951-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1392).

427. - ***Lycaena eurydame*** **(Hoffmannsegg, 1806)** (= *columbanus* de Prunner, 1798; *eurybia* Ochsenheimer, 1808)

Papilio columbanus è descritto su esemplari dei monti del Piemonte: "In montibus rarus" (26). *Papilio eurybia* è descritta su esemplari del Piemonte e della Svizzera meridionale (31).

Nota - Le citazioni di *L. eurydame* per l'**Appennino centrale** (3049) e di *L. hippothoe eurydame* per la **Campania:** (2192), vanno riferite a *L. italica*.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3224); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-1925; 1951-2000; (44); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-1900; 1926-1950; (10); (2180); **Liguria:** 1976-2000; (3183); (3423).

428. - ***Lycaena italica*** **(Calberla, 1887)**

Polyommatus hippothoe var. *italica* è descritta su individui dell'**Abruzzo:** Gran Sasso 1500 m (Correspondenzblatt des Entomologischen Vereins "Iris" zu Dresden, 4: 126) (344).

Nota - È citata genericamente per la **Calabria:** (2941); non si hanno altri dati per la regione.

Emilia: 1851-1900; (262); (3059); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; (19); (344); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (933); (2485); **Lazio:** 1851-2000; (359); (2651); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1900; 1951-1975; (359); (2192); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2093).

429. - **(-)** ***Lycaena candens*** **(Herrich-Schäffer, 1844)**

Nota - L'unica citazione per il **Piemonte:** (736) è certamente errata,

essendo la specie presente solo nella Penisola balcanica.

430. - ***Lycaena thersamon*** **(Esper, 1784)**

Nota - È citata per l'**Alto Adige** solo da Mann (171), le cui identificazioni sono spesso errate (1392). Le citazioni per il **Trentino:** (171), (654) vanno confermate (1038). Le citazioni per la **Liguria:** (114) e la **Campania:** Napoletano (359) sono dubbie. Citata con dubbio per la **Sicilia:** (97).

Nuovo dato - **Puglia:** Bosco di Gravina in Puglia (BA) 18.V.1995 (Bertaccini in litt.).

Piemonte: 1751-1975; (26); (1736); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; (164); (1392); **Trentino:** (?) 1851-1925; (171); (1053); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1926-2000; (1392); (2485); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (177); (3462 bis); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (1392); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (2202); **Calabria:** 1851-1900; 1951-2005; (277); (3304).

431. - ***Thecla betulae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È segnalata per la **Sicilia:** "Palermo: Conca d'Oro 1818 (37*), citazione priva di importanza scientifica" (343).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (958); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (164); (2995); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1975; (1038); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1950; (268); (2051); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (352); (2485); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2248); **Liguria:** 1926-2000; (1485); (2219); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3059); **Romagna:** 1926-1950; 1976-2000; (2516); (2643); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (177); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (3196); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2643); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2651); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (664); (3180); **Sicilia:** 1976-2000; (2148).

432. - ***Favonius quercus*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Basilicata:** Pollino: Fontana del Vaccaro 23.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (125 ter); (3270); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2255); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1751-

1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-2000; (177); (2251); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (664); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1976-2005; (70); (3457); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1910); **Puglia:** 1951-2000; (1845); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2100); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (3233); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3440).

433. - **(-)** ***Laesopis roboris*** **(Esper, 1793)**

Nota - Le citazioni per il **Trentino:** (211) e l'**Alto Adige:** (170) sono errate (218).

434. - **(-)** ***Tomares ballus*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - Una sola citazione per il **Piemonte:** (900), molto dubbia. Non risultano altre citazioni per l'**Italia.**

435. - ***Callophrys rubi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Monte Faito 4.V.1968; Torre del Greco 10.V.1964. **Basilicata:** fiume Camastra 1.V.1976; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980; Lago Duglia 18.VI.1982; Terranova 15 e 16.V.1983; Piano Ruggio 20.VI.1976; San Severino: Serra Cappellina 900 m 6.VII.1981; Rotonda 18.VI.1982. **Calabria:** Sila: Fossiata 20.V.1979; San Cosma Albanese 16.IV.1983; Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Pollino: Acquatremola 4.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (453); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (364); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3131); **Umbria:** 1901-1925; 1951-1975; (627); (1996); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2519); (3265); **Puglia:** 1926-2000; (1206); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1976-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3233); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 2001-2005; (3440).

436. - ***Satyrium w-album*** **(Knoch, 1782)**

Nuovo dato - **Basilicata:** Pollino: Serra Cappellina, bivio San Severino

900 m 6.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165); (3224); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (125 ter); (3270); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (2325); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1392); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-1975; (114); (2219); **Emilia:** 1851-1900; 1926-1950; (246); (3059); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2485); **Toscana:** 1851-2005; (437); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3417); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (681); (2142); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 2001-2005; (3457). **Puglia:** 1976-2000; (2202); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2202); **Calabria:** (1801-1850); 1951-2000; (70); (2202); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (355); (3233).

437. - ***Satyrium pruni*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le vecchie citazioni per **Trentino, Veneto** sono probabilmente errate (1392). Dubbie le citazioni per l'**Emilia:** (110), (214), estinta bel Ferrarese (3059). Le citazioni di *S. pruni* per **Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo** e **Sicilia** sono certamente errate, da riportare a *S. ilicis*.

Piemonte: 1751-1925; 1951-2000; (20); (3187); **Lombardia:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (44); (3270); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1392); **Emilia:** 1901-1925; (1392).

438. - ***Satyrium spini*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura 4.VI.1978; Mellitto 4.VI.1979; gravina di Ginosa 28.V.1980, 5 e 20.V.1984, 15.VI.1987, 22.VI.1991; Grottaglie (TA): gravina di Riggio 18.V.1990. **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 10.VI.1976, 20.VI.1982; Madonna del Pollino 23.VII.1979; **Calabria:** Oriolo (CS) 400 m 20.VI.1982; Pollino: Civita 18.VI.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1392); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** (1851-1900); 1976-2000; (214); (2988); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2000; (19); (2516); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-2000; (385); (2643); **Lazio:** 1901-2000; (664); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3010); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1206); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2001);

Calabria: 1851-1925; 1976-2000; (156); (3157); **Sicilia:** 1851-1900; 2001-2005; (209); (3423).

439. - ***Satyrium ilicis*** **(Esper, 1779)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Tuono 400 m 7.VI.1998, Levano 700 m 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 16.VII.1980, 20.VI.1982; fiume Mercure 20.VI.1980; San Severino: Serra Cappellina 900 m 6.VII.1981; Cersosimo 6.VI.1981. **Calabria:** Pollino: Campotenese 10.VII.1979; Civita 15.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3277); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3027); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3010); **Molise:** 1926-1950; 1976-2005; (1392); (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (811); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3179); **Puglia:** 1951-2000; (1845); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); **Calabria:** (1801-1850); 1901-2005; (70); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3233).

440. - ***Satyrium esculi*** **(Hübner, 1804)**

Nota - Le citazioni *S. ilicis* v. *aesculi* per **Valle d'Aosta, Alto Adige, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo** e **Sicilia** sono di aberrazioni di *ilicis*.

Piemonte: 1801-2000; (114); (2836); **Liguria:** 1951-2000; (1664); (3183).

441. - ***Satyrium acaciae*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (408) è un probabile errore di identificazione.

Nuovi dati - **Puglia:** Mellitto 4.VI.1979; **Basilicata:** fiume Camastra 27.VI, 1.VII.1975; Cersosimo 6.VI.1981; Noepoli (PZ) 600 m 4.VII.1981 (PRN).

Piemonte: 1851-1975; 2001-2005; (361); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2995); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2691); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (? 1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (501); (3152); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2485); **Toscana:** 1851-2005; (206); (3371); **Umbria:**

1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (664); (3224); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3180); **Molise:** 1976-2005; (3259); **Campania:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (1845); (2038); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2038).

442. - ***Lampides boeticus*** **(Linnaeus, 1767)**

Nuovi dati - Torre del Greco: Falde Vesuvio 18.VIII, 30.IX.1955 (PRN); Castel San Lorenzo (SA): Genzano, 330 m, 4.VII.1998 (DMR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3270); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1901-1950; (566); (1572); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2000; (10); (3279); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (935); (1013); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (214); (3425); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (623); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); (3025); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1392); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1751-1850; 1901-2005; (15); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3179); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2944); **Basilicata:** 1951-1975; (2038); **Calabria:** 1851-1925; 1951-2005; (437); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3291); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2960); **Arcipelago sardo:** 1976-2000 (2960).

443. - ***Cacyreus marshalli*** **Butler, 1898**

Piemonte: 2001-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 2001-2005; (3404); (3454); **Liguria:** 1976-2005; (3351); (3420); **Romagna:** 2001-2005; (3351); **Toscana:** 1976-2005; (3318); (3372); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3275); (3315); **Umbria:** 1976-2000; (3230); **Marche:** 2001-2005; (3351); **Lazio:** 1976-2000; (3050); (3351); **Abruzzo:** 2001-2005; (3351); **Molise:** 2001-2005; (3351); **Campania:** 1976-2000; (2001-2005); (3050); (3340); **Arcipelago campano:** 2001-2005; (3346); **Puglia:** 2001-2005; (3340); (3351); **Basilicata:** (2001-2005); (3340); **Calabria:** 2001-2005; (3340); **Sicilia:** 2001-2005; (3340); (3351); **Sardegna:** 2001-2005; (3315); (3423).

444. - ***Leptotes pirithous*** **(Linnaeus, 1767)** (= *telicanus* Lang, 1789)

Nuovo dato - **Puglia:** Terlizzi 19.X.1987. **Basilicata:** fiume Camastra 29.IX.1975 (PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1851-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (2995); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (424); (1787); **Alto Adige:** 1851-1975; (368); (1523); **Veneto:** 1801-2000; (98); (3279); **Friuli:** 1901-1925; (603); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (1048); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (214); (3425); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (623); (3275); **Umbria:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3417); **Abruzzo:** 1926-2000; (1392); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3179); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (70); (2247); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2093); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3291); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (330); (3226); **Sardegna:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (301); (3440); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

445. - **(?)** ***Tarucus theophrastus*** **(Fabricius, 1793)**

Nota - Le citazioni per la **Calabria:** (1013) e la **Sicilia:** (218), (1340), sono da confermare (3049).

446. - **(-)** ***Tarucus balcanicus*** **(Freyer, 1844)**

Nota - Le citazioni di *T. balcanicus* per la **Sicilia** vanno riportate a *T. teophrastus* (218, in: aggiunte alla parte prima: 315).

447. - **(-)** ***Zizeeria knysna*** **(Trimen, 1862)**

Nota - Le segnalazioni per la **Sicilia** e **Arcipelago siciliano** di *Z. knysna* vanno a *Z. karsandra* buona specie (2980).

448. - ***Zizeeria karsandra*** **(Moore, 1865)**

Nota - È citata come *Z. knysna* in (3423).

Sicilia: 1926-1975; (1585); (2620); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2620); (2935).

449. - ***Cupido minimus*** **(Fuessly, 1775)** (= *alsus* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Campania:** valle Furore (SA) 27.IV.1969. **Basilicata:** fiume Camastra 1.V.1975, 29.V.1976; Pollino: Piano Ruggio 30.VII.1972, 19.VI, 23.VII.1976; Terranova 16.V.1983. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800-1000 m 8.VI.1980; Civita 24.IV.1977 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (453); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3383); **Veneto:** 1851-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (3197); **Venezia**

Giulia: 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2000; (246); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (829); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1901-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (807); (3265); **Abruzzo:** 1901-2000; (575); (3010); **Campania:** 1901-2005; (658); (3457); **Arcipelago campano:** 1901-1925; 1976-2000; (658); (3265); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (933); (2941); **Sicilia:** 1951-1975; 1901-2000; (147); (3233).

450. - ***Cupido osiris*** **(Meigen, 1829)** (= *saportae* Duponchel, 1832; *sebrus* auct.)

Nota - Le citazioni per la **Venezia Giulia** sono da ritenersi errate (1392). La citazione per la **Puglia:** Parco delle Pianelle (1845) è errata.

Nuovi dati - **Liguria:** Andora: San Bartolomeo 23.V.1975; Conna (SV) 22.V.1975 (CMC, PRN). **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 6 e 8.VII.1981, 20.VI.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1851-2005; (218); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; (467); **Trentino:** (? 1901-1925); 1951-1975; (654*); (2014); **Alto Adige:** 1851-1975; (368); (1943); **Veneto:** 1901-2000; (900); (2909); **Liguria:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (715); (3059); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (3059); **Toscana:** 1901-2005; (933); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1901-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (807); (2651); **Abruzzo:** 1926-2000; (1392); (3312); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1285); (3457); **Puglia:** 2001-2005; (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2001).

451. - **(-)** ***Cupido lorquinii*** **(Herrich-Schäffer, 1847)**

Nota - La citazione per la **Lombardia:** (682), probabilmente va riferita a *C. minimus*. Non risultano altre citazioni per l'**Italia.**

452. - ***Cupido argiades*** **(Pallas, 1771)**

Nota - È citata per la **Liguria:** (114); non risulta trovata in questa regione (1392). Segnalata per la **Sardegna:** (359), probabilmente confusa con *E. alcetas*.

Piemonte: 1751-2005; (20); (3454); **Lombardia**: 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-1975; (171); (2342); **Alto Adige:** 1851-1975; (358); (1480); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (161); (3035); **Friuli:** 1951-2000; (1971); (2485); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-2000; (650); (2248); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1950; 1976-2005;

(24); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-2000; (359); (2651); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1398); (3180); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1976-2005; (3265); (3457); **Puglia:** 2001-2005; (3423); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2202); **Calabria:** 1976-2000; (2941); (3158); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (144); (1392).

453. - ***Cupido alcetas*** **(Hoffmannsegg, 1804)** (= *coretas* Ochsenheimer, 1808)

Piemonte: 1851-1950; 1976-2005; (534); (3461 bis); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2995); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (398); (2995); **Alto Adige:** 1851-1975; (398); (1912); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (650); (2248); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1392); (3224); **Emilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (262); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (437); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1901-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (681); (3010); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3457); **Puglia:** 1976-2005; (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2100); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2941); **Sicilia:** 1976-2000; (3466).

454. - ***Celastrina argiolus*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1978; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2722); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (364); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3277); **Arcipelago toscano:** 1901-2000; (623); (3315); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (3025); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1751-1800; 1851-2005; (15); (3457); **Arcipelago campano**: 1901-1925; 1951-2000; (783 bis); (3265); **Puglia:** 1901-2000; (921); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3233); **Arcipelago siciliano:**

1851-1900; 1976-2000; (223); (3055); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (290); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2005; (2960); (3440).

455. - ***Pseudophilotes baton*** **(Bergsträsser, 1779)** (= *hylas* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le segnalazioni per la **Sardegna** di *P. baton, hylas* e *abencerragus* vanno riportate a *P. barbagiae*. Citato per la **Sardegna** anche in (2030), ma non sono presenti esemplari di *baton* nella sua collezione (3090). La citazione "Il Signor Ortner ha rinvenuto un maschio di *baton* sul Monte Limbara 10.VI.2000" (3315); è da riferire a *P. barbagiae*.

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 19.VI.1976; Cozzo Vardo 9.VII.1972. **Calabria:** Pollino: Civita 19.VII.1974, 20.IV, 25.VIII.1975, 20.V.1979; Monte Manfriana 1600 m 7.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1950; 2001-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2342); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1856); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1183); (3457); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2005; (921); (3311); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1901-2005; (1013); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (1129); (3233).

456. - **(-)** ***Pseudophilotes panoptes*** **(Hübner, 1813)**

Nota - È citato con dubbio per il **Piemonte:** (534) e per la **Liguria occidentale** (218), (319); citazioni errate.

457. - ***Pseudophilotes vicrama*** **(Moore, 1865)**

Alto Adige: 1851-1900; 1951-1975; (1129); (1527); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1392).

458. - **(-)** ***Pseudophilotes abencerragus*** **(Pierret, 1837)**

Nota - Le segnalazioni per la **Sardegna** di *P. abencerragus* vanno riportate a *P. barbagiae*.

459. - ***Pseudophilotes barbagiae*** **De Prins & Poorten, 1982**

Pseudophilotes barbagiae è descritta su esemplari della **Sardegna:** Nuoro e monti a 1000 m (Phegea, 10 (2): 68) (2257).

Sardegna: (1801-1850); 1926-2005; (114); (3440).

460. - ***Scoliantides orion*** **(Pallas, 1771)**

Nota - Le citazioni per **Emilia, Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria** e **Sicilia** sono errate. In (3297) è riportata per la **Sardegna** e non per la Corsica; probabile scambio di dati (3315).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (375); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1392); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3384 bis).

461. - ***Glaucopsyche alexis*** **(Poda, 1761)** (= *cyllarus* Rottemburg, 1775)

Nota - È citata per **Sardegna:** (841), (2250); dalla **Sardegna** non si hanno notizie (1392); è assente in **Sardegna** (3049).

Nuovi dati - **Campania:** Torre del Greco 10.V.1964. **Basilicata:** Pietrapertosa 15.IV.1975; Genzano (PZ) 25.VIII.1988; fiume Camastra 1.V, 1.VI.1975; Terranova 16.V.1983. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800-1000 m 6-8.VI.1980; Civita 20.IVI.1975, 20.V, 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2365); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2457); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1392); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (872); (3315); **Umbria:** 1951-1975; (1996); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); (3265); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (102); (3457); **Arcipelago campano: 1901-1925;** 1976-2000; (783 bis); (3179); **Puglia:** 1801-2000; (70); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2038); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (70); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (94); (2178).

462. - ***Glaucopsyche melanops*** **(Boisduval, 1829)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte:** Arquata Scrivia (AL) (900), **Veneto:** Monte Berico (VC) (900) e **Lazio:** Tivoli (1085) non sono attendibili. Segnalata in **Sicilia:** (145); "la citazione per le Madonie di Failla va riferita a *L. meleager*" (343).

Liguria: 1901-2000; (471); (3183).

463. - ***Iolana iolas*** **(Ochsenheimer, 1816)**

Lycaena iolas magnaiolas Beuret, 1957 è descritta su esemplari dell'**Alto Adige**: Meran (1567).

Nota - Le citazioni per la **Puglia:** Gargano (3230) e per la **Sicilia:** "avvistata a Taormina" (1193) sono da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2284); (3145); **Piemonte:** 1851-1975; 2001-2005; (114 bis); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1975; (260); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (2995); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (1480); **Liguria:** 1976-2000; (2219); **Emilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (377); (3059); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3429); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2651); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-2005; (1013); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3179); **Basilicata:** 1976-2000; (2202); **Calabria:** 1951-2000; (2142); (2202).

464. - ***Maculinea arion*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia:** (97) e la **Sardegna:** (214), sono molto dubbie.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3218); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2342); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1751-2000; (10); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2000; (110); (3059); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2485); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (177); (3372); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3180); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (103); (3457); **Puglia:** 1926-1950; (1206); (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2672); **Calabria:** 1926-2000; (1392); (3158).

465. - ***Maculinea teleius*** **(Bergsträsser, 1779)** (= *euphemus* Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni di *M. teleius* per **Lombardia, Trentino, Liguria, Emilia, Toscana** ed **Abruzzo** sono dubbie, probabilmente confusa con *M. arion*.

Piemonte: 1751-1900; 1926-1950; 1976-2005; (26); (3378); **Friuli:** 1976-2000; (2485); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3049).

466. - **(-)** ***Maculinea nausithous*** **(Bergsträsser, 1779)**

Nota - Le vecchie citazioni per **Piemonte, Lombardia, Lazio** e **Abruzzo** sono errate; non esiste in Italia, confusa con altra specie (1392).

467. - ***Maculinea alcon*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per la **Valle d'Aosta:** (1392), (2165), (2633), (2769); "le segnalazioni controllate sono risultate errate, altre non sono state controllate; pertanto, non si ritiene di poter annoverare questa specie per la regione" (3145). In (3423) sono indicati siti di cattura solo per il **Piemonte**, il **Veneto**, il **Friuli** e la **Venezia Giulia**.

Piemonte: (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1975; 2001-2005; (795); (3393); **Trentino:** 1851-1950; (398); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (239); (1638); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (1038); (2180); **Friuli:** 2001-2005; (3378); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (935); **Liguria:** 1951-2000; (1727); (2219); **Emilia:** 1851-1975; (246); (2219); **Toscana:** 1926-1950; (1392); **Marche:** 1901-1975; (1016); (2085); **Lazio:** 1926-2000; (1392); (2651); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2945); **Molise:** 1976-2000; (2142).

468. - ***Maculinea rebeli*** **(Hirschke, 1905)**

Nota - È citata per l'**Alto Adige:** come segnalata in (Kitschelt, 1925; Scheuringer, 1972), nessuna cattura recente (2973); in Kitschelt e Scheuringer è riportata solo *M. alcon*. In (3423) sono indicati numerosi siti per l'**Alto Adige**, il **Veneto**, il **Friuli**, la **Venezia Giulia**, le **Marche** ed il **Lazio**, da verificare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2365); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2995); (3218); **Trentino:** 1976-2000; (2995); (3218); **Alto Adige:** 2001-2005; (3423); **Veneto:** 2001-2005; (3423); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** 1976-2000; (2284); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3059); **Toscana:** 1976-2000; (2691 bis); **Marche:** 2001-2005; (3423); **Lazio:** 2001-2005; (3423); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (2758).

469. - **(-)** ***Plebejus pylaon*** **(Fischer de Waldheim, 1824)**

Nota - Le citazioni per **Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino** e **Alto Adige** vanno riferite a *P. trappi*, sola specie presente in Italia settentrionale (2892).

470. - ***Plebejus trappi*** **(Verity, 1927)** (= *lycidas* Trapp, 1863)

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3049); **Piemonte:** 1951-1975; (1998); (3049); **Trentino:** (1976-2000) (2774); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1932); (3049).

471. - ***Plebejus argus*** **(Linnaeus, 1758)** (= *aegon* Denis & Schiffermüller, 1775; *argyrotoxus* Bergstrasser, 1779)

Nota - Le segnalazioni per l'**Arcipelago toscano**: Isola d'Elba di *Lycaena argus corsica* vanno riferite a *L. villai*; quelle per la **Sardegna** vanno riferite a *L. corsica*.

Nuovi dati - **Campania:** Monte Faito 18.VII.1951 (PRN). **Basilicata:**

Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Monte Caperino 16.VII.1976; Pollino: sorgente Acquafredda 2.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1976-2000; (864); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3383); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (175); (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (1060); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1851-1925; (359); (627); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3265); **Abruzzo:** 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1926-1950; 1976-2000; (1392); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1926-1950; (1206); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1901-2005; (833); (3304); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (148); (2844).

472. - ***Lycaeides idas*** **(Linnaeus, 1761)** (= *argus* sensu Denis & Schiffermüller, 1775 nec Linnaeus)

Nota - Le citazioni di *L. idas* per la **Emilia, Romagna, Toscana, Arcipelago toscano**, **Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata** e **Calabria** vanno riferite a *L. abetonica*. Citata genericamente per la **Sicilia:** (2980), probabilmente per errore. In **Sardegna** è *L. corsica* (2892). Le citazioni di *L. idas* per la **Sardegna** vanno riferite a *L. bellieri* (3382). Le segnalazioni per l'**Arcipelago toscano**: Isola d'Elba di *L. idas bellieri* e *L. idas corsica* vanno riportate a *L. villai* (3339).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1813); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1901-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1901-2005; (125 ter); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-1800; 1851-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

473. - ***Lycaeides abetonica*** **(Verity, 1911)** (= *argellus* Turati, 1911)

Lycaena argus abetonica è descritta su esemplari della **Toscana:** Abetone, presso le "Piramidi", 1400 m (Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze, 42 (1910): 273) (715).

Nuovo dato - **Basilicata:** fiume Camastra 27.VI, 9.VI, 11.VIII.1975 (PRN).

Piemonte: 1926-1950; 1976-2005; (1392); (3461 bis); **Lombardia:** 2001-2005; (3423); **Alto Adige:** 2001-2005; (3423); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1392); (2248); **Venezia Giulia:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** 1926-1950; (1392); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005;

(710); (3425); **Romagna:** 1926-2005; (1392); (3429); **Toscana:** 1901-2005; (715); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (902); (3196); **Marche:** 1901-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1926-1950; 1926-2000; (929); (3265); **Abruzzo:** 1926-2000; (1392); (2593); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1976-2000; (3265); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (1013); (3127).

474. - **(-) *Lycaeides bellieri* Oberthür, 1910** (= *argus* ssp. *corsica* sensu auct.)

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** e l'**Arcipelago sardo** di *L. bellieri* vanno riferite a *L. corsica*, sola specie del genere *Lycaeides* presente nell'isola (3440).

475. - ***Lycaeides corsica* (Tutt, 1909)**

Nota - Le segnalazioni di *L. argus corsica* per l'**Arcipelago toscano**: Isola d'Elba vanno riferite a *L. villai*; in **Sardegna** e nell'**Arcipelago sardo** è *L. bellieri* (3382). La sola specie del genere *Lycaeides* presente in **Sardegna** è *L. corsica*, secondo (3440).

Sardegna: 1851-2005; (301); (3440); **Arcipelago sardo:** 1976-2005; (2960); (3440).

476. - ***Lycaeides villai* Jutzeler, Leigheb, Manil, Villa & Volpe, 2003**

Lycaeides villai è descritta su esemplari dell'**Arcipelago toscano:** isola d'Elba: (olotipo) Monte Capanne, 850 m (Linneana Belgica, XIX (2): 69, Tav. 3, figg. 1, 10-16) (3339).

Nota - *Lycaeides villai* non è compreso nella Checklist italiana (3423) e per l'**Arcipelago toscano** viene indicata la presenza di *L. corsica*.

Arcipelago toscano: 1951-2005; (1640); (3339).

477. - ***Lycaeides argyrognomon* (Bergsträsser, 1779)**

Nota - Le citazioni per l'**Alto Adige** vanno riferite a *L. idas*, in quanto nessuno ha dimostrato la sua esistenza in tale regione (1392). Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite a *L. corsica*.

Nuovo dato - **Calabria:** Pollino: Anticristo 7.VII.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1851-1975; 2001-2005; (534); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (550); (3393); **Trentino:** (1901-1925); 1951-1975; (1038); (2014); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (3154); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1392); **Liguria:** (1926-1950); 1976-2000; (977); (3183); **Emilia:** 1901-2000; (501); (3205); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2255); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (474); (3429); **Marche:** 1926-2000; (1392); (2142); **Lazio:** 1901-2000; (656); (3265); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000;

(681); (3180); **Campania:** 1901-1925; 1951-2005; (867); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); **Puglia:** 1926-1975; (1392); (1565); **Calabria:** 1901-1925; 1951-1975; (933); (2038).

478. - ***Agriades glandon*** **(de Prunner, 1798)** (= *orbitolus* Esper, 1800)

Papilio glandon è descritta su esemplari del **Piemonte** "in montibus" (Lepidoptera Pedemontana: 76) (26).

Nota - "Poichè *P. glandon* è descritta nel Supplemento su esemplari ricevuti da Lezzolo, la provenienza non è certa; inoltre come luogo di origine è riportato "in montibus" e non "in alpibus", per cui i tipi potrebbero provenire dalle Hautes-Alpes o dalle Alpes-Maritimes" (1229). La citazione generica per la **Liguria** è dubbia.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Bardonecchia, Valfredda 2300 m 6.VIII.1981; Colle Bercia: Cesana (TO) 2300 m 25.VIII.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-1900; 1926-1950; 2001-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (215); (3218); **Trentino:** 1851-1925; (273); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (356); (2485); **Veneto:** 1851-1900; (273); (1038); **Liguria:** (1801-1850); (114).

479. - ***Albulina optilete*** **(Knoch, 1781)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria** è da confermare.

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1926-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (26); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1851-1950; 1976-2000; (244); (2620); **Liguria:** (1801-1850); (114).

480. - ***Albulina orbitolus*** **(de Prunner, 1798)**

Papilio orbitolus è descritta su esemplari della **Valle d'Aosta:** "Monte Traversagne (*recte* Monte Mucrone) mense Junii rarissimus" (Lepidoptera Pedemontana: 76) (26).

Nota - La citazione generica per la **Liguria** è da confermare.

Nuovi dati - **Piemonte:** Bardonecchia: Valfreddo 2000 m 6.VIII.1981; Valle Argentera 2300 m 21.VIII.1980. **Trentino:** Canazei (TN) 2000 m, Gruppo Sella 4.VII.1966 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1751-1800; 1851-1900; 1926-2000; (26); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1975; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (164); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-1950; 1976-2000; (244); (2485); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** (1851-1900); (114 bis).

481. - ***Eumedonia eumedon*** **(Esper, 1780)** (= *chiron* Rottemburg, 1775; *belinus* de Prunner, 1798)

Papilio belinus è descritto su esemplari del Piemonte "in montibus rarus" (26)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). La citazione per la **Puglia** va confermata.

Dadi inediti - **Piemonte:** Val di Susa: Pian Gelassa 3.VII.1975; Frais 1400 m 15.VI.1976 (CMC, PRN). **Basilicata:** Serra di Calvello, Fosso Bifurno 26.VI.1979. **Calabria:** Sila: Lorica 21.VI.1970 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3224); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (439); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1214); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Umbria:** 1951-1975; (2085); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (700); (3265); **Abruzzo:** 1851-1975; (344); (2027); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (945); (3457); **Puglia:** 1926-1950; (1206); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2077); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (902); (2941); **Sicilia:** 1851-2000; (145); (3146).

482. - ***Aricia cramera*** **(Eschscholtz, 1821)**

Sardegna: (1801-1850); 1901-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo**: (1976-2000); (2960).

483. - ***Aricia agestis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *astrarche* Bergsträsser, 1779)

Nota - *A. cramera* è presente solo nelle isole Canarie, mentre *A. agestis* popola le isole mediterranee (1643). *A. agestis* manca in **Sardegna,** dove è sostituita da *A. cramera* (2353), (3148). *A. agestis* è citata per l'Isola dell'Asinara (2960), ma tale dato va riferito a *A. cramera*.

Nuovi dati - **Campania:** Torre del Greco 10.X.VII.1968 (PRN); Aquara (SA): Ponte Calore 120 m 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Pollino: Fonte di Rummo 29.V.VII.1975; fiume Mercure 8.VI.VII.1980; Terranova 16.V.1983. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (398); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (1014); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (177);

(3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3138); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1901-2000; (902); (2883); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (658); (3312); **Molise:** (1926-1950); 1976-2005; (1392); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (3265); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3311); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1851-1900); 1926-2005; (156); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519).

484. - ***Aricia artaxerxes*** **(Fabricius, 1793)** (= *allous* Geyer, 1837; *astrarche* auct. nec Bergstrasser)

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1851-1950; 1976-2005; (372); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (550); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3224); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (471); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (501); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (177); (2691 bis); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (681); (2651); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (681); (3180); **Molise:** 1976-2000; (2142); **Campania:** 1976-2005; (3265); (3457); **Basilicata:** 1951-1975; (2001); **Calabria:** 1976-2000; (3157); **Sicilia:** 1901-1925; 1951-2000; (635); (2649).

485. - **(-)** ***Aricia montensis*** **Verity, 1928**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte,** l'**Emilia** e la **Toscana** sono da riferire a *A. agestis*. È citata genericamente come presente in **Sicilia:** (3049), citazione non confermata da altri dati. Non risultano altre citazioni per l'**Italia.**

486. - ***Aricia nicias*** **(Meigen, 1830)** (= *donzelii* Boisduval, 1832)

Nota - La citazione per il **Veneto** è dubbia (1392).

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri (CN), 2000 m, 10.VIII.1966; Cesana (TO), 1450 m, 3.VII.1970, 25.VIII.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3218); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1392); **Veneto:** 1851-1900; (439); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

487. - ***Cyaniris semiargus*** **(Rottemburg, 1775)** (= *acis* Denis & Schiffermüller, 1775; *frejus* de Prunner, 1798)

Papilio frejus è descritto su esemplari del **Piemonte:** "In Montibus" (26)

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Cavallo, 400 m, 14.VI.1998, Levano, 700 m, 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 1300 m 26.VI.1979; Monte Vulture (PZ)

10.VI.1972; Cersosimo 6.VI.1971, 9.VI.1978; Pollino: Cozzo Vardo 9.VII.1972, Belvedere, radura di faggeta 16.VII.1980; Acquatremola 4.VI.1981. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Pollino: Colle del Dragone 16.VII.1980; Anticristo 10.VI.1968 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (3312); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (777); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (437); (3371); **Umbria:** 1951-1975; (2085); **Marche:** 1901-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (807); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3383); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1926-1975; 2001-2005; (1206); (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (2844).

488. - ***Polyommatus escheri*** **(Hübner, 1823)**

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 27.VI, 1 e 9.VII.1975 C; Noepoli (PZ) 600 m 4.VII.1981; Cersosimo 9.VI.1978, 6.VI.1981; Pollino: Fonte di Rummo 29.V.1975; Piano Ruggio 23.VII.1979. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979; Oriolo 9.VI.1978 (PRN),

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-2005; (49); (3378); **Lombardia:** 1901-2000; (550); (3218); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (2503); **Alto Adige:** 1851-1975; (368); (1856); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (446); (1912); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (246); (2255); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (206); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (1044); (3315); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (3196); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (929); (2651); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3305); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (867); (3025); **Puglia:** 1926-1950; (1206); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (2142); **Calabria:** 1976-2000; (2941); (3423).

489. - ***Polyommatus dorylas*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *argester* Bergsträsser, 1779; *hylas* Esper, 1777; *dedalus* Giorna, 1791)

Papilio dedalus è descritta su esemplari del **Piemonte**: contorni di Torino (20).

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). La citazione per la **Sicilia:** (209) va depennata (1419). Riportata come citata per **Lombardia:** "Val Bregaglia" (Curò, 1885); Lanzada,

Bernina (Curò, 1885) (3227), si tratta di un errore, perchè Curò riporta solo: Zona sett. (Piem., Lomb., ecc.).

Nuovi dati - **Puglia:** Gargano: Peschici, Baia di Manaccora 28.VI.1995 (Bertaccini in litt.). **Basilicata:** Pietrapertosa (PZ) 15.VI.1977; Pollino: Piano Ruggio 19.VI, 20.VII.1976, 23.VII.1979, Timpone della Capanna 18.VII.1977. **Calabria:** Sila: Camigliatello 28.VII.1956; Pollino: Civita 15.VII.1977, 9.VI.1978; Monte Moschereto 8.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1851-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (603); (1392); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2000; (214); (3152); **Romagna:** 1976-2000; (2255); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1950; 1976-2000; (24); (2516); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1901-2000; (895); (2643); **Lazio:** 1901-2000; (807); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1206); (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2093); **Calabria:** 1951-2005; (1733); (3304).

490. - ***Polyommatus amandus*** **(Schneider, 1792)** (= *icarius* Esper, post 1792)

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Cavallo 400 m 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 26.VI.1976; Vaglio della Basilicata 31.VII.1994; Laghi di Monticchio 12.VI.1967. **Calabria:** Sila: Lorica 21.VI.1970; Fago del Soldato 22.VII.1956; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1981 (PRN).

Piemonte: 1801-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (2995); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (368); (2691); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (439); (2995); **Liguria:** 1926-2000; (1392); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (262); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2255); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (520); (3371); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (664); (2651); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3010); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1926-1950; (1206); (1415); **Basilicata:** 1926-2000; (1206); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (811); (3157); **Sicilia:** 1926-2000; (1637); (2649).

491. - ***Polyommatus thersites*** **(Cantener, 1834)**

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (3224) è dovuta a errata

identificazione. La citazione per la **Sicilia:** (832) è molto dubbia, probabilmente dovuta a scambio di etichette.

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 1.VI, 1 e 9.VII, 28.VIII, 29.IX.1975; Pollino: Piano Ruggio 22.VII.1979; Timpone Castellana 13.IX.1979. **Calabria:** Sila: Cerenzia 30.IV.1971; Pollino: Anticristo 10.VI.1978; Civita 31.VI.1972, 22.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (724); (3145); **Piemonte:** 1901-2005; (724); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (807); (3393); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1900; 1926-1950; (170); (1142); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1392); (3380); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1392); **Liguria:** 1901-2000; (797); (3183); **Emilia:** 1926-2000; (1392); (3186); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1901-1950; 1976-2005; (724); (3371); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1901-2000; (724); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (807); (3265); **Abruzzo:** 1926-2000; (1392); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (1013); (3457); **Puglia:** 1951-1975; (1845); (2038); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1901-2005; (933); (3304).

492. - ***Polyommatus icarus*** **(Rottemburg, 1775)** (= *alexis* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998; Roccadaspide (SA): Vallone Macchia della Chiesa 700 m 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 1.V, 9.VII, 29.IX.1975; Cersosimo 9.VI.1978; Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Timpone Castellana 13.IX.1979; Timpone della Capanna 18.VII.1977; fiume Mercure 8.VI.1980, 6.VI.1981; Terranova 4.VII, 25.IX.1981, 16.V.1983. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979; Civita 31.VI.1972, 9.VII.1974, 20.IV.1975, 22.VII, 15.IX.1979, 6.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1751-1800; 1851-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (1044); (3315); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1801-2000; (109); (2883); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000;

(2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1851-1925; 1951-2000; (259); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3311); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-2005; (109); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; 1976-2000; (781); (2960).

493. - ***Polyommatus eros*** **(Ochsenheimer, 1808)** (= *tithonus* Hübner, 1804; *bramafama* de Prunner, 1798)

Papilio bramafama è descritta su esemplari del **Piemonte**: "Pedemontanis rarus" (26).

Nota - Il *P. bramafana* de Prunner è stato descritto su esemplari del "Forte Bramafan" a 1500 m, a sud di Bardonecchia in Valle di Susa, dove è abbondante in VII (1440). La citazione per il **Veneto:** (359) non è attendibile.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (275); (3227); **Trentino:** 1901-1925; (1038); (1053); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2325); **Veneto:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (3196); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2485); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (359); (2651); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); (3265).

494. - ***Polyommatus daphnis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *meleager* Esper, 1777)

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Seghino 18.VIII.1987 (CMC, PRN). **Campania:** Monte Faito 500-900 m VII.1955 (PRN). **Puglia:** Gargano: Peschici, Baia di Manaccora 29.VI.1989, al livello del mare (Bertaccini in litt.). **Basilicata:** Monte Caperino 11.VIII.1975; Pollino: Piano Ruggio 30.VII.1972, 25.VII.1979, 23.VIII.1975; Fonte di Rummo 9.VII.1972. **Sicilia:** Madonie; Piano Battaglia 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (417); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2441); **Alto Adige:** 1851-2000; (358); (2722); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (935); (1392); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (3383); **Romagna:** 1976-2005; (2255); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (437); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (3077); **Lazio:** 1901-2000; (681); (3265); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3010); **Molise:** 1976-2000;

(2142); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2005; (1563); (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2093); **Calabria:** 1951-2000; (2001); (3304); **Sicilia:** 1851-2000; (147); (2095).

495. - ***Polyommatus bellargus*** **(Rottemburg, 1775)** (= *thetis* Rottemburg, 1775)

Nota - È citata per la **Sardegna** da Courvoisier, citazione dubbia (1392).

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Cavallo, 400 m, 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Cersosimo 9.VI.1978; Pollino: Piano Ruggio 19.VI.1976, 20.VI.1982. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Pollino: Civita 20.V.1979, 18 e 22.VII.1977, 15.IX.1979; Monte Moschereto 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1801-1950; 1976-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (109); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (2485); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); (3315); **Umbria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; (109); (2085); **Marche:** 1851-2000; (344); (2145); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (99); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1392); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2038); **Calabria:** 1951-2000; (1658); (2093); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (214); (3083).

496. - ***Polyommatus coridon*** **(Poda, 1761)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (209); l'esemplare di Zeller dovrebbe essere di **Toscana:** Foligno e non di **Sicilia:** (832). Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite a *P. gennargenti* (3337).

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Susa: Seghino 700 m 18.VIII.1977. **Lombardia:** Casana: Colle Bercia 2300 m 25.VIII.1977. **Abruzzo:** Pietracamela (TE) VIII.1985 (PRN). **Puglia:** Gargano: Manaccore di Peschici 2.IX.1974 (Cameron-Curry in litt.); Mellitto 27.VIII.1977; Parco delle Pianelle (TA): Masseria Carrucola 18.VIII.1975; Mottola (TA): gravina di Petruscio 12.VIII.1983, 13.VIII.1985, 4 e 14.VIII.1991; gravina di Ginosa 27.VIII.1978; Grottaglie (TA): gravina di Riggio 20.VIII, 10.IX.1991. **Basilicata:** Pollino: Timpone della Capanna 18.VII.1977; Madonna del Pollino 23.VII.1979. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979, 28.VII.1988 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20);

(3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1901-1925; 1951-2000; (164); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (398); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (146); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (935); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2255); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3371); **Umbria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (109); (2142); **Marche:** 1951-1975; 1901-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3338); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3338); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (712); (3457); **Puglia:** 1951-2005; (1891); (3338); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (70); (3157).

497. - **Polyommatus gennargenti (Leigheb, 1987)**

Lysandra coridon ssp. *gennargenti* è descritta su esemplari della **Sardegna:** Barbagia Seulo (NU), 800 m (Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 5 (2): 449, figg. 1-2) (2480).

Sardegna: 1976-2000; (2480); (3362).

498. - ***Polyommatus hispana* (Herrich-Schäffer, 1852)**

Nota - La segnalazione di *P. hispana* per le **Marche**: (2255) va riferita a *P. coridon* (2516).

Nuovi dati - **Piemonte:** Ponzone di Acqui 9.VIII.1973. **Liguria:** Val Lerone: Arenzano 9.IX.1972, 13.VI.1971; Andora (SV) 31.V.1976 (CMC, PRN).

Piemonte: (1901-1925); 1951-2005; (737); (3461 bis); **Liguria:** (1901-1925); 1926-2000; (737); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1781); (3423); **Toscana:** 1901-2005; (846); (3372).

499. - **(-) *Polyommatus albicans* (Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - Le citazioni di *P. albicans* per il **Piemonte,** la **Liguria** e la **Toscana** vanno riferite a *P. hispana*; quelle per l'**Emilia** a *P. coridon*. La citazione per l'**Alto Adige:** (172) è molto dubbia.

500. - **(-) *Polyommatus admetus* (Esper, 1783)**

Nota - Le citazioni di *P. admetus* per il **Piemonte** vanno riferite a *P. exuberans*; quelle generiche per il **Trentino,** l'**Alto Adige** e la **Liguria** sono dubbie. Non risultano altre citazioni per l'**Italia.**

501. - **(-) *Polyommatus fabressei* (Oberthür, 1910)**

Nota - È riportata genericamente per l'**Italia** (2980); citazione dubbia.

502. - ***Polyommatus humedasae* (Toso & Balletto, 1976)**

Agrodiaetus humedasae è descritta su esemplari della **Valle d'Aosta:** Cogne, Pondel (Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria", Genova, 81: 124) (2088).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3132).

503. - ***Polyommatus ripartii*** **(Freyer, 1831)**

Nota - Le citazioni per il **Trentino:** (654*) e l'**Alto Adige:** (172); sono errate, mai trovata in queste regioni (1392). Le citazioni per il **Piemonte:** Val di Susa di *P. ripartii exuberans* e di *P. admetus ripartii* vanno riferite a *P. exuberans* (2862). Le citazioni di *P. ripartii* per la **Basilicata** vanno riferite a *P. galloi*.

Piemonte: 2001-2005; (3313); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3313).

504. - ***Polyommatus exuberans*** **(Verity, 1926)**

Hirsutina admetus r. *exuberans* è descritta su esemplari del **Piemonte:** Oulx 1100 m (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 38: 121) (1080).

Nota - *P. ripartii exuberans* è citata per la **Liguria:** (2019), (2154). *P, exuberans* è endemismo del **Piemonte**: Valle di Susa, non presente in **Liguria** (3423).

Piemonte: 1851-2005; (114 bis); (3378).

505. - ***Polyommatus galloi*** **(Balletto & Toso, 1979)**

Agrodiaetus galloi è descritta su esemplari della **Basilicata:** Piano Ruggio, 1550 m (olotipo), Vallone di Malvento, Belvedere, Timpone della Capanna, Monte Pollino e **Calabria:** Campotenese, Massiccio dell'Orsomarso: Passo Campolungo (Nota lepidopterologica, 2 (1-2): 13) (2154).

Basilicata: 1951-2000; (2001); (3132); **Calabria:** 1951-2000; (2154); (3313).

506. - **(-)** ***Polyommatus nephohiptamenos*** **(Brown & Coutsis, 1978)**

Nota - È citata genericamente per l'**Italia** (2980), (3049); sole citazioni, dubbie.

507. - ***Polyommatus dolus*** **(Hübner, 1823)**

Nota - Le citazioni per **Trentino:** (654*), **Piemonte:** (114), (1392), (3183) e **Veneto:** (10) non sono attendibili (3423). Le citazioni per l'**Italia centrale** e **meridionale** vanno riferite a *P. virgilia*.

Liguria: 1901-1950; 1976-2000; (682); (3132).

508. - ***Polyommatus virgilia*** **(Oberthür, 1910)** (= *menalcas* sensu Turra, 1780 et Calberla, 1887)

Lycaena dolus r. *virgilia* è descritta su individui dell'**Abruzzo:** Sulmona (AQ) (Études de Lépidoptérologie comparée. 4: 263) (658).

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 9.VII, 1 e 28.VIII.1975; Monte Caperino 9.VII, 11 e 23.VIII.1975; Pollino: Piano Ruggio 23.VII.1975 (PRN).

Emilia: 1976-2000; (2140); (3049); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-2000; (385); (2516); **Lazio:** 1926-2000; (1084); (3212); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3132); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (867); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1206); (3397); **Basilicata:** 1951-1975; (2038); **Calabria:** (1926-1950); 1951-2000; (1206); (3157).

509. - ***Polyommatus damon*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Citata per l'**Emilia:** Monte Cimone (262); dato dubbio, non presente nella collezione Fiori (1392). Nella collezione del Muzelului Banatului è conservato un esemplare di Bologna 1.VIII (2032).

Nuovi dati - **Piemonte:** Grange della valle di Exilles 1750 m 29.VII.1976; Cesana (TO) 1650 m 3.VIII.1976 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1950; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1950; (171); (1392); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Friuli:** 1851-1900; (352); (364); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (828); (3132); **Lazio:** 1926-2000; (1084); (2142); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (3259).

Fam. Libytheidae

510. - ***Libythea celtis*** **(Laicharting, 1782)**

Papilio celtis è descritta su esemplari dell'**Alto Adige:** Campodazzo (Bolzano) (in Fuesslin, Archiv der Insectengeschichte: 25, Tav. 8, figg. 1-3) (12*); (1443).

Nota - È citata genericamente per la **Liguria:** (114); nessuna cattura in **Liguria:** (1443).

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 12.VI.1982; Piano Ruggio 20.VI.1981; Cropani 18.VI.1976. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981, esemplare svernato (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1751-1800; 1851-2000; (12*); (2485); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1975; (109); (1480); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3205); **Toscana:** 1926-1950; 1976-2005; (1443); (3371); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3056); **Umbria:** 1901-1950; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** 1926-2000; (1443); (3010); **Molise:** (1801-1850); (70); **Campania:** 1751-1850; 1901-

1925; 1976-2005; (15); (3457); **Puglia:** 1951-1975; (2202); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1926-1950; 1976-2005; (1443); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (94); (3291); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3049); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

Fam. Nymphalidae

511. - ***Argynnis paphia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 27.VI, 9.VII.1975; Monte Caperino 9.VII.1975; Noepoli 6.VII.1981; Pollino: Terranova 20.VI.1982; Cersosimo 6.VI.1981. **Calabria:** Gambarie (RC) 8.VIII.1971; Pollino: Cozzo Vardo 9.VII.1972; Anticristo 9.VII.1972; Acquatremola 4.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1950; 1976-2000; (966); (3315); **Umbria:** 1851-1925; 1976-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3305); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1801-1850; 1926-2000; (70); (3274); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2000; (97); (3146); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (43); (3148).

512. - ***Argynnis pandora*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *maja* Cramer, 1776)

Nuovi dati - **Campania:** Bellosguardo (SA): Mortellito 200 m 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Serra di Calvello (PZ): Fosso Bifurno 17.VII.1976; Pollino: Fonte del Vaccaro 23.VII.1981; Venosa (PZ): Loreto 15-25.VII.1967. **Calabria:** Sila: lago Arvo 7.VII.1965; Pollino: Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979. **Sicilia:** Madonie: Piano Battaglia 24.VII.1976 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1975; (26); (1563); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (211); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1443); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (129); (2180); **Friuli:** 1851-

1900; 1926-1975; (352); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (2017); **Emilia:** 1851-1900; (214); (246); **Toscana:** (1851-1900); 1926-2005; (1312); (3372); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3365); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (3196); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** 1926-2000; (1443); (3312); **Molise:** 1976-2000; (3265); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (811); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2519); **Puglia:** 1801-1850; 1901-2000; (70); (2756); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (3383); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (43); (3148).

513. - ***Argynnis aglaja*** **(Linnaeus, 1758)** (= *charlotta* Haworth, 1802)

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Caperino 26.VI.1976; Pollino: Madonna del Pollino 23.VII.1979; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980, 19.VI.1982. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; La Fossiata 22.VII.1981; Pollino: Acquatremola 4.VII.1981; Cozzo Vardo 9.VII.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: (1801-1850); 1851-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-2000; (10); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (568); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (214); (2093); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2485); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3371); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3180); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1976-2000; (2093); (3397); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1801-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (145); (2554).

514. - ***Argynnis adippe*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Venezia Giulia:** Trieste 10.VII.1972. **Puglia:** Gargano: Mattinata 12.VIII.1991; Pianelle: Masseria Carrucola 22.VI.1975. **Basilicata:** fiume Camastra 1 e 9.VII.1975; Accettura 7.VIII.1980; Pollino: Piano Ruggio 6.VII.1981; Serra Cappellina: San Severino 6.VII.1981; Noepoli 4.VII.1981. **Calabria:** Sila: Lago Arvo 7.VIII.1965 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2574); **Veneto:**

1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1443); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3186); **Romagna:** 1926-2005; (1443); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3371); **Umbria:** 1851-1925; 1976-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1751-1800; 1851-2005; (15); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (1549); (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (3265); **Calabria:** (1751-1800); 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (13); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (59); (2095).

515. - ***Argynnis niobe*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Pollino: Fonte di Rummo 9.VII.1972; Fonte del Vaccaro 23.VII.1981. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana 3.VII.1972; Pollino: Colle del Dragone 16.VII.1980, 6.VII.1981; Anticristo 9.VII.1972; Cozzo Vardo 9.VII.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-1975; (10); (2313); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1443); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3062); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3371); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (828); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3457); **Puglia:** 1976-2000; (3397); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-1925; (97); (1928); **Sardegna:** 2001-2005; (3423).

516. - ***Argynnis elisa*** **Godart, 1823** (= *cyrene* Hübner, 1824; *cyrene* Bonelli, 1826)

Papilio cyrene è descritta su esemplari della **Sardegna**: Gennargentu, 1000-1800 m (43).

Sardegna: 1801-2000; (43); (3148).

517. - ***Issoria lathonia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Vulture 9.VI, 20.IX.1968, 23.VII, 22.VIII.1969, 5.IV.1971, 10.VI.1972; fiume Camastra 9.VII, 29.IX.1975; Noepoli 4.VII.1981; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Madonna del Pollino 23.VII.1979;

Timpone Castellana 6.VI.1980. **Calabria:** Sila: Fossiata 20.V.1979; Pollino: Civita 20.IV.1975, 20.V.1979. **Sicilia:** Cefalù (PA) 3.VI.1988 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2005; (171); (3291); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3131); **Umbria:** 1851-1925; 1976-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (99); (3457); **Puglia:** 1901-2000; (611); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3291); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (43); (3148).

518. - ***Brenthis ino*** **(Rottemburg, 1775)**

Nota - È citata genericamente per **Liguria:** (114), non presente nella regione (1443). Le citazioni per l'**Emilia:** Formigine (MO) (246) e le **Marche:** Osimo (385) e Bolognola (895), sono dubbie. La citazione per la **Sicilia:** (187) va riferita a *B. daphne* (832).

Nuovi dati - **Calabria:** Sila: Lago Cecita 20.VII.1981; Macchia di Pietro 25.VI.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (550); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (398); (3218); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1443); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1950; (367); (1443); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Calabria:** 1926-1975; (1443); (2202).

519. - ***Brenthis daphne*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *chloris* Esper, 1777)

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Cavallo, 400 m, 14.VI.1998, Casalotti, 200 m, 21.VI.1998; Bellosguardo (SA): Mortellito, 200 m, 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Pulo di Altamura 30.V.1977; Acquaviva delle Fonti 31.V.1981. **Basilicata:** Cersosimo 6.VI.1981; fiume Camastra 1.VII.1975; Sellata: La Maddalena 18.VII.1976; Pollino: sorgente Acquafredda 2.VII.1981. **Calabria:** Sila: lago Cecita 16.VII.1969; Pollino: Acquatremola 4.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3378); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2005; (253); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (171);

(2722); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1443); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2000; (110); (2485); **Romagna:** 1926-2000; (1443); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3180); **Molise:** 1976-2005; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1926-2005; (1415); (3423); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1801-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1851-2000; (145); (3146).

520. - ***Brenthis hecate*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura 30.V, 6.VI.1977; Mellitto 4.VI.1979; Castel del Monte 2.VI.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1443); (3145); **Piemonte:** 1801-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (164); (3218); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (171); (2485); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); **Veneto:** 1851-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (375); (2485); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1250); **Liguria:** (1801-1850); 1951-1975; (114); (2219); **Emilia:** 1801-1925; (110); (2313); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (177); (3372); **Umbria:** 1976-2000; (2988); (3196); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (3074); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (2204); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3180); **Campania:** 1976-2005; (3265); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2038); (2202); **Basilicata:** 1951-2000; (1630); (3298).

521. - ***Boloria eunomia*** **(Esper, 1799)**

Nota - Una citazione per le **Marche:** (385) è certamente errata.

Alto Adige: 1926-1950; 1976-2000; (1443); (2485).

522. - ***Boloria euphrosyne*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 27.V, 23.VI.1969, 9 e 16.VI.1968, 5.IV.1971, 10.VII.1972; Laghi di Monticchio 12.VI.1967; fiume Camastra 29.V, 26.VI.1976; Pollino: Acquatremola 4.VI.1981, Viggianello 29.V.1975. **Calabria:** Pollino: Colle del Dragone 29.V.1975, 19.VI.1976 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (368); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (364); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (974); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; (110); (2313); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3371); **Umbria:** 1951-1975; (1996);

Marche: 1901-1925; 1951-2000; (847); (2516); **Lazio:** 1901-2000; (807); (3265); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1926-1950; (1415); (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1851-2000; (187); (2148).

523. - ***Boloria titania* (Esper, 1793)** (= *amatusia* Esper, 1783)

Nymphalis Phalerati titania è descritta su esemplari del **Piemonte** (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 1: 170, tav. 88, fig. 1-2) (9*); (1443).

Nuovi dati - **Piemonte:** Pozza San Nicolò 1600 m 10.VII.1973; Cesana (TO) 7.VII.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (9*); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2457); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2224); **Veneto:** 1901-2000; (1046); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (352); (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183).

524. - ***Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per **Liguria, Abruzzo, Campania, Calabria** e **Sicilia**; identificazioni errate.

Nuovo dato - **Piemonte:** La Cassa (TO) 13.VII.1976, 29.V.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (2365); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1901-1925; (2313).

525. - ***Boloria dia* (Linnaeus, 1767)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** sono errate (1249).

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Susa: Arnodena 3.VII.1977; Bruzolo 16.IV.1972; Val della Torre 27.VII.1975. **Friuli:** Tirano (UD) 1300 m 16.VIII.1973; Martignacco (UD) 23.VII.1967 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3270); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (181); (2248); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (3196); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3052).

526. - ***Boloria thore*** **(Hübner, 1804)**

Nota - È citata per la **Valle d'Aosta:** (114); mai rinvenuta, la presenza in Val d'Aosta è da confermare (3145).

Piemonte: 1801-1900; 1951-2000; (114); (2391); **Lombardia:** 1851-2000; (355); (2457); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (231); (2691); **Veneto:** 1901-1950; (1046); (1443); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528).

527. - ***Boloria pales*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1801-1925; 1951-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1751-1900; 1926-1950; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (215); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1801-2000; (98); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (352); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (2093); **Umbria:** 1951-1975; (1750); **Marche:** 1951-1975; (1750); (2144); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (359); (2651); **Abruzzo:** 1801-2000; (344); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259).

528. - ***Boloria napaea*** **(Hoffmannsegg, 1804)**

Nota - La citazione per la **Liguria** va confermata.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (114 bis); (3145); **Piemonte:** 1851-2005; (361); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (215); (3393); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (398); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1926-1950; (1081); (1443); **Liguria:** (1901-1925); (1016).

529. - ***Boloria graeca*** **(Staudinger, 1870)**

Piemonte: 1901-2000; (1443); (2766).

530. - ***Vanessa atalanta*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Casalotti 200 m 21.VI.1998; Bellosguardo (SA): Mortellito 200 m 27.VI.1998; Castel San Lorenzo (SA): Genzano 330 m 4.VII.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Bari: Campus 1-5.X.1980; Locorotondo 30.VII.1992; Fasano 25.X.1982; San Cataldo (LE) 3.VII.1968; Lequile (LE) 24.V.1983. **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Fonte di Rummo 19.VI.1976; Terranova 10.VIII.1980. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1981; Acquatremola 4.VII.1981; Civita 20.V.1979. **Sicilia:** Polizzi Generosa (PA) 1000 m 21.VI.1966; Capaci (PA) 19.VII.1961; Cefalù (PA) 3.VI.88; Casteldaccia (PA) 25.VIII.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (398); (3291); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650);

(1480); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1851-1925; 1976-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (3025); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** (1751-1800); 1801-2005; (21*); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2005; (468); (3274); **Basilicata:** (1926-1950); 1951-2000; (1443); (3265); **Calabria:** (1751-1800); 1901-1925; 1976-2005; (13); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3291); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (223); (3055); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

531. - ***Vanessa cardui*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Levano 700 m 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Locorotondo 19.IX.1992; Pianelle 20-22.VI.1969, 4.VI, 25.VII.1971,.VI.1973, 11.VII.1974, 24.VI.1976; San Paolo 24 e 30.VII, 4.VIII.1969; Massafra 2 e 10.VI.1970; Faggiano 21.IV.1968. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 24.IV.1977; fiume Camastra 9.VII.1975, 26.VI.1976; Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Lago Duglia 18.VI.1982; Fonte di Rummo 19.VI.1976; Timpone Castellana 6.VI.1980. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Sila: Botte Donato 1928 m 18.VII.1969; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1981; Civita 20.V.1979; Monte Moschereto 600-1000 m 6.VI.1980, 17.VII.1980. **Sicilia:** Madonie: Piano Battaglia 17.VII.1962; Piano del Faggio 1450 m 31.V.1998; Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1751-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2563); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (252); (3197); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; (109); (932); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3383); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1926-2005; (1443); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-2000; (313); (3315); **Umbria:** 1851-1925; 1976-2000; (252); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); (3025); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3312); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-2005; (55); (3457); **Arcipelago campano:** 1851-1925; 1951-2000; (259); (2519); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3274); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1751-1800); 1801-1850; 1901-1925;

1976-2005; (13); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (37*); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1801-1900; 1951-2000; (95); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

532. - ***Inachis io*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Corneliano d'Alba (CN) 22.VI.1975 (CMC, PRN). **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Genzano, 330 m, 4.VII.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Palagiano 15.V.1990 (2 es.) (NRD); Castellaneta Marina 4.VII.1999, 12.VIII.2002. **Basilicata:** fiume Camastra 26.VI.1976; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 26.VI.1979; Pollino: Piano Ruggio 8.VII, 1.VIII.1972, 6.VII.1981; Fonte di Rummo 19.VI.1976. **Calabria:** Pollino: Colle del Dragone 19.VI.1976, 6.VII.1981; Acquatremola 4.VII.1981; Civita 19.VII.1974, 20.IV.1975, 22.VII.1979; San Cosma Albanese 5.IV.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2574); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (177); (3371); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3056); (3315); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (895); (2516); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (817); (3312); **Molise:** 1976-2005; (3259); **Campania:** (1751-1800); 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (21*); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1976-2005; (2202); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (37*); (3291); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148).

533. - ***Aglais urticae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni di A. urticae per la **Sardegna** vanno riferite a *A. ichnusa*.

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 16.VI.1970; Pollino: Fonte di Rummo 19.VI.1976; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Lago Duglia 18.VI.1982; Terranova 4.VII.1981. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; La Fossiata 30.VIII.1982; Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Santo Stefano di Rogliano 850 m 25.IX.1981; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1981; Acquatremola 4.VII.1981. **Sicilia:** Madonie: Piano del Faggio 1450 m 31.V.1998 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-

2000; (1443); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-2000; (623); (2251); **Umbria:** 1851-1900; 1976-2000; (421); (3196); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1900; 1976-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1901-1925; 2001-2005; (468); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (2093); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3233).

534. - ***Aglais ichnusa* (Hübner, 1824)** (= *ichnusa* Bonelli, 1826)

Papilio ichnusa Bonelli è descritta su esemplari della **Sardegna:**vetta del Gennargentu (43).

Nota - Le citazioni di *A. ichnusa* per l'**Arcipelago toscano**: Isola d'Elba e le **Marche** vanno riferite a *A. urticae*.

Sardegna: 1801-2000; (43); (3148).

535. - ***Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Bellosguardo (SA): Mortellito 200 m 27.VI.1998; Castel San Lorenzo (SA): Genzano 330 m 4.VII.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Pianelle: Masseria Carrucola 22.VI.1975 (ab. *hutchinsoni* Robson). **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 10.VI.1972, 9.VI.1968; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 25.VI.1979; Pollino: Cersosimo 6.VI.1981. **Calabria:** Sila: Camigliatello 30.VI.1991 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (966); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1801-1850; 1976-2000; (70); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); **Puglia:** 1976-2005; (3274); (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3298); **Calabria:** 1751-1800; 1901-1925; 1951-2005; (13); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (3233); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43);

(3148).

536. - ***Polygonia egea*** **(Cramer, 1775)** (= *i-album* Esper, 1789)

Nota - Citata con dubbio per l'**Arcipelago toscano** (3315). È citata per la **Sardegna:** (359), (2980), (3056), (3315); presenza in **Sardegna:** molto dubbia (3148); è assente in **Sardegna:** (3049).

Nuovi dati - **Puglia:** Locorotondo 12.VIII.1992; Mellitto 4.VI.1979; Bari: Campus 1-5.X.1980; Fasano 24.IX.1982; Castellaneta Marina 20-30.VII.1980; Lecce 12.VI.1983; Otranto 16.VIII.1999. **Basilicata:** Massiccio del Pollino: Fonte del Vaccaro 23.VII.1981. **Calabria:** Gambarie (RC) 8.VIII.1971; Pollino: Civita 25.VIII.1973; Monte Moschereto 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; (659); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-1975; 2001-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2995); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (211); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1011); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (161); (2180); **Friuli:** 1851-1975; (364); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1975; 2001-2005; (650); (3383); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (3205); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3058); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (19); (3310); **Umbria:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (359); (3058); **Lazio:** 1851-2005; (359); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2519); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2100); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (54); (3383); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519).

537. - ***Araschnia levana*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la **Lombardia:** (164); mai trovata (550). Estinta in **Piemonte** all'inizio del secolo, la reintroduzione è fallita (20). Estinta in **Italia** nel 1935; ricomparsa sporadica a Tarvisio (2892). Citata per la **Toscana:** (2020); probabile errore di etichettatura.

Valle d'Aosta: 1951-1975; (1563); **Piemonte:** 1751-1900; (6); (361); **Trentino:** 1976-2000; (2443); **Alto Adige:** (1851-1900); 1951-1975; (170); (1917); **Veneto:** 1801-1925; 1976-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2892); (2995).

538. - ***Nymphalis antiopa*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (144), la segnalazione di Mann è dubbia (832). Citata anche per la **Sardegna:** (359); in **Sardegna** frequente ma non dannosa (1169); forse errata identificazione.

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 29.V.1976 (svernante); Monte

Caperino 17.VII.1976; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; Fonte del Vaccaro 23.VII.1981; Acquatremola 4.VI (svernante), 4.VII.1981; Fonte di Rummo 19.VI.1976; Terranova 4.VII.1981. **Calabria:** Pollino: Civita 20.IV.1975; Castrovillari: Fiume Coscile 20.V.1979 (svernante) (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (2365); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2574); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3205); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (895); (2516); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3052); **Abruzzo:** 1901-2000; (616); (3305); **Molise:** 1801-1850; 1976-2000; (70); (3259); **Campania:** 1801-1925; 1976-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2202); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2202); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (54); (3157).

539. - ***Nymphalis polychloros*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Bellosguardo (SA): Mortellito 200 m 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Turi 26.V.1971 ex l.; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 20.VI.1985; San Vito dei Normanni 7.VI.1965. **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 10.VI.1972; fiume Camastra 1 e 9.VII.1975; Pollino: Fonte di Rummo 19.VI.1976; Rotonda 29.III.1981. **Calabria:** Pollino: Acquatremola 4.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1443); **Liguria:** 1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (3152); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (623); (3315); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1443); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (99); (3457); **Puglia:** 1926-2005; (1776); (3274); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2005; (2038); (3399); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (87); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (94); (3233); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148).

540. - **(-)** ***Nymphalis xanthomelas*** **(Esper, 1781)**

Nota - Le citazioni per **Alto Adige, Marche** e **Sardegna** vanno riferite a *N. polychloros*.

541. - (-) ***Nymphalis vau-album*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Alcune vecchie citazioni di *P. v-album* o *P. l-album* per **Piemonte, Alto Adige, Veneto, Marche, Regno di Napoli** e **Calabria** sono probabilmente da riferire a *P. c-album*.

542. - ***Euphydryas cynthia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le vecchie citazioni generiche e quelle per località di pianura o collinari di **Friuli, Emilia, Toscana, Sicilia** sono da riferire a *M. cinxia*, in quanto *E. cynthia* è di alta montagna.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Cresta Grossiéres (Bardonecchia) 2450 m 13.VII.1978 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1950; 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1801-1950; 1976-2000; (105*); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** (? 1801-1900); 1926-1950; (98); (2180); **Friuli:** 1851-1900; 2001-2005; (364); (3423); **Liguria:** 1951-2000; (2017); (2825).

543. - ***Euphydryas intermedia*** **(Ménétriès, 1859)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte:** (3186), (3378) sono da confermare; non è indicato alcun sito per la regione in (3423).

Piemonte: (? 1901-1925); 1976-2005; (3186); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (218); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2485); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3186); **Veneto:** 1851-1950; (161); (2313); **Friuli:** 1926-1975; (1400); (1528).

544. - ***Euphydryas maturna*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per il **Piemonte** da parte di de Prunner (Fenestrelle) è stata a lungo considerata un errore. Recentemente, tuttavia, vi è stata ritrovata nelle Alpi Cozie meridionali, in un fondovalle fra i 1000 e i 1200 m (3330). Le citazioni di *E. maturna* e di *E. maturna wolfenbergeri* per **Lombardia, Trentino** e **Alto Adige** vanno riferite a *E. intermedia wolfensbergeri*; quelle per **Friuli** e **Marche** sono errate, da riferire a altra specie.

Piemonte: 1751-1800; 2001-2005; (26); (3330).

545. - ***Euphydryas aurinia*** **(Rottemburg, 1775)**

Nota - Le citazioni per **Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia** e **Basilicata** vanno riferite a *E. provincialis* (2892). Le citazioni per la **Valle d'Aosta** vanno riferite a *E. glaciegenita*.

Piemonte: 1801-1950; 1976-2000; (14); (3378); **Lombardia:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (105*); (2995); **Trentino:** 1851-1900;

(171); **Alto Adige:** 1851-1950; (171); (1443); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (2909); **Friuli:** 1901-1950; (1007); (1443); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1443).

546. - ***Euphydryas provincialis*** **(Boisduval, 1829)**

Nota - Le citazioni per la **Lombardia** sono da confermare, non essendo riportata per la regione in (3423). Le citazioni per la **Venezia Giulia** e l' **Emilia** sono dubbie.

Piemonte: (1851-1900); 1901-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; (319); (1443); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Liguria:** 1926-2000; (1443); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1976-2000; (3077); (3110); **Umbria:** 1976-2000; (2002); (3196); **Marche:** 1951-2000; (1855); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (669); (3265); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3010); **Campania:** 1976-2005; (3265); (3457); **Puglia:** 1976-2005; (3397); **Basilicata:** 1951-2000; (1829); (2703); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2000; (54); (3158).

547. - ***Euphydryas glaciegenita*** **(Verity, 1928)** (= *merope* de Prunner, 1789)

Melitaea aurinia r. *glaciegenita* è descritta su esemplari dell'**Alto Adige:** Passo dello Stelvio sopra i 1600 m e Svizzera (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 40 (3): 43) (1124). *Papilio merope* è descritta su esemplari del **Piemonte**: "Valle Varaitana (*recte* Varaita) circa Lyaiol (Layol)" (26).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1926-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (146); (3227); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (398); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2722); **Veneto:** 1926-1950; (1081); (1443); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528).

548. - ***Melitaea cinxia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Vallone Macchia della Chiesa, 700 m, 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 1.V, 20.V.1975; Pollino: Piano Ruggio 18.VI.1976, Terranova 15.V.1983. **Calabria:** Oriolo-Cersosimo 9.VI.1978; Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Pollino: Colle del Dragone 29.V.1975, 19.VI.1976; Civita 29.V.1975. **Sicilia:** Madonie: Piano del Faggio 1450 m 31.V.1998 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2908); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-1975; 2001-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (364); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1443); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (?

1751-1800); 1851-2005; (19); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (2251); (3315); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2142); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (64); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1901-2005; (811); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (3083).

549. - ***Melitaea phoebe*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Tuono 400 m 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 23.VI.1969, 10.VI.1972; Pollino: Terranova 4.VI.1981; Cersosimo 6.VI.1981; Viggianello 29.V.1975. **Calabria:** Pollino: Civita 29.VI.1975, Monte Moschereto 600-800 m 6-8.VI.1980. **Sicilia:** Madonie: Piano del Faggio 1450 m 31.V.1998 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (253); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2722); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (935); (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (511); (2248); **Liguria:** 1901-1950; 1976-2000; (583); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3371); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2005; (36); (3417); **Abruzzo:** 1901-2000; (681); (3010); **Molise:** 1951-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1901-2005; (811); (3457); **Puglia:** 1801-1850; 1901-2000; (70); (2247); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-1850; 1901-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3083).

550. - ***Melitaea aetherie*** **(Hübner, 1826)**

Nota - Le citazioni di *M. aetherie* per il **Veneto:** (171), (446), vanno riferita ad altre specie; la citazione per la **Venezia Giulia:** (218) va riferita a *M. asteria;* la citazione per le **Marche:** (385) va riferita a *M. varia*.

Calabria: 1976-2000; (2941); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2005; (73); (3381).

551. - ***Melitaea trivia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *fascelis* Esper, 1794)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). La citazione per i dintorni di Napoli in (218) è basata su quella di Costa.

Nuovo dato - **Basilicata:** Pollino: Rotonda 1.VIII.1975 (PRN).

Piemonte: 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; ex (171); (673); estinta (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005;

(244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (2051); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (650); (2485); **Emilia:** (1851-1900); (110); **Romagna:** 1926-2000; (1443); (3077); **Toscana:** (?) (1851-1900); 1976-2005; (206); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2485); **Lazio:** 1801-2000; (64); (3265); **Abruzzo:** 1901-2000; (616); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1976-2005; (2142); (3457); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2202); **Calabria:** 1901-2005; (883); (3304).

552. - ***Melitaea didyma*** **(Esper, 1778)**

Nota - È citata per la **Sardegna:** (278), errata identificazione.

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Genzano 330 m 4.VII.1998; Bellosguardo (SA): Mortellito 200 m 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Pulo di Altamura 4.VI.1978; gravina di Petruscio 31.V.1991; gravina di Riggio 18.V.1990, 20.VIII.1991; gravina di Ginosa 27.VIII.1978, 20.V.1980, 20.V.1984, 15.VI.1987. **Basilicata:** fiume Camastra VI-VII.1975, 26.VI.1976; Pollino: sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Terranova 4.VII.1981, 15.V.1983. **Calabria:** fiumara di Oriolo 21.VI.1982; Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Sila: Pietralata Soprana 3.VII.1972; Pollino: Monte Moschereto 600-1000 m 6.VI.1980; Civita 29.V.1975, 31.VI.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1851-2005; (129); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (466); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1851-2005; (177); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-2000; (623); (3315); **Umbria:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (3383); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (64); (3417); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1901-2000; (921); (2247); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3233).

553. - ***Melitaea diamina*** **(Lang, 1789)** (= *dictynna* Esper, 1794)

Nota - È citata per l'**Emilia:** (501) ma è molto probabile sia una ab. di *M. parthenie* (525). Le citazioni per la **Toscana** e le **Marche** sono da confermare.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (231); (2995); **Trentino:**

1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-2000; (161); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Toscana**: 1851-1900; (371*); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1801-1850; 1976-2000; (64); (3051); **Abruzzo:** 1976-2005; (2945); (3458); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3458); **Campania:** 1951-2005; (2002); (3458); **Basilicata:** 1951-2000; (1829); (2202).

554. - ***Melitaea deione*** **(Geyer, 1832)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1813); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1926-2005; (375); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (218); **Alto Adige:** 1901-1975; (507); (1856); catturata dopo il 1970 (2973); **Liguria:** 1926-2000; (1443); (3183).

555. - ***Melitaea varia*** **Meyer-Dür, 1851**

Nota - La citazione di *M. partheniae* per la **Toscana:** (344) probabilmente va riferita a questa specie,

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1901-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (215); (3227); **Trentino:** 1976-2000; (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1926-1950; (1443); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (3423); **Liguria:** 1901-2000; (1016); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (828); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3049); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3312).

556. - ***Melitaea parthenoides*** **Keferstein, 1851**

Nota - Le citazioni per **Trentino:** (654*), **Alto Adige:** (172) e **Umbria:** (1443), sono poco attendibili; nella cartina in (3423) la specie è confinata al settore nordoccidentale.

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1926-2000; (375); (2620); **Lombardia:** 1976-2000; (1787); (2658); **Liguria:** 1951-2000; (2017); (3183).

557. - ***Melitaea aurelia*** **Nickerl, 1850** (= *parthenie* Borkhausen, 1788)

Nota - Le citazioni per **Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Arcipelago campano** e **Sardegna** sono dovute a identificazioni errate. Le citazioni per la **Sicilia** vanno riferite a *M. aetherie*.

Valle d'Aosta: 1901-2000; (736); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1851-2005; (129); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-2000; (1060); (2139); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (1727); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2000; (246); (2988).

558. - ***Melitaea britomartis*** **Assmann, 1847**

Nota - Le citazioni per la **Liguria** vanno riferite a *M. aurelia* (2139). La

citazione per il **Trentino:** (3049) è errata. In **Piemonte** è estinta, tranne forse le colonie presso il lago di Ivrea; in **Lombardia** estinta verso la metà del '900 (3330).

Nuovo dato - **Piemonte:** Bienca Chiaverano (TO) 12.V.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: (1951-1975); 1976-2000; (1526); (3145); **Piemonte:** 1851-2000; (375); (2139); **Lombardia:** 1926-1950; ex (1200); **Alto Adige:** 1976-2000; (2722); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2485).

559. - ***Melitaea asteria*** **Freyer, 1828**

Nota - La citazione per il **Trentino:** (654*) è da riferire all'**Alto Adige.** La citazione per la **Valle d'Aosta:** (426) è dubbia.

Lombardia: 1851-1950; (218); (3393); **Alto Adige:** 1851-2000; (366); (2722).

560. - ***Melitaea athalia*** **(Rottemburg, 1775)**

Nuovi dati - **Campania:** Aquara (SA): Ponte Calore 120 m 27.VI.1998 (SCR); Roccadaspide (SA): Tuono 400 m, 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Vulture (PZ) Laghi di Monticchio 12.VI.1967; fiume Camastra 27.VI, 1.VII.1975; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Pollino: Cersosimo 6.VI.1981; Acquatremola 6.VI.1981; sorgente Acquafredda 13.VI.1982. **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 8.VIII.1971; Pollino: Colle del Dragone 19.VI.1976 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (253); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (650); (2248); **Liguria:** 1801-2000; (58); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1975; (623); (1870); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (64); (3265); **Abruzzo:** (1801-1850); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1926-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (712); (3304); **Sicilia:** 1851-2000; (144); (3233).

561. - ***Limenitis populi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - In **Toscana** e nel **Lazio** è estinta (616).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2000; (164); (3227); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3255); **Alto Adige:** 1851-2000; (218); (2722); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2659); **Friuli:**

1851-1900; 1976-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** (1851-1900); (218); **Liguria:** 1951-2000; (2017); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (246); (3037); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; (19); (177); **Lazio:** 1851-1900; (5247).

562. - ***Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764)** (= *sibilla* Linnaeus, 1767; *xylostei* de Prunner, 1798)

Papilio xylostei ò descritta su esemplari del **Piemonte**: "haud rarus Stupinixii (*recte* Stupinigi)" (26).

Nuovo dato - **Piemonte:** Vercelli: Greggio 13.VI.1971 (CMC, PRN).

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). La citazione per la **Basilicata:** (1974) va riferita a *L. reducta*; la citazione per la **Puglia:** (3274) è basata su una segnalazione di Wimmers, che però intendeva *L. reducta* (3397).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (398); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (368); (2248); **Veneto:** 1751-1950; 1976-2000; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1975; (650); (1480); **Liguria:** 1926-1975; (1172); (1693); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3186); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1801-1925; 1976-2000; (109); (3196); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (3077); **Lazio:** 1801-2000; (109); (2248); **Campania:** 1851-1925; (218); (1013).

563. - ***Limenitis reducta* Staudinger, 1901** (= *camilla* Denis & Schiffermüller, 1775; *anonyma* Lewis, 1872)

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura (BA) 30.V.1977; Torre a Mare (BA) 14.V.1983; Mottola (TA) gravina di Petruscio 31.V.1991; gravina di Ginosa (TA) 20.V.1980, 15.VI.1987; Grottaglie (TA) gravina di Riggio 20.VIII.1991. **Basilicata:** Cancellara (PZ) 3.VII.1979; Pollino: Terranova 4.VII, 25.IX.1981, 15.V.1983; Cersosimo 6.VI.1981. **Sicilia:** Altavilla Milicia: Valle del Corvo 5.VIII.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1813); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2000; (246); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (206); (3371); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-1975; (1044); (1741); **Umbria:** 1851-1900; 1951-1975; (359); (2085); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305);

Molise: 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1926-2000; (1206); (3274); **Basilicata:** (1926-1950); 1951-2000; (1443); (3265); **Calabria:** (1751-1800); 1801-1950; 1976-2005; (13); (3304); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3233); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3148).

564. - ***Neptis sappho*** **(Pallas, 1771)** (= *leucothoë* Piller & Mitterpacher, 1783)

Nota - Le citazioni per il **Piemonte**, il **Trentino**, l'**Alto Adige** e il **Veneto**, sono poco attendibili o catture accidentali.

Piemonte: 1781-1800; (20); **Trentino:** (1901-1925); (654*); **Alto Adige:** (1851-1900); 1926-1950; (172); (1443); **Veneto:** 1801-1900; (98), (218); **Friuli:** 1951-2000; (2051); (2485); **Venezia Giulia:** 1851-2000; (218); (2485).

565. - ***Neptis rivularis*** **(Scopoli, 1763)** (= *lucilla* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la **Liguria** va confermata. La citazione per le **Marche:** (385) è poco attendibile.

Nuovi dati - **Piemonte:** Venaria (TO) 13.VI.1973; La Cassa (TO) 12.VI.1977 (CMC, PRN).

Piemonte: 1751-2000; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1856); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2659); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (650); (2485); **Liguria:** (1926-1950); (1174).

566. - ***Charaxes jasius*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - La specie, come riportato da Vincenzo Petagna, non è autoctona, ma è stata introdotta in Italia da Antonio Pinto, che ha portato per primo le larve dall'Egitto nel Regno delle due Sicilie verso la metà del secolo XVIII (92). La citazione per il Piemonte: (30) è errata in quanto ripresa da (20), dove è precisato che nel 1788 il Giorna ha ricevuto alcuni esemplari da Nizza di Provenza; anche la citazione per Torino: (70), ripresa da Bonelli, è dubbia. È citata per il **Veneto:** (Tacchetti, 1872-73) (359); ma è citata a pag. 113 "gen. 21. *Charaxes*, (nullus)", quindi assente nel **Veneto.** In **Romagna** la cattura di un esemplare presso Rimini sembra dovuta a introduzione accidentale (1852).

Nuovi dati - **Toscana:** Saline di Volterra (PI) 12.IX.1978. **Puglia:** Gargano: Manaccore di Peschici 2.IX.1974 (Cameron-Curry in litt.); Laghi Alimini (LE) 25.IX.1991 (PRN).

Friuli: 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1014); **Liguria:** 1801-2000; (58); (3183); **Toscana:** 1801-2005; (113);

(3372); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (1044); (3027); **Umbria:** 1926-1950; 2001-2005; (1443); (3432); **Marche:** 1976-2000; (2419); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Campania:** 1751-1850; 1901-1950; 1976-2005; (15); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); (3265); **Puglia:** 1751-1800; 1951-2005; (21*); (3423); **Calabria:** (1751-1800); 1901-1925; 1976-2005; (99); (3304); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (2554); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 1851-1900; 1976-2000; (320); (2960).

567. - **(-)** ***Apatura metis*** **Freyer, 1829**

Nota - Le citazioni per **Piemonte:** (375), **Alto Adige:** (172), **Emilia:** (2600), **Romagna:** (2600) e **Toscana:** (437) vanno riferite a *A. ilia*.

568. - ***Apatura ilia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *iris* Esper,1777)

Piemonte: 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (3154); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (352); (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1480); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1976-2005; (3069); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3372); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1976-2000; (3077); **Lazio:** 1851-1950; (359); (2313); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (3010).

569. - ***Apatura iris*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - **Italia centrale**: "esiste un esemplare catturato a Caporaso negli anni '90 (fide D'Alessandro)" (3187); dato poco attendibile. La citazione per la **Venezia Giulia è** da confermare. Le citazioni per **Toscana** e **Lazio** sono di esemplari scuri di *A. ilia*, che viveva anche lungo l'Aniene (Balletto in litt.).

Nuovo dato - **Lombardia:** Campo dei Fiori (VA) 1100 m 7.VII.1968 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1900; 1926-1950; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (211); (3218); **Alto Adige:** 1851-1975; (396); (1856); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (218).

Fam. Satyridae

570. - ***Pararge aegeria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Bellosguardo (SA): Mortellito, 200 m, 27.VI.1998; Castel San Lorenzo (SA): Genzano, 330 m, 4.VII.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Fonte di Rummo 19.VI.1978; Terranova 11.VIII.1980; Noepoli, 600 m, 4.VII.1981. **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 8.VIII.1971. **Sicilia:** Cefalù 3.VI.1988 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2443); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (1044); (3131); **Umbria:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2519); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (2519); (3265); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

571. - ***Lasiommata megera*** **(Linnaeus, 1767)** (= *megaera* Esper, 1777; *xiphia* Boisduval, 1832)

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** e l'**Arcipelago sardo** vanno riferite a *L. paramegaera*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Monte Rocciamelone 1000 m 13.IX.1980 (CMC, PRN). **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998; Roccadaspide (SA): Levano 700 m 14.VI.1998; Aquara (SA): Ponte Calore 120 m 27.VI.1998 (DMR, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata**: Bosco di Policoro (MT) 24.IV.1977; fiume Camastra 1.V.1975; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980; Fonte di Rummo 19.VI.1976; Terranova 4.VII, 25.IX.1981. **Calabria:** Corigliano: Piana Caruso 750-900 m 9.V.1981; Pollino: Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979; Civita 19.VII.1974, 20.IV.1975, 18.VI.1976, 20.V, 22.VII.1979. **Sicilia:** Cefalù 3.VI.1988 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2000; (10); (3035); **Friuli:** 1851-2000; (352); (2248); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3383);

Emilia: 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-2005; (623); (3275); **Umbria:** 1851-1925; 1951-1975; (359); (1996); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1951-2000; (2952); (3025); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (102); (3457); **Arcipelago campano: 1901-1925;** 1951-2000; (783 bis); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (468); (3311); **Arcipelago pugliese:** 1901-1950; (556); (1415); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (223); (3226).

572. - ***Lasiommata paramegaera* (Hübner, 1824)** (= *tigelius* Bonelli, 1826; *tigellina* Verity, 1922)

Papilio paramegaera è descritta su esemplari di Corsica e **Sardegna** (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 1: 842, tav. 170) (23*); (1443). *Papilio Satyrus tigelius* è descritta su esemplari delle pianure della **Sardegna** (Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino, XXX (1838) (1): 181 (presentato nell'adunanza del 7 marzo 1824, di cui copie sono state messe a disposizione nel febbraio 1826) (43).

Nota - Il nome è *paramegaera* (Hübner, 1824) secondo (3423), ma sempre nello stesso volume, nella Checklist integrale, è *tigelius* (Bonelli, 1826), probabilmente perché ripresa da (2892). Le citazioni per la **Liguria** e la **Sicilia:** (355) vanno riferite a *P. megera*. Nella cartina in (3423) non è indicata per l'**Arcipelago toscano**.

Arcipelago toscano: 1951-2000; (1904); (3027); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (23*); (3148); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; 1976-2000; (984); (2960).

573. - ***Lasiommata petropolitana* (Fabricius, 1787)** (= *hiera* auct. nec Fabricius, 1777)

Nota - Nessuna località nelle **Marche** e nel **Lazio** è indicata nella cartina in (3423).

Nuovo dato - **Piemonte:** Valchiusella (BI) 25.VI.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1801-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (1038); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2695); **Veneto:** 1901-2000; (1046); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2284); (3183); **Marche:** 1976-2000 (2326); **Lazio:** 1951-2000 (2142); (2326); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2002).

574. - ***Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite a *L. paramegaera*.

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Tuono 400 m 7.VI.1998, Vallone Macchia della Chiesa 700 m 7.VI.1998, Forma 850 m 13.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Locorotondo 18.VII.1992. **Basilicata:** Monte Vulture 3.VIII.1970, 10.V.1972, 27.V.1969; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980; Acquatremola 1500 m 4.VI.1981; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Cersosimo 6.VI.1981, 9.VI.1968; Terranova 4.VII.1981. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Pollino: Castrovillari 20.V.1978; Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979; Civita 29.V.1975, 20.V, 22.VII.1979, 6.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (1060); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3371); **Umbria:** 1851-1925; (359); (627); **Marche:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3383); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1950; 1976-2005; (91); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (91); **Puglia:** 1926-1975; (1206); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (94); (3233).

575. - ***Lasiommata achine*** **(Scopoli, 1763)** (= *deianira* Linnaeus, 1764)

Nuovo dato - **Piemonte:** La Cassa (TO) 12.VI.1977 (CMC, PRN).

Piemonte: 1751-2000; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (253); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (1038); (3218); **Alto Adige:** 1851-2000; (398); (2722); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2000; (98); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650).

576. - ***Coenonympha tullia*** **(Müller, 1764)** (= *tiphon* Rottemburg, 1775; *davus* Fabricius, 1777)

Nota - Citata con dubbio per la **Lombardia:** (319). La citazione di *C. tiphon* per la **Valle d'Aosta:** (736), è da riferire a *C. gardetta*. La citazione generica per il **Trentino:** (654*) è poco attendibile. Le citazioni di *C. tullia, C. davus* e *C. tiphon* per **Veneto, Umbria, Marche, Lazio** e **Abruzzo** sono da riferire a *C. rhodopensis*.

Alto Adige: 1851-1925; (157); (1038); **Friuli:** 1951-1975; (1497); (1720).

577. - ***Coenonympha oedippus*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - Segnalata per l'**Emilia:** Reggiano, San Valentino (246), citazione ripresa in (262), (319). L'esemplare di Tognoli probabilmente è delle

Alpi francesi (377). La segnalazione per l'**Emilia:** Modenese desunta dal Curò deriva da una vecchia collezione del Tognoli priva di dati attendibili (1111). Segnalata per il **Friuli** nella cartina in (3423).

Nuovi dati - **Piemonte:** Cavallirio (NO) 6.VII.1971; La Cassa (TO) 5.VII.1977 (CMC, PRN).

Piemonte: 1751-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (253); (3218); **Trentino:** 1851-1975; (566); (1955); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2000; (1198); (2995); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (73); (2248).

578. - ***Coenonympha rhodopensis*** **Elwes, 1900**

Nota - È citata indicata una località il **Trentino:** (3423), ma tale citazione si riferisce a Costabella: (2995) (ex verbis Balletto), località del Monte Baldo, situata "fra Altissimo e i dolci pendii della catena di Costabella, nella parte meridionale della catena del Monte Baldo": (1943), chiaramente nel **Veneto**. Le antiche citazioni per l'; **Alto Adige** (157), (1024), (1038), sono dubbie. La citazione per la **Basilicata:** "scoperta di recente sul Monte Pollino da D'Alessandro" (3230) va confermata.

Veneto: 1951-2000; (1720); (2995); **Toscana:** 1976-2000; (691 bis); **Umbria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3196); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (828); (2485); **Lazio:** (1951-1975); 1976-2000; (2093); (2651); **Abruzzo:** 1926-2000; (1231); (3180).

579. - ***Coenonympha arcania*** **(Linnaeus, 1761)** (= *seyta* de Prunner, 1798)

Papilio seyta è descritta su esemplari del **Piemonte**: "Rare invenitur silvis Stupinixii (*recte* Stupinigi) tempore autumnali" (26).

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (144) è dubbia. Citata per la **Sardegna:** (841), (886) ma dovrebbe essere *C. corinna* (2250).

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 9.VI.1969, 16.VI.1968; fiume Camastra 1 e 9.VII.1975, 27.VI.1976 Serra di Calvello: Fosso Bifurno 26.VI.1979; Pollino: Piano Ruggio 22.VII.1979; sorgente Acquafredda 13.VI.1982, 19.VI.1981; Acquatremola 4.VI.1981. **Calabria:** Sila: Camigliatello 30.VI.1991; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1980; Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (453); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2443); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (175); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1950; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-

2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (811); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3265); **Puglia:** 1926-1975; (1415); (1565); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (811); (3304).

580. - ***Coenonympha glycerion*** **(Borkhausen, 1788)** (= *iphis* Denis & Schiffermüller, 1775; *bertolis* de Prunner, 1798)

Papilio bertolis è descritto su esemplari del **Piemonte**: "Invenitur non tam rar circa Castellum Delphinium (*recte* Casteldelfino, in Val Varaita) mensibus Maii et Junii" (26).

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria** e la **Lombardia** e quelle per il **Trentino** sono da confermare. La citazione per la **Toscana:** (206) è probabilmente da riferire a *C. tiphon italica* (= *rhodopensis*), molto simile a *C. iphis* (828).

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Gressoney La Trinité, un esemplare nella collezione Taccani nel Museo di St. Nat. di Milano (ex verbis Balletto).

Valle d'Aosta: (1926-1975); **Piemonte:** 1751-1950; 1976-2005; (26); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); (1388); **Trentino:** 1851-1900; (171); (654*); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (171); (3049); **Veneto:** 1851-1900; (446); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (974); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Marche:** 1976-2000; (3074); **Lazio:** 1901-2000; (894); (2142); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312).

581. - ***Coenonympha gardetta*** **(de Prunner, 1798)** (= *satyrion* Esper, 1704; *philea* Hübner, 1800)

Papilio gardetta è descritta su esemplari del **Piemonte:** "Haud rare invenitur valle Varaitana (*recte* Varaita, CN) mense Junii" (Lepidoptera Pedemontana: 74) (26).

Nota - La citazione per la **Liguria** è dubbia.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Val Thules 4.VIII.1977 (GRL). **Piemonte:** Colle Bercia: Cesano (TO) 11.VIII.1977; Aquila Giaveno 18.VII.1975 (CMC, PRN). **Trentino:** Val di Genova: Pian di Bedole 1300 m 26.VI.1967; Canazei 2000 m 4.VII.1966, 11.VII.1976; Passo Pellegrino 2000 m 27.VII.1973. **Alto Adige:** Brunico (BZ) 1700 m 6.VIII.1974 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (736); (2769); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (215); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (161); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 2001-2005; (175); (3423); **Liguria:** (1801-1850); (114).

582. - ***Coenonympha darwiniana*** **Staudinger, 1871**

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1976-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2000; (263); (2781); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-

2000; (550); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2485); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (273); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1925; (1046).

583. - ***Coenonympha corinna* (Hübner, 1804)** (= *norax* Bonelli, 1826)

Papilio corinna è descritta su esemplari della **Sardegna** (Sammlung Europäischer Schmetterlinge: 536) (23*); (1443). *Satyrus norax* è descritta su esemplari di **Sardegna**, pianura (43).

Nota - Le citazioni per **Toscana:** (1740) e **Arcipelago toscano** vanno riferite a *C. elbana. C. corinna* sarebbe presente nell'Isola di Capraia (3232). Presente solo in **Sardegna:** (3423). La presenza in **Sicilia:** Madonie, diverse località (90*) è considerata errata. Le citazioni per la Sicilia vanno confermate e probabilmente riferite a *C. elbana*.

Sardegna: (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960); (2976).

584. - ***Coenonympha elbana* Staudinger, 1901**

Coenonympha corinna v. *elbana* è descritta su esemplari dell'**Arcipelago toscano:** Isola d'Elba (Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes, I: 66) (448). *Coenonympha corinna* var. *lefebvrei* è descritta su un esemplare della collezione Oberthür, proveniente dal Museo di Asch. Guénée a sua volta l'ebbe dal Lefebvre; poichè il Lefebvre raccolse molto in **Sicilia** nei boschi di Sperlinga, potrebbe essere questa la località di provenienza (573).

Nota - L'esemplare di *C. corinna lefebvrei* della collezione Guénée non presenta differenze con i tipi di *C. corinna elbana* (1365 bis). Recentemente due individui sarebbero stati catturati in **Sicilia** nel Bosco di Ficuzza (3142); tale segnalazione va confermata e probabilmente riferita a *C. elbana*.

Toscana: 1951-2005; (1904); (3372); **Arcipelago toscano:** 1851-2000; (448); (3131). (?) **Sicilia**: 1851-1900; 1976-2000; (573); (3142).

585. - ***Coenonympha dorus* (Esper, 1782)**

Nota - La citazione generica per la **Romagna** va confermata. Le citazioni per la **Basilicata:** Massiccio del Pollino vanno riferite alla **Calabria,** dove è situata l'unica stazione nota. La citazione per la **Sicilia:** (2362) è errata.

Nuovo dato - **Piemonte:** Castel d'Appio 7.VII.1975 (CMC, PRN).

Piemonte: 1751-1975; (20); (1166); **Lombardia:** 1901-1925; (2362); **Trentino:** 1901-1925; (490); **Liguria:** 1926-2000; (1497); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (1497); (3186); **Romagna:** (1926-1950); (1388); **Toscana:** 1951-2000; (1860); (2691 bis); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1901-2000; (895); (2485); **Lazio:** 1850-1900; 1976-2000; (359); (2142); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3180); **Calabria:** 1951-2000; (2038); (2202).

586. - (-) ***Coenonympha hero*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte:** (26), **Trentino:** (654*), **Veneto:** (1388) e **Venezia Giulia:** (218) sono errate o da riferire a *C. glycerion*.

587. - ***Coenonympha pamphilus*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998, Genzano 330 m 4.VII.1998; Roccadaspide (SA): Forma 850 m 13.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 1.V.1975; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; Timpone Castellana 6.VI.1980; Fonte di Rummo 19.VI.1976; fiume Mercure 6.VI.1981; Cersosimo 6.VI.1981. **Calabria:** Sila: Camigliatello 30.VI.1991; Fossiata 20.V.1979; Pollino: Civita 15 e 31.VI.1972, 22.VII.1973, 19.VII.1974, 20.IV.1975, 18.VII.1976, 27.VII.1979; Monte Moschereto 600-1000 m 22.VII.1979, 21.VI, 17.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3454); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (175); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (502); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3425); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3281); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3131); **Umbria:** 1801-1925; 1951-1975; (109); (1996); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3417); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** (1751-1800); 1801-1850; 1901-2005; (21*); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3179); (3265); **Puglia:** 1926-2005; (1206); (3311); **Arcipelago pugliese:** 1926-1950; (1415); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (833); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (94); (3233); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

588. - ***Pyronia tithonus*** **(Linnaeus, 1771)**

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice, 350 m, 6.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Terranova 4.VII.1981. **Calabria:** foce torrente Coserie 27.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2342); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2722); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1950; 1976-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-

2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (2548); **Umbria:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3383); **Abruzzo:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (70); (3305); **Molise:** 1926-1950; 1976-2000; (1497); (3259); **Campania:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2000; (15); (2162); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2093); **Basilicata:** 1951-2000; (1666); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2202); (3304); **Sicilia:** 1801-1850; 1976-2000; (145); (2844); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3148).

589. - ***Pyronia cecilia*** **(Vallantin, 1894)** (= *ida* Esper, 1784)

Nota – Le citazioni per il **Piemonte** sono dubbie. La citazione per l'**Alto Adige** va confermata.

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Noepoli 4.VII.1981; fiume Camastra 31.VII, 29.IX.1975; Pollino: Terranova 4.VII.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 22.VII.1979; 17.VII.1980; Civita 19.VII.1974, 22.VII.1979 (PRN).

Piemonte: (1751-1800); 1851-1900; (26); (361); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-1925; (211); (1053); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); (566); **Veneto:** 1851-1900; (129); (268); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (246); (262); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3277); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3027); **Umbria:** 1801-1850; 1901-1925; (109); (627); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3268); **Abruzzo:** 1901-2000; (611); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3311); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (833); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (94); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1801-1850; 1976-2000; (95); (2519); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

590. - **(-)** ***Pyronia bathseba*** **(Fabricius, 1793)** (= *pasiphaë* Esper, 1781)

Nota - Le citazioni di *E. pasiphae* per l'**Alto Adige,** la **Liguria** e l'**Emilia** sono errate.

591. - ***Aphantopus hyperantus*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per **Toscana:** (206), **Marche:** (385), **Lazio:** (359), **Puglia:** (1206) e **Sardegna:** (841), (886) sono probabilmente dovute a errata identificazione.

Nuovi dati - **Piemonte:** Perrero (TO) 4.VII.1970; La Casa (TO) 19.VI.1976 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2000; (98); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (175); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-1975; (114); (2019).

592. - **(-)** ***Maniola telmessia*** **(Zeller, 1847)**

Nota - La citazione di *M. jurtina* v. *telmessia* per la **Lombardia:** (1238) è certamente errata e da riferire a *M. jurtina*.

593. - ***Maniola nurag*** **(Ghiliani, 1852)**

Maniola nurag è descritta su esemplari della **Sardegna:** piano, colli estate (Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino, Serie 2, 14: 83) (114).

Sardegna: (1801-1850); 1851-2000; (114); (3148).

594. - ***Maniola jurtina*** **(Linnaeus, 1758)** (= *janira* Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Campania:** Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice 350 m 6.VI.1998, Genzano 330 m 4.VII.1998; Roccadaspide (SA): Forma 850 m 13.VI.1998, Cavallo 400 m 14.VI.1998, Levano 700 m 14.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 27.VI, 1 e 9.VII, 29.IX.1975; Pollino: Piano Ruggio 22.VII.1979; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Madonna del Pollino 23.VII.1979; Terranova 25.IX.1981; Serra Cappellina: San Severino 6.VII.1981; Cersosimo 9.VI.1978. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Oriolo fiumara 21.VI.1982; Sila: Camigliatello 30.VI.1991; Pietralata Soprana (CS) 2.VII.1973; Pollino: Monte Manfriana 1500 m 7.VII.1981; Civita 19.VII.1974, 29.V.1975, 18.VI.1978. **Sicilia:** Racalmuto IV.1981; Grottarossa 12.V.1988; Cefalù 3.VI.1988 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2722); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (175); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (650); (2248); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3186); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2000; (623); (3138); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1950; 1976-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (109); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265); **Puglia:** 1901-

2005; (921); (3311); **Basilicata:** 1951-2000; (2087); (3298); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (94); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2519); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1851-1925; 1976-2000; (320); (2960).

595. - ***Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775)** (= *eudora* Esper, 1777)

Nota - Una citazione per la **Sardegna:** (278) è probabilmente da riferire a *M. nurag*.

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Belvedere 10.VII.1980; Fonte di Rummo 6.VII.1972; Cozzo Vardo 6.VII.1972; Madonna del Pollino 23.VII.1979; Timpone della Capanna 18.VII.1979; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980. **Calabria:** Pollino: Civita 19.VII.1974. **Sicilia:** Piano Battaglia 25.VII.1978; Madonie 21.VII.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (129); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (2825); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (246); (2093); **Toscana:** 1851-1900; (1976-2000); (177); (3056); **Marche:** 1901-2000; (847); (2988); **Lazio:** 1851-2000; (807); (2651); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 2001-2005; (3457); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2093); **Calabria:** 1951-2000; (2001); (3157); **Sicilia:** 1851-2000; (187); (2095).

596. - ***Hyponephele lupinus* (O.G. Costa, 1836)** (= *rhamnusia* Freyer, 1845)

Satyrus lupinus è descritta su esemplari della **Puglia:** Terra d'Otranto, Bosco di Guagnano (LE) VII (Fauna del Regno di Napoli, Lepidotteri, vol. I: 7, Tav. IV, figg. 1-2) (70).

Nota - In (2192) è riportato erroneamente come luogo tipico Napoli; non segnalata in **Campania.** La citazione generica per la **Lombardia:** (1388) è dubbia.

Nuovi dati - **Puglia:** Laconia (FG) 30.VI.1981; Mellitto 29.VI.1977; Quasano 7.VI.1980; Salice Salentino (LE) 14.VII.1993. **Basilicata:** fiume Camastra 9.VII.1975; Pollino: Terranova 11.VIII.1980 (PRN).

Piemonte: 1901-1925; (598); **Lombardia:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** 1951-1975; (2054); **Romagna:** 1951-1975; (3429); **Toscana:** 1901-2000; (897); (3232); **Umbria:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3196); **Marche:** 1926-2000; (1363); (2485); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (616); (2142); **Abruzzo:** 1901-2000; (622); (2142); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Puglia:** 1801-1850; 1901-2000;

(70); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3304); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (2554).

597. - ***Erebia ligea*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (439); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (175); (3197); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (2029); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3062); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (616); (2651); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259).

598. - ***Erebia euryale*** **(Esper, 1805)**

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (368); (3383); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1851-2000; (161); (2995); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (175); (3197); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3186); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (177); (3232); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Abruzzo:** 1801-2000; (344); (2093).

599. - ***Erebia eriphyle*** **(Freyer, 1836)**

Nota - Mai rinvenuta in **Valle d'Aosta**; le segnalazioni per la regione vanno confermate (3145). Citata con dubbio per il Trentino: (654*), citazione ripresa in (3049); non presente nella regione.

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2165), (2471); **Piemonte:** 1851-1900; (375); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (218); (3227); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (2620); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1976-2000; (2284); (2485).

600. - ***Erebia manto*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Liguria** va confermata. In (3227) è citata come riportata da Curò per la **Lombardia**: IV cantoniera dello Stelvio; in (3393) è precisato che non è presente nella collezione Curò. Peraltro, da Curò è citata solo *E. manto lappona* Thnbg. che è sinonimo di *E. pandrose*.

Valle d'Aosta: 1901-1950; (894); (1497); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1951-2000; (30); (2836); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (146); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1773); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (175);

(2485); **Liguria:** (1801-1850); (114).

601. - ***Erebia flavofasciata*** **Heyne, 1895**

Piemonte: 1951-2000; (1638); (3049); **Lombardia:** 2001-2005; (3393).

602. - ***Erebia epiphron*** **(Knoch, 1783)** (= *cassiope* Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (215); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2691); **Friuli:** 1851-1900; (352); (392); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (262); (3186); **Toscana:** 1901-1950; 1976-2000; (902); (3232); **Umbria:** 1951-1975; (1750); **Marche:** 1901-2000; (847); (2142); **Lazio:** 1951-2000; (1547); (2651); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (2531); (3312).

603. - ***Erebia christi*** **Rätzer, 1890**

Nota - Nella cartina in (3423) non è indicato alcun sito in **Lombardia**.

Piemonte: 1951-2000; (2072); (2836); **Lombardia:** 1901-1925; (550).

604. - ***Erebia pharte*** **(Hübner, 1804)**

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1497); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (1038); (3393); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2503); **Alto Adige:** (1801-1850); 1851-2000; (157); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (244); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (175); (1214).

605. - ***Erebia melampus*** **(Fuessly, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria** va confermata.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (215); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-1900; (367); (1081); **Friuli:** 1926-1950; 2001-2005; (1425); (3423); **Liguria:** (1801-1850); (114).

606. - ***Erebia aethiops*** **(Esper, 1777)** (= *medea* Denis et Schiffermüller, 1775 nec Fabricius, 1777; *blandina* Fabricius, 1793)

Nota - Una citazione per le **Marche:** (385) è molto dubbia. Citata per l'**Abruzzo:** (70), ma 4 individui raccolti da Costa sul Gran Sasso e sulla Majella etichettati *E. medea* conservati nel Museo Zoologico dell'Università di Napoli sono in realtà *E. neoridas etrusca* Verity (712).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-1950; (175); (1425); **Liguria:**

(1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2988); (3037); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2000; (933); (2691 bis).

607. - ***Erebia triarius*** **(de Prunner, 1798)** (= *evias* Godart, 1823)

Papilio triarius è descritta su esemplari del **Piemonte:** "Exilles admodum rarus; invenitur in silvis mensibus Junii et Julii" (Lepidoptera Pedemontana: 70) (26).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1813); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (366); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2691); **Veneto:** 1951-1975; (1943); (2995); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183).

608. - ***Erebia medusa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *ligea* Esper, 1777 nec Linnaeus; *medea* Borkhausen, 1788)

Nota - In **Valle d'Aosta** non rinvenuta negli ultimi cinquanta anni (3145). In (3423) è indicato un sito nella **Venezia Giulia**, in provincia di Trieste. La citazione per l'**Abruzzo:** (70) è probabilmente dovuta a errata identificazione.

Valle d'Aosta: 1926-1950; (1497); **Piemonte:** 1751-1950; 1976-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (368); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3024); **Veneto:** 1851-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (175); (1528); **Venezia Giulia:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** 1901-1925; (995); **Emilia:** 1801-1925; (110); (1004); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (177); (3321); **Abruzzo:** 1801-1850; 2001-2005; (70); (3423).

609. - ***Erebia alberganus*** **(de Prunner, 1798)** (= *themistocles* Loche, 1801; *ceto* Hübner, 1804)

N(ymphales) G(emmati) Papilio alberganus è descritta su esemplari del **Piemonte:** "Alpibus rarissimus" (Lepidoptera Pedemontana: 71) (26). *Papilio themistocles* è descritta su esemplari di **Piemonte** (27).

Nuovi dati - **Piemonte:** Bardonecchia 1300 m 29.VI.1977; Passo della Teglia 7.VII.1979; Cesana (TO) 7.VII.1975; Colle d'Oggia 7.VII.1974; Val Thures 4.VIII.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (453); (2769); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1951-1975; (2051); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Liguria:** 1951-2000; (2017); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); (377); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (344); (2691 bis); **Umbria:** 1951-2000; (2085); (2142); **Marche:** 1901-2000; (933); (2485); **Lazio:** 1901-2000; (1684); (2651); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); **Molise:** 1976-2000; (3259).

610. - ***Erebia pluto*** **(de Prunner, 1798)** (= *morio* Giorna, 1791; *petrosus* de Prunner, 1798; *glacialis* Esper, 1804; *belzebub* Costa, 1839)

Papilio pluto è descritta su esemplari del **Piemonte:** "invenitur in valle Varodisiana fine Maii et Junii: frequens" (Lepidoptera Pedemontana: 20) (26); presumibilmente la Val Varodisiana è la valle del Var (Balletto in litt.) (3378). *Papilio morio* è descritta su esemplari del **Piemonte:** Exilles (20). *Papilio petrosus* è descritta su esemplari del **Piemonte:** "Alpibus invenitur mensibus Maii et Junii frequens" (26). *Satyrus belzebub* è descritta su esemplari dell'**Abruzzo:** Gran Sasso, Montecorno (84).

Nota - La citazione per la **Liguria:** Monte Lega (IM) di Verity, è errata; si tratta del Monte Bego, nelle Alpi Marittime francesi (2124).

Nuovo dato - **Piemonte:** Saretto (CN) 30.VII.1975 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1813); (3145); **Piemonte:** 1751-1900; 1926-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (231); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (402); (3364); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3364); **Veneto:** 1926-2000; (1081); (2995); **Marche:** 1951-1975; (1547); (2144); **Abruzzo:** 1801-2000; (84); (3180).

611. - ***Erebia gorge*** **(Hübner, 1804)** (= *medon* de Prunner, 1798; *hecuba* Prola, 1940)

Papilio medon è descritta su esemplari del **Piemonte:** "Barcellonesis (Barcelloneta) mense Juli non tam rarus" (26). *Erebia hecuba* è descritta su esemplari dell'**Abruzzo:** Gran Sasso, Campo Imperatore, 2200 m (1360). *Erebia triope* è descritta su esemplari della **Lombardia:** Bernina (163):

Nota - *E. triope* è ssp. di *E. gorge*.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1801-1950; 1976-2000; (105*); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (398); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-2000; (1038); (2995); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; (110); **Toscana:** 1901-2000; (902); (2691 bis); **Umbria:** 1951-1975; (1750); **Marche:** 1901-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1851-1900; (359); **Abruzzo:** 1851-1950; 1976-2000; (344); (3180); **Basilicata:** 1951-2000; (2100); (2093); **Calabria:** 1976-2000; (2855).

612. - ***Erebia aethiopellus*** **(Hoffmannsegg, 1806)** (= *gorgophone* Bellier, 1863)

Papilio aethiopellus (Magazin für Insektenkunde, von Karl Illiger (edit.), V: 180) (29), nomen novum pro *Papilio aethiops minor* descritta su esemplari del **Piemonte:** "in montibus, non rarus in silvis" VI, VIII (Lepidoptera Pedemontana, 70) (26).

Nota - La citazione per l'**Alto Adige:** (1053) non è attendibile.

Piemonte: 1751-1800; 1851-2005; (26); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2219).

613. - ***Erebia mnestra*** **(Hübner, 1804)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Saretto (CN) 30.IX.1975 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1926-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1901-2000; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (164); (2995); **Trentino:** 1851-1950; (273); (1320); **Alto Adige:** 1851-2000; (216); (2485).

614. - **(-)** ***Erebia gorgone*** **Boisduval, 1833**

Nota - **Tirolo meridionale** (172); citazione, molto dubbia. Non risultano altre segnalazioni per l'**Italia.**

615. - ***Erebia ottomana*** **Herrich-Schäffer, 1851**

Lombardia: 1976-2000; (2658); (2995); **Trentino:** 1926-2005; (1523); (3295); **Veneto:** 1926-2000; (1231); (3218).

616. - ***Erebia tyndarus*** **(Esper, 1781)**

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Torgnon 15.VI.1971 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2000; (26); (2413); **Lombardia:** 1801-2000; (105*); (3227); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2485); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1851-1950; (161); (1231); **Friuli:** 1851-1900; (174); (175).

617. - ***Erebia nivalis*** **Lorkovic & de Lesse, 1954**

Nota - In (3423) non è indicata per il **Trentino** e l'**Alto Adige**.

Trentino: 1976-2000; (2211); **Alto Adige:** 1976-2000; (3049); **Friuli:** 1976-2000; (2477).

618. - ***Erebia calcaria*** **Lorkovic, 1949**

Nota - La citazione per il **Trentino:** (1607) va riferita a *E. cassioides*. Probabilmente a *E. cassioides* vanno riferite anche le citazioni per il **Veneto:** (1650), poichè non è presente in tale regione secondo (3423).

Friuli: 1951-2000; (1650); (2485); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (1650).

619. - ***Erebia cassioides*** **(Reiner & Hochenwarth, 1792)**

Nota - In (2892) è riportato che recenti studi hanno dimostrato l'inesistenza della specie *E. neleus* e la separazione in due distinte specie: *E. cassioides* delle Alpi a Est del Passo dello Stelvio e delle Dolomiti, *E. carmenta* delle Alpi occidentali e degli Appennini. Secondo (3031) *E. arvernensis* è buona specie, con le ssp. *carmenta* (= *cassioides* auct.; *tyndarus* auct.), *murina* e *aquitania* (= *tusca* Verity). In (3423) *E. carmenta* e *E. cassioides* sono ancora riportate come specie distinte. Ci atteniamo a quest'ultima opinione.

Lombardia: 1951-2000; (1506); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (679);

(3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (1320); (2855); **Friuli:** 1976-2000; (2477); **Venezia Giulia:** 1951-1975; (1650).

620. - ***Erebia carmenta*** **Fruhstorfer, 1909**

Erebia tyndarus carmenta è descritta su esemplari della Valle d'Aosta: Courmayeur e della Svizzera (Societas entomologica, XXIV (16): 125) (602)

Valle d'Aosta: 1901-2000; (602); (3145); **Piemonte:** 1851-1950; 1976-2005; (417); (3378); **Liguria:** 1951-2000; (2093); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2855); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (177); (2691 bis); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (2085); (2855); **Lazio:** 1851-2000; (359); (2651); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3180); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2154); **Calabria:** 1976-2000; (2855).

621. - ***Erebia pronoë*** **(Esper, 1780)** (= *arachne* Fabricius, 1787)

Nota - Le citazioni di *E. pronoë* per la **Liguria:** (114), l'**Abruzzo:** (70) e la **Campania:** (1388) non sono attendibili.

Valle d'Aosta: 1901-1925; (958); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1975; (20); (2134); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2503); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1480); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (367); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (175); (2485).

622. - ***Erebia scipio*** **Boisduval, 1832**

Nota - A Valdieri non è stata più ritrovata (736). Il Vallone di Mollières e la Balma de la Frema visitati da Turati e Verity (714), sono in territorio francese; probabilmente anche Ghiliani ha raccolto in quella zona per cui le citazioni per il **Piemonte** in (114), (218), (319), (361) vanno riferite alle Alpi Marittime francesi.

Piemonte: 1951-2005; (2124); (3378).

623. - ***Erebia stirius*** **(Godart, 1824)** (= *nerine* Freyer, 1831)

Erebia morula è descritta su esemplari dell'**Alto Adige:** Seiser Alpe (163).

Nota - *E. morula* è ssp. di *E. stirius*. È citata per il **Piemonte:** (1388); non fa parte della fauna della regione (3294). Le citazioni di *E. nerine* per l'**Emilia:** (262), (505), vanno riferite a *E. styx stelviana*. La citazione per l'**Abruzzo:** (712) è dubbia.

Lombardia: 1851-2000; (505); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (424); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (163); (2485); **Veneto:** 1951-2000; (1943); (2995); **Friuli:** (1901-1925); 1951-2000; (505); (3197).

624. - ***Erebia styx*** **(Freyer, 1834)**

Nota - Le citazioni per la **Valle d'Aosta:** (453), il **Piemonte:** (218),

(839) e la **Venezia Giulia:** (73) vanno riferite a altra specie. Citata erroneamente per l'**Emilia:** (262) e l'**Abruzzo:** (712).

Lombardia: 1851-2000; (186); (3218); **Trentino:** 1851-2000; (272); (2995); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3242); **Veneto:** 1851-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (181); (3294).

625. - ***Erebia montanus*** **(de Prunner, 1798)** (= *goante* Esper, 1805)

Papilio montanus è descritta su esemplari del **Piemonte:** "in montibus rarus" (Lepidoptera Pedemontana: 71) (26).

Nota - La *Erebia goante* r. *apenninigena* è descritta su esemplari degli Appennini Liguri: Arpetto (recte Punta dell'Arpetta) (902); la località oggi è in territorio francese.

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (26); (3227); **Lombardia:** 1851-2000; (368); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (490); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2691); **Veneto:** 1901-1925; (1053); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (262); (834); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2000; (1016); (2897); **Abruzzo:** 1926-2000; (1390); (2093).

626. - ***Erebia neoridas*** **(Boisduval, 1829)**

Nota - La citazione generica per la **Lombardia** va confermata.

Nuovo dato - **Piemonte:** Colle del Melegno 1000 m 26.VIII.1972 (CMC, PRN).

Piemonte: 1751-1975; 2001-2005; (26); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); (1388); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1926-1950; (1388); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (495); (3383); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (847); (2485); **Lazio:** 1901-2000; (738); (2651); **Abruzzo:** 1801-1850; 1901-2000; (70); (3312).

627. - **(-)** ***Erebia melas*** **(Herbst, 1796)**

Nota - Citata per il **Trentino:** (402), è in realtà *Erebia glacialis* var. *pluto* (397).

628. - ***Erebia oeme*** **(Hübner, 1804)**

Nota - La ssp. *seliza* Fruhstorfer, 1918 è stata descritta su esemplari del San Bernardo, ma nessun Autore la menziona per la **Valle d'Aosta:** (2365). In realtà la ssp. *seliza* è stata descritta su esemplari di San Bernardino, dal Passo all'altopiano di San Giacomo, Svizzera (877). La citazione di *E. oeme* per la **Lombardia:** Valtellina è errata; gli esemplari nella collezione del Museo di St. Nat. di Morbegno sono tutti *E. medusa* (3393); pertanto anche le citazioni in (3227) vanno riferite a *E. medusa*. Le citazioni per **Trentino:** (398), (2211), **Alto Adige:** (239), (1958) e **Veneto:** (273), probabilmente sono da riferire ad altra specie, in quanto *E. oeme* è presente solo nel **Friuli:** (3423).

Le vecchie citazioni per **Liguria, Piemonte** e **Toscana** sono errate, probabilmente da riferire a *E. medusa*.

Friuli: 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (410); (2485).

629. - ***Erebia meolans*** **(de Prunner, 1798)** (= *stygne* Ochsenheimer, 1807)

Papilio meolans è descritta su esemplari del **Piemonte:** "Mense Junii et Augusti montibus rarus" (Lepidoptera Pedemontana: 71) (26).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1497); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (26); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (1038); (3073); **Trentino:** 1901-1925; (490); **Alto Adige:** 1851-1925; (273); (1055); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (129); (1670); **Liguria:** 1926-2000; (1423); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (377); (1004); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (177); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2142); (3196); **Marche:** 1901-1975; (847); (2144); **Lazio:** 1926-2000; (1497); (2651); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3312).

630. - ***Erebia pandrose*** **(Borkhausen, 1788)** (= *pyrrha* Denis & Schiffermüller, 1775; *lappona* Thunberg, 1791; *castor* Esper sensu de Prunner, 1798; *pollux* Esper sensu de Prunner, 1798)

Nuovo dato - **Piemonte:** Marmora (CN) 28.VII.1975 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (215); (7264); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2503); **Alto Adige:** 1851-2000; (231); (2691); **Veneto:** 1851-2000; (244); (2995); **Friuli:** 1926-1975; (1528); (1943); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1951-1975; (2050); **Abruzzo:** 1951-2000; (1547); (2093).

631. - **(-)** ***Erebia sthennyo*** **de Graslin, 1850)**

Nota - La citazione per l'**Alto Adige:** come *E. lappona* f. *sthennyo* Graslin (1053) è errata.

632. - ***Melanargia russiae*** **(Esper, 1784)** (= *japygia* Cyrillus, 1787; *clotho* Hübner,1790)

Papilio japygia è descritta su esemplari di Japygia (**Puglia**) (15).

Nota - Erroneamente in (2142) come luogo tipico della ssp. *japygia* Cyrillo è indicata Napoli. La citazione generica per la **Liguria** va confermata. La mancanza di dati recenti per la Valle di Susa (**Piemonte**) e per tutta l'area settentrionale non lasciano dubbi sulla sua estinzione nella regione (3378).

Nuovi dati - **Puglia:** Pulo di Altamura 30.V, 4 e 18.VI.1978; Mellitto 4.VI.1979, 28.V.1982. **Basilicata:** Monte Caperino 17.VII.1976; fiume Camastra 27.VI, 1 e 9.VII.1975, 26.VI, 16.VII.1976; Pollino: Madonna del Pollino 23.VII.1979; Cozzo Vardo 9.VII.1972; Terranova

4.VII.1981, 20.VI.1982. **Calabria:** Oriolo fiumara 21.VI.1982; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1980, 6.VII.1981; Civita 31.VI.1972, 19.VII.1974, 18.VI.1976; Monte Moschereto 700 m 17.VII.1980. **Sicilia:** Sovereto (Sciacca) 1.V.1993 (PRN).

Piemonte: (1751-1800); 1851-1900; (26); (361); **Liguria:** (1851-1900); (218); **Romagna:** (1976-2000); (3077); **Toscana:** 1976-2000; (3049); **Umbria:** 1976-2000; (3196); **Marche:** 1901-2000; (828); (2703); **Lazio:** 1901-2000; (616); (3212); **Abruzzo:** 1926-2000; (1085); (3180); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (36); (3457); **Puglia:** (1751-1800); 1851-2000; (15); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** (1801-1900); 1901-1925; 1951-2000; (30); (3157); **Sicilia:** 1801-2000; (68); (3146).

633. - ***Melanargia galathea*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per la **Sardegna:** (278); non presente nell'isola (2447).

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Casalotti 200 m 21.VI.1998; Bellosguardo (SA): Mortellito 200 m 27.VI.1998; Aquara (SA): Ponte Calore 120 m 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Toritto (BA): Quasano 12.V.1977; Mellitto (BA) 21.VII.1978. **Basilicata:** fiume Camastra 1 e 9.VII.1975, 16.VII.1976; Pollino: Cozzo Vardo 8.VII.1972; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Madonna del Pollino 23.VII.1979; Fonte del Vaccaro 23.VII.1981; Terranova (PZ) 11.VIII.1980, 20.VI.1982; Cersosimo (PZ) 9.VI.1978, 6.VI.1981. **Calabria:** Oriolo (CS) 9.VI.1979; Sersale (CZ) 27.VII.1985; Sila: Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; lago Cecita 16.VII.1979; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1980; Civita 31.VI.1972, 19.VII.1974, 22.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3270); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (2574); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (988); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3152); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2485); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1901-1925; (627); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (31); (3268); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3305); **Molise:** 1901-1925; 1976-2000; (929); (3259); **Campania:** 1751-1850; 1901-2005; (15); (3457); **Arcipelago campano:** 1751-1800; (12 bis*); **Puglia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (70); (3311); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1751-1925; 1976-2005; (13); (3304); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3146).

634. - **(-)** ***Melanargia lachesis*** **(Hübner, 1790)**

Nota - È citata da diversi autori fra le specie italiane, senza indicazione

di località (218). Una citazione per l'**Alto Adige:** (758) è probabilmente errata. Non risultano altre segnalazioni per l'**Italia.**

635. - ***Melanargia arge*** **(Sulzer, 1776)**

Papilio arge è descritta su esemplari di **Sicilia** (*recte* **Italia continentale**) (Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnäischen System. Erster Teil. Winterthur, Taf. 16, fig. 8-9) (8*); (611).

Nota -Il luogo tipico indicato da Sulzer sarebbe della **Campania:** Castellammare di Stabia, secondo (1876). Il Monte Coppola, sopra Castellammare di Stabia, è il luogo tipico della ab. *melanotica* (991). La citazione per la **Lombardia:** Cm (= Como) (1388) probabilmente va riferita a Cp. (**Campania**). Le citazioni per la **Sicilia** probabilmente vanno riferite a *M. pherusa*.

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Vallone Macchia della Chiesa, 700 m, 7.VI.1998, Tempone Zerrillo, 630 m, 7.VI.1998 (DMR, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Pietrapertosa 2.V.1975; fiume Camastra 1.VI.1975, 29.V.1976; Pollino: Terranova 16.V.1983; Cersosimo 9.VI.1968. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978, 20.VI.1982; Pollino: Colle del Dragone 19.VI.1976; Civita 31.VI.1967, 29.V.1975, 18.VI.1978, 20.V.1979; Monte Moschereto 20.VI.1982, 6.VI.1980 (PRN).

Toscana: 1976-2005; (2867); (3371); **Umbria:** 1951-2000; (1716); (2867); **Lazio:** 1851-2000; (218); (3052); (3265); **Abruzzo:** 1926-2000; (1497); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** 1751-1850; 1901-2005; (8*); (3457); **Puglia:** (1751-1800); 1801-1850; 1901-2005; (15); (3311); **Basilicata:** 1926-2000; (1016); (2620); **Calabria:** (1751-1800); 1801-1925; 1951-2005; (18); (3304); **Sicilia:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-1975; (16*); (1795).

636. - ***Melanargia occitanica*** **(Esper, 1793)** (= *psyche* Hübner, 1799; *syllius* Herbst, 1796)

Nota - La citazione generica per il **Piemonte:** (188) è considerata dubbia (1424). Le citazioni per la **Calabria** vanno riferite a *M. arge*, quelle per la **Sicilia** a *M. pherusa*. La citazione per la **Sardegna:** (68) è probabile errore di identificazione.

Nuovi dati - **Liguria:** Imperia: Capo Mimosa 2-11.VI.1972; Capo Mele 22.V.1976, 2.VI.1972, 30.V.1975 (CMC, PRN).

Liguria: 1851-1900; 1926-2000; (375); (3183).

637. - ***Melanargia pherusa*** **(Boisduval, 1833)**

Arge Pherusa è descritta su esemplari della **Sicilia** (Icones, I: 141, tav. 26, figg. 4-6) (71*); (611).

Nota - Le citazioni per la **Liguria** di *M. syllius pherusa* e *M. psyche pherusa* vanno riferite a *M. occitanica*; le citazioni per il **Piemonte:** (188), la **Calabria:** (506) e la **Sardegna:** (68) sono errate.

Nuovo dato - **Sicilia:** Madonie: Piano del Faggio 1450 m 31.V.1998 (PRN).

Sicilia: (1801-1850); 1851-2005; (71*); (3320).

638. - **(-) *Melanargia ines* (Hoffmannsegg, 1804)** (= *lachesis* Hübner, 1790; *thetis* Hübner, 1799)

Nota - È citata per la **Campania:** dintorni di Napoli (36), citazione sicuramente errata, da riferire a *M. russiae*.

639. - ***Satyrus ferula* (Fabricius, 1793)** (= *proserpina* Cyrillus, 1787; *cordula* Fabricius, 1793; *peas* de Prunner, 1798; *bryce* Hübner, 1800)

Papilio ferula è descritta su esemplari di Italia (Entomologia Systematica emendata et aucta, Tom. III. Pars. I: 225, N. 707) (22*); (1443). *Papilio proserpina* è descritta su esemplari della **Campania:** monti del Napoletano (15). *Papilio peas* è descritta su esemplari del **Piemonte:** "in montibus rarus" (26).

Nota - Non è segnalata in **Romagna** e **Sicilia**: (3423).

Nuovi dati - **Veneto:** Trezzano (VR) 400 m 22.VI.1976 (GRL). **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Monte Caperino 16.VII.1976; Pollino: Cozzo Vardo 2.VII.1972, 24.VII.1978; Madoa del Pollino 23.VII.1979; Terranova 4.VII.1981. **Calabria:** Cerasia 6.VII.1969; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1980; Monte Manfriana 1500 m 7.VII.1981; Civita 19.VII.1974, 3.VI.1972; Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979, 17.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (26); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (105*); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (352); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (603); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1666); (2989); **Toscana:** 1851-1900; 1926-1950; (177); (1312); **Umbria:** 1901-1925; 1951-1975; (627); (1750); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2989); **Lazio:** 1901-2000; (712); (2703); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (3010); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1751-1800; 1976-2005; (15); (3457); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2000; (54); (3157); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (145); (2247).

640. - ***Satyrus actaea* (Esper, 1780) (=** *orsiera* de Prunner, 1798)

Papilio orsiera è descritto su esemplari del Piemonte "in montibus rarus menss Junii et Julii" (26)

Nota - Le citazioni per **Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige** e **Abruzzo** sono da riferire a *S. ferula*.

Piemonte: 1751-1800; 1851-1950; 1976-2000; (20); (3183); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3183).

641. - ***Minois dryas* (Scopoli, 1763)** (= *phaedra* Linnaeus, 1764)

Nota - In **Emilia:** Bosco della Mesola (FE) esisteva una consistente colonia fino all'inizio degli anni settanta, oggi estinta (3186), citazione da verificare. Le citazioni per **Marche, Lazio, Abruzzo** e **Calabria** vanno riferite a *S. ferula*.

Nuovo dato - **Piemonte:** La Cassa (TO) 13.VII.1976. **Veneto:** Verona: Albisano 26.VIII.1972, **Liguria:** Molini di Triora (IM) 7.VII.1976 (CMC, PRN).

Piemonte: 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (390); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (390); (3024); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (352); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2548); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (1727); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3152); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; (19); (2020).

642. - ***Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763)** (= *hermione* Linnaeus, sensu auct.)

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (278) è errata.

Nuovi dati - **Basilicata:** Monte Vulture 16.VII.1968; Pollino: Fonte di Rummo 9.VII.1972; Cozzo Vardo 9.VII.1972. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1980; Civita 31.VI.1972, 19.VII.1981; Monte Moschereto 700 m 17.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (125 ter); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2691); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (352); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2548); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3152); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1901-1925; 1976-2000; (627); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (616); (3265); **Abruzzo:** 1901-2000; (616); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3259); (3264); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; 1976-2000; (72); (3265); **Puglia:** 1926-1975; (1415); (1565); **Basilicata:** 1851-1900; 1951-2000; (279); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3316); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (2485).

643. - ***Hipparchia alcyone* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *hermione* Linnaeus, 1764; *aelia* Hoffmannsegg, 1804)

Nota - Le citazioni per **Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto** e **Friuli,** sono da riferire a *H. fagi*.

Nuovi dati - **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976;

Pollino: Belvedere 10.VII.1982; Cozzo Vardo 9.VII.1972; Madonna del Pollino 13.VII.1979. **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 8.VIII.1971; Pollino: Colle del Dragone 6.VII.1981; Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979, 19.VII.1974; Civita 19.VII.1974, 31.VI.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1851-2005; (263); (3461 bis); **Venezia Giulia:** (1801-1850); 1851-1900; 2001-2005; (109); (3423); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1801-1925; (110); (1004); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-2005; (344); (3429); **Umbria:** 1851-1900; (359); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (895); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (109); (3265); **Puglia:** 1926-1950; (1206); (3274); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1951-2000; (1566); (3320).

644. - ***Hipparchia genava*** **(Fruhstorfer, 1908)** (= *vivilo* Fruhstorfer, 1908; *latevittata* Verity, 1911; *remota* Verity, 1911; *nigrogenava* Verity, 1953)

Nota - *H. genava* è sinonimo di *hermione* (2103). *H. genava* è buona specie presente in Italia e *Satyrus alcyone* r. *latevittata* Verity, 1911; *S. alcyone* r. *remota* Verity, 1911, *H. aelia genava* sr. *nigrogenava* Verity, 1953, *H. aelia elesyka* Varin, 1958, sono suoi sinonimi (2614), (3438). In attesa di una ulteriore verifica vengono riferite a *H. genava* le citazioni di *H. genava, H. alcyone latevittata, H. hermione latevittata, H. aelia remota*, e le citazioni delle f. *vivilo* e *nigrogenava*.

Piemonte: (1951-1975); 2001-2005; (1795); (3438); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Liguria:** 1926-1950; (1497); **Emilia:** 1901-1925; 2001-2005; (1497); (3438); **Toscana:** 1951-1975; 2001-2005; (1795); (3438); **Umbria:** (1951-1975); (1795); **Lazio:** (1951-1975); (1795); **Abruzzo:** (1951-1975); (1795); **Molise:** 1976-2000; (3264); (3438); **Campania:** 1901-1925; 2001-2005; (1047); (3457); **Basilicata:** 1951-2000; (2038); (3438); **Calabria:** 1901-1950; 2001-2005; (1047); (3438); **Sicilia:** 1951-2000; (1566); (3438).

645. - ***Hipparchia neomiris*** **(Godart, 1822)** (= *jolaus* Bonelli, 1826)

Satyre (sic!) *neomiris* è descritta su esemplari della **Corsica** e dell'**Arcipelago toscano** : Isola d'Elba (39*); (1705). *Satyrus jolaus* è descritta su esemplari della **Sardegna:** Gennargentu, 800-1000 m (43).

Arcipelago toscano: 1801-1925; 1951-2005; (39*); (3372); **Sardegna:** 1801-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2960).

646. - ***Hipparchia semele*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La validità ed attribuzione dei vari taxa del gruppo *semele* è ancora da definire; si riportano le opinioni più recenti. *H. semele* ssp. *neapolitana* (Stauder, 1921) è ritenuta da alcuni autori sinonimo di *H. semele*, sinonimo di *H. semele* ssp. *cadmus* Fruhstorfer (3031), buona specie del gruppo *aristaeus* (3025). *H. ballettoi* è considerata ssp. di *semele* (2980), sinonimo di *neapolitana*, sinonimo di *semele* (2892), buona specie del gruppo *aristaeus* (3025). Le citazioni per la **Campania** e l'Isola d'Ischia di *H. neapolitana* e *H. ballettoi* e le citazioni di *H. blachieri* e *H. semele blachieri* per la **Sicilia** vanno riferite a *H. senthes* (3036). Dalle illustrazioni dei genitali in (3025) sembrerebbe che *blachieri* e *neapolitana* siano del gruppo *aristaeus*, mentre *leighebi* e *sbordonii* sarebbero del gruppo *semele*, pertanto, anche *H. aristaeus* potrebbe essere annoverata nella fauna della **Campania,** se tale tesi risultasse valida. Secondo (3025) in **Sicilia** sono presenti *H. semele* ssp. *wilkinsoni* Kudrna e *H. blachieri* Frhst.

Nella Checklist della fauna italiana (3423) viene riportato che *H. aristaeus* è di **Sardegna** e **Arcipelago toscano**; *H. blachieri* di **Sicilia** e **Calabria**; *H. fagi* di tutta **Italia** e **Sicilia**; *H. fidia* di **Liguria** W; *H. hermione* da **Valle d'Aosta, Piemonte** W e **Liguria** a tutti gli Appennini fino ai Monti Nebrodi e Peloritani in **Sicilia** ed una colonia isolata in **Venezia Giulia:** (Goriziano); *H. leighebi* dell'**Arcipelago siciliano**; *H. neapolitana* di **Campania** e **Arcipelago campano**; *H. neomiris* di **Sardegna** e **Arcipelago toscano**; *H. sbordonii* dell'**Arcipelago laziale**; *H. semele* di tutta **Italia** e **Sicilia**. Ci atteniamo a quest'ultima opinione.

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 2.VII.1975, 29.IX.1975, 16.VII.1976; Pollino: Fonte di Rummo 8.VII.1972; Cozzo Vardo 9.VII.1972; Madonna del Pollino 23.VII.1979. **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 8.VIII.1971; Sila: Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; Camigliatello 7.VIII.1965; Pollino: Monte Manfriana 1500 m 7.VII.1981; Pollino: Monte Moschereto 800 m 2.VII.1979, 17.VII.1980; Civita 31.VI.1972, 15.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (426); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (125 ter); (2995); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (2722); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2000; (10); (3154); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (109); (2336); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; (437); (933); **Umbria:** 1851-1925; 1951-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3265); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2000; (344); (3305); **Molise:**

1976-2005; (3259); **Campania:** 1901-2005; (1013); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1415); (2944); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (54); (3304); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (3025).

647. - ***Hipparchia leighebi*** **Kudrna, 1976**

Hipparchia semele leighebi è descritta su esemplari dell'**Arcipelago siciliano:** Isola di Vulcano, 0-500 m (olotipo) (Atalanta, 7 (3): 168) (2071).

Arcipelago siciliano: 1951-2000; (2071); (2838).

648. - ***Hipparchia aristaeus*** **(Bonelli, 1826)**

Papilio Satyrus aristaeus è descritta su esemplari della **Sardegna**: Gennargentu, 800-1000 m (Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino, 30 (1838) (1): 177, Tav. II, fig. 1, di cui copie sono state messe a disposizione nel febbraio 1826) (43).

Nota - Le citazioni di *H. semele* v. *aristaeus* per l'**Emilia** e le **Marche** sono da riferire a *H. semele*. La citazione per l'**Arcipelago laziale** va riferita a *H. sbordonii*. Le citazioni per la **Sicilia** ad altre specie. Le citazioni per l'**Arcipelago siciliano** a *H. leighebi*.

Arcipelago toscano: 1851-1925; 1951-2005; (177); (3275); **Sardegna:** 1801-2000; (43); (3148); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2838).

649. - ***Hipparchia neapolitana*** **(Stauder, 1921)** (= *ballettoi* Kudrna, 1984)

Satyrus semele f. *neapolitana* è descritta su esemplari della **Campania**: monti del Napoletano (Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris", 35: 29) (945). *Hipparchia ballettoi* è descritta su esemplari della **Campania**: Monte Faito 1200 m (2343).

Campania: 1901-1925; 1976-2005; (945); (3265); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (3265).

650. - ***Hipparchia blachieri*** **(Fruhstorfer, 1908)**

Satyrus semele ssp. *blachieri* è decritta su esemplari di **Sicilia** (Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 22: 93) (562).

Calabria: 1901-1925; 1976-2005; (833); (3304); **Sicilia:** 1901-2000; (562); (3146).

651. - ***Hipparchia sbordonii*** **Kudrna, 1984**

Hipparchia sbordonii è descritta su esemplari dell'**Arcipelago laziale**: Isola di Ponza: Monte Guardia) (Fragmenta Entomologica, Roma, 17 (2): 23) (2343).

Arcipelago laziale: 1951-2000; (2343); (2838).

652. - ***Hipparchia statilinus*** **(Hufnagel, 1766)** (= *fauna* Sulzer, 1776; *allionia* Fabricius, 1781)

Nuovi dati - **Emilia:** Rigollo (PR) 18.VIII.1957 (RBR, PRN). **Puglia:**

Locorotondo 12.VIII.1992; Sava (TA) 10.IX.1990; Torre Chianca (LE) 8.VII.1983; gravina di Laterza (TA) 15.VII.2004. **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 4.VI.1996; Cancellara 31.VII.1968; fiume Camastra 28.VIII.1975; Monte Vulture (PZ) 20.IX.1968; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 22.VII.1979, 17.VII.1980; Civita 28.VIII.1975, 22.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-2000; (417); (3145); **Piemonte:** 1751-1975; 2001-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-1925; 1951-2000; (105*); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (558); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (439); (2342); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (603); (2004); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2485); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-2000; (437); (2548); **Umbria:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3268); **Abruzzo:** 1901-2000; (611); (3010); **Molise:** 1976-2000; (3259); **Campania:** (1751-1800); 1801-2005; (15); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; 1976-2000; 1976-2000; (72); (3265); **Puglia:** 1901-2005; (921); (2247); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2247); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2005; (87); (3304); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3233).

653. - **(-)** ***Hipparchia fatua*** **(Freyer, 1844)** (= *allionii* Hübner, 1824)

Nota - Le citazioni di *H. fatua* per **Piemonte:** (26), **Lombardia:** (164) e **Lazio:** (359) potrebbero essere riferite a una forma gigante di *H. statilinus*.

654. - ***Hipparchia fidia*** **(Linnaeus, 1767)**

Nuovo dato - **Liguria:** Capo Mele 24.VII.1973, 27.VII.1974, 19.VII.1977 (CMC, PRN).

Nota - Le citazioni di *H. fidia* per il **Piemonte:** (20), (900), la **Lombardia:** (164) e l'**Alto Adige:** (170) sono molto dubbie; quelle per l'**Emilia,** la **Toscana** e la **Calabria** vanno riferite a *H. statilinus*.

Liguria: 1851-1900; 1926-2000; (1424); (3183).

655. - ***Arethusana arethusa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *erythia* Hübner, 1804)

Nota - Citata da Curò per l'**Alto Adige,** non è presente nel Tirolo meridionale (1038). Costa cita *Hipparchia arethusa* per la **Sicilia:** Etna e Nebrodi (86*), ma dovrebbe essere *H. semele* v. *aristaeus* (109). Citata anche per la **Sardegna:** (2362), identificazione o etichettatura errata.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Susa: Seghine 18.VIII.1979, Monte Rocciamelone 1000 m 13.IX.1981; Poggio di Carasco (Val Curone, AL)

28.VIII.1967; Albarasca (AL) 20-30.VIII.1979 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (736); **Piemonte:** 1801-2005; (114); (3461 bis); **Veneto:** 1851-1900; (161); (268); **Friuli:** 2001-2005; (3423); **Venezia Giulia:** (1851-1900); 1901-2000; (935); (2548); **Liguria:** 1901-2000; (737); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2988).

656. - ***Brintesia circe*** **(Fabricius, 1775)** (= *proserpina* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA): Casalotti, 200 m, 21.VI.1998; Aquara (SA): Ponte Calore, 120 m, 27.VI.1998 (DMR, PRN). **Puglia:** Pulo di Altamura (BA) 30.VI.1979; Monte Camplo (TA) 20.VI.1980. **Basilicata:** fiume Camastra (PZ) 1 e 9.VII.1975, 16.VII.1976; Pollino: Cozzo Vardo 9.VII.1972; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Fonte del Vaccaro 23.VII.1981; Terranova 4.VII.1981; Serra Cappellina: San Severino 6.VII.1981. **Calabria:** Oriolo fiumara 21.VI.1981; Pollino: Monte Moschereto 800 m 17.VII.1980, 22.VII.1979; Civita 31.VI.1972, 19.VII.1974, 19.VII.1981. **Sicilia:** Cefalù 3.VI.1988 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (164); (3393); **Trentino:** 1851-1900; (171); (398); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (812); **Veneto:** 1801-1900; (98); (244); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (352); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650); (1480); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2000; (110); (3105); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3371); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (359); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3305); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3259); **Campania:** 1976-2005; (2091); (3457); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1951-2000; (1845); (2756); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3265); **Calabria:** 1801-1925; 1976-2005; (54); (3304); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (94); (3233); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (43); (3148).

657. - ***Chazara briseis*** **(Linnaeus, 1764)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Madonna del Pollino 23.VII.1979. **Sicilia:** Piano Battaglia 26.VII.1979 (PRN).

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**: (1943), sola segnalazione per l'isola, poco attendibile.

Piemonte: 1801-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-2000; (358); (2691); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; (109); (1480); **Liguria:** 1801-1850; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-

1975; (214); (1781); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1851-2005; (437); (3371); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1943); **Umbria:** 1851-2000; (359); (2142); **Marche:** 1851-2000; (344); (3077); **Lazio:** 1851-2000; (359); (3212); **Abruzzo:** 1801-2000; (70); (3312); **Campania:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (218); (3265); **Basilicata:** 1951-2000; (2001); (2093); **Calabria:** (1976-2000); (2941); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (97); (3146).

657 bis (-) ***Chazara persephone*** **(Hübner, 1805)** (= *anthe* Hoffmansegg, 1806; *anthe* Ochsenheimer, 1807)

Nota - *Satyrus anthe* è citato per l'**Alto Adige:** (544 bis); il *Satyrus anthe* citato per l'Alto Adige è in realtà una var. di *briseis* (593). *Satyrus anthe* è citato anche per la **Calabria:** (54) certamente da riferire a *C. briseis*.

658. - ***Oeneis glacialis*** **(Moll, 1783)** (= *aëllo* Hübner, 1804)

Valle d'Aosta: 1801-1850; 1901-2000; (114); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (30); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (215); (3393); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2995); **Alto Adige:** (1801-1850); 1851-2000; (215); (2691); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); (3423); **Sardegna:** (1951-1975); (1943).

Fam. Danaidae

659. - ***Danaus chrysippus*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Puglia:** Gallipoli (LE): Costa Brada 9.VIII.1984 (PRT, PRN); Palagiano estate 1988 (PRN).

Liguria: 1976-2000; (2702); (3150); **Emilia:** 1976-2000; (2686); **Toscana:** 1976-2000; (3150); (2420); **Lazio:** 1976-2000; (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2686); (2702); **Campania:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (21*); (3457); **Puglia:** 1976-2000; (2543); (3150); **Basilicata:** 1976-2000; (3467); **Calabria:** (1801-1850); (1851-1900); 1976-2005; (88); (3304); **Sicilia:** 1976-2005; (2393); (3233); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2638); (2935); **Sardegna:** 1976-2000; (2353); (3148).

Fam. Thyatiridae

660. - ***Thyatira batis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 10.VI.1966, 5.VII.1970 (GLL, PRN). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD), 16.VII.1973 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.VI.1975 (GRL). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 30.VII.1985 (SNN). **Basilicata:** Pollino:

Timpone Castellana 17.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Rotonda 7.VI, 9.VII, 16.VIII.1980; fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 2.V.2001, 9.VII.2001. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1976; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 3.V.1997, 29.V.1995, 18.VI.1995, 7.VIII.1989, 15.XI.1996, Serra San Bruno (VV) 900 m 10.VI.2000 (SCR). **Sicilia:** Gibilmanna 25.IX.1987 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (3322); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1976-2005; (2142); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (72); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (72); (2108); **Basilicata:** 1976-2005; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2949); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1975; (114); (1976).

661. - ***Habrosyne pyritoides*** **(Hufnagel, 1766)** (= *derasa* Linnaeus, 1767)

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 2.VII.1983, 21.VII.1985 (GRL). **Emilia:** Roncobilaccio m (BO) 15.VII.1985 (GRL). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 5.VIII.2005 (PRN). **Calabria:** Serra San Bruno (VV) 900 m 10.VIII.2000 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1976-2005; (2346); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2488); (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1951-2005; (2142); (3386); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (2923); (3007); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (2108); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2923); **Calabria:** 1976-2005; (3007); (3347).

662. - ***Tethea ocularis*** **(Linnaeus, 1767)** (= *octogesimea* Hübner, 1786; *octogesima* auct.)

Phalaena ocularis è descritta su esemplari di **Italia** (Systema Naturae (Ed. 12) 1: 837, n. 100) (7*); (18).

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna** non risultano altre segnalazioni per l'isola, da confermare.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 10.VII.1976 (GRL). **Abruzzo:** Ovindoli 9.VII.1984 (GRL). **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 25.VII.2001 (SCR); Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; Timpone Castellana 9.V.1981, 23.VII.1979; fiume Mercure 8.VI.1980; Rotonda 20.V.1979, 7 e 21.VI.1980; Cropani 6.VI.1981. **Calabria:** Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 26.VIII.2001; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 28.V.1995, 4.VI.1995; Foce Fiume Crati (CS) 2 m 9.V.2003 (PRN). **Sicilia:** Contrada Traversa 20.VII.1978; Casteldaccia 5.VIII.1979 (PRN); Piana degli Albanesi 14.VIII.1980; San Martino (PA) 6.IX.1973; Giacalone 31.V.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (1851-1925); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (114 bis); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (3129); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2108); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (2949); **Sardegna:** (1976-2000); (2469); (2929).

663. - ***Tethea or*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 8.VII.1983 (GRL). **Friuli:** Taipana 30.VI.1987 (GRL). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3007); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3007); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2346); (2516); **Toscana:** (1851-1900);

1976-2005; (218); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2732); **Marche:** 1951-2000; (1980); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 1951-2000; (2108); (3007).

664. - ***Tetheella fluctuosa*** **(Hübner, 1803)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1976-2000; (2957); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; (170); (1038); **Veneto:** 1976-2000; (3007); **Friuli:** 1976-2000; (3007); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2553).

665. - ***Ochropacha duplaris*** **(Linnaeus, 1761)** (= *bipuncta* Borkhausen, 1792)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (239); (3241); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2795); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1976-2005; (3183); (3273); **Toscana:** 1976-2000; (2166); (2447).

666. - ***Cymatophorina diluta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.X.1986 (GRL). **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 6.X.1981; Vulture (PZ): Monticchio 30.IX.1983; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR); Pollino: Lago Duglia 9.X.1983; Terranova 8-11.X.1983 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 5.X.1997, 14.X.1998 (SCL). **Sicilia:** Ficuzza 13.X.1976; Etna N: Linguaglossa 21.X.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** (1901-1925); 1976-2005; (990); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1976-2000); (1060); (3007); **Liguria:** (1901-1925); 1976-2000; (990); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (773); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (2923); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2923); (3316); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (3083).

667. - ***Polyploca ridens*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - Le citazioni per **Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia,**

Basilicata, Calabria e **Sicilia** vanno riferite a *P. neoridens*. Nelle **Marche** potrebbero essere presenti entrambe le specie.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (1787); (3007); **Trentino:** 1926-2000; (1089); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007); **Liguria:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3183); **Romagna:** 1951-1975; (2516); (3062); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2076); (2085).

668. - ***Polyploca neoridens*** **Parenzan, 1976**

Polyploca neoridens è descritta su esemplari di **Basilicata, Puglia, Lazio** e **Marche:** (olotipo) valle torrente Camastra (PZ) (Entomologica, Bari, 12: 203, figg. 1-4) (2076).

Nota - È riportata da alcuni Autori come sinonimo di *P. ridens*, senza motivazione.

Nuovi dati - **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 6.V.1979; Rifreddo (PZ) 7.V.1984; Pollino: Timpone Castellana 27.III, 9.V.1981; Lago Fondo 1700 m 15.V.1983; Rotonda 28.III, 4.IV.1981, 19.IV.1982; fiume Mercure 29.III.1981 (PRN). **Calabria:** Rogliano: Mauritania 1200-1400 m 12.IV.1982; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 20.III.1989 (SCL).

Marche: 1951-1975; (2076); **Lazio:** 1951-2005; (1839); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (773); (3007); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3447); **Campania:** (1951-1975); (1931); **Puglia:** 1951-2000; (2076); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (1839); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); **Sicilia:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2949).

669. - ***Asphalia ruficollis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1801-1850; (114); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Venezia Giulia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007).

670. - ***Achlya flavicornis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per l'**Emilia** è poco attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3007); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (161); (3068); **Emilia:** (1926-1950); (1388); **Sicilia:** 1976-2000; (2718); (3320).

Fam. Drepanidae

671. - ***Falcaria lacertinaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per **Liguria:** (114), **Toscana:** (19), **Campania:** (298) e **Sardegna:** (741), sono molto dubbie. La citazione generica per la **Venezia Giulia:** (2732) va confermata.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1950; 1976-2000; (820); (2658); **Trentino:** 1926-1950; 1976-2000; (1320); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (273); (2269); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (81); (1787); **Friuli:** 1951-2000; (2269); (3197).

672. - ***Watsonalla binaria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *hamula* Esper, 1786)

Nuovi dati - **Campania:** Serino (AV), 600 m, 5.X.1984; Portici 15.VI-6.VII.1983 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 30.V.1985 (leg. Sannino, PRN). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 10-16.VIII.1980; Madonna del Pollino 24.VII.1982, Timpone Castellana 28.VII.1979; Cropani 7.VI, 26.IX.1981; Rotonda 14-16.IX, 21.IX.1979, 17-18.VII, 16.XI.1980, 16.VI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 3.VI.1981; Terranova 24.IX.1981; San Severino 15.IX.1979, 23.VII.1982 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001. **Calabria:** Gambarie (RC) 8.VIII.1971; Pollino: Monte Cerviero: Acquaformosa 23.VII.1979 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 26.V.1995, 18.VI.1996, 1.VII.1996; Tessano (CS) 750 m 11.X.1994; Copanello (CZ) 200 m 16.IV.1999; Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003 (SCL); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sicilia:** Ficuzza 30.VI.1974, 30.V.1991; Monte Soro 18.VI.1978; Piana degli Albanesi 23.VI.1978; Contrada Traversa 30.VII.1978 (GRL). **Sardegna:** Bosco Monte Pisano 18.III.1994 (1f) (Luciano in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (2269); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (448); (3428); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (2142); (2269); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1901-2005; (656); (3443); **Abruzzo:** 1926-2005; (1127); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1976-2000; (2732); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2108); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (218); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (357); (3083); **Sardegna:**

1901-1925; 1976-2000; (711); (2249).

673. - ***Watsonalla uncinula*** **(Borkhausen, 1790)**

Phalaena binaria var. *uncinula* è descritta su esemplari di **Italia** (Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge, 3: 461) (16*).

Nota - È citata genericamente per la **Lombardia**, il **Trentino** e l'**Umbria**, citazioni da confermare.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 14.VII.1974, 6.V.1975, 14.VII.1979 (GRL). **Puglia:** Bari 14.X, 5.XI.1980; Mottola 13.VIII.1977 (PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; Bosco delle Pianelle (TA) 17.VI.1999; gravina di Petruscio 12.VIII.1983; gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Pollino: Rotonda 18.VII.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001; Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Sersale (CZ) 20.X.1985; Aspromonte: Gambarie (RC) 8.VIII.1971 (PRN); Copanello (CZ) 200 m 15.V.1998; Laghi La Vota (CZ) 10 m 3.VII.1997; Verzino: Fiume Lese 150 m 14.VI.2003 (SCL). **Sicilia:** Piana degli Albanesi 11.V.1980, 7.VII.1980, 29.IV.1983; Mandria del Conte 1 e 11.X.1986; Gibilmanna 9.X.1988 (GRL). **Sardegna:** Abbasanta (OR) 24.V.1994 (Luciano in litt.).

Piemonte: 1951-1975; (2269); **Lombardia:** (1951-1975); (1910); **Trentino:** (1926-1950); (1388); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1926-2000; (2269); (3007); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2000; (2269); (3007); **Romagna:** (1951-1975); 1976-2000; (1910); (2269); **Toscana:** 1901-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (3322); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1951-2000; (2269); (2538); **Lazio:** 1901-2005; (772); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2269); (2945); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2269); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (310); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1851-2000; (318); (2269).

674. - ***Watsonalla cultraria*** **(Fabricius, 1775)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 15.VII.1977; Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Belvedere 16.VII.1980; Lago Duglia 18.VII.1982; Timpone Castellana 13.IX.1979, 9.VI.1981; Piana San Francesco 24.IX.1981; Rotonda 16.IX.1979; Terranova 19.VII.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1901-1925); 1976-2000; (820); (3007); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3007); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3411); **Friuli:** 1951-2000; (2269);

(3007); **Liguria:** 1976-2000; (2553); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2000; (269); (3007); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1951-2005; (2142); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2269); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1901-2000; (772); (2142); **Abruzzo:** 1951-2000; (2269); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1901-1925; (2269); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1951-2000; (2108); (3007); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (310); (2949).

675. - ***Drepana curvatula*** **(Borkhausen, 1790)**

Nota - La citazione per la **Campania:** (811) è dubbia; lo stesso Stauder evidenzia la somiglianza fra *D. curvatula* e la *D. falcataria* di Polsi (833). La citazione per la **Calabria:** (2274) è probabilmente dovuta a errata identificazione. La citazione generica per la **Sicilia:** (97), è errata. Le citazioni generiche per la **Lombardia** e la **Venezia Giulia:** (2732), non sono supportate da alcuna segnalazione.

Alto Adige: 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3241).

676. - ***Drepana falcataria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 3.VII.1976; Aymavilles 30.VII.1989. **Veneto:** Nevegal (BL) 27.VI.1974 (GRL). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 27.VI.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2269); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (81); (3068); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (2269); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (298); (3007); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3007); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2142); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (2274): **Sicilia:** 1951-1975; (3007).

677. - ***Sabra harpagula*** **(Esper, 1786)**

Nota - Una citazione generica per la **Sicilia:** (97) è poco attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3007); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1900; 1951-1975; (1053); (1820); **Veneto:** 1951-2000; (2051); (3068); **Friuli:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3007); **Liguria:** 1951-2000; (3183; (3384 bis)); **Toscana:** 1976-2005; (2166); (3321).

678. - ***Cilix glaucata*** **(Scopoli, 1763)** (= *spinula* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - A seguito della recente descrizione di *Cilix hispanica* le citazioni per l'Italia, dove le due specie sono simpatriche, sono da riesaminare.

Si riportano separatamente i dati bibliografici e di cattura verificati.

Nuovi dati controllati - **Puglia:** Parco delle Pianelle (TA) 2.VI.1973; gravina di Massafra 8.III.1975; Mottola 20.III.1972 (PRN). **Basilicata:** Calciano scalo (PZ) 22.IV.1976; Bosco di Policoro (MT) 13.V.1977, 24.IV.1978; Bradano: Santa Lucia, 300 m, 10.III.1977; fiume Camastra (PZ): Cantoniera Inferno, 350 m, 1.IV.1974, 1 e 17.VI.1975, 29.V e 1.VI.1976; Serra di Calvello (PZ): Fosso Bifurno, 1250 m, 17.VII.1975; Lago Duglia 18.VI.1982 (PRN); Monticchio (PZ) 9.VI.1968 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 14.IX.1985; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 27.VI.1995 (SCL).

Presenza verificata: **Toscana**: 1976-2000; (2094); **Molise:** 1976-2000; (3453); **Puglia:** 1951-1975; **Basilicata:** 1951-2005; (3453); **Calabria:** 1976-2005.

Presenza da riesaminare: **Valle d'Aosta:** 1976-2000; (2506); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (260); (2378); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; 2001-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3402); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3164); **Campania:** 1901-1925; (1013); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (553); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3083); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

679. - ***Cilix hispanica*** **Pérez De Gregorio, Torruella, Requena Miret, Rondós Casas & Vallhonrat i Figueras, 2002**

Nota - L'esemplare di *C. glaucata* illustrato in (2269), Tav. 1, fig. 4, della **Toscana**: Bagni di Lucca (LU), 20.VIII.1977 è *C. hispanica*.

Nuovi dati: **Puglia:** Martina Franca (TA), località Parco delle Pianelle, 400 m, 30.VII.1969, 31.VII e 4.VIII.1970; San Paolo 24.VI, 30-31.VII.1969, 26.IX.1971; gravina di Massafra (TA), 50-130 m, 26.IX.1971; Monte Camplo 4.VIII.1970, 1.IX.1971 (PRN);. **Basilicata:** Fiume Bradano, località Santa Lucia (MT), 300 m, 29.VIII e 18.IX.1976; Serra di Calvello (PZ), località Fosso Bifurno, 1260 m, 17.VII.1975; Fiume Camastra (PZ), località Cantoniera

Inferno, 250 m, 26.VIII.1979; Pollino: Timpone Castellana (PZ), 1000 m, 23.VII.1977 (PRN).

Toscana: 1976-2000; (2269); **Abruzzo:** 1976-2005; (3385); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3453); **Campania:** 1976-2000; (3453); **Puglia:** 1951-1975; **Basilicata:** 1951-2000; (3385); **Calabria:** 1976-2005 (3469).

Fam. Geometridae

680. - ***Archiearis parthenias*** **(Linnaeus, 1761)**

Piemonte: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (273); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1943); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

681. - ***Archiearis notha*** **(Hübner, 1803)** (= *hyemalis* Giorna, 1791)

Phalaena hyemalis è descritta su esemplari del **Piemonte**: alte colline di Torino, in vicinanza dell'Eremo (20).

Piemonte: 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1976-2000; (3426); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Toscana:** 1976-2000; (3070); (3428); **Lazio:** 1976-2000; (3070); **Puglia:** 2001-2005; (3426).

682. - **(?)** ***Archiearis puella*** **(Esper, 1787)**

Nota - È citata per l'**Alto Adige:** (170), (1038); da confermare.

683. - ***Abraxas grossulariata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 22.VI.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (6); (3394); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (3463); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); (1053); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2005; (2968); (3463); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114): **Emilia:** 1851-1900; (269); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Puglia:** 1976-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (2868).

684. - ***Abraxas sylvata*** **(Scopoli, 1763)** (= *ulmaria* Hübner, 1799)

Nota - È citata per la **Toscana:** (24); probabile errore di identificazione.

Piemonte: 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (114); (3463); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2804); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (81); (2051); **Friuli:** 1976-2005; (3328); (3463); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060).

685. - ***Abraxas pantaria*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - La citazione generica per il **Piemonte:** (114) è da confermare.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 28.VIII.1961, 7.VII 25.VIII e 10.IX.1962 (DBR, PRN). **Sicilia:** Zucco (PA): Fiume Nocella 28.VII.2000 ex l. su *Fraxinus oxycarpa* (leg. Lo Duca, PRN). **Sardegna:** Musei (CA) 28.III.1973, 12.VIII.1974 (HRT, PRN).

Friuli: 1901-1925; (502); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (3106); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2005; (114); (3463); **Emilia:** 1801-1850; (110); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1926-2000; (1421); (3428); **Marche:** 1976-2000; (3237); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2145); (3052); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); **Sicilia:** (1851-1900); 1926-2000; (188); (2967); **Sardegna:** 1851-1925; 1951-2000; (318); (3237).

686. - ***Lomaspilis marginata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Citata con dubbio per la **Sicilia:** (2980). Le citazioni per la **Sardegna:** (841), (886) sono poco attendibili.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** La Thuile 1.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta E.VII-M.VIII.1967 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 23.VI.1977; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 18.VII.1985. **Trentino:** Val Resia 6.VII.1975. **Venezia Giulia:** Doberdò del Lago (GO), 1992 (coll. Provera); Sistiana (TS) 1925 (coll. MSNM) (Flamigni in litt.). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 5.VI.1982 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1751-2000; (10); (3433); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (2423); (3429); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1976-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 2001-2005; (3427); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347).

687. - ***Ligdia adustata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovo dato - **Venezia Giulia:** Col di Medea, Iamiano (GO) 2000 (coll. Deutsch); Trieste (coll. Barajon) (Flamigni in litt.). **Toscana:** Pratomagno (AR) 8.VI.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2005; (164); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1081); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (181); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1900; 1976-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2203); (3463); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3367); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); (2868); **Puglia:** 1951-2005; (2868); (3427); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3462); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (3358); **Sardegna:** 1926-1975; (1303); (1975).

688. - ***Stegania cararia*** **(Hübner, 1790)**

Nota - Sono conservati presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum esemplari del **Tirolo meridionale** (2973).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (3463); **Trentino:** 1976-2000; (2200); (2475); **Alto Adige:** (1951-1975); 1976-2000; (2973); (3463); **Veneto:** 1976-2005; (3455); (3463); **Friuli:** 1951-2005; (3455); (3463); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3463); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (3191); (3428).

689. - ***Stegania trimaculata*** **(de Villers, 1789)** (= *permutaria* Hübner, 1790)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 15.VII.1979 (GRL). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano A.VI.1993 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (424); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3433); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1751-

1800); 1801-1925; 1976-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2005; (344); (3367); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1976-2005; (2868); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-2000; (109); (2967); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3463).

690. - ***Stegania dilectaria*** **(Hübner, 1790)**

Alto Adige: 1926-1950; (3463); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106).

691. - ***Heliomata glarearia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Per la **Sicilia** si ha solo una citazione generica da confermare.

Nuovi dati - **Veneto:** Santa Croce Lago 9.VII.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 21.VII.1975, 15.VII.1976, 14.IV e 12.VI.1977, 5.VI.1982, 27.V.1987, 3.VII.1988. **Umbria:** Sigillo (PG), Val di Ranco 3.VII.1978. **Basilicata:** Lago Sirino, 700 m, 4.VII.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3433); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1976-2000; (125); (3463); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3463); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2203); (3463); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (3409); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (2968); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (72); (2868); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2005; (72); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2868); **Sicilia:** (1851-1900); (188).

692. - ***Macaria notata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *notataria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Le citazioni per **Marche**, **Campania** e **Calabria** sono dubbie, da confermare.

Nuovi dati - **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 19.VII.1973. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1975, 17.VII.1978, 2.VI.1982 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; (1951-1975); 1976-2000; (170);

(3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (583); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2005; (298); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Campania:** 1800-1851; (111); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** (1851-1900); (156).

693. - ***Macaria alternata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *alternaria* Hübner, 1809)

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** e la **Sardegna:** (2868) vanno riferite a *Epirrhoe alternata*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 17.VII.1977; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 2.VII.1983 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Emilia**: Bargi; sopra Poggiolforato; Rifugio Cavone; Baita del Sole. 16-VII-26-VIII.1984/88 (coll. Flamigni), **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ): Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3329); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1976-2005; (2422°); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** 1951-1975; (2868).

694. - ***Macaria signaria*** **(Hübner, 1809)**

Nota - Le citazioni per la **Romagna:** (2516), (3062), e la **Calabria:** (2195), vanno riferite a *M. liturata* (3328). La citazione per le **Marche:** (385) è dubbia (3237).

Trentino: 1851-1925; (1038); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2005; (1425); (3463); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (878).

695. - ***Macaria liturata*** **(Clerck, 1759)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 20.VI.1977; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 20.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3394); **Lombardia:** 1851-2000; (239); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-

2000; (171); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (2051); (3463); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (175); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; 1976-2000; (1060); (3463); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2005; (2346); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2346); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (448); (3429); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); **Calabria:** 1951-2000; (2730); (2195).

696. - ***Macaria wauaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** (1926-1950); 1951-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1081); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1951-1975; (10); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (2203).

697. - ***Macaria artesiaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati -**Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 25.VI.1974, 4 e 18.VII.1978 (GRL). **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) (5 km dalla foce) 20 m, 23.VI.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3463); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2968); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3463); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (459); (2593); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (111); (3463); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3104).

698. - ***Macaria ichnusae*** **Govi & Fiumi, 2005**

Macaria ichnusae è descritta su esemplari della **Sardegna**: Cala Liberotto: Rio Sos Alinos (NU) (olotipo), Monte Arcosu: località Sa Canna (CA) (Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 21: 129, figg. 1-3) (3434).

Sardegna: 1976-2005; (3434).

699. - ***Macaria carbonaria*** **(Clerck, 1759)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3463).

700. - ***Chiasmia clathrata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna:** (925) è probabilmente dovuta a una svista.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 29.VI.1976; St. Vincent 11.VI e 12.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta A.VIII.1967 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 20.VII.1985; Val Bognanco (VB) 4.VII.1980 (GRL); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Trentino:** Dimaro 26.VI.1974 (GRL). **Alto Adige:** Lana (BZ) 4.VII.1975; Resia (BZ) 6 e 9.VII.1975. **Veneto:** Colli Euganei 21.VII.1973 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 14.IV.1977 (GRL). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 29.VI.1976 (GRL).**Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Sicilia:** Madonie: Isnello 16.VI.1991 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1900); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1801-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (3044); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2203); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (2868); **Puglia:** 1951-1975; (1538); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1851-1925; 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1901-2000; (97); (3358).

701. - ***Chiasmia aestimaria*** **(Hübner, 1809)**

Nota - La citazione per la **Campania:** (459) è dovuta a determinazione errata, probabilmente da riferire a *aestimaria* (3463). La citazione per il **Trentino** è dubbia, va confermata.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 1-15.VIII.1965 (DBR, PRN). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 20.VII.1985 (PRT, PRN). **Sicilia:** Piano Colla 31.VIII.1973 (GRL). **Sardegna:** Cabras 21.VII.1981 (Luciano in litt.).

Trentino: 1851-1900; (272); **Veneto:** 1951-2005; (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (603); (3463); **Liguria:** 1801-1850; (114); **Emilia:** 1976-2000; (2268); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3326); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3260);

Puglia: 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** (1901-1925); 1976-2000; (459); (2868); **Sicilia:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (343); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1851-1900; 1951-2000; (317); (1945).

702. - **(-)** ***Godonela syriacaria*** **(Staudinger, 1871)**

Nota - "Un esemplare sciupato, presso le rovine della Basilica (Pystum) (**Campania**) IX.1889" (459); identificazione errata, probabilmente da riferire a *C. aestimaria* (3463).

703. - ***Digrammia rippertaria*** **(Duponchel, 1830)**

Nota - La citazione per il **Friuli:** Orcenico (PN) (1007) è dubbia, in quanto nella collezione Wagner, conservata nel Museo di Vienna, non vi è alcun esemplare di questa specie (3463). La citazione generica per la **Liguria:** (1388) probabilmente è dovuta alla presenza nel Nizzardo; non si hanno altre segnalazioni per la regione. La citazione generica per la **Sicilia:** (1388), è poco attendibile.

Piemonte: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-1975; (3106); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (1004); (3301); **Liguria:** (1926-1950); (1388); **Umbria:** 1976-2000; (2203).

704. - ***Bichroma famula*** **(Esper, 1787)** (= *concordaria* Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni generiche per l'**Italia centrale:** (448), (753), (1752), (1388), sono errate.

Piemonte: 1801-1850; (114); (797); **Liguria:** (1801-1850); (114).

705. - **(-)** ***Narraga fasciolaria*** **(Hufnagel, 1767)**

Nota - È citata come *Fidonia fasciolaria* Rott. per le **Marche,** identificazione dubbia.

706. - ***Isturgia limbaria*** **(Fabricius, 1775)** (= *auroraria* Hübner, 1787)

Nuovi dati - **Veneto:** Monte Baldo: Valdritta, 1400-1600 m, M.V.1966; Borgo San Dona, 13.VII.1963 (GLL, PRN). **Liguria:** Alpi Marittime: Passo Gouta 21.VII.1984, 21.VII.1986, 5.VII.1988 (GRL)

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (366); (3463); **Veneto:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (161); (3463); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3463); **Liguria:** (1801-1900); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (269); (3237); **Toscana:** 1976-2000; (3237).

707. - **(-)** ***Isturgia roraria*** **(Fabricius, 1776)**

Nota - Le citazioni per la **Lombardia** e l'**Alto Adige** vanno riportate a *I. limbaria* (3463).

708. - (-) ***Itame vincularia*** **(Hübner, 1813)**

Nota - È citata per le **Marche:** (385); identificazione errata.

709. - ***Itame sparsaria*** **(Hübner, 1809)** (= *acquiaria* Millière, 1875)

Thamnomona (Halia) acquiaria è descritta su esemplari del **Piemonte**: Acqui-les-Bains (221).

Nota - È citata erroneamente per la **Puglia:** San Cataldo (2868); non è San Cataldo di Lecce bensì il Monastero di San Cataldo presso Amalfi (**Campania**).

Piemonte: 1851-1925; 1976-2005; (221); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-1950; (1238); **Liguria:** 2001-2005; (3463); **Emilia:** 1851-2005; (336); (3237); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3237); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (687); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3115); (3403); **Campania:** 1901-2000; (1733); (3327); **Basilicata:** 1976-2000; (2804); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104).

710. - ***Itame messapiaria*** **Sohn-Rethel, 1929**

Itame messapiaria è descritta su esemplari della **Calabria:** Sila, 600-1200 m (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", 43 (1): 21, Tav. 2, figg. 17, 18) (1139).

Calabria: 1901-2000; (1139); (3463).

711. - ***Itame brunneata*** **(Thunberg, 1784)** (= *fulvaria* de Villers, 1789; *flammata* Fabricius, 1794; *quinquaria* Hübner, 1822)

Phalaena flammata è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Nota - È citata come *Fidonia pinetaria* Tr, per l'**Emilia:** (110), ma l'esemplare di *F. pinetaria* conservato nella collezione Bertoloni è in realtà *Ematurga atomaria* (3329).

Nuovo dato - **Piemonte:** Frabosa (CN) 20.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2559); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3463); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3463); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (231); (3293); **Friuli:** 1851-1900; (174).

712. - (-) ***Itame loricaria*** **(Eversmann, 1837)**

Nota - "Si dice che *Itame loricata* appartenga anche alla **Sicilia,** ma è molto dubbia, a meno che non sia stata catturata sui monti più alti dell'isola" (265).

713. - ***Tephrina murinaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte** e la **Liguria** (114) vanno riferite a *Mesotype parallelolineata* (2580). Le citazioni per **Trentino, Alto**

Adige, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Basilicata e **Calabria** vanno riferite a *T. arenacearia* o alla sua f. *flavidaria* Eversmann; solo dato certo, due femmine raccolte in **Lombardia:** Valle Imagna (BG) nell'800 (3463). La citazione per la **Sicilia:** "*Fidonia spoliaria* (sic!) descritta da Lefebvre su esemplari di Val di Noto è sinonimo di *T. murinaria*" (343) va riferita a *Enconista spodiaria*.

Lombardia: 1851-1900; (164); (3463).

714. - ***Tephrina arenacearia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Valle d'Aosta:** (2851) attende conferma.

Nuovi dati - **Piemonte:** Poggio di Carasco (Val Curone, AL) 300 m 14.VII.1981 (CMC, PRN); Albarasca (AL) 8-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Lazio:** Roma: La Storta 5.VI.1964 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3463); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1657); (1787); **Alto Adige:** 1951-2000; (1657); (3463); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1951-2000; (1820); (3463); **Liguria:** 2001-2005; (3463); **Emilia:** 1951-2005; (1781); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1951-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (1551); (3044); **Lazio:** 1951-2005; (1999); (3417); **Abruzzo:** 1951-2005; (1657); (3367); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2527); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (2868); **Sicilia:** 1976-2000; (3466); **Sardegna:** 1801-1850; 1951-2000; (114); (2249).

715. - **(-)** ***Tephrina inconspicuaria*** **(Hübner, 1819)** (= *pumicaria* Lederer, 1855)

Nota - È citata per le **Marche:** come *Eubolia pumicaria* (385); identificazione errata.

716. - ***Tephrina assimilaria*** **(Rambur, 1833)**

Sardegna: (?) 1801-1850; 1901-2005; (114); (3463).

717. - **(-)** ***Enconista miniosaria*** **(Duponchel, 1829)**

Nota - Le citazioni per l'**Alto Adige:** sono probabilmente errate; l'esemplare della **Lombardia:** (2362) è risultato essere *Aplasta ononaria*; le località delle citazioni generiche per il **Piemonte:** (188) e la **Liguria:** (114) probabilmente sono in territorio francese; non si hanno segnalazioni certe per il territorio italiano (3463).

718. - ***Enconista spodiaria*** **(Lefèbvre, 1832)** (= *semicanaria* Freyer, 1832; *plumbeolata* O.G. Costa, 1840; *cerataria* Guenée, 1858)

Fidonia spodiaria è descritta su esemplari della **Sicilia:** Val di Noto (Magasin de Zoologie, Paris, 2: Classe 9, 2 pp., Pl. 8) (69). *Fidonia semicanaria* è descritta su esemplari di **Sicilia** (66*); (3174). *Fidonia plumbeolata* è descritta su esemplari dell'**Arcipelago campano**: Isola di Capri (91). *Selidosema ceratariа* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Messina (136*); (3174).

Nota - Le citazioni generiche per la **Lombardia e** la **Toscana:** (1388) sono poco attendibili.

Nuovo dato - **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 29.IX, 24.X.1998, 19.X.1999 (BLL/RSS).

Lazio: 1901-1950; 1976-2005; (807); (3463); **Arcipelago campano:** 1801-1850; 1926-1950; (91); (1139); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2005; (111); (3469); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (69); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1851-1925; 1976-2000; (223); (2786).

719. - ***Neognopharmia stevenaria*** **(Boisduval, 1840)**

Nota - Le citazioni di *N. stevenaria* per la **Puglia,** la **Basilicata** e la **Calabria:** (2075) vanno riportate a *G. sartatus* (2868).

Venezia Giulia: 1976-2000; (3463).

720. - ***Rhoptria asperaria*** **(Hübner, 1817)** (= *collaria* Boisduval, 1840)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 20-30.VIII.1962, 1-15.VIII.1965, 18.IX.1966 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 26.VII.1975 (GRL). **Basilicata:** Fiume Noce 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 25.VII.1989 (SCL). **Sardegna:** Ortuabis Santa Sofia 9.V.1975 (leg. Luciano, PRN).

Piemonte: 1951-1975; 2001-2005; (3461 bis); (3463); **Lombardia:** 1976-2000; (3463); **Alto Adige:** 2001-2005; (3463); **Veneto:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (3433); **Friuli:** 2001-2005; (3463); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (3237); **Toscana:** 1926-1950; 1976-2005; (2347); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; (111); (459); **Arcipelago campano:** 1976-2005; (2511); (3463); **Puglia:** 1951-2000; (2868); (3237); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** 1951-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2786); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (314); (3237); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (3463).

721. - ***Pygmaena fusca*** **(Thunberg, 1792)** (= *venetaria* Hübner, 1809)

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è certamente errata.

Nuovo dato - Cogne: Alpe Manda, 2370 m, 15.VII.1976 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (215); (3073); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2325); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (244); (2909); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

722. - ***Cepphis advenaria*** **(Hübner, 1790)**

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; (1053); (1038); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (239); (1053); **Veneto:** 1851-1900; 2001-2005; (446); (3455); **Friuli:** 1976-2005; (3197); (3463); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3463); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 2001-2005; (3463); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 1801-1850; 2001-2005; (111); (3453).

723. - ***Petrophora chlorosata*** **(Scopoli, 1763)** (= *petraria* Hübner, 1799)

Nuovo dato - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 7.VII.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (446); (3463); **Friuli:** 1976-2000; (3463); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3463); **Liguria:** 1976-2000; (2871); (3183); **Emilia:** 1976-2005; (2346); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3138); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3324); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (3324); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (811); (3104); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (886).

724. - ***Petrophora binaevata*** **(Mabille, 1869)**

Nota - Culot (1919-20) colloca erroneamente in Italia (**Lombardia**) Magenta (luogo tipico della f. *unicoloraria* Oberthür, 1881); tale località è in Algeria ed inoltre questa forma va riferita a *P. narbonea* (1274).

Toscana: 1951-2005; (2968); (3276); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Sardegna:** 1926-1950; 2001-2005; (1303); (3463).

725. - ***Petrophora convergata*** **(de Villers, 1789)** (= *scutularia*

Duponchel, 1830)

Nota - La citazione per l'**Arcipelago toscano** (2805) va riferita a *P. binaevata* (3322). La citazione per la **Toscana:** (2968) va riferita a *P. binaevata*, mentre la citazione per la **Liguria:** (3183) va riferita a *P. narbonea* (3463). Le citazioni per la **Lombardia**, sono poco attendibili.

Piemonte: (1851-1900); 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; (260), (2408); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3463).

726. - ***Petrophora narbonea*** **(Linnaeus, 1767)** (= *partitaria* Hübner, 1813; *peltaria* Boisduval, 1840)

Liguria: 1901-1925; 1976-2005; (515); (3463).

727. - **(-)** ***Liodesina homochromata*** **(Mabille, 1869)**

Nota - È citata per le **Marche:** (385); identificazione errata.

728. - ***Plagodis pulveraria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-15.VIII.1967 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (2769); **Piemonte:** 1751-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3328); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3463); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3040); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3062); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3463).

729. - ***Plagodis dolabraria*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - La citazione generica per l'**Abruzzo** va confermata.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pondel 11.VII.1978. **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 29.VI.1965, E.VII-M.VIII.1967, VI.1968 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 6.VII.1983. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 26.VI.1976 (GRL). **Lazio:** Monte Cimino 700 m (VT), 1970; tra Tufo e Pescorocchiano (RI), 1978; Vallinfreda, Pisoniano (RM), 2002 (coll. Provera). **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1184); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1976-2000; (3328); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005;

(298); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3062); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2203); (3463); **Abruzzo:** (1901-1925); (459); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (109); (2868); **Puglia:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (459); (2868); **Calabria:** (1901-1925); 1976-2000; (459); (2868); **Sicilia:** (1801-1850); (1851-1900); 1976-2000; (97); (3247).

730. - ***Pachycnemia hippocastanaria*** **(Hübner, 1799)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 14.IV.1963, A.VIII, 31.XII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 21.VII.1975, 25.VI.1976 (GRL). **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Calabria:** Aspromonte: Gambarie 9.VIII.1971; Umbriatico 10.VII.1982 (PRN). **Sicilia:** Altavilla Milicia (PA), Valle Corvo: Bosco Artale 650 m 17.V.1997 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-1975; (3463); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** 1976-2005; (2408); (3463); **Emilia:** 1951-2005; (1577); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1950; 1976-2000; (807); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1350); (2868); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1976-2000; (3463); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1951-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2786); **Sardegna:** 1901-2005; (711); (3463); **Arcipelago sardo:** 2001-2005; (3463).

731. - ***Pachycnemia tibiaria*** **(Rambur, 1829)**

Nuovo dati - **Sardegna:** Belvì 20.VIII.1975 (PRN).

Piemonte: (1901-1925); 1976-2005; (518); (3461 bis); **Liguria:** 1976-2000; (2871); (3183); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2143); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Calabria:** 1951-2000; (3104); (3463); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (3463).

732. - **(-)** ***Pachycnemia benesignata*** **(Bellier, 1861)**

Nota - *P. benesignata* è considerata buona specie (2805), (2980), (2929), (3365); sottospecie di *P. tibiaria* (3031), (3463). Ci si attiene a quest'ultima tesi e si riferiscono le citazioni di *P. benesignata* per l'**Arcipelago toscano:** (2805) e la **Sardegna:** (781), (1303) a *P. tibiaria*.

733. - ***Opisthograptis luteolata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *crataegata* Linnaeus, 1761)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 25.V.1968 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 16.VI.1977 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 5.VI.1967 (GLL, PRN). **Trentino:** Roncegno 27.VI.1974 (GRL). **Veneto:** Nevegal (BL) 28.VI.1974 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 3.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 8.V.1975, 18.V.1987 (GRL). **Lazio:** Borgo San Donato (LT) 26.VIII.1963 (DBR, PRN). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 3.VI.1997. **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Sicilia:** Altavilla Milicia: Valle del Corvo 9.XI.1996; Madonie: Piano Zucchi 1500 m 22.VIII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (410); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3463); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2005; (19); (3321); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (3324); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1350); (2868); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3083); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2249).

734. - ***Epione repandaria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *apiciaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 5.VII.1976 (GRL). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano A.VI.1993 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (239); (3241); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (3433); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3463); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (687); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3329); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1976-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3463); **Lazio:** 1951-2005;

(2203); (3443); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (3463); **Sardegna:** 1926-1950; (1476).

735. - ***Epione vespertaria*** **(Linnaeus, 1767)** (= *parallelaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione di *E. parallelaria* per la **Toscana:** (518) va riferita a *E. repandaria* (3237). La citazione generica per la **Sardegna:** (2980) è probabilmente un refuso.

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2000; (164); (3463); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (3241); **Veneto:** (?) (1801-1850); 1851-1900; 1926-1975; 2001-2005; (81); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (174); (3463); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183).

736. - ***Pseudopanthera macularia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Biella 1.VI.1978; Bardonecchia 23.VI.1974, Ulzio 29.V.1978, Cameri (NO) 24.V.1979 (CMC, PRN); Val Bognanco (VB) 17 e 23.VII.1977, 30.VI.1980; Valdieri 1300 m 19.VI.1965. **Veneto:** Monte Grappa 9.VII.1989; Monte Baldo 1400 m 18.VI.1986. **Toscana:** Camaldoli di Firenze 20.VI.1974; Pratomagno (AR) 2.VI.1989 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2005; (171); (3463); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1976-2000; (565); (3463); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3463); **Emilia:** 1801-1900; 1926-2005; (110); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2085); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2422°); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1901-1925; 1976-2000; (1047); (2162); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (156); (2868).

737. - ***Hypoxystis pluviaria*** **(Fabricius, 1787)**

Trentino: 1951-2000; (1943); (3463); **Alto Adige:** 1851-1900; (244); (273); **Veneto:** 1951-1975; (2014); (1943); **Friuli:** 1951-2000; (3463); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106).

738. - ***Apeira syringaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-

1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3463); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3463); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (81); (2795); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2346); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1801-1850; (111); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347).

739. - ***Ennomos autumnaria*** **(Werneburg, 1859)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia** di *E. autumnaria* sono da considerarsi errate (3237).

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; (188); (797); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Lazio:** 1926-1950; (3106).

740. - ***Ennomos quercinaria*** **(Hufnagel, 1767)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Campania:** fiume Bussento 600 m (Sanza, SA) (coll. Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi", Bergamo). **Sicilia:** Madonie: Pizzo Carbonara 28.VIII.1994 (leg. et coll. Cullotta).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (268); (2241); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3040); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1850; 1951-2005; (24); (3429); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1951-1975; (1538); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1951-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (357); (2967).

741. - ***Ennomos alniaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (2085) è errata, come dimostra l'esame del materiale raccolto; anche la citazione in (385) probabilmente è errata (3463).

Piemonte: 1751-1850; 1901-1925; (20); (900); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Alto Adige:** 1851-1900; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900;

1951-1975; (98); (1787).

742. - ***Ennomos fuscantaria*** **(Haworth, 1809)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 290 m 27.VII-16.VIII.1967, 5.X.1968 (GLL, PRN).

Piemonte: 1951-1970; **Lombardia:** 1951-1975; (3106); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2000; (2051); (2659); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (2268); (3329); **Toscana:** 1976-2005; (3428); (3462); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (3268); **Abruzzo:** 2001-2005; (3357); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1976-2000; (2230); **Basilicata:** 1976-2000; (2528); (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2195); (3104); **Sicilia:** 1951-1975; (2967).

743. - ***Ennomos erosaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Gli esemplari del Modenese (**Emilia**) della collezione Fiori, sono risultati essere *E. quercaria* (3329). Le citazioni per le **Marche:** (2085), (2145), (3409) e il **Molise:** (3260), vanno riferite a *E. quercaria*; anche le citazioni per il **Lazio:** (2203), la **Campania:** (1285), la **Puglia:** (111) e quella generica per la **Basilicata:** (1943) vanno probabilmente riferite a *E. quercaria* (3463).

Nuovo dato - **Alto Adige:** Vinschgau 1300 m 9.IX.1931 (AST, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3421); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; (1053); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (2051); **Friuli:** 1926-1950; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429).

744. - ***Ennomos quercaria*** **(Hübner, 1813)**

Nota - È riportata genericamente per l'**Alto Adige:** (1388) e come catturata dopo il 1970 (2973), ma come riferimento bibliografico è citato (Kitschelt, 1925), dove la specie non è menzionata.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 18.VI, 5.X.1968 (GLL, PRN). **Liguria:** Caprieto di Vobbia 4.IX.1977 (CMC, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 20-30.IX.1992 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Amantea 6.X.1995; Copanello 10.VII.1996; Donnici: Fosso Cucolo 6.VIII e 30.IX.1995, 27.VI e 2.VII.1996 (SCL).

Piemonte: 1951-1975; **Lombardia:** 1951-2000; (2014); (2658); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2005;

(1207); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1951-2005; (2968); (3428); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2005; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (357); (3083).

745. - ***Selenia dentaria*** **(Fabricius, 1775)** (= *bilunaria* Esper, 1795)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (111).

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta A.VIII.1967 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 16.IV.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1951-2000; (1681); (3064); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (501); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1951-2005; (2203); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (459); (2868); **Puglia:** 1951-1975; (1549); (1565); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347).

746. - ***Selenia lunularia*** **(Hübner, 1788)** (= *lunaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 18.V.1969; Alpi Marittime, Frabosa (CN) 7.VII.1983. **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 5.VI.1967 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1975 (GRL). **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1976-2005; (3108); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3357); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1801-

1925; 1976-2005; (99); (2868); **Puglia:** 1926-1950; (1538); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (833); (3347); **Sicilia:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (188); (3083).

747. - ***Selenia tetralunaria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *lunaria* Fabricius, 1775)

Nuovo dato - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 10.VI.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1951-2000; (2051); (3068); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2005; (3237); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (206); (3428); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2203); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; (111); (459); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2967).

748. - ***Artiora evonymaria*** **(Denis Schiffermüller, 1775)**

Trentino: 1926-1975; (1320); (2014); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053).

749. - ***Odontopera bidentata*** **(Clerck, 1759)**

Nuovo dato - **Abruzzo:** Monti della Laga: Ceppo (TE) 1300 m 5.VI.1966 (Zangheri in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3328); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (2408); **Emilia:** 1851-1900; (298); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Abruzzo:** 1951-2000; (3305); **Molise:** 1976-2005; (3156); (3447).

750. - ***Crocallis tusciaria*** **(Borkhausen, 1793)**

Phalaena Geometra tusciaria è descritta su esemplari della **Toscana** (in Scriba, Beiträge zur der Insektengeschichte, 3: 217, tav. 17, figg. 10-11) (21 bis*); (3174).

Nuovi dati - **Toscana:** Argentario (GR) 20.X.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 23.X.1986 (GRL). **Lazio:** Ostia lido 13.X.1973 (DBR, PRN).

Piemonte: (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024);

Alto Adige: 1851-1975; (326); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1901-1925; (622); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (687); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3062); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1951-2005; (21 bis*); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2819); (2203); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2162); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (271); (3083).

751. - ***Crocallis elinguaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta A.VII.1967 (GLL, PRN); Albarasca (AL) 8-18.VIII.1980 (BER, PRN). **Liguria:** Conna (SV) 1.IX.1979 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.IX.1982 (GRL). **Lazio:** Rocca di Papa 26.IX.1963 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3411); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (629); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (2423); (3433); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (406); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (314); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1901-1925); 1926-2005; (459); (3357); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1900; (99); (459); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** (1901-1925); 1976-2005; (459); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3083).

752. - ***Crocallis dardoinaria*** **Donzel, 1840**

Nota - Manca in **Romagna,** la citazione Forlì XI: (1885) va riferita a *C. tusciaria gaigeri* (2516).

Liguria: 1901-1925; 1976-2000; (622); (3314); **Sicilia:** 1926-1950; (3358); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; (781); (1976).

753. - ***Crocallis auberti*** **Oberthür, 1883**

Nuovo dato - **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 5.X.2997, 24.X.1998, 29.X.2000 (BLL/RSS).

Sicilia: (1851-1900); 1976-2000; (448).

754. - ***Crocallis boisduvalaria*** **(H. Lucas, 1849)** (misspelling: *boisduvaliaria*)

Nota - "Dico *boisduvalaria* piuttosto che *boisduvaliaria* - come è stato erroneamente citata ad (sic!) Staudinger nel Catalogo e dagli altri autori più recenti (Spuler, Seitz, ecc.) - perchè il nome imposto da Lucas a questa specie è precisamente *boisduvalaria*. Vedi "Exploration Scientifique de l'Algérie pendant les annéé 1840-1841-1842. Histoire naturelle des animaux articulés". Edito a Parigi il 1849 dalla Stamperia Nazionale" (1131).

Calabria: 1976-2000; (2527); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (247); (1384).

755. - ***Ourapteryx sambucaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - "La citazione per la **Sicilia:** Palermo, Conca d'Oro (37*) è priva di importanza scientifica" (1388).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 5 e 11.VII.1976. **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 7.VII.1983. **Trentino:** Andalo 1000 m 6.VIII .1953 (GRL), **Friuli:** Castelmonte (UD) 600 m 5.VII.1989 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (893); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Puglia:** 1976-2005; (2610); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 2001-2005; (3401).

756. - ***Colotois pennaria*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - È citata come *Odontia dentata* per l'**Arcipelago siciliano:** (337), citazione ripresa in (2967); si tratta di un Microlepidottero, riportato per errore fra i Geometridi.

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 24.X.1969. **Trentino:** Andalo (TN) 1000 m 6.VIII.1953 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 31.XII.1963. **Lazio:** Ostia (RM) 30.I.1966 (DBR, PRN). **Sicilia:** Madonie (PA): Mandria del Conte 5.IX, 2.X.1994 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005;

(298); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1951-2005; (2516); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2067); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3083); **Sardegna:** 1926-2000; (1303); (2067).

757. - ***Angerona prunaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria:** (114) va confermata.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 9 e 14.VII.1968 (GLL, PRN); Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 5.VI.1967 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.V.1989 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2005; (164); (3300); **Trentino:** 1901-2000; (1083); (3293); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3433); **Friuli:** 1901-1950; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1976-2005; (2203); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868).

758. - ***Apocheima hispidaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per il **Trentino**: (1388) è da riferire all'**Alto Adige**. È citata per il **Veneto:** (161), (268); probabilmente queste segnalazioni vanno riferite a *L. florentina* (3433).

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 8.IV.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; (2362); **Alto Adige:** 1901-1975; (1038); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1820); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2009; (269); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Puglia:** 1951-2000; (2610); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2610); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (2967); **Sardegna:** 2001-2005; (3441).

759. - ***Apocheima pilosaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pedaria* Fabricius, 1787)

Nuovi dati - **Toscana:** Mulinelli (AR) 9.III.1987, 15.II.1990; Pieve a Maiano (AR) 13.III.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (834); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2203); (3324); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (573); (2844).

760. - ***Lycia hirtaria*** **(Clerck, 1759)**

Lycia hirtaria f. *diniensis* Oberthür, 1913, è stata descritta su esemplari di Francia e **Abruzzo**: (3174). *Biston hirtaria* f. *istriana* Galvagni, 1901, è stata descritta su esemplari della **Venezia Giulia**: Monte Spaccato, dintorni di Padrich, Basowitza e Trieste (444).

Nota - È citata con dubbio per la **Sicilia:** (218); manca nell'isola.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 10.IV, 12.V.1968. **Lombardia**: Cittiglio (VA): Valcuvia 400 m 5.IV.1967 (GLL, PRN). **Veneto:** Vittorio Veneto (TV) 9.IV.1985 (GRL). **Emilia:** Carpaneto Piacentino 24.IV.1959 ex l. (RBR, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 7.IV.1975, 29.III.1978, 13.IV.1979, 10.IV.1988 (GRL). **Lazio:** Lido di Roma 27.IV.1963; Dazio Salaria 12.IV.1966 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1925); 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3433); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (444); (1274); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1900; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2203); (3268); **Abruzzo:** (1901-1925); 1951-2000; (3174); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (111); (2868); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** (1901-1925); 1951-1975; (459); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:**

(1851-1900); 1976-2005; (218); (3347); **Sardegna:** 1901-1975; (792); (1976).

761. - ***Lycia alpina* (Sulzer, 1776)** (= *bombycaria* Boisduval, 1840)

Nota - Le citazioni di *L. alpinaria* per il **Piemonte:** (114 bis) e per l'**Emilia:** (218) vanno riferite a *L. florentina*.

Nuovo dato - **Veneto:** Branchetto (Verona): Bosco Chiesa Nuova 26.V.1974 (GLL, PRN).

Lombardia: (1801-1850); 1851-1900; 1951-2000; (88); (3073); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (275); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (400); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528).

762. - ***Lycia graecarius* (Staudinger, 1861)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio** e **Abruzzo** vanno riferite a *L. florentina*. La citazione per la **Lombardia**: (218) è un dato ripreso quasi certamente da Villa e si riferisce quindi a *L. alpina*, l'unica presente nelle Alpi lombarde.

Friuli: 1851-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (443); (1060).

763. - ***Lycia florentina* (Stefanelli, 1882)**

Biston graecarius var. *florentina* è descritta su esemplari della **Toscana**: Fiesole (Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze, 14 (2): 221) (288). *Ithisa italica* è descritta su esemplari di Italia (727).

Nota – *Ithisia italica* Harrison, 1912, è ssp. di *Lycia florentina.*

Nuovo dato - **Toscana:** Olmo (AR) 20.IV.1987 (GRL).

Piemonte: 1851-1925; 1976-2005; (114 bis); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (3106); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3433); **Friuli:** 1926-1950; (1274); (1430); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1430); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (50); (3429); **Umbria:** (1951-2000); (2203); (2488); **Marche:** 1926-2000; (1430); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (314); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1976-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1926-2005; (1430); (3469).

764. - **(-)** ***Lycia lapponaria* (Boisduval, 1840)**

Nota - Le citazioni di *L. lapponaria* per l'**Alto Adige** vanno riferite a *L. isabellae*.

765. - ***Lycia isabellae* (Harrison, 1914)**

Alto Adige: 1901-1925; 1951-1975; (566); (1467); catturata dopo il 1970 (2973).

766. - **(-)** ***Lycia zonaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per il **Veneto:** (81); identificazione certamente errata, molto probabilmente da riportare a *L. florentina* (476).

767. - ***Lycia pomonaria*** **(Hübner, 1790)**

Piemonte: 1801-1850; (114); **Alto Adige:** 1901-1925; (812).

768. - ***Biston strataria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *prodromaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.III.1978, 7.IV.1985, 7.III.1988 (GRL). **Lazio:** Lido di Roma 27.IV.1963 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2000; (1279); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (517); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (1943); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2868); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1951-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3083); **Sardegna:** 1951-1975; (1589); (2041).

769. - ***Biston betularia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 7.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta V.1970, VII.1964, 24.V, 7-31.VII.1968, A.VIII.1967 (+ ab. carbonaria Jordan) (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 8.VII.1983; Val Bognanco (VB) 18.VI.1977, 5.VII.1980, 21.VII.1985 (GRL); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 5.VI.1967; Ponte di Legno (BS) VII.1964 (GLL, PRN). **Trentino:** Levico 24.VI.1975 (GRL). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 2.VII.1973 (GRL). **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-2005; (20); (3421); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1901-2005; (765); (3388); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (589); (1577); **Romagna:** 1951-

2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2868); **Sicilia:** 2001-2005; (3247).

770. - ***Apochima flabellaria*** **(Heeger, 1833)**

Amphidasis flabellaria è descritta su esemplari della **Sicilia:** Palermo 1829; larva a Messina (Beiträge zur Schmetterlingskunde, Wien: 6, Tav. 1, fig. 6-11) (80).

Nuovi dati - **Lazio:** Dazio Salaria (Roma) 5 e 12.II.1966 (DBR, PRN).

Emilia: 1926-2000; (1551); (3237); **Romagna:** 1951-2000; (1551); (2516); **Toscana:** 1951-2005; (1620); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (1822); (2203); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1901-2000; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1951-2000; (1822); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1822); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1801-2000; (80); (3083); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (188); (3237).

771. - ***Chemerina caliginearia*** **(Rambur, 1833)**

Nuovo dato - **Sicilia:** Altavilla Milicia: Valle del Corvo 25.II.1996 (PRN).

Veneto: 1976-2005; (3380); **Liguria:** (1901-1925); 1976-2000; (3106); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1551); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2143); (3329); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (807); (3403); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3316); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (2844); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2786); **Sardegna:** 1951-2000; (2067); (1841).

772. - ***Agriopis leucophaearia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (1038); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1551); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-1975; (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2232);

(3469); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (2967); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (792); (3441).

773. - ***Agriopis bajaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Liguria:** (2868) è dovuta a un errore di trascrizione.

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-1975; (1184); (2014); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (629); (3237); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1951-2000; (1651); (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (357); (2967); **Sardegna:** 1951-1975; (2066); (2041).

774. - ***Agriopis aurantiaria*** **(Hübner, 1799)**

Nota - È citata per la **Sardegna:** (841), (886); identificazione errata.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (?) (1850-1900); 1951-1975; (218); (2014); **Trentino:** 1926-1950; 1976-2000; (1184); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2000; (2014); (2659); **Friuli:** 1976-2000; (3237); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (629); (3237); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3164).

775. - ***Agriopis marginaria*** **(Fabricius, 1776)** (= *progemmaria* Hübner, 1799)

Nuovi dati - **Toscana:** Arezzo 25.XII.1988, 9.XII.1989 (GRL). **Lazio:** Dazio Salaria (Roma) 1.I.1976 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1926-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (2770); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2868); **Basilicata:** (1951-

1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (357); (2844); **Sardegna:** 1901-1925; (711).

776. - ***Erannis defoliaria*** **(Clerck, 1759)** (= *bistrigaria* Giorna, 1791)

Phalaena bistrigaria è descritta su esemplari del **Piemonte**: contorni di Torino, sponde del Po (20).

Nuovi dati - **Toscana:** Molinelli (AR) 29.IX e 26.XII.1988 (GRL). **Lazio:** Santa Chiara (Roma) 1.I.1966 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1900); 1926-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1850; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 2001-2005; (3466); **Puglia:** 1926-2000; (1776); (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** (1901-1925); 1951-2000; (990); (3247); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-1975; 2001-2005; (114); (3441).

777. - ***Erannis ankeraria*** **(Staudinger, 1861)**

Marche: 1951-1975; (1940); (2085); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Puglia:** 1951-2000; (2527); (2868).

778. - ***Crocota tinctaria*** **(Hübner, 1799)** (= *lutearia* Fabricius, 1794)

Phalaena lutearia è descritta su esemplari di **Italia** (22*), (3174).

Nota - *P. lutearia* è stata descritta su esemplari catturati da Allioni, professore a Torino, probabilmente raccolti sui monti presso tale città (3151). La citazione generica per la **Calabria:** (459) non è attendibile.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Val Paradiso 22.VII.1979; Monte Bianco 1800 m 9.VII.1976; La Thuile 4.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Berselio (CN) Gos de Bas 2000 m 31.VII.1964 (GLL, PRN); Monte Lavanna: Lago Serrù 2600 m 10.VII.1983; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 10.VII.1983. **Alto Adige:** Valle d'Ultimo 15.VII.1977 (GRL).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3302); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-2005; (22*); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3302); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (1831); **Veneto:** 1901-1925; (1038); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2000; (344); (3302); **Marche:**

1951-1975; (2085); **Abruzzo:** 1801-1950; (111); (3302).

779. - ***Crocota pseudotinctaria*** **Leraut, 1999**

Valle d'Aosta: 1901-2000; (3302); **Piemonte:** 1901-2000; (3151); (3214); **Trentino:** 1951-1975; (3302).

780. - **(-)** ***Crocota niveata*** **(Scopoli, 1763)**

Nota - È citata per il **Veneto:** (10); probabilmente è un errore di identificazione. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

781. - **(?)** ***Athroolopha pennigeraria*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte:** (188) e la **Liguria:** (1388) sono dubbie. Secondo (218) e (2929), in **Sicilia** sono presenti sia *A. pennigeraria* che *A. chrysitaria*, tesi non attendibile. Hausmann in (2786) rileva che "L'*habitus* della popolazione siciliana (= loc. typ. della *chrysitaria*) è estremamente uniforme nei confronti dei rappresentanti del genere in Spagna. Non conspecifico con *pennigeraria* Hb.".

782. - ***Athroolopha chrysitaria*** **(Hübner, 1831)**

Geometra chrysitaria è descritta su esemplari di **Sicilia** (Sammlung europäischer Schmetterlinge 5, Geometrae (1): Tav. 107, figg. 557-558) (52*); (3174).

Sicilia: (1801-1850); 1851-2000; (144); (2967).

783. - ***Eurranthis plummistaria*** **(de Villers, 1789)**

Nota - La citazione per il **Piemonte:** (114) va confermata.

Piemonte: 1801-1850; (114); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (419); (3328).

784. - ***Nychiodes obscuraria*** **(de Villers, 1789)** (= *lividaria* Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni per la **Calabria:** (2000), (2868) sono da riferire a *N. ragusaria*. Le citazioni per la **Sicilia** di *N. lividaria* vanno riferite a *N. ragusaria*; anche l'esemplare della collezione Mariani che Raineri ha attribuito a *obscuraria* (3385) è risultato essere *N. ragusaria* (Flamigni in litt.). Pertanto *N. ragusaria* è la sola specie presente in queste regioni.

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3017); **Veneto:** 1951-1975; (1681); (2227); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-2005; (24); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2203);

Abruzzo: 1926-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1951-2005; (2868); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2868); (3298).

785. - **(-)** ***Nychiodes andalusiaria*** **Staudinger, 1892** (= *andalusaria* Millière, 1865)

Nota - Le citazioni di *N. lividaria* var. *andalusiaria* per la **Sicilia** sono errate; tutti gli esemplari di *andalusaria* sono solo di Spagna (1274).

786. - ***Nychiodes ragusaria*** **Millière, 1884**

Nychiodes lividaria var. *ragusaria* è descritta su esemplari della **Sicilia:** Castelbuono (Il Naturalista Siciliano, 3 (7): 196, Tav. 3, fig. 1) (305).

Nota - In (3017) *Nychiodes ragusaria* è riportata come endemismo siciliano; in tale lavoro, revisione del genere *Nychiodes*, non viene esaminato alcun esemplare dell'**Italia meridionale** nè consultato il lavoro sui Geometridi (2868) in cui sono illustrati i genitali di *N. ragusaria* di **Sicilia** e **Calabria.**

Basilicata: 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3469); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (205); (3083).

787. - **(?)** ***Nychiodes dalmatina*** **Wagner, 1909**

Nota - La citazione per la **Venezia Giulia:** (1060), è da confermare.

788. - **(-)** ***Nychiodes amygdalaria*** **(Herrich-Schäffer, 1848)**

Nota - È riportata come presente nell'**Italia peninsulare:** (2929), e per l'**Italia:** (2980); l'unica citazione italiana nota, per le **Marche:** (385), è errata.

789. - ***Menophra abruptaria*** **(Thunberg, 1792)** (= *petrificaria* Treitschke, 1828)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta A.VIII.1967, A.IV.1969 (GLL, PRN); Torrazza (TO) 28.III.1976 (CMC, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 17.IV.1963, 21.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 15.IV.1976 (GRL). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 21.VIII.1985 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001. **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999. **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000, 4.IV.2001 (SCR). **Calabria:** Verzino (CZ) 16 e 24.VIII.1993; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 26.V.1995 (SCL). **Sardegna:** Belvì (NU) 5.VIII.1974 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (367); (3433); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183);

Emilia: 1851-1925; 1951-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1976-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3275); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (817); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (99); (2868); **Arcipelago campano:** 1926-1950; 1976-2000; (1139); (2511); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1951-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (144); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

790. - ***Menophra japygiaria*** **(O.G. Costa, 1849)**

Boarmia japygiaria è descritta su un esemplare della **Puglia:** dintorni di Lecce (Fauna del Regno di Napoli, Lepidotteri. Parte seconda. Geometre: 348, Tav. 9, fig. 5) (111).

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria**, l'**Emilia** e la **Romagna** sono da confermare.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 5.VIII.1964, 25.VII.1965, 20.VII, 10 e 20.VIII.1966, 24.VIII.1967, 10.VIII.1969 (DBR, PRN). **Puglia:** gravina di Riggio (TA) 20.VIII.1991; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 9.VI.1990, 17.VII.1994 (SCL).

Liguria: (1926-1950); (1388); **Emilia:** (1926-1950); (1388); **Romagna:** (1851-1900); (314); (1388); **Toscana:** (1851-1900); 1951-2005; (344); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2599); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2934); **Abruzzo:** 1901-1925; (590); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1901-1950; (590); (1350); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (590); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (343); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (781); (2249).

791. - ***Menophra nycthemeraria*** **(Geyer, 1831)**

Nota - È citata per l'Etna: Randazzo 1824 (69), da allora non è stata più catturata.

Sicilia: 1801-1850; (69).

792. - ***Menophra harterti*** **(Rothschild, 1912)**

Sardegna: 1951-1975; (2052).

793. - ***Megalycinia serraria*** **(A. Costa, 1882)**

Hemerophila serraria è descritta su una femmina della **Calabria:** Sila: Serra (Atti della Regia Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli, 9 (4): 41, fig. 13) (277).

Nota - Le citazioni per la **Sicilia:** (2929), (2980), sono errate, probabilmente riprese dalla citazione di *Cidaria serraria* Z. per San Guglielmo (360), ma si tratta di *Thera serraria* Z.

Nuovo dato - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Emilia: 1976-2000; (2606); **Romagna:** 1951-2000; (1788); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3029); **Lazio:** 1901-2000; (592); (3268); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1343); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3104); **Calabria:** 1851-1900; 1926-2000; (277); (3104).

794. - ***Synopsia sociaria*** **(Hübner, 1799)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.VII.1973, 16.VI.1974 (GRL). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.V.1996 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 26.V e 8.VI.1995 (SCL); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3433); **Friuli:** 1851-1900; 1951-1975; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1901-2005; (687); (3329); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1926-2000; (1274); (3305); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (222); (2868); **Puglia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3083); **Sardegna:** (1851-1900); 1951-1975; (188); (1975).

795. - (-) ***Afriberina tenietaria*** **(Staudinger, 1900)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna:** (2244) non è attendibile.

796. - ***Phthonandria viertlii*** **(Bohatsch, 1883)**

Nota – La citazione per la **Calabria:** 1976-2000; (3104) è dovuta ad

una svista, non è segnalata per la regione.

Liguria: 1976-2000; (3183); **Basilicata:** 1976-2000; (2527); **Sicilia:** (1901-1925); 1976-2000; (609); (2967).

797. - ***Calamodes occitanaria*** **(Duponchel, 1829)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** vanno riportate a *C. subscudularia*.

Liguria: 1901-1950; 1976-2000; (553); (3183).

798. - ***Calamodes subscudularia*** **(Turati, 1919)**

Boarmia subscudularia è descritta su esemplari della **Sicilia:** Nicolosi (Etna) e di Cirenaica (Tobruk) (Il Naturalista Siciliano, 23 (7-12): 112, fig. 2, tav. IV. figg. 25, 26) (894).

Calabria: 1976-2000; (3221); **Sicilia:** 1901-1950; (894); (1340).

799. - ***Sardocyrnia bastelicaria*** **(Bellier, 1862)**

Sardegna: 1901-1950; (781); (1303).

800. - ***Sciadia tenebraria*** **(Esper, 1806)**

Nota - È citata per il Monte Cimone (**Emilia**) (269); l'esemplare è risultato essere *Selidosema brunnearia* de Villers (3237).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (3106); (3237); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (231); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (424); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3237).

801. - ***Peribatodes rhomboidaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *gemmaria* Brahm, 1791; *ichnusaria* Ghiliani, 1852)

Boarmia ichnusaria è descritta su sole femmine della **Sardegna**: regione selvosa e montuosa dell'interno (114).

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 23.VIII.1970, Miasino (NO): Lago di Orta 27.VIII.1967 (GLL, PRN); Albarasca (AL) 20.VIII.1980 (BER, PRN). **Veneto:** Cortina d'Ampezzo (BL) 30.VIII.1956. **Toscana:** Ansedonia (GR) 3.X.1965, 18.IV.1966 (DBR, PRN); Pratomagno (AR) 8.VI.1988; Pieve a Maiano (AR) 16.VI.1974 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 24.VII.1987 (RTN, PRN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001; Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gargano: San Giovanni Rotondo 24.VI.1998; gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Metaponto (MT): San Marco 19.V.1985 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 25-31.V.1995 (SCL); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sicilia:** San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL); Giacalone 2.X.1995 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (164); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3433); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2203); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (817); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (111); (2868); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1801-1850; 1926-2005; (111); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1801-1850); 1951-2005; (111); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (144); (3247); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1975; (114); (2066).

802. - ***Peribatodes dragone*** **De Laever & Parenzan, 1985**

Peribatodes dragone è descritta su esemplari della **Calabria:** Monte Pollino: Colle del Dragone (SHILAP Revta. lepid., 13 (51): 178) (2404).

Calabria: 1976-2000; (2404).

803. - ***Peribatodes perversaria*** **(Boisduval, 1840)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1851-1900; (1053); **Veneto:** 1851-1900; (446).

804. - ***Peribatodes umbraria*** **(Hübner, 1809)**

Nuovi dati - **Campania:** Scafati (SA) 5-10.VI, 28-31.VIII.1983 (SNN). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 19.V.1985 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 26.V.1994 (SCL); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sicilia:** San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL); Giacalone 28.X.1995 (GRL).

Piemonte: (1851-1900); (188); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (566); (1787); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1787); **Liguria:** 1951-2000; (1693); (3183); **Emilia:** 1901-1975; (629); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1951-2005; (2968); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3417); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (2593); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1651); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (360); (3083);

Sardegna: (1926-1950); 1951-1975; (1275); (2041).

805. - ***Peribatodes secundaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (2748 (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2005; (750); (3388); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1004); (3237); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3237); **Toscana:** 1976-2005; (3062); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2143); (2203); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2819); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3156); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

806. - **(?)** ***Peribatodes ilicaria*** **(Herrich-Schäffer, 1853)** (= *manuelaria* Herrich-Schäffer, 1852 nec Geyer, 1833)

Nota - Si hanno solo vecchie citazioni generiche, da confermare.

(?) **Piemonte:** (1850-1925); (293); (990); (?) **Lombardia:** (1926-1950); (1388).

807. - ***Selidosema brunnearia*** **(de Villers, 1789)** (= *ericetaria* de Villers, 1789)

Nuovo dato – **Calabria:** Cava di Melis 10.VIII.1996 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; (1038); (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1681); (2051); **Friuli:** 1926-1950; (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** (? 1851-1900); 1976-2005; (218); (3429); **Umbria:** 1851-1900; (344); **Marche:** 1851-2000; (344); (3237); **Abruzzo:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2967).

808. - ***Selidosema plumaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per **Liguria, Emilia, Romagna** e **Marche** vanno riportate a *S. brunnearia* (3237). La citazione generica per il **Piemonte** è dubbia. La citazione per la **Puglia** va confermata.

Piemonte: (1801-1850); (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (3106); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (2441); **Alto Adige:** 1851-1900; 1926-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2203); **Puglia:** 1801-1850; (111); **Basilicata:**

1951-2000; (2868); (3298); **Sicilia:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (2967).

809. - ***Selidosema taeniolaria*** **(Hübner, 1813)**

Piemonte: 1901-1925; 1976-2005; (894); (3461 bis); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (622); (3183).

810. - ***Selidosema ambustaria*** **(Geyer, 1831)** (= *duponchelaria* Lefebvre, 1831)

Geometra ambustaria è descritta su esemplari della **Sicilia** (Sammlung europäischer Schmetterlinge, 5, Geometrae (1): Tav. 108, fig. 567, 568) (52*); (3174).

Nota - La citazione generica per l'**Abruzzo:** (111); è dubbia. La citazione per la **Puglia** va confermata.

Puglia: 1801-1850; (111); **Calabria:** (1901-1925); 1976-2000; (459); (3104); **Sicilia:** 1801-2000; (65); (3083).

811. - ***Selidosema parenzani*** **Hausmann, 1993**

Selidosema parenzani è descritta su esemplari della **Sicilia:** Madonie, 1200 m (Il Naturalista Siciliano, S. IV, 17 (1-2): 94, figg. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15) (2786).

Sicilia: 1926-1950; (2786).

812. - ***Cleora cinctaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Basilicata:** 1951-2000; 2810); (3104); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

813. - ***Deileptenia ribeata*** **(Clerck, 1759)**

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (1038); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943).

814. - ***Alcis repandata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 9.VII.1976; Brusson 15.VII.1988 (GRL); Cogne 12.VII.1976 (GLL, PRN). **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 4.VII.1980; Ceresole (TO), 1600 m, 17.VII.1985; Alpi

Marittime: Frabosa (CN) 22.VII.1985 (GRL). **Alto Adige:** Dolomiti, Mendola, 1340 m, 16.VII.1964. **Veneto:** San Vito di Cadore (BL) 2.IX.1951; Cadore: Bosco Auronzo 16.VIII.1960 (GLL, PRN); Nevegal (BL) 28.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (893); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1901-1925; (459); (1047); **Puglia:** (1901-1925); 2001-2005; (459); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** (1901-1925); 1951-2000; (459); (2195); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (343); (2844).

815. - ***Alcis bastelbergeri*** **(Hirschke, 1908)** (= *maculatus* Staudinger, 1892)

Trentino: 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787).

816. - ***Alcis jubata*** **(Thunberg, 1788)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1926-1950); (1388); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (2871); **Alto Adige:** 1901-1975; (452); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1976-2000; (3328).

817. - **(-)** ***Arichanna melanaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata da Herrich-Schäffer e Duponchel come specie di **Italia** (218). Citata per l'**Alto Adige:** Terlano (812), probabile errore di etichettatura (1038). Come *Rhyparia melanaria* L. è segnalata per la **Calabria:** (156) e per la **Sardegna:** (841); la descrizione corrisponde, ma non si hanno conferme successive.

818. - ***Hypomecis roboraria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (298) è molto dubbia.

Nuovo dato - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.III, 15.IV.1967 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2227); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3455); **Friuli:** 1951-2000;

(1528); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2871); (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2005; (501); (3329); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1850; 1976-2005; (24); (3462); **Lazio:** 1976-2000; (2143); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868).

819. - ***Hypomecis punctinalis*** **(Scopoli, 1763)** (= *consortaria* Fabricius, 1787)

Nuovi dati - **Piemonte:** Terme di Valdieri (CN) 28.VII.1966. **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 15.VI.1967 (GLL, PRN). **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-1975; 2001-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3433); **Friuli:** 1851-2000; (181); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2005; (817); (3462); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (111); (2868); **Puglia:** 1926-1975; (1538); (1565); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2005; (111); (3347).

820. - ***Ekboarmia atlanticaria*** **(Staudinger, 1859)**

Sardegna: 1926-1950; 1976-2000; (1303); (3327).

821. - ***Cleorodes lichenaria*** **(Hufnagel, 1767)**

Piemonte: (1801-1900); (114); (2580); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); **Friuli:** 1901-1950; (899); (1274); **Liguria:** 1976-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (3237); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 2001-2005; (3409); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1951-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (2967); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (792).

822. - ***Fagivorina arenaria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *angularia* Thunberg, 1792; *viduaria* Borkhausen, 1794)

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna,** non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-

1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1950; (1038); (1184); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2227); **Friuli:** 1926-1950; (1110); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (144); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (629); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (1684); (3403); **Abruzzo:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1926-1950; 2001-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (111); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (2844); **Sardegna:** (1851-1900); (298); (2929).

823. - ***Ascotis selenaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta E.VII-M.VIII.1967. **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 3.VI.1967 (GLL, PRN). **Veneto:** Colli Euganei: Monte Rua 22.VII.1973. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 16.VII.1979 (GRL); Ansedonia (GR) 7-20.VII, 20-30.VIII.1962 (DBR, PRN). **Campania:** Scafati (SA) 5-10.VI, 1-15.VIII.1983; Vesuvio: Osservatorio 12.VI.1985, 6-8.VII.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 10-13.VII.1987; Gallipoli (LE) 10.IX.1986 (PRT, PRN); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Metaponto (MT): San Marco 19.V.1985; Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1901-1975; (840); (1787); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (367); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1900; 1976-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** (1901-1925); 1951-2005; (459); (3462); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (99); (2868); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (111); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (144); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-1975; (114); (1841).

824. - ***Ectropis crepuscularia*** (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *bistortata* Goeze, 1781; *biundulata* de Villers, 1789)

Nota - In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra biundulata* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. biundulata* è descritta su esemplari di Bressiae sylvis (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p, 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-15.VIII.1963 (GLL, PRN). Albarasca (AL) 10-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m M.VI.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3062); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** 1851-1900; (343); (1340).

825. - ***Paradarisa consonaria*** **(Hübner, 1799)**

Nota - È citata per la **Toscana:** (517); si ritiene che gli esemplari di Verity, andati distrutti, appartenessero alla seconda generazione di *Ectropis crepuscularia*: (3237).

Piemonte: (1851-1900); 1976-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3237); **Liguria:** (1801-1850); (114).

826. - ***Parectropis similaria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *luridata* Borkhausen, 1794; *extersaria* Hübner, 1799)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-15.VIII.1963 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 3.VII.1983 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1004); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3428); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

827. - ***Aethalura punctulata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (=

punctularia Hübner, 1787)

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è inattendibile (3237).

Piemonte: (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (260); (807); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1943); **Friuli:** 1951-2000; (1528); (3237); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2000; (112); (3428).

828. - ***Ematurga atomaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia** e per la **Sardegna** non risultano segnalazioni attendibili.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Formazza (VB) 20.VI.1976, 20.VII.1987; Val Bognanco (VB) 17.VI.1977 (GRL); Val di Susa: Ulzio 20.V.1978; Bienza Chiaverana (TO) 12.V.1977 (CMC, PRN). **Veneto:** Dolomiti: Cortina Pocol 1530 m 1.VII.1961 (GLL, PRN); Valtellina: Val Viola 9.VII.1974; Monte Baldo, 1400 m, 18.VI.1986 (GRL). **Liguria:** Caprieto di Vobbia (GE) 12.VI.1977 (CMC, PRN); Genova 14.V.1967 (GLL, PRN); Cipresso, 400 m, 17.VI.1987. **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 18.VII.1975. **Toscana:** Pratomagno (AR) , 1100 m, 11.VI.1981, 28.V, 4.VI.1982; Pieve a Maiano (AR) 19.IV, 19.VI.1976, 21.V.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3433); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (466); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1926-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2203); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (111); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1926-1975; (1538); (1565); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (111); (3104); **Sicilia:** (1926-1950); (1388); (2929); **Sardegna:** 1901-1925; (841); (2929).

829. - ***Adactylotis contaminaria*** **(Hübner, 1813)**

Nuovi dati - **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998; Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; (260); (2362); **Veneto:** 1851-1900; (268); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (269); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-

1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1340); (2967).

830. - ***Tephronia sepiaria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *cineraria* Denis & Schiffermüller, 1775; *cremiaria* Freyer, 1837; *corticaria* Duponchel, post. 1926 et auct.)

Nota - Le citazioni per la **Romagna** e la **Toscana:** di *T. sepiaria* vanno riferite in parte a *T. oranaria* (3237).

Nuovo dato - **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (629); (3237); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3428); **Umbria:** 1926-1975; (1274); (3237); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (3324); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3298); **Sicilia:** 1851-1925; (357); (2786); **Sardegna:** 1851-1975; (781); (1975).

831. - ***Tephronia codetaria*** **(Oberthür, 1881)**

Toscana: 1926-1950; 1976-2000; (3237); (3428); **Lazio:** 2001-2005; (3419); **Abruzzo:** 1976-2000; (3237); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1976-2000; (2868); (3237); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1254); (3083); **Sardegna:** 1951-1975; (2041); (1906).

832. - **(-)** ***Tephronia cremiaria*** **(Freyer, 1838)**

Nota - Le citazioni di *T. cremiaria* per **Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Liguria, Toscana, Puglia, Basilicata** e **Calabria,** vanno riferite a *T. sepiaria*, di cui *cremiaria* è ssp. (1821), (3031), (3174) o sinonimo (3161).

833. - ***Tephronia oranaria*** **Staudinger, 1892**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 15.VII.1975, 14 e 18.VII.1976, 15.VII.1979, 8.VII.1980, 14.VII.1986. **Umbria:** Sigillo (PG), Val Ranco 29.VII.1973. **Basilicata:** Monte Sirino (PZ) 18.VII.1979 (GRL). Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m,

9.VII.2001 (SCR).

Liguria: 1976-2000; (2454); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (3237); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (554); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (3237); **Marche:** 1976-2000; (3237); **Lazio:** 1976-2005; (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2868); (3324); **Puglia:** 1951-1975; (2868); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2967).

834. - ***Bupalus piniaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni generiche per **Liguria**, **Toscana** e **Lazio** e la citazione per la **Campania** sono dubbie, da confermare.

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 16.VI.1977 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2241); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (175); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850), (114), **Toscana:** (1751-1800); (24), **Lazio:** (1926-1950); (1388); (1943); **Campania:** 1901-1925; (459).

835. - ***Cabera pusaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna** è molto dubbia.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 17 e 20.VI.1977 (GRL). **Trentino:** Levico 25.VI.1974. **Friuli:** Val Resia 9.VII.1975 (GRL). **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001; Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (410); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (2362); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (817); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (867); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3401); **Sardegna:** (1801-1850); (114).

836. - ***Cabera exanthemata*** **(Scopoli, 1763)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-

15.VIII.1967 (GLL, PRN). **Trentino:** Dimaro (TN) 26.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1951-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347).

837. - ***Lomographa bimaculata*** **(Fabricius, 1775)** (= *taminaria* Hübner, 1799)

Piemonte: (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** (1926-1950); 1951-1975; (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (268); (2795); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1852); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2005; (1207); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3062); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3462).

838. - ***Lomographa temerata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per la **Toscana** sono da confermare (3429).

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-18.VIII.1967 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 17.VI.1977. **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 7.VII.1973 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** (1926-1950); 1951-2000; (1943); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1852); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2871); (3183); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1850; (24); (112).

839. - ***Aleucis distinctata*** **(Herrich-Schäffer, 1839)** (= *pictaria* Curtis et auct.)

Piemonte: 1976-2005; (3378); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053).

840. - ***Theria rupicapraria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1926-1950;

(1681); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3052); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); **Calabria:** 1976-2000; (2232).

841. - ***Theria primaria*** **(Haworth, 1809)**

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Emilia:** 1951-2000; (1551); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3428); **Lazio:** 1976-2000; (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (3305); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2347).

842. - ***Campaea margaritaria*** **(Linnaeus, 1761)** (= *vitriolata* Cyrillus, 1787)

Phalaena vitriolata è descritta su esemplari della **Campania**: Appennini del Napoletano (15).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 30.VI.1976. **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 20.VI.1977. **Lombardia:** Vione (BS), 4.VII.1979. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 5.X.1989; Civitello 21.IX.1976 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3108); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (656); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** (1751-1800); 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (15); (2868); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (156); (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3083); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (2066).

843. - ***Campaea honoraria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.X.1962, 3.X.1965, 9.X.1966, 18.V.1984; Argentario (GR) 20.X.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 21.IX.1976 (GRL). **Sicilia:** San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1038); **Liguria:** (1801-1850); 1976-

2000; (114); (3183); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (111); (2868); **Puglia:** 1801-1850; 1951-1975; (111); (2868); **Basilicata:** 1901-1925; 1976-2000; (459); (3104); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (3247); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

844. - ***Hylaea fasciaria*** **(Linnaeus, 1758)** (= *prosapiaria* Linnaeus, 1758; *prasinaria* Denis & Schiffermüller, 1775; *biliosata* de Villers, 1789)

Nota - In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra biliosata* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. biliosata* è descritta su esemplari di Bressiae (Bresse, presso Lyon), come precisato a p, 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 10.VII.1976 (GRL). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 1230 m 20.X.1960 (f. manitiaria H.-S.) (GLL, PRN). **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sicilia:** San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (81); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (174); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (406); (3429); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Molise:** 1976-2000; (3156); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2967); (3247).

845. - **(-)** ***Hylaea squalidaria*** **(Costa O.G., 1848)**

Hemithea squalidaria è descritta su esemplari della **Campania:** Lago di Patria (NA) e della **Puglia:** San Cataldo (LE) (Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte seconda. Geometre: 17, Tav. II, fig. 4) (111).

Nota - In (3174) è elencata come buona specie, ma probabilmente è sinonimo di *H. fasciaria*.

846. - ***Puengeleria capreolaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovo dato - **Toscana:** Poti (AR) 8.VI.1988 (GRL, PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378);

Lombardia: (1951-1975); (1943); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (400); (2871); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3314); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (314); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2882); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Molise:** 1976-2005; (3156); (3447); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1951-2005; (3104); (3401).

847. - ***Gnophos furvata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovo dato - **Alto Adige:** Val d'Isarco: Campodazzo 17.VII.1941 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3064); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (110); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (894); (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3260); (3403); **Campania:** 1801-1850; (111); (894); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3104); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (459); (3104).

848. - ***Gnophos obfuscata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *myrtillata* Thunberg, 1788; *clavellata* Fabricius, 1794)

Phalaena clavellata è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3394); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (170); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (244); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (174); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2203); **Abruzzo:** 1801-1900; 1926-2000; (111); (2203); **Molise:** 1901-1925; (459); **Campania:** 1851-1925; (459).

849. - **(-)** ***Gnophos subsignaria*** **Staudinger, 1892**

Gnophos mucidaria var. *subsignaria* è descritta su esemplari di Francia S, Spagna S e **Sicilia** (Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris", 5: 190) (383).

Nota - È riportata come buona specie (3174); non sono note altre citazioni per il territorio italiano.

850. - ***Gnophos sartata*** **Treitschke, 1827**

Nota - Secondo Curò la citazione di *G. respersaria* per Susa (**Piemonte**) in Ghiliani (114) è probabile sia *G. sartata* (910). La citazione per la **Liguria:** (114) va confermata. La citazione per il **Lazio:** (807), probabilmente è errata (2203). È riportata genericamente per la **Sardegna**, citazione dubbia, come dubbia è la presenza in Corsica.

Nuovi dati - **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Calabria:** Copanello - Staletti, 0-70 m, 15.V.1998 (SCL).

Piemonte: (?) 1801-1850; 1851-1900; (114); (293); **Alto Adige:** 1901-1925; (593); **Veneto:** 1951-1975; (2795); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Lazio:** 1901-1925; (807); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; (111); (1350); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2075); (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (144); (3083); **Sardegna:** (1951-1975); (1752); (2929).

851. - ***Odontognophos dumetata*** **(Treitschke, 1827)**

Piemonte: 1976-2005; (3328); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1951-1975; (1656); (2227); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Lazio:** 1976-2000; (2143); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); (2203); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2868); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Calabria:** 1976-2000; (2868).

852. - **(-)** ***Odontognophos perspersata*** **(Treitschke, 1827)** (= *respersaria* Hübner, 1813)

Nota - Le citazioni di *G. respersaria* per **Piemonte, Alto Adige, Liguria** e **Campania,** vanno riferite a *G. sartata*.

853. - ***Charissa obscurata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR); Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR). **Sicilia:** Madonie, Piano Zucchi, 1500 m, 22.VIII.1979 (PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 20.VIII.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; (157); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (129); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (2203); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1951-

2000; (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2967); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; (781).

854. - ***Charissa bellieri*** **(Oberthür, 1913)**

Sardegna: (1901-1925); 1926-2000; (901); (1476).

855. - **(?)** ***Charissa predotae*** **(Schawerda, 1929)**

Nota - È una specie endemica della Penisola iberica. Un maschio ex coll. Daumiller, etichettato "**Sicilia,** 1895" è presente nella collezione dello ZSM; da confermare.

Sicilia: (1851-1900); (2786).

856. - ***Kemtrognophos ambiguata*** **(Duponchel, 1830)** (= *ophthalmicata* Lederer, 1853)

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (807); (1787); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183).

857. - ***Kemtrognophos onustaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Nuovi dati - **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001; Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Emilia:** 1901-1950; (687); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (2203); (2362); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2005; (3104); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3083); **Sardegna:** 1976-2000; (2249).

858. - ***Costignophos pullata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia** sono da confermare (3237). La citazione per la **Romagna:** (1885) va riferita a *R. glaucinaria* (2516).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (747); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1950; (171); (1089); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-

1925; 1951-1975; (1038); (2051); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 1901-1925; (589); (687); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2203); **Abruzzo:** 1801-1900; 1951-2000; (111); (2203); **Campania:** 1901-1925; (459); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1340).

859. - **(-)** ***Costignophos crenulata*** **(Staudinger, 1871)**

Nota - Le citazioni per **Lombardia, Emilia, Marche** e **Lazio** vanno riferite a *Glaucinarius etruscarius* (2459).

860. - ***Costignophos italohelveticus*** **(Rezbanyai-Reser, 1986)**

Gnophos italohelveticus è descritta su esemplari di Svizzera: Lugano (luogo tipico), Francia, Austria, **Alto Adige** e **Trentino** (Nota lepidopterologica, 9 (1-2): 99) (2459).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Lombardia:** 1976-2000; (2459); **Trentino:** 1926-1975; (1787); (2459); **Alto Adige:** 1901-1975; (2459); **Veneto:** 1851-1900; (3328).

861. - **(-)** ***Neognophina intermedia*** **(Wehrli, 1917)**

Nota - Le citazioni per **Alto Adige:** (2973), **Veneto:** (982) e **Friuli:** (1025) sono errate o esemplari immigrati (1425).

862. - ***Neognophina supinaria*** **(Mann, 1854)**

Nota - La citazione per l'**Abruzzo:** (344) è probabilmente da riferire a *R. glaucinaria*.

Trentino: 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

863. - ***Rhopalognophos glaucinaria*** **(Hübner, 1799)** (= *falconaria* Freyer, 1842)

Nuovi dati - **Piemonte:** Serravalle Scrivia (AL) 13-31.VIII.1967; Sempione 8-12.VIII.1969 (GLL, PRN); Albarasca (AL) 8-30.VIII.1980 (BER, PRN). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 2.IX.1960; Monte Grappa 6.VII.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1801-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (383); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (3322); **Umbria:** 1851-1900; (344); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; (111); (1408); **Puglia:** 1801-1850; (111);

Basilicata: 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1926-1950; (1384); (1419).

864. - ***Euchrognophos variegata*** **(Duponchel, 1830)**

Gnophos variegatus ssp. *siculus* è descritto su esemplari della **Sicilia:** Catania (Etna) (1205).

Nota - Le citazioni per **Arcipelago toscano**, **Sardegna** e **Arcipelago sardo** vanno riferite a *G. corsica* (2409). *E. variegata sicula* (Wehrli, 1931) è considerata buona specie (3174); è ssp. di *E. variegata* (2786).

Nuovi dati - **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** agro di Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2227); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2871); (3183); **Emilia:** 1801-1900; (110); (3329); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** (1851-1900); 1901-2000; (150*); (3268); **Abruzzo:** 1926-2005; (1231); (3435); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 2001-2005; (111); (1350); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2409); (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (148); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (2935); (3231).

865. - ***Euchrognophos corsica*** **(Oberthür, 1913)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (come *corsica* Obth. nec *corsica* Mill.) "ho trovato anche un maschio che è sicuramente un *corsica* all'epoca determinato come *cymbalariata* di **Sicilia**" (1125); citazione da confermare.

Toscana: 1976-2005; (3276); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (1044); (3276); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (3042): **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781); **Sicilia**: (1901-1925); (1125).

866. - ***Euchrognophos mucidaria*** **(Hübner, 1799)**

Nota - È citata per la **Valle d'Aosta:** (2471); non presente in **Valle d'Aosta:** (3145). Le citazioni per **Alto Adige, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria** sono da riferire a *G. variegata*, quelle per la Sardegna a *G. corsica..*

Piemonte: (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; (164); (1279); **Trentino:** 1851-1925; (1053); **Veneto:** 1851-1900; (161); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (2844).

867. - ***Elophos dilucidaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *myopata* Fabricius, 1794)

Phalaena myopata è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Nota - Gli esemplari di *E. dilucidaria* della coll. Fiori sono risultati essere *E. dognini*; *E. dilucidaria* non è presente in **Emilia:** (3147).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (146); (3388); **Veneto:** 1851-1925; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (174); (3237); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** 1976-2000; (3191).

868. - ***Elophos sproengertsi*** **(Püngeler, 1914)** (= *canitiaria* auct. nec Guenée, 1852)

Nota - È buona specie delle Alpi occidentali (2980), (3031), (3174).

Piemonte: 1901-1950; (1031); (1274).

869. - ***Elophos serotinaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Liguria** è dubbia. Le citazioni per la **Toscana**, il **Lazio** e l'**Abruzzo** vanno riferite a *E. dognini*; *E. serotinaria* va esclusa dalla fauna dell'Appennino (3237).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 9.VII.1976. **Piemonte:** Cesana (TO), 1950 m, 25.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (1986); (3237); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Trentino:** 1901-2000; (1190); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (1038); (3237); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Liguria:** (1801-1850); (114).

870. - ***Elophos dognini*** **(Thierry-Mieg, 1910)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2713); (3237); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (2580); (3421); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3237); **Emilia:** 1851-2000; (269); (3237); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2000; (344); (3237); **Lazio:** 1951-1975; (1684); **Abruzzo:** (1926-1950); (1388).

871. - ***Elophos vittaria*** **(Thunberg, 1788)** (= *sordaria* Thunberg, 1792)

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) non è attendibile.

Nuovo dato - **Alto Adige:** Fanes 2000 m 1.VIII.1962 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2000; (684); (3328); **Lombardia:** 1851-1900; (218); (2362); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (1081); (3328); **Friuli:** 1926-1975; (1214); (3328).

872. - ***Elophos zelleraria*** **(Freyer, 1836)**

Nota - Le citazioni di *E. zelleraria* per **Valle d'Aosta** e **Piemonte** sono ritenute da Rezbanyai-Reser *E. unicoloraria* Stdgr. (3378).

Lombardia: 1851-1900; (218); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (3328); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2325); **Veneto:** 1951-2005; (1943); (3328); **Friuli:** 1926-2000; (1214); (3328).

873. - ***Elophos unicoloraria*** **(Staudinger, 1871)**

Nota - La presenza di *E. unicoloraria* in Italia è limitata al settore alpino Nord-occidentale, nel tratto che va dalle Alpi Marittime alla **Valle d'Aosta**; nell'arco alpino Sud-orientale *E. unicoloraria* è sostituita dall'affine *E. zelleraria* Freyer (3378).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); (3378); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2000; (747); (2200).

874. - ***Elophos caelibaria*** **(Heydenreich, 1851)** (= *caelibaria* Herrich-Schäffer, 1852)

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; (188); (797); **Lombardia:** 1851-1925; (215); (1053); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3328); **Alto Adige:** 1851-1925; (157); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528).

875. - (-) ***Elophos operaria*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni per **Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige** e **Marche** sono da considerarsi errate (3378).

876. - ***Elophos andereggaria*** **(de La Harpe, 1853)**

Nota - La citazione di *E. andereggaria* per l'**Alto Adige:** (356) va riferita a *E. spurcata* (1038); *E. spurcata* è ssp. di *E. caelibaria*.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1851-1900); (188).

877. - ***Psodos quadrifaria*** **(Sulzer, 1776)**

Nota – La citazione per le Alpi della **Liguria:** (114) va confermata.

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3328); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3328); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2005; (244); (3328); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Liguria:** (1801-1850); (114).

878. - ***Glacies alticolaria*** **(Mann, 1853)**

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 2001-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (231); (1053); **Trentino:** 1851-1925; (218); (1053); **Alto Adige:** 1851-1950; (157); (1053).

879. - ***Glacies spitzi*** **(Rebel, 1906)**

Trentino: 1951-1975; (1559); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038);

Friuli: 1951-1975; (1528); (1816).

880. - ***Glacies canaliculata*** **(Hochenwarth, 1785)** (= *trepidaria* Hübner, 1809)

Nota – La citazione per le Alpi della **Liguria:** (114); va confermata.

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3328); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (215); (1532); **Trentino:** 1851-2000; (170); (3328); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3328); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (244); (3328); **Liguria:** (1801-1850); (114).

881. - ***Glacies bentelii*** **(Rätzer, 1890)**

Valle d'Aosta: 1951-1975; (3328); **Piemonte:** 1901-1925; (1031); **Trentino:** 1951-1975; (2227); (2292); **Alto Adige:** 1901-1925; (998); (1038).

882. - ***Glacies noricana*** **(Wagner, 1898)**

Nota - È citata per il **Friuli:** (447); è in realtà *P. coracina* (452).

Piemonte: 1976-2005; (3285); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1901-1925; (1053).

883. - **(-)** ***Glacies perlinii*** **(Turati, 1915)**

Psodos perlinii è descritta su due maschi del **Trentino:** Monte Adamello, sulla morena al disopra del Lago Salarno, 3000 m (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, LIII: 560) (807):

Nota - *G. perlinii* è ssp. di *G. coracina* (2292); pertanto le citazioni per la **Lombardia** e il **Trentino** vanno riferite a *G. coracina*.

884. - ***Glacies coracina*** **(Esper, 1805)** (= *hirtata* Fabricius, 1794)

Phalaena hirtata è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174),

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (797); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2211); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (366); (2325); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (447); (1528).

885. - ***Glacies alpinata*** **(Scopoli, 1763)** (= *horridaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Cogne, Rifugio A. Manda 2400 m 15.VII.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; (114); (372); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (215); (3073); **Trentino:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3328); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2000; (244); (3328); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528).

886. - (?) ***Glacies wehrlii*** **(Vorbrodt, 1918)**

Nota - Presso Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono conservati alcuni esemplari del **Tirolo meridionale**; nessuna cattura recente (2973).

887. - ***Glacies baldensis*** **(Wolfsberger, 1966)**

Psodos baldensis è descritta su esemplari del **Veneto:** Monte Baldo, 2100-2200 m (Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona, 14: 451, Tav. 1, figg. 1-4, Tav. 2, figg. 1-2, Tav. 3, figg. 1-2) (1816).

Veneto: 1951-1975; (1816); (2227).

888. - ***Siona lineata*** **(Scopoli, 1763)** (= *dealbata* Linnaeus, 1767; *sordida* Cyrillus, 1787)

Phalaena sordida è descritta su esemplari della **Campania:** Napoletano (15),

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Dondenaz 16.VII.1988. **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 17.VII.1977. **Friuli:** Taipana (UD), 700 m, 30.VI.1987; Val Resia, 9.VII.1975. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.VII.1977 (GRL). **Lazio:** Monti Prenestini, 650 m, 24.V.1969 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1950; (260); (1502); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1976-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (2362); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3321); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1751-1800; 1851-1900; (15); (135); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3083).

889. - ***Chariaspilates formosaria*** **(Eversmann, 1837)**

Alto Adige: 1901-1925; (1038); (1053); **Romagna:** 1976-2000; (2268); (2643).

890. - (-) ***Aspitates acuminaria*** **(Eversmann, 1851)**

Nota - È citata per la **Toscana:** (344); la *Cleogene acuminaria* citata da Calberla di Camaldoli nel Casentino è *Hemerophila serraria* (592).

891. - ***Aspitates gilvaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Probabilmente le vecchie segnalazioni di *A. gilvaria* per il

Veneto: (98), (161), (268), vanno riportate a *A. ochrearia* (3433). Le citazioni generiche per la **Liguria:** (114) e la **Toscana:** (24) attendono conferma. Le citazioni per la **Calabria:** (156) e la **Sardegna:** (1274) sono errate.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1925; (1038); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); **Veneto:** (?) (1801-1900); 1951-1975; (98); (1787); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Toscana:** (1751-1800); (24); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3402).

892. - ***Aspitates ochrearia* (Rossi, 1794)** (= *citraria* Hübner, 1799)

Phalaena ochrearia è descritta su esemplari dell' Etruria (**Toscana**) (Mantissa Insectorum, 2: 33, n. 429) (24).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.VI.1974 (GRL); Montepulciano (SI) 10.IX.1976 (PRN). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 3.V.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 8.VI, 27.VII.1995 (SCL).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (3106); **Trentino:** (1801-1850); 1851-1925; (114); (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1038); **Veneto:** 1926-1950; (3433); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1951-2005; (24); (3429); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1976-2005; (1044); (3322); **Umbria:** 1801-1850; 1976-2000; (109); (2203); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; (99); (111); **Arcipelago campano:** (1801-1850); (91); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; 1976-2000; (2786); (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1975; (114); (1975); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

893. - ***Dyscia conspersaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Al momento, *Dyscia conspersaria* non figura fra le specie italiane (Trusch & Erlacher, 2001) (3378). È possibile che la segnalazione per la **Liguria**: (2408) sia dovuta a confusione con *D. raunaria* (3329). La citazione per il **Piemonte:** Oropa, Susa (797) probabilmente va riferita a *D. raunaria* (3378). La citazione per L'**Emilia** in (110) va riferita a *E. variegatus*, quella in (687) va riportata a *D. raunaria*; tutti gli esemplari di **Toscana** esaminati appartengono a *D. raunaria*

o *D. innocentaria* (3237). Le citazioni per **Marche, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia** e **Sardegna** sono da riferire a *D. innocentaria*. Le citazioni per la **Lombardia** il **Trentino** e la **Liguria** sono dubbie.

(?) **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (164); (734); (?) **Trentino:** 1901-1950; (1053); (1184); **Friuli:** (1976-2000); (2408); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (1060); (2362); (?) **Liguria:** 1976-2000; (2408).

894. - **(-) *Dyscia crassipunctaria* (Rebel, 1916)**

Nota - Le segnalazioni per la **Campania:** (1274), (1388) e la **Basilicata:** (1388) sono da riferire a *D. innocentaria*.

895. - **(-) *Dyscia fagaria* (Thunberg, 1784)**

Nota - Le citazioni per l'**Umbria:** (2143) e le **Marche:** (385) vanno riferite a *D. innocentaria* (2203).

896. - ***Dyscia innocentaria* (Christoph, 1885)** (= *sicanaria* Oberthür, 1923; *scannaria* Dannehl, 1933; *sicula* Reisser, 1940)

Nuovi dati - **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gargano: Vieste VII.1979 (PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR).

Emilia: 1976-2000; (3237); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (3237); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2143); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1926-2000; (1373); (2203); **Abruzzo:** 1926-2000; (1231); (3237); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (111); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2938); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2000; (111); (3237); **Sicilia:** 1851-2000; (328); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (1373); (2786); **Sardegna:** 1901-1925; (711); (781).

897. - ***Dyscia lentiscaria* (Donzel, 1837)**

Liguria: (1926-1950); 1976-2000; (1364); (2408).

898. - ***Dyscia raunaria* (Freyer, 1851)**

Piemonte: 1901-1925; 1976-2005; (797); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (1274); (3263); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1274); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-2000; (218); (3237); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (112); (3310); **Marche:** 1901-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-1975; (1684); (3263); **Abruzzo:** 1901-2000; (1373); (3263); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104).

899. - ***Perconia strigillaria* (Hübner, 1787)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 23.VI.1977. **Toscana:** Pratomagno (AR) 2.VI.1988. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco, 15.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1976-2005; (3301); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2516); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2000; (314); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1901-1950; (811); (1350); **Puglia:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1538); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (506); (2967).

900. - ***Onychora agaritharia*** **(Dardouin, 1842)**

Liguria: 1901-1925; (622).

901. - ***Compsoptera aemiliorum*** **Raineri, 1994**

Compsoptera aemiliorum è descritta su esemplari della **Sardegna:** Soleminis (olotipo), Musei (CA), Belvi, Ortuabis e isola di Capraia (SHILAP Revta. lepid., 22 (88): 318, figg. 1-2, 5-7) (2873).

Nota - Permane il dubbio sulla validità di questo taxon, basato su singoli individui sempre frammisti a popolazioni di *C. opacaria*.

Toscana: 1976-2000; (3276); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); (2873); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2873).

902. - ***Compsoptera opacaria*** **(Hübner, 1819)**

Nota - Le citazioni della f. *rubra* per l'Isola di Capraia e di **Sardegna** vanno riferite a *C. aemiliorum* (2873).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 23.X.1965; Argentario (GR) 20.X.1962 (DBR, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 2001-2005; (114); (3461 bis); **Liguria:** (1901-1925); 1976-2000; (901); (3183); **Toscana:** 1926-2005; (2873); (3429); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (2873).

903. - ***Compsoptera jourdanaria*** **(Serres, 1826)**

Nota - La citazione per la **Liguria:** (1388) probabilmente è dovuta alla presenza della specie nel Nizzardo.

Nuovi dati - **Sardegna:** Belvì (NU) 25.IX.1975; Aritzo 800 m 12.IX.1975 (HRT, PRN).

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2805); **Sardegna:** 1851-1925; 1951-1975; (317); (2067).

904. - ***Compsoptera argentaria*** **(Herrich-Schäffer, 1839)**

Aspilates argentaria è descritta su esemplari della **Sicilia:** (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Heft 165: 57) (83*); (3174).

Nota - La citazione per la **Toscana:** (2968) è da confermare, probabilmente è un errore di etichettatura.

Sicilia: (1801-1850); 1851-2000; (83*); (3083).

905. - ***Alsophila aescularia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Taglido (AL) 12.V.1974 (GLL, PRN). **Emilia:** Piacenza ex l. su Nocciuolo 1962 (RBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1951-2005; (1551); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1850; 1976-2005; (24); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-1975; (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (573); (2967); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; (792); (1841).

906. - ***Alsophila aceraria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *quadripunctaria* Esper 1800)

Nota - È citata per la **Calabria:** (3237); è un errore di trascrizione, non è presente nella regione (3329).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-1950; (1184); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; (109); (1060); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (1551); (3237); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3237); (3429); **Marche:** 1851-1900; 1951-2005; (385); (3429); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868).

907. - ***Myinodes interpunctaria*** **(Herrich-Schäffer, 1839)**

Sterrha interpunctaria è descritta su un maschio della **Sicilia** della collezione Kaden (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-

Fauna), Heft 165: tav. 6) (83*); (3174).

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è molto dubbia (3240). La citazione per la **Calabria:** (2672) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Puglia: 1951-2000; (2075); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (2868); **Sicilia:** (1801-1850); 1976-2000; (83*); (2967).

908. - ***Orthostixis cribraria*** **(Hübner, 1799)**

Basilicata: 1951-2000; (1931); (2527); **Calabria:** 1951-1975; (2804); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (147); (2967).

909. - ***Aplasta ononaria*** **(Fuessly, 1783)**

Nota - È citata con dubbio per la **Sardegna:** (3240); non presente nell'isola.

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Pondel 11.VII.1978 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); **Campania:** 1926-1950; (1285); (1350); **Calabria:** 1976-2000; (3469); **Sicilia:** 1851-1900; (144); (343).

910. - ***Pseudoterpna pruinata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *cythisaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 3.VII.1983 (GRL); Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 8.VII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2990); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-2005; (112); (3428); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (109); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2195).

911. - ***Pseudoterpna coronillaria*** **(Hübner,1817)**

Nota - In **Italia centrale** e **meridionale** è presente la ssp. *flamignii* Hausmann, 1977 e non la ssp. *cinerascens* Zeller, 1847 come detto in (2970); *cinerascens* Zeller è ssp. di *P. pruinata* (3022).

Nuovi dati - **Liguria:** Conna (SV) 1.IX.1978 (CMC, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 10-14.VIII.1964 (DBR, PRN). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 21.VIII.1985 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001. **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Liguria: 1851-1900; 1976-2000; (314); (3183); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2169); (3022); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3237); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (314); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (111); (2868); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3022); **Calabria:** 1851-1900; 1951-2005; (277); (3347); **Sicilia:** 1801-1925; 1976-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2786); **Sardegna:** 1851-1900; 1951-2000; (301); (2249).

912. - ***Pseudoterpna corsicaria*** **(Rambur, 1833)**

Nuovi dati - **Sardegna:** Aritzo 28.VI.1974; Belvì (NU) 6.X.1975 (HRT, PRN).

Sardegna: (1851-1900); 1901-1975; (448); (2067).

913. - ***Geometra papilionaria*** **Linnaeus 1758**

Nuovi dati - **Piemonte:** Passo del Sempione 8.VIII.1969; Miasino (NO): Lago d'Orta 10.V.1970; Terme di Valdiri 28.VII.1966 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (253); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; 2001-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (1004); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (2429°); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; (111); (1047); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347).

914. - ***Comibaena bajularia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pustulata* Hufnagel, 1767)

Nuovi dati - **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 5.VII.1967

(GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 10.VI.1981, 3.VI.1982 (GRL).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2000; (1681); (3433); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (925); **Liguria:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (298); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2169); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (2868); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2000; (111); (3104); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (357); (3083); **Sardegna:** 1951-1975; (2041); (1841).

915. - **(-)** ***Proteuchloris neriaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è certamente errata.

916. - ***Thetidia smaragdaria*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite a *T. sardinica*.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 11.VI.1974, 4.VII.1978 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Sicilia:** Etna N: Galvarina (CT) 1800 m 22.VII.1992 (coll. Dip. Biol. Anim. Catania).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (621); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1081); (3433); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (3240); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (2872); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (893); (3329); **Romagna:** (1976-2000); 2001-2005; (2516); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3277); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1951-2005; (2169); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1801-1925; 1976-2000; (109); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (111); (3347); **Sicilia:** 1851-2000; (148); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2786).

917. - ***Thetidia sardinica*** **(Schawerda, 1934)**

Nuovo dato - **Sardegna:** Belvì (NU) 10-23.VII.1975 (PRN).

Sardegna: 1851-2000; (301); (2249).

918. - **(-)** ***Thetidia plusiaria*** **Boisduval, 1840**

Nota - Una citazione per le **Marche:** (385) non è attendibile.

919. - ***Hemithea aestivaria*** **(Hübner, 1789)** (= *strigata* O.F. Müller, 1764)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 20.V.1970, A.VIII.1967 (GLL, PRN). **Basilicata:** Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1951-2000; (1681); (3433); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3183); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2005; (2770); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2657); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (206); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2169); (3419); **Abruzzo:** 1976-2005; (2169); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1801-1850; (111); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (144); (3083).

920. - ***Chlorissa viridata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna:** (114) non è attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2964); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2990); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3433); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (298); (3329); **Romagna:** 1901-1975; (1010); (1885); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2000; (19); (2347); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2169); (2990); **Abruzzo:** 1951-2005; (2169); (3367); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1340).

921. - ***Chlorissa cloraria*** **(Hübner, 1813)** (= *porrinata* Zeller, 1848)

Nota - Le citazioni per la **Sicilia:** (109), (126), (148), (144) sono errate; la specie manca nell'isola (3240).

Nuovo dato - **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 3.VII.1978 (GRL).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:**

1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1925; (174); (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1926-2005; (1781); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2516); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1976-2005; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2005; (2968); (3403); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

922. - ***Phaiogramma etruscaria*** **(Zeller, 1849)** (= *pulmentaria* Guenée, 1857)

Geometra etruscaria è descritta su esemplari della **Toscana:** Livorno e Pisa (Entomologische Zeitung, Stettin, 10: 203) (112).

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) 15.VII.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) VI.1965, E.VIII.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 3.V.1975 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 1-5.VIII.1983 (SNN). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 25.IV.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) (5 km dalla foce) 20 m, 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cuculo 550 m 28.VIII.1987, 20.VI.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2990); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (3240); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1926-2005; (1749); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); (2805); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (310); (2967); **Sardegna:** 1851-1975; (301); (1976).

923. - ***Phaiogramma faustinata*** **(Millière, 1868)**

Sicilia: (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (382); (2967).

924. - ***Microloxia herbaria*** **(Hübner, 1813)** (= *graminaria* Zeller, 1849)

Geometra graminaria è descritta su esemplari della **Toscana:** Ardenza (112),

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) E.VIII.1962 (DBR, PRN). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 3.X.1997 (1f), 17.VII.2001 (BLL/RSS). **Sardegna:** Musei (CA) 27.IX.1972 (HRT, PRN).

Veneto: 1951-1975; (3237); (3433); **Liguria:** 1901-1925; (2990); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (3237); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (1044); (2805); **Umbria:** 1951-2000; (2169); (3237); **Marche:** 1851-1900; 1926-1975; (314); (2085); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3419); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2169); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1900; (111); (459); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (459); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3104); **Calabria:** 1951-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3358); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-2000; (188); (2249).

925. - ***Kuchleria menadiara*** **(Thierry-Mieg, 1893)**

Nota - È citata per la **Sardegna:** (1260); tutti gli esemplari di **Sardegna** nella collezione di Bytinski-Salz (Hamburg) sono risultati essere femmine di *M. herbaria* (3240).

Sicilia: 1976-2000; (3466).

926. - **(?)** ***Holoterpna pruinosata*** **(Staudinger, 1898)**

Nota - È citata solo per **Venezia Giulia:** dintorni di Trieste (970), (1060); probabilmente introdotta accidentalmente (3023).

927. - ***Thalera fimbrialis*** **(Scopoli, 1763)** (= *thymiaria* Linnaeus, 1767; *bupleuraria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Veneto:** Santa Croce Lago (BL) 7.VII.1974. **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 11.VII.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 11.VII.1974, 1.VII.1975, 1.VI.1976, 13.VI.1977, 2.VII.1979 (GRL). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1831); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (161); (3433); **Friuli:** (1951-1975); (1943; **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1951-2005; (19); (3428); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005;

(344); (3390); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (99); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (2868); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (2967).

928. - ***Hemistola chrysoprasaria*** **(Esper, 1795)** (= *biliosata* auct. nec de Villers, 1789; *vernaria* Hübner, 1789)

Phalaena Geometra chrysoprasaria è descritta su esemplari di Germania e della **Toscana**: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 5 (1): 37 (1795), ibd. tav. 5, fig. 1 (1801)) (9*); (3174).

Nota - Le citazioni di *H. chrysoprasaria, H. immaculata* e *H. vernaria* per **Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria** e **Sicilia** vanno riferite a *H. siciliana*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 19.VII.1985 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 5.VI.1968 (GLL, PRN). **Trentino:** Levico 26.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.VI.1976, 12.VI.1977, 17.VI.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (9*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1975; (114); (2041).

929. - ***Hemistola siciliana*** **Prout, 1935**

Hemistola chrysoprasaria ssp. *siciliana* è descritta su esemplari della **Sicilia:** Taormina, Ficuzza, Busambra, ecc. (in Seitz, The Macrolepidoptera of the World, 4 (suppl.): 19) (1274).

Nuovo dato - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Umbria: 1976-2000; (2169); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (3327); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3447); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; (99); (1350); **Puglia:** 1976-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2005; (111); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (2148).

930. - ***Jodis lactearia*** **(Linnaeus, 1758)** (= *aeruginaria* Denis &

Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**; non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovo dato - **Lazio:** Monti Reatini, 1100 m, 1.VII.1978 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1850-1900; 1926-1950; 1976-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2169); (3052); **Abruzzo:** (1801-1850); 1976-2000; (111); (2422°); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 1801-1850; 2001-2005; (99); (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** (1801-1850); 2001-2005; (111); (3347); **Sardegna:** (1976-2000); (2929); (3240).

931. - ***Jodis putata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *putataria* Linnaeus, 1767)

Nota - Le citazioni per il **Piemonte** sono da confermare. Le citazioni per l'**Emilia** e la **Toscana:** sono probabilmente errori di identificazione, in quanto nelle collezioni Fiori e Stefanelli esistono solo esemplari di *J. lactearia* (3237). La segnalazione di *putataria* per l'**Emilia**: (269) è da riferire a *Chlorissa* sp. (Flamigni in litt.).

Piemonte: 1751-1800; (1801-1850); (20); (114); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3240); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1943); **Friuli:** 1901-1950; (1425); (3237); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

932. - ***Eucrostes indigenata*** **(de Villers, 1789)** (= *virginalis* O.G. Costa, 1841)

Phalaena virginalis è descritta su esemplari del **Regno di Napoli** (93*), (3174).

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Sardegna:** Musei (CA) 2.X.1972 (HRT, PRN).

Liguria: 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1951-1975; 2001-2005; (2968); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1926-1950; (1285); (1350); **Puglia:** 1801-1850; 1976-2000; (111); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3104); **Calabria:** 1951-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (3231); **Sardegna:** 1801-1900; 1926-2000; (114); (2249).

933. - ***Xenochlorodes olympiaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)** (=

beryllaria Mann, 1853; *aureliaria* Millière, 1864)

Nemoria aureliaria è descritta su esemplari dell'**Italia meridionale** (150*); (3174).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) E.VII-E.VIII.1965/68. **Lazio:** Lido di Roma V.1963 (DBR, PRN).

Veneto: 1976-2005; (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); **Liguria:** 1951-2000; (1693); (3183); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2000; (518); (3237); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (314); (2175); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1926-1950); (1388); **Campania:** 1926-1950; (1183); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (388); (2967); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (1476).

934. - **(-) *Anthometra plumularia* Boisduval, 1840)**

Nota - La citazione per la **Campania:** (459) non è attendibile.

935. - ***Emmiltis pygmaearia* (Hübner, 1809)** (= *minutaria* Fabricius, 1781)

Phalaena minutaria è descritta su esemplari di **Italia** (11*); (3174).

Nota - La citazione generica per la **Basilicata:** (1493) attende conferma. Esiste un maschio etichettato **Sicilia** nello Zoological Institute, Academy of Sciences, St. Petersburg; probabilmente errore di etichettatura (3376).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (3376); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); **Veneto:** 1851-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; (114); (329); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1801-1850; 1976-2000; (109); (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (2169); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (344); (3376); **Molise:** 1976-2005; (3260); (3403); **Puglia:** 1951-1975; (1538). **Basilicata:** (1951-1975); (1493).

936. - **(-) *Cleta ramosaria* (de Villers, 1789)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte**: (20), la **Toscana:** (112), le **Marche:** (385) e la **Sardegna:** (448) non sono attendibili; manca in **Italia** (3376).

937. - ***Cleta filacearia* (Herrich-Schäffer, 1847)**

Marche: 1951-1975; (2144); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-1975; (314); (2143); **Calabria:** 1951-2000; (1565); (3327).

938. - ***Idaea serpentata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *similata* Thunberg, 1784; *perochraria* Fischer von Röslerstamm, 1836)

Nota - Le citazioni per l'**Emilia** e la **Toscana** sono da riferire a *I. ochrata* o altra specie (3429). Le citazioni per il **Lazio** e la **Sicilia** sono inattendibili (3072).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2000; (3421); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1943); **Alto Adige:** 1851-1950; (239); (2770); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (3072); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

939. - **(-)** ***Idaea luteolaria*** **(Constant, 1863)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte:** (797) e la **Lombardia:** (368) sono dovute a errori di identificazione.

940. - ***Idaea aureolaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *trilineata* Scopoli, 1772)

Nota - È citata per la **Calabria:** Fossiata (2195); l'unico esemplare della Fossiata è stato esaminato ed è risultato essere *Cleta filacearia* (3327).

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime, Monte Moro, 1730 m, 3.VII.1983. **Alto Adige:** Resia, 1500 m, 10.VII.1975. **Abruzzo:** Ovindoli (AQ), 1400 m, 9.VII.1984 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2968); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2000; (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-1950; (1053); (1184); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (812); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3072); **Toscana:** 1801-1900; (112); (344); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2169); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2169).

941. - ***Idaea flaveolaria*** **(Hübner, 1809)** (= *brunnearia* Fabricius, 1796 nec de Villers, 1789)

Phalaena brunnearia è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Nota - La citazione per le **Marche** è da confermare (3376).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3072); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3072); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (2029); **Toscana:** 1976-2005; (3321); **Marche:** 1951-1975; (2085).

942. - ***Idaea muricata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *auroraria* Borkhausen, 1794, nec Hübner, 1787)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 13.VII.1974 (GRL). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3072); **Piemonte:** 1751-1800; (1851-1900); 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (269); (3072); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3462); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (72); (2868); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1976-2000; (72).

943. - ***Idaea determinata*** **(Staudinger, 1876)**

Acidalia determinata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Palermo, Valdesi (grosso vigneto presso Mondello) (Entomologische Zeitung, Stettin, 37: 141) (225).

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna:** (2980); da confermare.

Basilicata: 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (225); (2148).

944. - **(?)** ***Idaea litigiosaria*** **(Boisduval, 1840)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte, Lombardia, Liguria** ed **Emilia** sono da riferire ad altre specie (3072). Le citazioni per la **Toscana,** le **Marche** e il **Lazio** sono da riferire a *I. rufaria* e *I. straminata*, quelle per la **Basilicata,** la **Calabria** e la **Sicilia** a *I. mutilata* (3376). La citazione generica per la **Sardegna** attende conferma.

Sardegna; (1801-1850); (114); (2929).

945. - ***Idaea mutilata*** **(Staudinger, 1876)** (= *litigiosaria* sensu auct. nec Boisduval, 1840)

Acidalia mutilata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Palermo, Valdesi (grosso vigneto presso Mondello) (Entomologische Zeitung, Stettin, 37: 140) (225).

Basilicata: 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1901-1925; (1047); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (148); (3083).

946. - **(-)** ***Idaea sardoniata*** **(Homberg, 1912)**

Nota - È citata dubitativamente per l'**Italia settentrionale** (2929), (2980); non è presente in Italia.

947. - ***Idaea mediaria*** **(Hübner, 1819)**

Nota - Le citazioni per **Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia** e **Arcipelago siciliano** vanno riferite a *I. leipnitzi* (3376). La citazione generica per il **Piemonte** è dubbia.

Piemonte: (1851-1900); (188); **Liguria:** 1801-1850; (1851-1900); 1976-2000; (114); (3384 bis); **Toscana:** 2001-2005; (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3275); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (1476); (3327).

948. - ***Idaea leipnitzi*** **Hausmann, 2004**

Nuovi dati - **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000. **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR).

Molise: 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2527); **Puglia:** 1976-2000; (2527); (3376); **Basilicata:** 1976-2000; (2527); (3376); **Calabria:** 1976-2000; (2527); (3376); **Sicilia:** 1976-2005; (3083); (3376); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231).

949. - ***Idaea rufaria*** **(Hübner, 1799)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (2780); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (2211); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (2227); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (3072); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1781); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3402); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (1565); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (196); (2967).

950. - ***Idaea consanguinaria*** **(Lederer, 1853)** (= *faillata* Fuchs, 1901; *turatii* Sohn-Rethel, 1929)

Acidalia faillata è descritta su esemplari di **Sicilia** (441). *Ptychopoda turatii* è desritta su individui dell'**Abruzzo:** Gran Sasso e del **Lazio** (1139).

Nuovi dati - **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 17.VII.1985 (SNN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT), Fossa Bradano 28.VI.1993 (PRN).

Emilia: 1976-2000; (3072); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3310); **Umbria:** 1926-1950; (2143); (3376); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1950; 1976-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (3324); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-1975; (1565); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (1047); (2868); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (343); (3083).

951. - ***Idaea sericeata*** **(Hübner, 1813)**

Nuovo dato - **Sardegna:** Belvì (NU) 2.VII.1975 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (797); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2145); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3435); **Calabria:** 1901-1925; 2001-2005; (459); (3401); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1975; (114); (3376).

952. - ***Idaea macilentaria*** **(Herrich-Schäffer, 1847)** (= *antiquaria* (Herrich-Schäffer, 1847)

Nota - Le citazioni per l'**Alto Adige** sono dubbie. La citazione di *I. macilentaria* f. *hornigaria* Stgr. per il **Friuli:** (1528) va riportata a *I. typicata*. La citazione di *I. antiquaria* per la **Calabria:** (2868), basata su una segnalazione di Zangheri, è errata, poichè Zangheri cita *I. pallidata*.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (797); (3378).

953. - ***Idaea ochrata*** **(Scopoli, 1763)** (= *corrigata* Fabricius, 1781; *ochraria* Fischer von Rösslerstamm, 1836)

Phalaena corrigata è descritta su esemplari di **Italia** (11*); (3174).

Nuovi dati - **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 11.VII.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.VI.1976 (GRL). **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001. **Puglia:** Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1976-2005; (24); (3429); **Arcipelago toscano:** 1951-2005; (1904); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1951-2005; (2169); (3462); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1976-2000; (2868); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (3376); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-2000; (109); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-1975; (114); (1975).

954. - ***Idaea completa*** **(Staudinger,1892)**

Sicilia: 1976-2000; (3128); (3155); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226).

955. - ***Idaea rusticata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *vulpinaria* Herrich-Schäffer, 1852)

Nuovi dati - **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.VI.1993 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR). **Sicilia:** San Gregorio (ME) 0-2 m 8.V.1997 (VTL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (218); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3433); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (466); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1851-2000; (1010); (2948); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (99); (2868); **Puglia:** 1851-1900; 1951-2000; (459); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (1047); (2868); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (310); (3083); **Arcipelago siciliano**: 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2249).

956. - ***Idaea filicata* (Hübner, 1799)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 30.VIII.1965 (DBR, PRN). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 30.V, 13.VIII.1985 (SNN); Agerola (NA): loc. Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001; Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Fiume Noce 23.VI.1998; Rionero in Vulture: località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001, 25.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 11.V.1989, 25.V e 3.VI.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3421); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-

2000; (2169); **Marche:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (3044); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2169); (3435); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (109); (2868); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1951-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (1476).

957. - ***Idaea laevigata*** **(Scopoli, 1763)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Trecchina (PZ), Monte Sirino. **Calabria:** Cetraro (Hausmann in litt.).

Piemonte: (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (2227); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (268); (1787); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Emilia:** 1901-1925; (3072); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3310); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Lazio:** 1851-1900; 1926-1950; (344); (1085); **Abruzzo:** (1851-1900); (344); **Puglia:** 1976-2000; (3104); **Basilicata:** 1976-2005; (3104); **Calabria:** 2001-2005; (3376); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (2967); **Sardegna:** 1926-1950; (1476).

958. - ***Idaea efflorata*** **Zeller, 1849** (= *extarsaria* Herrich-Schäffer, 1852)

Idaea efflorata è descritta su esemplari della **Toscana:** Antignano, Posignano e Riparbella (Entomologische Zeitung, Stettin, 10 (5): 218, index) (112).

Nuovo dato: **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 10.IX.1987 (GRL).

Toscana: 1801-1900; 1976-2005; (112); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3376); **Campania:** 1901-1925; 1976-2000; (867); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (3467); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3128); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (1303); (3376).

959. - ***Idaea attenuaria*** **(Rambur, 1833)**

Puglia: 1976-2000; (2730); **Calabria:** 1976-2000; (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (343); (2148); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (2249).

960. - **(-)** ***Idaea incalcarata*** **(Chrétien, 1913)** (= *disjunctaria* Staudinger, 1870 nec de Laharpe, 1860)

Nota - La citazione di *I. disjunctaria* per la **Sardegna:** (1476) è errata, va riferita a *I. attenuaria* (2676).

961. - ***Idaea typicata*** **(Guenée, 1858)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3421); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2990); **Trentino:** 1901-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (448); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3376); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (893); (3072); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1951-2005; (2730); (3310); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-1950; (1085); (3376); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1231); (2429°); **Campania:** 1976-2000; (2730); **Puglia:** 1976-2000; (2730); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (506); (3376).

962. - **(-)** ***Idaea alyssumata*** **(Himminghoffen & Millière, 1871)**

Nota - Le citazioni generiche per l'**Italia centrale** e la **Sicilia:** (1752) non sono attendibili.

963. - ***Idaea moniliata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *omicata* Fabricius, 1794)

Phalaena omicata è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1976 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (3072); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1976-2005; (24); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-1975; (1538); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104).

964. - ***Idaea circuitaria*** **(Hübner, 1819)**

Geometra circuitaria è descritta su esemplari dell'**Abruzzo:** Monte Sirente (sintipi) (Sammlung Europäischer Schmetterlinge, 5 Geometrae (1): Tav. 97, fig. 499) (23*); (3376).

Nota - Le segnalazioni per l'**Arcipelago toscano**, la **Sicilia** e la **Sardegna** vanno riferite a *I. rainerii* (2847).

Piemonte: (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-

1975; (2014); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3376); **Toscana:** 1976-2000; (3237); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Lazio:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (2169); **Abruzzo:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (23*); (2169); **Puglia:** 1801-1850; 1976-2000; (712); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868).

965. - ***Idaea rainerii* Hausmann, 1994** (= *mimosaria* Herrich-Schäffer, 1856, nec Guenée, 1857)

Idaea rainerii è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo (olotipo); Busambra; Etna; Siracusa; Piana Albanesi, **Sardegna,** Tunisia, Algeria, Spagna meridionale (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreischer Entomologen, 46 (1/2): 50, figg. 3, 4, 8, 11, 12) (2847).

Arcipelago toscano: 1851-1925; (1044); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (2967); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (2967).

966. - ***Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859)**

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia:** (448), (1388), (2929), (2980); citazioni errate (3376).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3328); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2408).

967. - ***Idaea belemiata* (Millière, 1868)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (343), (2929), (2980), non presente nell'isola (3376).

Liguria: 2001-2005; (3314).

968. - ***Idaea elongaria* (Rambur, 1833)** (= *aridata* Zeller, 1847)

Idaea aridata è descritta su esemplari della **Sicilia;** Messina, il Castellaccio, Siracusa: Convento dei Cappuccini e del **Lazio:** Roma, Cisterna (109).

Nota - È citata per la **Romagna:** Calboli (2516), ma l'esemplare è in realtà *I. subsericeata* (3072).

Nuovi dati - **Puglia:** Tricase (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.V, 28.VI.1996 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3072); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3376); **Emilia:** 1976-2000; (3072); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (206); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2770); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** (1801-1850); 1976-2000; (109); (2169); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1901-1925; 1976-2000; (459); (2868); **Puglia:** 1976-

2000; (2868); (2924); **Basilicata:** 1901-1925; 1951-2000; (459); (2868); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2005; (459); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-2000; (109); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (2935); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (188); (3072).

969. - ***Idaea obsoletaria*** **(Rambur, 1833)**

Nuovo dato - **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (797); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (218); (1224); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3072); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (206); (3277); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2169); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3419); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** (1851-1900); 1976-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1976-2000; (2610); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (2610); (3104); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1975; (114); (1975).

970. - ***Idaea obliquaria*** **(Turati, 1913)**

Acidalia obliquaria è descritta su esemplari della **Sardegna**: Monte Chiesa (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3-4): 321) (781) & (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 25 (1): 17) (782).

Nota - È citata per la **Sicilia:** (1752), (1274), non è presente nell'isola (3376).

Toscana: 1976-2000; (3044); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1476).

971. - ***Idaea inquinata*** **(Scopoli, 1763)** (= *herbariata* Fabricius, 1798; *microsaria* Boisduval, 1840)

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; (260); (2990); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1038); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (161); (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (687); (3072); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2169);

Campania: 1901-1950; (2990); (1285); **Puglia:** 1976-2000; (2610); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2610); (3104); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1975; (97); (2786); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1476).

972. - ***Idaea dilutaria*** **(Hübner, 1799)** (= *holosericata* Duponchel, 1842)

Nuovo dato - **Basilicata:** Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (446); (3433); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (1060); (1694); **Liguria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (114); (3072); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (1885); (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1851-1925; (344); (817); **Campania:** 1901-1950; (811); (1350); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (1565); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 2001-2005; (343); (3376); **Sardegna:** 1901-1950; (792); (1476).

973. - ***Idaea fuscovenosa*** **(Goeze, 1781)** (= *interjectaria* sensu Herrich-Schäffer, 1847)

Nuovo dato - **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2957); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2795); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (2990); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (817); (2429°); **Campania:** 1976-2000; (2610); (2868); **Puglia:** 1951-1975; (1565); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (3104); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1340); (2844); **Sardegna:** (2001-2005); (3376).

974. - ***Idaea humiliata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *osseata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-

2000; (239); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (446); (2241); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2169); (2990); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (1565); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (357); (3358); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

975. - ***Idaea politaria*** **(Hübner, 1799)**

Nuovi dati -**Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), Grotticelle, 600 m, 9 e 25.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (2957); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (466); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2000; (269); (3072); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2175); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (867); (2868); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** (1851-1900); 1901-1950; (147); (3358); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (188); (2249).

976. - ***Idaea longaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Nuovo dato - **Sicilia:** Trapani: Salina Paceco 14.V.1999 (PRN).

Lazio: 1951-2000; (2143); (3044); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (346); (3376); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2786); **Sardegna:** (1851-1900); 1976-2000; (188); (3376); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

977. - ***Idaea manicaria*** **(Herrich-Schäffer, 1851)**

Sardegna: 1976-2000; (2676).

978. - ***Idaea vesubiata*** **(Millière, 1873)**

Nota - Le citazioni per **Valle d'Aosta:** (797), (2471) sono errate (3145).

Piemonte: (1851-1900); (448), (3376); **Liguria:** 1951-2000; (3183).

979. - ***Idaea consolidata*** **(Lederer, 1853)**

Nota - Gli esemplari di *A. consolidata* citati per la **Sardegna:** (711)

sono risultati essere di *A. virgularia* (781). La citazione per la **Sicilia** va confermata (3376).

Toscana: 1976-2000; (3237); **Lazio:** 1976-2000; (2730); **Puglia:** 1976-2000; (2730); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1851-1900; (387).

980. - ***Idaea seriata*** **(Schrank, 1802)** (= *virgularia* sensu Hübner, 1799; *incanaria* Hübner, 1799; *calcearia* Zeller, 1849 *cossurata* Millière, 1875)

Idaea incanata var. *australis* è descritta su esemplari della **Sicilia:** Messina, strada per Palermo, Siracusa: fiume Ciane, Siracusa, Catania e della **Campania**: Napoli (109). *Idaea calcearia* è descritta su esemplari della **Toscana:** Livorno, Antignano, Posignano (112), *Eupithecia cossurata* è descritta su esemplari dell'**Arcipelago siciliano:** Pantelleria (223).

Nota - *Idaea calcearia* è sin. di *canteneraria* Boisduval, 1840, ssp. di *I. seriata* (3376). La varietà *incanata* è sinonimo di *I. virgularia* Hb. (= *seriata* Schrank) (2617). La citazione di Fiori per l'**Emilia**: piano modenese e reggiano: (269) va imputata a un errore di determinazione (3329), La citazione di *Acidalia incanata* per la **Sicilia** in: (144), ripresa in: (343) e tutte le citazioni generiche successive, vanno riferite a *I. seriata*.

Nuovi dati - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.VI.1993 (PRN); Trecchina (PZ), 320 m, 23.VI.1998; Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (170); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2325); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3433); **Friuli:** 1851-1950; (174); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1976-2005; (24); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (109); (3303); **Arcipelago campano:** 1901-1925; 1951-1975; (783 bis); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (223); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (3376).

981. - **(-)** ***Idaea minuscularia*** **(Ribbe, 1912)**

Nota - Le citazioni per la **Puglia** e la **Basilicata:** (2868) vanno riferite a *I. seriata* (3104).

982. - ***Idaea albitorquata*** **(Püngeler, 1909)** (= *boeklini* Mentzer, 1990 partim)

Acidalia albitorquata è descritta su esemplari del Peloponneso; fra i paratipi anche individui della Sicilia: Ficuzza (612 bis)

Nota - È stata descritta *Idaea boeklini* su esemplari della **Sicilia**: Taormina (2617); in realtà i maschi sono di *I. albitorquata*, le femmine di *I. camparia* (2735). La citazione generica per la **Sardegna:** (1337) è molto dubbia.

Puglia: 1976-2000; (2527); (2730); **Basilicata:** 1976-2000; (2527); (2730); **Calabria:** 1951-1975; (2730); **Sicilia:** 1901-1950; (529); (2786).

983. - ***Idaea carvalhoi*** **Herbulot, 1979**

Liguria: 2001-2005; (3314).

984. - ***Idaea camparia*** **(Herrich-Schäffer, 1852)** (= *sodaliaria* Herrich-Schäffer, 1852; *boeklini* Mentzer, 1990 partim)

Nota - È citata per il **Tirolo meridionale** da Spuler e da alcuni collezionisti, sembra mancare nella regione (1038); assente in **Alto Adige:** (3376). La citazione per la **Romagna:** (1388) è probabilmente errata, in quanto non confermata dalle ricerche successive (3072). Un unico esemplare della collezione Verity catturato a Firenze e determinato come *I. camparia* è in realtà *I. dimidiata*; è possibile che anche la segnalazione di Vallombrosa (554) sia errata (3072). Le citazioni per il **Piemonte**, la **Toscana**, il **Lazio** e la **Campania** sono da confermare (3376).

Piemonte: 1901-1925; (797); (910); **Veneto:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1976-2000; (125); (218); **Toscana**: 1851-1900; (206); **Lazio:** 1901-1925; (807); **Campania:** 1926-1950; (1183); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-2000; (144); (3376).

985. - ***Idaea subsericeata*** **(Haworth, 1809)** (= *pinguedinata* Zeller, 1847; *asbestaria* Zeller, 1849)

Acidalia pinguedinata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Messina: Castellaccio e del **Lazio:** Cisterna (109). *Idaea asbestaria* è descritta su esemplari della **Toscana:** Antignano e Posignano (112)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 3.X.1965 (DBR, PRN). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1996 (TRG, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3239); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1572); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380);

Friuli: 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (2454); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2169); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3443); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-2005; (2230); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1976-2000; (109); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1950; (188); (1476).

986. - ***Idaea pallidata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Sicilia** è da confermare (3376). La citazione per la **Sardegna:** (114) non è attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (171); (2516); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (2014); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3072); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Romagna:** 1901-1925; (1010); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2516); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); **Calabria:** 1951-2000; (1733); (2610); **Sicilia:** 1851-1900; (310).

987. - ***Idaea sylvestraria*** **(Hübner, 1799)**

Nota - La segnalazione di Zangheri per la **Romagna** va riferita a *I. subsericeata* (2516). Le citazioni per **Umbria** e **Lazio** sono da riportare a *I. consanguinaria* (3376). Non rinvenuta in **Molise,** la citazione va riportata a *I. elongaria* (2991, errata corrige). La citazione generica per la **Calabria:** (156) non è attendibile. La citazione per la **Sardegna** va confermata (3376).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (239); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (446); (3433); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3072); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1976-2005; (3072); (3329) **Abruzzo:** 1976-2000; (3072); **Sardegna:** 1926-1950; (1476); (2929).

988. - ***Idaea dimidiata*** **(Hufnagel, 1767)**

Nuovi dati - **Campania:** Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (1m) (SNN).

Basilicata: Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 26-31.V.1993 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000, 4.IV.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1951-1975; (1007); (1528); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (3106); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (687); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (3072); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3128); **Sardegna:** 1901-1950; 1976-2000; (782); (2421).

989. - ***Idaea trigeminata*** **(Haworth, 1809)** (= *reversata* Treitschke, 1828)

Nota - La presenza in **Alto Adige è** da accertare, in quanto la citazione Taufers in (273) è errata (1038). I dati per la **Calabria**: Saracena 30.VI, Fossiata 7.VII.1979 (2195), riportati in (2868), sono erroneamente stati attribuiti a questa specie, in realtà riguardano il Nottuide *Abrostola trigemina* Werneburg.

Nuovo dato - **Basilicata:** Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Piemonte: 1976-2005; (3378); (3421); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** (1926-1950); (1388); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (2795); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (2362); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1004); (3072); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1976-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-1975; (1538); (1658); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (328); (2844); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

990. - ***Idaea biselata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *bisetata* auct.)

Nota - Non rinvenuta in **Molise**; il dato riportato va riferito a *I. politaria* (2991, errata corrige). La citazione per la **Sardegna:** (331) è molto

dubbia.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (1681); (3433); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (501); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3072); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Calabria:** 2001-2005; (3376).

991. - ***Idaea fractilineata*** **(Zeller, 1847)**

Acidalia fractilineata è descritta su due esemplari della **Sicilia**: Catania, località Vieranni e Etna, bassa regione dei boschi (Isis, 40 (7): 518) (109).

Puglia: 1976-2000; (2730); **Calabria:** 1901-1925; (1047); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (3226).

992. - **(-)** ***Idaea inclinata*** **(Lederer, 1855)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (346) è da riferire a *I. fractilineata*.

993. - **(-)** ***Idaea cervantaria*** **(Millière, 1869)**

Nota - Nello ZSM è presente una femmina etichettata "**Sardegna:**", probabile scambio di etichetta (3376).

994. - ***Idaea contiguaria*** **(Hübner, 1799)** (= *eburnata* Wocke, 1850)

Nota - Le citazioni per le **Marche:** (385), (2085) e la **Campania:** (1350) probabilmente sono da riferire a *I. consolidata* (3376). È riportata con dubbio per la **Sardegna:** (218), citazione certamente errata.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (157); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Liguria:** (1801-1850); (114).

995. - ***Idaea infirmaria*** **(Rambur, 1833)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.VII.1975, 20.VII.1978 (GRL). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999. **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998. **Calabria:** Sila Grande, Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Liguria: 1851-1900; 1951-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3072); **Toscana:** 1951-2005; (2051); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (3268);

Abruzzo: 1976-2000; (3072); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2610); (3072); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (3104); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (1047); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (343); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (1476).

996. - ***Idaea rhodogrammaria*** **(Püngeler, 1913)**

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2805); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (1476); (3376).

997. - ***Idaea ostrinaria*** **(Hübner, 1813)**

Nuovi dati - **Liguria:** Andora (SV), 300 m, 18.VI.1987. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19 e 29.VI.1975, 10.VII.1980 (GRL). **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Sardegna:** Belvì (NU) 2 e 10.VII.1975 (PRN).

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Liguria:** 1851-1925; 1976-2000; (314); (3183); **Toscana:** 1951-2000; (2169); (3428); **Arcipelago toscano:** 1951-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (3104); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (144); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1901-2000; (2990); (3376).

998. - ***Idaea eugeniata*** **(Dardoin & Millière, 1870)**

Trentino: 1951-1975; (2787).

999. - ***Idaea distinctaria*** **(Boisduval, 1840)** (= *ruficostata* Zeller, 1847)

Idaea ruficostata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa, Convento dei Cappuccini (109).

Piemonte: 1901-1925; (797); (910); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (2490); (2990); **Toscana:** 1801-1900; 2001-2005; (112); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Marche:** 1851-1925; (385); (2490); **Lazio:** 1801-1900; 1926-2000; (112); (2490); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (2490); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1976-2005; (2610); (3439); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (2610); (3104); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (2249); (2578).

1000. - ***Idaea predotaria*** **(Hartig, 1951)** (= *griseanova* Rezbanyai-Reser, 1987)

Sterrha incarnaria ssp. *predotaria* è descritta su esemplari della Sardegna: Teulada e Porto Santoru (in Hartig & Amsel, Fragmenta Entomologica, Roma, 1 (1): 38) (1476).

Liguria: 1976-2000; (2804); **Toscana:** 2001-2005; (3277); **Lazio:** 1926-2000; (2578); (3044); **Sardegna:** 1926-2000; (1476); (2578).

1001. - ***Idaea nitidata*** **(Herrich-Schäffer, 1861)**

Piemonte: (2001-2005); (3376); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (1787); (2990); **Trentino:** 1926-1975; (1438); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (2990); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650).

1002. - ***Idaea emarginata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per **Toscana, Marche, Abruzzo, Sicilia** sono poco attendibili; quelle per la **Sardegna** sono errate, non è presente nell'isola (3376).

Piemonte: 1751-1800; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (1787); (2362); **Alto Adige:** 1851-1925; (812); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; (268); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1901-1925; 2001-2005; (2990); (3301).

1003. - ***Idaea rubraria*** **(Staudinger, 1901)** (= *bilinearia* Fuchs, 1889)

Nuovo dato - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT), località Ponte Cagnolino 16-20.IX.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (797); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 1976-2005; (3072); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2948); **Toscana:** 1951-2005; (2968); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1951-1975; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-2005; (1085); (3419); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); (3324); **Campania:** 1976-2000; (2868); (3104); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (753); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (459); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (343); (3083); **Sardegna:** 1976-2000; (2249).

1004. - ***Idaea aversata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 7.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 1-15.VIII.1967 (f. remutata L.) (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 900 m 21.VII.1975, 2.VII.1983; Val Bognanco (VB) 20.VI.1972, 3.VII.1980. **Friuli:** Taipana (UD), 500 m, 30.VI.1987 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001; Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9 e 25.VII.2001,

25.IX.2001. **Calabria:** Sila Grande, Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1951-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (807); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (170); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3433); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; x 1976-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3462); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1976-2005; (109); (2868); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2005; (459); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (459); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (196); (2844); **Sardegna:** 1901-1950; (792); (1476).

1005. - ***Idaea degeneraria*** **(Hübner, 1799)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 27.V.1969 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 3.X.1965 (f. meridiaria Mill.), 15.VI.1969 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 21.IX.1984 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001; Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001, 25.IX.2001. **Calabria:** Sila Grande, Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 3.V, 24.VIII.1986, 28.V.1988 (PRT, PRN). **Sardegna:** Musei (CA) 8.X.1972; Belvì (NU) 7.X.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-1975; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1950; 1976-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3390); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (109); (2868); **Puglia:** 1951-2005; (2230); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3083); **Arcipelago**

siciliano: 1851-1900; 1976-2000; (223); (3226); **Sardegna:** 1901-2000; (753); (2249).

1006. - ***Idaea straminata*** **(Borkhausen, 1794)** (= *inornata* Haworth, 1809)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 9.VII.1980 (GRL). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 17.VII.1985 (SNN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Sardegna:** Belvì (NU) 6.X.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1851-1950; 1976-2005; (747); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (366); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1851-1900; (174); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (893); (3072); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** (1901-1925); 1976-2000; (459); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2868); **Calabria:** 1851-1925; 1976-2000; (459); (2868); **Sicilia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (343); (2844); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (1976).

1007. - ***Idaea deversaria*** **Herrich-Schäffer, 1847** (= *maritimaria* Bruand, 1846; *italicata* Millière, 1885)

Acidalia italicata è descritta su esemplari sfarfallati da larve raccolte in **Piemonte**: terme di Acqui (322).

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 20.VI.1977 (GRL). **Puglia:** Gravina di Laterza (TA) 4.VI.1992 (NRD); Bosco delle Pianelle (TA) 17.VI.1999. **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Gambarie (RC) 16.VII.1984 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2005; (322); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (171); (3388); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1926-1975; (2990); (3040); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3072); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3376); **Abruzzo:** 1951-2005; (2169); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:**

1951-2005; (1565); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3083); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

1008. - **(-)** ***Idaea squalidaria*** **(Staudinger, 1882)**

Nota - È riportata come presente in **Italia meridionale** (1752); citazione non attendibile.

1009. - ***Scopula immorata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Toscana:** (112), (206), probabilmente sono da riferire a *S. tessellaria* (3237). La citazione per la **Sicilia:** (2980) è da riferire a *S. tessellaria* (3376).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3328); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); (3328); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183).

1010. - ***Scopula tessellaria*** **(Boisduval, 1840)**

Strenia tessellaria è descritta su esemplari dell'**Italia settentrionale** (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 228) (88).

Nota - La citazione per la **Puglia:** (2672) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco 30.VI.1980 (GRL).

Piemonte: 1851-1925; 1976-2005; (114 bis); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; (3237); **Emilia:** 1901-1925; (515); (3376); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3428); **Marche:** 1976-2000; (2516); **Lazio:** 2001-2005; (3327); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1801-1850; (102); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2610); **Sicilia:** 1851-1900; (340).

1011. - ***Scopula corrivalaria*** **(Kretschmar, 1862)**

Nota - La citazione per il **Lazio:** Roma, Tor Carbone (2143) è errata, da riferire a *S. minorata* (3376).

Piemonte: 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Veneto:** 1951-2000; (3433); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Emilia:** 1926-1950; (3237); **Romagna:** 1976-2000; (2829).

1012. - ***Scopula caricaria*** **(Reutti, 1853)** (= *virginalis* Fourcroy, 1785; *immaculataria* de Villers, 1789)

Nota - Le citazioni per le **Marche**: (2085), (2169) sono da riferire a *Cabera exanthemata* (3376).

Piemonte: 1976-2005; (3378); **Lombardia:** 1901-1975; (1238); (1787); **Trentino:** 1926-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3237); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1951-1975; (3183); **Emilia:** 1901-2000; (544); (1781); **Toscana:** 1901-1925; 2001-2005; (517); (3462).

1013. - ***Scopula nemoraria*** **(Hübner, 1799)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è dovuta a errata identificazione (3376).

Piemonte (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (1787); (2362); **Trentino:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1801-1850); (114).

1014. - ***Scopula umbelaria*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (2085), è dubbia, va confermata (3376).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 2001-2005; (1388); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (218); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; (446); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

1015. - ***Scopula nigropunctata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *tristriaria* Fabricius, 1794; *strigillaria* Hübner sensu auct.)

Phalaena tristriaria è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Nota - La citazione di Bertoloni (come *Ennomos strigilata* Tr.) per Bologna: (110) va riferita a *Idaea maritimaria* (= *Idaea deversaria*) (3329). Le citazioni generiche per la **Sicilia** sono dubbie (3376).

Nuovo dato - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-28.VIII.1980 (leg. Berio. PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (171); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (268); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3301); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1801-1900; 1951-2000; (109); (2169); **Molise:** 1976-2005; (3260); (3453); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 2001-2005; (109); (3453); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3104); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** (1851-1900); (343): (2929).

1016. - ***Scopula virgulata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); **Veneto:** 1951-1975; (1681); (1943); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (932); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3183); **Toscana:** 1951-1975; (2051); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3324).

1017. - ***Scopula ornata*** **(Scopoli, 1763)** (= *ornataria* Hübner, 1799)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta A.VIII.1967 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) A.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 26.VI.1973, 11.VII.1974, 15.VII.1979 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 20.X.1988 (RTN, PRN). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; 1976-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1901-1950; (1007); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3040); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1926-2000; (1285); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (114); (3376).

1018. - ***Scopula decorata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *violata* Thunberg, 1784; *congruata* Zeller, 1847)

Idaea congruata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa, Messina: strada per Palermo (109).

Nota - Le citazioni di *S. decorata* per la **Sardegna** vanno riferite a *S. honestata* (3376).

Nuovi dati - **Puglia:** Mottola 9.V.1995 (PRN). **Sicilia:** Madonie: Portella Colla 1450 m 31.V.1998 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171);

(2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1951-1975; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3329); **Romagna:** 2001-2005; (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (112); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1926-2000; (1053); (2169); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (2169); **Puglia:** 1951-2000; (2868); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** (1901-1925); 1951-2000; (459); (2868); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (2986).

1019. - ***Scopula honestata*** **(Mabille, 1869)**

Toscana: 1951-1975; (3376); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (3376).

1020. - ***Scopula submutata*** **(Treitschke, 1828)** (= *gianellaria* Turati, 1905)

Acidalia gianellaria è descritta su esemplari della **Valle d'Aosta:** Donnaz (515).

Nuovo dato - **Alto Adige:** Vingschau 3.VI.1929 (AST, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (515); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2000; (1502); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (840); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2347); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-2005; (807); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Puglia:** 1976-2005; (2672); (3439); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3376); **Calabria:** 1951-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1950; (144); (3358).

1021. - ***Scopula vigilata*** **(Prout, 1913)**

Acidalia submutata vigilata è descritta su esemplari della **Campania:** Isola di Capri e Golfo di Salerno, della **Sicilia** e della Siria (in Seitz: The Macrolepidoptera of the World, 4: 64) (753).

Lazio: 1901-1950; (1139); (2169); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3260); **Campania:** 1926-1950; (1139); **Arcipelago campano:** 1901-1950; (753); (1139); **Puglia:** 1951-2000; (2868); (3104); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (3104); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (2610); (3347); **Sicilia:** 1901-2000; (753); (2967).

1022. - ***Scopula rubiginata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *rubricata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per la **Sardegna:** (318); assente nell'isola (3376).

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 18-25.VIII.1980 (BER, PRN). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 19.VII.1973 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 1-15.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1975, 17.VII.1978, 1.VI e 18.IX.1982, 13.VII.1984 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2000; (17*); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (1943); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (893); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3044); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (72); (2868); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-1975; (72); (1565); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (2990); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; (144).

1023. - **(-)** ***Scopula ochraceata*** **(Staudinger, 1901)**

Nota - Le citazioni di *S. rubiginata ochraceata* per l'**Alto Adige:** (1024) e la **Venezia Giulia:** (1060), vanno riferite a *S. rubiginata*.

1024. - ***Scopula turbidaria*** **(Hübner, 1819)**

Nota - Le citazioni per **Emilia, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Arcipelago siciliano** e **Sardegna** vanno riferite a *S. turbulentaria* (3376). La citazione generica per la **Lombardia** è molto dubbia.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3183).

1025. - ***Scopula turbulentaria*** **(Staudinger, 1970)**

Emilia: 1901-1925; (629); **Lazio:** 1851-1900; 1926-1950; 2001-2005; (344); (3419); **Campania:** 1976-2000; (3168); **Puglia:** 1976-2000; (2527); **Basilicata:** 1976-2000; (2527); (3104); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3469); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (147); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2990); (3231); **Sardegna:** (1851-1900); 1951-1975; (188); (1975).

1026. - ***Scopula decolor*** **(Staudinger, 1897)**

Nota - È presente nella collezione Turati fra gli esemplari di questa specie uno spillo con il cartellino: Benaco (**Lombardia**); è probabile che

la sua collocazione sia errata (2990).

Basilicata: 1976-2000; (2730); (3104); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (3128); (3358); **Sardegna:** 1976-2000; (2676).

1027. - ***Scopula scalercii* Hausmann, 2003**

Scopula scalercii è descritta su esemplari di **Puglia:** Gravina (BA) (olotipo femmina), Gravina di Riggio (TA), **Abruzzo:** Sulmona e **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT), località Fossa Bradano 150 m (Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 113 (11): 324, fig. 9, 20, 23) (3334).

Nuovo dato - **Puglia:** Gravina di Laterza (TA) 4.VI.1992 (PRN).

Abruzzo: 1851-1925; (344); (3334); **Puglia:** 1976-2000; (2730); (3334); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); (3334).

1028. - **(-) *Scopula beckeraria* (Lederer, 1853)**

Nota - Le segnalazioni di *S. beckeraria* per **Abruzzo, Puglia** e **Basilicata,** vanno riportate a *S. scalercii* (3376).

1029. - ***Scopula incanata* (Linnaeus, 1758)** (= *adjunctaria* Boisduval, 1840)

Acidalia adjunctaria è descritta su esemplari della **Lombardia:** Alpi (88).

Nota - La citazione di *Acidalia incanata* per la **Sicilia** in: (44), ripresa in: (343) e tutte le citazioni generiche successive, vanno riferite a *I. seriata*; *S. incanata* non è presente in **Sicilia**.

Nuovo dato - **Piemonte:** Frabosa (CN) 20.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1851-1925; 1951-2000; (427); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1801-1850); 1851-1925; 1901-1925; 1951-2000; (88); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (244); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (269); (2990); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1900; 1976-2005; (24); (3321); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2169); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (1684); (2169); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3260).

1030. - ***Scopula marginepunctata* (Goeze, 1781)** (= *immutaria* auct.)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.IV, 20.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 21.VII.1975, 21.IX.1976 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 11-15.VIII.1983 (SNN). **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 25.V.1995 (SCL). **Sardegna:** Belvì (NU) 7.X.1975 (HRT,

PRN).

Valle d'Aosta: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (1851-1925); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (410); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (2990); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); **Umbria:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (2169); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3443); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3367); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (833); (3347); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3083); **Sardegna:** 1901-1975; (792); (2249).

1031. - **(-)** ***Scopula luridata*** **(Zeller, 1847)**

Nota - Le citazioni per **Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige** e **Venezia Giulia** vanno riferite a *Glossotrophia confinaria*; quelle per **Emilia, Romagna, Marche, Campania** e **Sicilia** a *G. alba* (2788). La citazione di *S. luridata* per la **Sardegna:** (781) va riferita a *G. asellaria*.

1032. - ***Scopula imitaria*** **(Hübner, 1799)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 15.VI.1965, 31.IV.1967, 5.VIII, 3.X.1975 (DBR, PRN). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 12.VI, 13.VIII.1985; Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001. **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 4.VI.1992; Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001; Monte Vulture (PZ), 1000 m, 2.V.2001. **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 2.VI.1995; Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sicilia:** San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1038); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (1885); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2169); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883);

Lazio: 1801-2005; (109); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1926-2000; (1231); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (109); (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1901-1950; 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; 1976-2000; (2786); (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2421).

1033. - ***Scopula immutata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per l'**Abruzzo:** (344) e la **Sicilia:** (109), (126), (144), sono dubbie, da confermare (3376).

Valle d'Aosta: 1976-2005; (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (3433); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (1060); (650); **Emilia:** 1926-2005; (1749); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2829); **Toscana:** 1751-1925; (19); (517); **Lazio:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (2143).

1034. - ***Scopula ternata*** **Schrank, 1802** (= *fumata* Stephens, 1831; *commutaria* Boisduval, 1840)

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (1951-1975); (1943); (2362); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (2770); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

1035. - ***Scopula floslactata*** **(Haworth, 1809)** (= *remutaria* Hübner, 1799; *lactata* Haworth, 1809; *sublactata* Haworth, 1809)

Nota - È citata per l'**Emilia:** (269) e la **Toscana:** (206); probabile errata identificazione (3237).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte**: (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (410); (1425); **Liguria:** (1801-1850); (114).

1036. - ***Scopula subpunctaria*** **(Herrich-Schäffer, 1847)** (= *punctata* Scopoli, 1763)

Nota - La citazione per il **Lazio** è dubbia (3376).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2000; (188); (2957); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (2227); catturata dopo il 1970 (2973);

Veneto: 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (3376); **Liguria:** 1951-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (687); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3310); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1925-1975; (2169).

1037. - ***Scopula emutaria*** **(Hübner, 1809)**

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (164); (1787); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (269); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2169); **Molise:** 1976-2000; (3260); (3349); **Campania:** 1901-1925; (459); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** (1901-1925); 1976-2005; (459); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3083); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (1975).

1038. - **(-)** ***Scopula inustaria*** **(Herrich-Schäffer, 1847)**

Acidalia inustaria è descritta su esemplari dell'**Italia centrale** (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa als Text, Revision und Supplement zu Hübner, 3 (24): 24, Tav. 3, fig. 15) (100*); (3174).

Nota - *S. inustaria* è buona specie (3174), sinonimo di *S. minorata* (3376). Pertanto le citazioni per **Toscana, Marche, Lazio** e **Arcipelago laziale** vanno riferite a *S. minorata*.

1039. - ***Scopula minorata*** **(Boisduval, 1833)** (= *inustaria* Herrich-Schäffer, 1847; *ochroleucaria* Herrich-Schäffer, 1847)

Nuovi dati - **Puglia:** Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Sardegna:** Musei (CA) 9.X.1972 (HRT, PRN).

Trentino: 1901-1950; (1184); **Alto Adige:** 1926-1950; (1184); **Liguria:** (2001-2005); (3376); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2356); (2868); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (753); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2938); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (753); (3347); **Sicilia:** (1851-1900); 1901-2000; (346); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (3231); **Sardegna:** 1926-1975; (1476); (1975); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1040. - **(-)** ***Scopula remotata*** **(Guenée, 1858)**

Nota - *S. remotata* Guenée, descritta su esemplari dell'India settentrionale, secondo (874) è molto probabilmente sinonimo di *S. ochroleucata*. La citazione generica per l'**Italia settentrionale** (1752) e quelle per la **Sicilia** andrebbero pertanto riferite a *S. minorata* (= *ochroleucata*).

1041. - ***Glossotrophia confinaria*** **(Herrich-Schäffer, 1847)**

Nota - *G. confinaria* è presente solo in **Italia settentrionale** e ricompare come relitto glaciale in **Sicilia**; in **Italia centrale** e **meridionale** è sostituita da *G. alba* (2788). Negli **Appennini centrali** sono stati catturati alcuni esemplari con genitali di *G. confinaria*; potrebbero essere individui di *G. alba* con genitali aberranti oppure facenti parte di una popolazione di *G. alba* relitta (sic!) (3376).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1951-2005; (797); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (2788); (3377); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3064); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3183); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (2788); **Sardegna:** 1901-1950; (1260); (2990).

1042. - ***Glossotrophia alba*** **Hausmann, 1993** (= *romanaria* Dannehl, 1933)

Glossotrophia (*Glossotrophia*) *alba* Hausmann, nomen novum per *Acidalia luridata confinaria* ssp. *romanaria* Dannehl, 1933 (Atalanta, 24 (1/2): 284, figg. 7, 17, 31-35, 41, 41a) (2788). *Acidalia luridata confinaria* ssp. *romanaria* è descritta su esemplari delle formazioni calcaree dall'**Italia centrale**, dalla riva del mare ai monti, ad esempio in **Abruzzo:** Monte Sirente e Majella, fino 2000 m (Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a. M., 47 (10): 81) (1231).

Nota - La citazione per l'**Arcipelago toscano:** (1044) va riferita a *G. isabellaria*.

Nuovi dati - **Puglia:** San Paolo 8.VII.1969; gravina di Laterza (TA) 27.V.1976 (PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999. **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR); Rotonda (PZ) 23.VII.1979; Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.V.1993. **Sicilia:** Altavilla Milicia, Valle del Corvo 15.VIII.1978 (PRN).

Emilia: 1851-1925; 1976-2000; (269); (3237); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3237); (3310); **Umbria:** 1951-1975; (2618); (2788); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3237); **Lazio:** 1851-1900; 1926-1950; (2169); (3052); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1901-1950; (459); (1350); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (753); (2788); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:**

1951-2000; (2788); (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2610); (2788); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (360); (2786); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231).

1043. - **(-)** ***Glossotrophia rufomixtaria*** **(de Graslin, 1863)**

Nota - È riportata in (2618) come presente anche in **Italia**, ma non si hanno dati in merito (2788). Le citazioni per la **Valle d'Aosta:** (2471) e l'**Alto Adige:** (1053) sono errate. La citazione per l'**Umbria:** Orvieto (2618) va riferita a *G. alba* f. *mesocerata* Hausmann (2788).

1044. - ***Glossotrophia asellaria*** **(Herrich-Schäffer, 1847)**

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1851-1925; (363); (747); **Lombardia:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (2227); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** 1851-1925; 1976-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Lazio:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (150*); (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (344); (2788); **Sicilia:** 1926-1950; (1340); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1476).

1045. - ***Rhodostrophia vibicaria*** **(Clerck, 1759)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Cogne 8.VII.1978; Quart 25.VI.1976; Pré St. Didier 6.VII.1986 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (239); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2005; (110); (3329); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** 1751-1950; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-1975; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1901-1925; 1976-2000; (459); (2868); **Puglia:** 1801-1850; 1951-1975; (111); (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (811); (2868); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (310); (2967).

1046. - ***Rhodostrophia pudorata*** **(Fabricius, 1794)** (= *sicanaria* Zeller, 1852)

Geometra (Acidalia) sicanaria è descritta su esemplari di **Sicilia**: Siracusa (118).

Nota - La citazione per la **Toscana:** (830) è probabilmente dovuta a una errata identificazione. La citazione di *R. sicanaria* Z. per la

Toscana: (2968) è probabilmente dovuta a un errore di etichettatura. Le citazioni per la **Puglia:** (921) e la **Basilicata:** (459) sono sono da riferire a *R. calabra*.

Nuovo dato - **Sicilia:** San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Calabria: (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (188); (2868); **Sicilia:** 1851-2000; (118); (3128).

1047. - ***Rhodostrophia calabra* (Petagna, 1786)** (= *trifasciata* Cyrillus, 1787; *calabraria* Duponchel, 1845)

Phalaena calabra è descritta su esemplari della **Calabria**: Aspromonte, località Quinquefrondi (*recte* Cinquefrondi) (Specimen Insectorum Ulterioris Calabriae: 38, n. 199, Tav. 1, fig. 23) (13). *Phalaena trifasciata* è descritta su esemplari della **Campania**: agro Napoletano (15).

Nota - In (57) è citata erroneamente per la **Sardegna**, probabilmente indicata invece della **Sicilia.**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pondel 7.VII.1980 (GRL). **Piemonte:** Poggio di Carasco (Val Curone, AL) 11.VII.1981 (CMC, PRN). **Liguria:** Andora (SV) 20.VI.1987. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VI.1976, 20.VI.1985 (GRL). **Lazio:** Ostia lido 20.V.1963 (DBR, PRN). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 12.VI.1985 (SNN); Castel San Lorenzo (SA): Fontana dell'elice, 350 m, 6.VI.1998; Roccadaspide (SA): Tempone Zerrillo, 630 m, 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 8.VI.1997, 29.IV, 24.V.1998 (BLL/RSS).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (424); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (932); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2169); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2000; (15); (2868); **Puglia:** 1901-2000; (921); (2868); **Basilicata:** 1851-1925; 1951-2000; (459); (2868); **Calabria:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2000; (32); (2868); **Sicilia:** 1801-1900; 1976-2000; (109).

1048. - **(-)** ***Rhodostrophia tabidaria* (Zeller, 1847)**

Nota - La citazioni per **Basilicata:** di *R. calabraria* var. *sicanaria* ab. *tabidaria* Z. (459), va riferita a *R. calabra*. La citazione per la **Calabria:** (188) e quelle per la **Sicilia** vanno riferite a *R. sicanaria*.

1049. - **(-) *Timandra griseata* Petersen, 1902)** (= *amata* Linnaeus, 1761)

Nota - Le citazioni per l'**Italia** vanno riferite a *T. comae*, vicariante di *T. griseata* nell'Europa meridionale.

1050. - ***Timandra comae* Schmidt, 1931** (= *griseata* auct. nec Petersen, 1902; *amata* auct. nec Linnaeus, 1761; *vibicaria* Hufnagel, 1767; *angulata* Geoffroy, 1785)

Nuovi dati - **Piemonte:** Cuneo: San Rocco 14.VIII.1963 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 27.VI e 24.IX.1976, 25.VI.1977, 8.VII.1980 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 22.IX.1988; Roccadaspide (SA) 15.VII.1986; Serino (AV) 11.VIII.1984, 13.X.1984 (RTN, PRN). **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 6.VII.1997 (BLL/RSS).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1900); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3433); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (181); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Romagna:** (1901-1925); 1926-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); (2805); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1900; 1951-2000; (99); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (271); (3358); **Sardegna:** 1851-1975; (841); (2041).

1051. - ***Cyclophora pendularia* (Clerck, 1759)** (= *orbicularia* Hübner, 1799)

Nota - Le citazioni per la **Toscana:** (19), le **Marche:** (385) ed il **Lazio:** (344) sono dubbie; non presente in **Italia centrale** (3237).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (164); (807); **Trentino:** 1901-1950; (1064); (1184); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (188); (1572); **Veneto:** 1851-1950; (161); (2051); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1901-1950; (544); (3237).

1052. - ***Cyclophora albipunctata* (Hufnagel, 1767)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia:** (269) e le **Marche:** (385) sono dubbie, non essendo la specie stata più ritrovata in tali regioni (3147). Le

citazioni generiche per la **Toscana** e il **Lazio:** (1388), non sono attendibili; non presente in **Italia peninsulare** (3237).

Piemonte: (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (260); (2676); **Trentino:** 1926-1950; (1190); (1320); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1901-1975; (900); (1943).

1053. - ***Cyclophora albiocellaria*** **(Hübner, 1789)**

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 24.VI.1977, 16.VII.1978 (GRL).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1926-1975; (1106); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (314); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3083).

1054. - ***Cyclophora annularia*** **(Fabricius, 1775)** (= *annulata* Schulze, 1775; *omicronaria* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 2.VI.1982 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (181); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1976-2005; (3305); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-1975; (1538); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3104); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2967); (3083).

1055. - ***Cyclophora puppillaria*** **(Hübner, 1799)** (= *mirtalis* O.G. Costa, 1834; *calaritana* Turati, 1911)

Aspilates mirtalis è descritta su esemplari della **Campania:** Foro Volcani (cratere del Vesuvio) (72). *Ephyra calaritana* è descritta su esemplari della **Sardegna:** Cagliari: Bosco 7 Fratelli 800 m (711).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 16.IV, 1-30.VIII, 3-23.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 17.IV.1974, 6.V e 1.XI.1975, 24.IV.1976, 15.VI.1977 (GRL). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; Presicce Marina (LE)

6.VI.2000. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000; Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998. **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998; Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (424); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2227); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2005; (1681); (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3390); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (2429°); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1926-2000; (72); (2868); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1139); **Puglia:** 1951-2000; Gargano: (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (223); (3231); **Sardegna:** 1851-2000; (301); (2249); **Arcipelago sardo:** 1951-1975; (1910).

1056. - ***Cyclophora quercimontaria*** **(Bastelberger, 1897)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 1976-2000; (1274); (3421); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (2227); **Veneto:** 1926-1975; (1378); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1367); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1207); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1926-1950; 1976-2005; (1378); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2538); (2883); **Lazio:** 1926-2000; (1378); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

1057. - ***Cyclophora ruficiliaria*** **(Herrich-Schäffer, 1855)**

Nota - Dubbia la presenza in **Sardegna,** va confermata (3376).

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 24.IX.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2227); **Veneto:** 1951-1975; (2051); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (760); (1379); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (269); (3329); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1901-

1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3164); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1801-1900; 1976-2000; (1384); (2844); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1476).

1058. - ***Cyclophora porata*** **(Linnaeus, 1767)**

Phalaena (Geometra) porata è descritta su esemplari di **Italia** (Systema Naturae (ed. XII), 1 (2): 866, n. 233) (7*); (3376).

Nota - Secondo (17) sarebbe citata da Cyrillus, ma in (15) tale specie non compare.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 9.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 16.VII.1976, 19.IV.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2968); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (298); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (2990); (3104); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; (109); (1384); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1950; (114); (1260).

1059. - ***Cyclophora suppunctaria*** **(Zeller, 1847)**

Cabera suppunctaria è descritta su esemplari della **Campania**: un querceto presso il Lago di Agnano (NA) (Isis, 40 (7): 496) (109).

Nota - Erroneamente in (3376) il luogo tipico è situato in **Toscana**.

Nuovi dati - **Calabria:** Sila Grande, Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sardegna:** Belvì (NU) 30.V.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (1038); (2227); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (174); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (3376); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2005; (1207); (3329); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1801-1925;

1951-2000; (109); (3376); **Abruzzo:** 1976-2005; (2429°); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (109); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3083); **Sardegna:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (2041).

1060. - ***Cyclophora punctaria*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3421); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (3433); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (932); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1951-2005; (2169); (3462); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (109); (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3083); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1476).

1061. - ***Cyclophora linearia*** **(Hübner, 1799)** (= *luteolaria* de Villers, 1789; *trilinearia* Borkhausen, 1794)

Nota - In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra lutearia* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. lutearia* è descritta su esemplari di Bressiae sylvis (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p, 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).

È riportata come presente in **Sicilia** NE (3376); un unico esemplare di *C. linearia* di Zappulla presente nella collezione Mariani è in realtà *C. porata* (3358).

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-28.VIII.1984 (BER, PRN). **Toscana:** Bagni di Lucca (LU) 31.V.1982 (PRN). **Campania:** Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385);

(2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2169); (2990); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1062. - ***Rhodometra sacraria*** **(Linnaeus, 1767)** (= *fulvaria* Fabricius, 1794; *sanguinaria* Esper, 1801; *lividaria* O.G. Costa, 1848)

Phalaena fulvaria è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3376). *Phalaena Geometra sanguinaria* è descritta su esemplari della **Campania:** dintorni di Napoli, di **Toscana**: provincia di Firenze e di Francia meridionale (9*); (3376). *Aspilates lividaria* è descritta su esemplari della **Puglia:** dintorni di Lecce (111).

Nota - Erroneamente in (3376) è riportata Napoli come luogo tipico di *lividaria*.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.VIII-10.IX.1962, 29.VII.1964, 1-15.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 25.X.1986 (GRL). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 11-24.VIII, 10.IX, 12.X.1986, 19.X, 10.XI.1987, 14.V.1988; agro Gallipoli (LE) 14.VIII.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Sicilia:** San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL). **Sardegna:** Belvì (NU) 7.X.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1925-2000; (1089); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; (1038); (1089); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2426); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3329); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (9*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (2169); **Marche:** 1801-1900; 1951-2000; (109); (1885); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3443); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** (1901-1925); 1951-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1751-1850; 1901-1950; 1976-2000; (9*); (2868); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (2202 (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (330); (3231); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (114); (2421).

1063. - ***Casilda antophilaria*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni di *C. anthophilaria* per **Sicilia:** (1566) e **Sardegna:** (1303), (1274), vanno riferite a *C. consecraria*, sola specie presente

nelle isole (2929).

Marche: 1851-1900; (385); (3376); **Molise:** 1976-2000; (3349); **Puglia:** 1976-2000; (2737); (2868).

1064. - ***Casilda consecraria*** **(Staudinger, 1871)** (= *intermediaria* Turati, 1930)

Nota - La segnalazione di *C. anthophilaria* var. *consecraria* Rambur: foce Candelaro (**Puglia**) 1.VII.1980 (2730), riportata come *C. consecraria* in (2868) è in realtà un esemplare anomalo di *C. anthophilaria* (3104).

Sicilia: 1951-2000; (1566); (2737); **Sardegna:** 1926-1950; (1303); (1476).

1065. - **(-)** ***Ochodontia adustaria*** **(Fisher de Waldheim, 1840)**

Nota - In (2672) è stata attribuita per errore a *O. adustaria* una citazione per la **Calabria** che va riferita a *Ligdia adustaria* (Denis & Schiffermüller, 1775).

1066. - ***Lythria plumularia*** **(Freyer, 1831)**

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Gressoney 2200 m 15.VII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (164); (218); **Alto Adige:** 1901-1925; (566); (1184); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Umbria:** 1951-1975; (2085).

1067. - ***Lythria purpuraria*** **(Linnaeus, 1758)** (= *ruginaria* O.G. Costa, 1848)

Aspilates ruginaria è descritta su esemplari della **Puglia:** Terra d'Otranto, litorale adriatico (111).

Nota – La citazione generica per la **Liguria:** (114) attende conferma. La citazione per la **Sicilia**: (218) è dubbia; è riportata da Curò, secondo Mann, ma non figura presente nei lavori in cui sono elencate le specie raccolte da Mann in Sicilia.

Nuovi dati - **Piemonte:** Asti 1.VII.1983. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 4.VI.1972, 25.VI.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-1950; (164); (1279); **Trentino:** 1851-1900; 1951-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1820); **Veneto:** 1751-1975; (10); (1787); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (269); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1801-1900; 1951-1975; 2001-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1801-1850; 1976-2000; (109); (2169); **Marche:** 1851-1900; 1926-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (109); (2169); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Campania:** 1801-1950; (99);

(1408); **Puglia:** 1801-1850; 1926-2000; (111); (2868); **Basilicata:** 1801-1850; 1951-2000; (111); (2868); **Calabria:** 1851-1925; (277); (811); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (2249).

1068. - ***Lythria cruentaria*** **(Hufnagel, 1767)** (= *purpurata* Linnaeus, 1761; *rotaria* Fabricius, 1798; *fasciolaria* Esper, 1801)

Nota - Secondo Hufnagel *Phalaena Geometra fasciolaria* (9*) è stata descritta su esemplari di **Italia** (3144). Presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono conservati esemplari del **Tirolo meridionale**; nessuna cattura recente (2973).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (2779); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (2580); (3394); **Alto Adige:** (? 1851-1900); (2973); **Veneto:** 1901-1925; 1976-2005; (2990); (3380); **Emilia:** 1901-1925; (2990); **Toscana:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2968); **Umbria:** 1951-1975; (2085); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (1684); (2169); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1851-1925; 1976-2000; (277); (2868); **Sardegna:** 1901-1925; (730); (1303).

1069. - ***Cataclysme riguata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la **Sicilia** va confermata.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 13 e 21.VII.1974, 12.VII.1975, 21.IV.1976, 15 e 18.VII.1976, 28 e 31.V.1982, 1.VI.1982, 22.IV.1984. **Abruzzo:** Gran Sasso, 1200 m, 6.VI.1981 (GRL). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 2001-2005; (269); (3301); **Romagna:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3429); **Toscana:** 1801-1900; 1951-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3104); **Calabria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; (144).

1070. - ***Cataclysme dissimilata*** **(Rambur, 1833)** (= *spissistrigaria* Turati, 1913)

Larentia spissistrigaria è descritta su esemplari della **Sardegna:** Gennargentu, Aritzo (781) & (782).

Toscana: 1976-2000; (2971); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (2803).

1071. - ***Phibalapteryx virgata* (Hufnagel, 1767)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia:** (501) è da confermare, potrebbe essere stata confusa con *Costaconvexa polygrammata*, di cui esistono due esemplari nella collezione Verity, uno dei quali di Modena VIII.1903, determinati erroneamente come *P. virgata*; anche la citazione per la **Toscana:** (206) è dubbia (3283).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; (114); (797); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Friuli:** 1901-1925; (909); (1007); **Sicilia:** 1851-1900; (144); (3283).

1072. - ***Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763)**

Nota - L'esame degli esemplari della coll. Bertoloni ha consentito di appurare che la citazione per l'**Emilia**: monti del bolognese (110) va riferita a *S. angularia* (Flamigni in litt.)

Nuovi dati - **Piemonte:** Cesana 25.VII.1985; Frabosa (CN) 6.VII.1983, 22.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (2974); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (269); (1781); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2000; (112); (2347); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2169); (2990); **Abruzzo:** (1801-1850); 1851-1900; 1951-2000; (111); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1851-1950; (135); (1350); **Basilicata:** 1901-1925; (459); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (459); (3104).

1073. - ***Scotopteryx angularia* (de Villers, 1789)** (= *diniensis* Neuburger, 1906)

Nota – La citazione per il **Tirolo S:** (1752) va riferita al **Trentino**.

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Lazio:** Borgo San Donato (LT) 13.VIII.1963 (DBR, PRN).

Piemonte: 1926-2005; (2021); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2000; (2658); (3106); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1976-2005; (110); (3283); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; 2001-2005; (2516); (3283); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** 1976-

2000; (2195); (2868).

1074. - ***Scotopteryx coarctaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Toscana** va confermata (3283).

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3378); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1851-1900; (268); **Friuli:** 1901-1975; (997); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (878); (2770); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Toscana:** 1801-1850; (112); **Marche:** 1976-2000; (3283); **Lazio:** 1901-1925; 1976-2000; (2143); (2990); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); (3283).

1075. - ***Scotopteryx vicinaria*** **(Duponchel, 1830)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (2471); (3145); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973).

1076. - ***Scotopteryx bipunctaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 3.V.1983. **Liguria:** Passo Gouta 20.VII.1988 (GRL). **Calabria:** Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2968); **Marche:** 1901-1925; 1951-2005; (847); (3409); **Lazio:** 1951-2005; (1684); (3419); **Abruzzo:** 1801-2005; (111); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1975; (111); (4372); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2000; (277); (2868); **Sicilia:** 1851-2000; (196); (2967).

1077. - ***Scotopteryx octodurensis*** **(Favre, 1903)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (6450); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

1078. - ***Scotopteryx chenopodiata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *mensuraria* Denis & Schiffermüller, 1775; *limitata* Scopoli, 1763)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** La Thuile 4.VII.1976; Val Paradiso 8.VII.1973 (TBL, PRN); Gran San Bernardo 2100 m 13.VII.1988; Pondel 14.VII.1978. **Piemonte:** Limone (CN) 1000 m 24.VII.1985. **Veneto:** Santa Croce Lago 7.VII.1974 (GRL). **Calabria:** Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (2990); (3145); **Piemonte:**

1751-1800; (1801-1900); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (170); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (2770); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1976-2005; (24); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2516); **Lazio:** 1901-2000; (2169); (2990); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2000; (277); (2868).

1079. - ***Scotopteryx mucronata*** **(Scopoli, 1763)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 12.VII.1974, 17 e 22.VI.1977; Frabosa (CN) 8.VII.1983. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.VII.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1951-2005; (3082); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (1502); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (3183); (3283); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (1004); (3283); **Romagna:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3283); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (3283); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1901-1925; (2990).

1080. - ***Scotopteryx luridata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *plumbaria* Fabricius, 1775)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (260); (3283); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (3283); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (3283); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2005; (269); (3283); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1976-2000; (24); (3428); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (3283); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (111); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1926-1950; 2001-2005; (3283); (3401).

1081. - ***Scotopteryx obvallaria*** **(Mabille, 1867)**

Sardegna: 1951-1975; (2041); (2803).

1082. - ***Scotopteryx proximaria*** **(Rambur, 1833)**

Sardegna: 1851-1950; (278); (1303).

1083. - ***Orthonama vittata*** **(Borkhausen, 1794)** (= *lignaria* Boisduval, 1840)

Nota - Probabilmente presente anche in **Alto Adige**, in quanto nelle collezioni del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono conservati esemplari del Tirolo S; catturata dal 1950 al 1969 (2973). È citata per la **Liguria:** (114), (306) ma tali segnalazioni sono errate (1215). Le citazioni per l'**Emilia:** (269), (629) sono dovute ad un probabile errore di identificazione (3283).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1926-1950; (3106); **Trentino:** 1926-1975; (1184); (1787).

1084. - ***Orthonama obstipata*** **(Fabricius, 1794)** (= *fluviata* Hübner, 1799; *gemmata* Hübner, 1799; *fluviaria* Boisduval, 1840; *quaerendaria* O.G. Costa, 1850)

Larentia fluviaria è descritta su esemplari di **Sicilia** (88). *Larentia quaerendaria* è descritta su esemplari della **Campania:** Camaldoli di Napoli (111).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 10.VII.1980 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (SNN). **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2957); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1801-1850; (1851-1900); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1976-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1976-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (111); (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1776); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2005; (111); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (88); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (3231); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (2110); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1085. - ***Xanthorhoe biriviata*** **(Borkhausen, 1794)** (= *pomoeriaria* Eversmann, 1844; *quadrifasciaria* Treitschke, 1828)

Nota - È citata per la **Campania:** (111), (218); tali citazioni potrebbero riferirsi a *X. ferrugata* (elencata fra le sinonimie) e di conseguenza sarebbero da riportare a *X. vidanoi*. La citazione di *X. quadrifasciaria*

per Amalfi: (1350), riportata in (2868), è un errore di trascrizione.

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); (3106); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106); **Liguria:** 1901-1925; (583); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1951-2000; (2143).

1086. - ***Xanthorhoe designata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *propugnata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3328); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3328); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2447); (3429); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Calabria:** 1976-2000; (3467).

1087. - ***Xanthorhoe decoloraria*** **(Esper, 1806)** (= *munitata* Hübner, 1809)

Nota - La citazione per la **Calabria:** (277) è dovuta ad errata identificazione (3328).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (218); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (244); (3328).

1088. - ***Xanthorhoe spadicearia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le segnalazioni di *X. spadicearia* per **Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata** e **Calabria** vanno riferite a *X. vidanoi* (2868). Le citazioni per l'**Emilia:** (2516) e per la **Toscana:** (3171) vanno riferite a *X. ferrugata* (3283).

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN). **Trentino:** Monte Brenta, 1850 m, 28.VI.1930 (AST, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1901-2000; (797); (3421); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3283); **Trentino:** 1851-2000; (170); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3283); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183).

1089. - ***Xanthorhoe ferrugata*** **(Clerck, 1759)**

Nota - Le segnalazioni di *X. ferrugata* per l'**Appennino tosco-emiliano** in (269), (893), (1004), (1781) e parte delle segnalazioni in (1885), (3062), vanno riferite a *X. vidanoi* (3283). Le segnalazioni per

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e **Sicilia** vanno riferite a *X. vidanoi* (2868). In **Abruzzo** è stata accertata anche la presenza di *X. ferrugata* (3324).

Nuovi dati - **Piemonte:** Lago d'Orta: Miasino (NO) 470 m 24-27.VIII.1967 (GLL, PRN). **Trentino:** Riva, Ledrotal 11.V.1927; Brentagruppe 1850 m 28.VI.1930 (leg. Eisenberger, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 4.VII.1978 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3433); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (1885); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324).

1090. - ***Xanthorhoe vidanoi*** **Parenzan & Hausmann, 1994**

Xanthorhoe vidanoi è descritta su esemplari della **Basilicata:** Trecchina (PZ) 320 m (olotipo); **Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria** e **Sicilia:** (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 72 (1993): 491, figg. 1, 2, 4) (2869).

Piemonte: 1976-2000; (2869); **Veneto:** 1951-1975; (3283); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (269); (3283); **Romagna:** 1851-1900; 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1951-2000; (1885); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** (1901-1925); 1951-2005; (459); (3462); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (111); (3453); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (2869); **Calabria:** (1901-1925); 1951-2005; (459); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3083).

1091. - ***Xanthorhoe quadrifasciata*** **(Clerck, 1759)**

Nota - Le citazioni per il **Regno di Napoli:** (111) e per la **Sicilia** sono molto dubbie.

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1943); **Sicilia:** 1851-1900; (343).

1092. - ***Xanthorhoe montanata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *feisthamelaria* Boisduval, 1840)

Melanthia feisthamelaria è descritta su esemplari della **Sardegna** (88).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Alpi Marittime, Bossea 15.VI.1985; Ceresole (TO)

17.VII.1985. **Veneto:** Nevegal (BL) 30.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (244); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (629); (1781); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1850; 1976-2005; (24); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2968); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2516); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2169); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2869); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (2195); **Sardegna:** (1801-1850); (88).

1093. - ***Xanthorhoe fluctuata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-20.VIII.1980 (BER, PRN), **Toscana:** Ansedonia (GR) 12.IV, 3.X, 11.XII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 1.XI.1975, 18 e 21.IV.1976, 19.IV.1981 (GRL). **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 22.I.1998 (BLL/RSS).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1951-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1751-1925; 1951-2005; (10); (3433); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (314); (2869); **Puglia:** 1951-1975; (1538); (2869); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2868); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (1384).

1094. - ***Xanthorhoe disjunctaria*** **(de La Harpe, 1860)**

Larentia disjunctaria è descritta su esemplari della **Sicilia**: Bocca-di-falco (*recte* Boccadifalco) (PA) (Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles, 6: 407) (148).

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria** e la **Toscana** attendono conferma.

Liguria: (1926-1950); (1388); **Toscana:** (1851-1900); (344);

Arcipelago toscano: 2001-2005; (3322); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (148); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; 1976-2000; (2786); (2935); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1303).

1095. - ***Xanthorhoe oxybiata*** **(Millière, 1872)**

Nuovo dato - **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 11-17.X.1987 (TRG, PRN).

Liguria: 1901-1925; (622); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3275); (3322); **Puglia:** 1951-2000; (2730); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); **Calabria:** 1976-2000; (2730); **Sicilia:** (1851-1900); 1926-1950; (448); (3358); **Sardegna:** 1926-1950; (1303).

1096. - ***Xanthorhoe incursata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per l'**Emilia:** (1004) è molto dubbia, da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1024); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

1097. - ***Xanthorhoe conspectaria*** **(Mann, 1859)**

Cidaria conspectaria è descritta su una femmina della **Sicilia** ex pupa e numerosi individui di Madera (Wiener Entomologische Monatschrift, 3 (4): 104, Tav. 1, figg. 2, 3) (144).

Nota - Probabilmente il luogo tipico è Vallecorta (Monreale, PA), sola località siciliana nota, dove Mann ha catturato anche altre specie citate nel lavoro.

Sicilia: 1851-1900; (144); (343).

1098. - ***Catarhoe basochesiata*** **(Duponchel, 1831)** (= *confusaria* Staudinger, 1870)

Cidaria confusaria è descritta su esemplari di **Sicilia** (189*); (3022).

Nota - È citata una *Cidaria confusaria* Stdgr. ? (*bistrigata* Tr.) **Toscana:** Antignano A.V (Mann) (344). *C. confusaria* Staudinger (= *bistrigata* Herrich-Schäffer nec Treitschke, 1828) è una forma di *C. cupreata* H.-S. (753). *C. cupreata* è ritenuta buona specie presente anche in **Sicilia** e **Sardegna** (2980). *Euphyia cupreata* (Herrich-Schäffer, 1839) è ssp. di *E. basochesiata* (3174).

Nuovo dato - **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR).

Liguria: (1901-1925); 1976-2000; (781); (3183); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3275); **Marche:** (? 1850-1900); (385); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Puglia:** 1976-2000; (2730); (2868); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:**

1851-1900; 1926-2000; (189*); (3128); **Sardegna:** 1901-1950; (711); (1303).

1099. - ***Catarhoe putridaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (GRL). **Alto Adige:** (ssp. *bulgariata* Mill.) esemplari del Tirolo S sono nella collezione del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (2973).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2000; (797); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (840); (1787); **Alto Adige:** (1926-1950); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (2227); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (553); (3183); **Lazio:** 1976-2000; (2145); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (314); (3435); **Sicilia:** 1851-1900; (205); (2929); **Sardegna:** 1926-1950; (1260).

1100. - ***Catarhoe permixtaria*** **(Herrich-Schäffer, 1856)**

Nota - È citata per le **Marche:** (385), dato poco attendibile.

Trentino: 1901-1950; (1038); (1257); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; (448); (1038).

1101. - ***Catarhoe rubidata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 21.VI.1977; Frabosa (CN) 5.VII.1983 (GRL); Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 10.VI.1981, 29.V e 7.VI.1982, 26.V.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (268); (3433); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2000; (269); (2346); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1102. - ***Catarhoe cuculata*** **(Hufnagel, 1767)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta AVIII.1967 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 5.VII.1983. **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 21.VII.1973. **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 750

m 15.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (629); (1004); **Romagna:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2195).

1103. - ***Epirrhoe hastulata*** **(Hübner, 1790)** (= *luctuata* Hübner, 1790)

Nota - È riportata genericamente per l'**Emilia**; non si hanno altre citazioni, ed è probabile che si sia trattato di un errore di identificazione (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2968); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (2968); **Lombardia:** 1951-1975; (3106); **Trentino:** 1951-1975; (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106); **Emilia:** (1926-1950); (1388); **Toscana:** (1751-1800); (24); **Lazio:** 1951-2000; (2143).

1104. - ***Epirrhoe pupillata*** **(Thunberg, 1788)**

Piemonte: (1901-1925); 1976-2000; (448); (2968); **Veneto:** 1851-1900; (129).

1105. - ***Epirrhoe tristata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Toscana** sono da confermare (3283).

Nuovi dati - **Veneto:** Monte Baldo 1400 m 18.VI.1986; Nevegal (BL) 30.VI.1974 (GRL). **Liguria:** Colla Melosa (IM) 1540 m 16.VI.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1081); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2659); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3328); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** 1750-1850; (19); (112); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (2538); **Abruzzo:** 1976-2000; (3328); **Molise:** 1976-2000; (3260).

1106. - ***Epirrhoe alternata*** **(Müller, 1764)** (= *sociata* Borkhausen, 1794)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976. **Piemonte:** Moncalieri (TO) 11.IX.1968; Miasino (NO): Lago di Orta A.VIII.1967 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.V.1975, 18.IV.1976, 4.VII.1978, 29.VI.1983 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 11-15.VIII.1983 (SNN). **Calabria:** Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1951-2005; (747); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2005; (164); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (231); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (314); (3465 bis); **Toscana:** (1851-1900); 1951-2005; (218); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2005; (2991); (3403); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (811); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3128); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1925; (188); (792).

1107. - ***Epirrhoe rivata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le segnalazioni di *E. rivata* per la Romagna: (1010), (1885), vanno riferite a *E. alternata* (2516). La citazione generica per la **Calabria Ulteriore:** (156) è poco attendibile.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Val di Susa: Rocciamelone 1000 m 15.VII.1978 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; (273); (819); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3433); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3040); **Emilia:** 1901-1925; (501); (1004); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3310); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3044); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (2429°); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** (1851-1900); (156); **Sicilia:** (1926-1950); 1976-2000; (1340); (2178); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; (349); **Sardegna:** 1851-1900; (290).

1108. - ***Epirrhoe galiata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna:** (114) è poco attendibile.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Ceresole (TO) 1600 m 17.VII.1985 (GRL). **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (1038); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; (501); (2770); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1801-1850; 1976-2000; (109); (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3260); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** (1901-1925); 1951-2000; (459); (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (2967).

1109. - ***Epirrhoe timozzaria*** **(Constant, 1884)**

Sardegna: 1901-1925; (711).

1110. - ***Epirrhoe latevittata*** **(Turati, 1913)**

Larentia latevittata è descritta su esemplari della **Sardegna**: Monte Gennargentu, 1000 m, (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3/4): 329, figg. 9-10) (781).

Sardegna: 1901-1950; (781); (1260).

1111. - ***Euphyia molluginata*** **(Hübner, 1813)**

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (273); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (2227); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2538); (2882); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203).

1112. - **(?)** ***Protorhoe unicata*** **(Guenée, 1858)**

Nota - È noto un solo esemplare per la **Sicilia:** (1f) leg. Dannehl (2786);

da confermare.

1113. - ***Protorhoe corollaria*** **(Herrich-Schäffer, 1848)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (314) è probabilmente errata (344).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145).

1114. - ***Costaconvexa polygrammata*** **(Borkhausen, 1794)**

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Ginosa 20.V.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 28.V.1988 (PRT, PRN); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.VI.1993 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000 (SCR). **Sardegna:** Musei (CA) 16.V, 23.VI.1974 (HRT, PRN).

Piemonte: (1851-1900); 1976-2005; (188); (3378); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3433); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1901-1925; (3139); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (629); (3283); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 2001-2005; (3322); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); **Campania:** 1801-1900; 1976-2000; (111); (2868); **Puglia:** 1976-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1851-1900; 1976-2000; (459); (2868); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2005; (459); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3128); **Sardegna:** 1851-2000; (792); (2249).

1115. - ***Camptogramma bilineata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite a *C. bistrigata*.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 22.VI.1977. **Trentino:** Levico 25.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.VI.1974 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA): Levano 700 m 14.VI.1998 (DMR, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3433); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (859); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1801-1900; 1951-2000; (109); (2883); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3268); **Abruzzo:** (1801-1850); 1851-1925;

1951-2000; (111); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1851-1925; 1951-2005; (277); (3347); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231).

1116. - ***Camptogramma bistrigata*** **(Treitschke, 1828)**

Acidalia bistrigata è descritta su esemplari della **Sardegna** (in Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa, Vol. 6, 2 Teil: 59) (57).

Nota - Le citazioni per la **Toscana:** (218), (344) e la **Sicilia:** (218), (2362), sono molto dubbie, probabilmente aberrazioni di *C. bilineata*.

Nuovi dati - **Sardegna:** Belvì (NU) 5.VIII.1974, 10.VII, 20.VIII.1975; Aritzo 1100 m 28.VI.1974; (HRT, PRN).

Sardegna: (1801-1850); 1851-2000; (57); (2249).

1117. - ***Entephria nobiliaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2903); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (218); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (157); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1950; (1038); (2051); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

1118. - ***Entephria flavata*** **(Osthelder, 1929)** (= *juliensis* Pinker, 1953)

Entephria nobiliaria ssp. *juliensis* è descritta su esemplari del **Friuli**: Montasio (1493).

Nota - Presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono presenti esemplari del **Tirolo meridionale** (2973).

Trentino: 1926-2000; (1320); (2475); **Alto Adige:** (? 1926-1950); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (1274); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1493); (1528).

1119. - ***Entephria cyanata*** **(Hübner, 1809)**

Nota - È citata genericamente per la Lombardia: (1943), (2454), non risultano altre segnalazioni.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 11.VII.1976 (TBL, PRN); Champoluc 21.VII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); (947); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1788); (2516); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Abruzzo:** 1801-1900; 1926-2000; (344); (2738).

1120. - ***Entephria flavicinctata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la **Sicilia:** (506) non è attendibile.

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (260); (689); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2000; (554); (2347); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2738).

1121. - ***Entephria contestata*** **(Vorbrodt & Müller-Rutz, 1913)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1951-1975; (1515).

1122. - ***Entephria infidaria*** **(de La Harpe, 1853)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** Madonie (1943) va riferita a *Cidaria salicata* v. *ruficinctaria* Gn. (387).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3378); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (231); (2325); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1901-1925; (893); **Romagna:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2516); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145).

1123. - ***Entephria caesiata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *lineolata* Fabricius, 1794)

Phalaena lineolata è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Nota - Un esemplare di *P. caesiaria* citato da Ghiliani è in realtà *Cidaria kollariaria* (2580).

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Valtournanche 18.VII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1901-1975; (885); (2795); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (269); (589); **Toscana:** 1976-2000; (2347); (3429); **Abruzzo:** 1901-1925; (1035).

1124. - ***Larentia clavaria*** **(Haworth, 1809)**

Nota – La citazione generica per la **Liguria:** (218) attende conferma.

Nuovi dati - **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 17-19.IX.1986 (TRG, PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 26.IX.1989 (SCL). **Sicilia:** Trapani: Salina Paceco 1.XII.1999 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1851-1900);

1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); (1038); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2014); **Liguria:** (1851-1900); (218); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (893); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-2000; (310); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-1975; (218); (1976).

1125. - ***Larentia malvata*** **(Rambur, 1833)**

Nuovo dato - **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 21.XI.1998 (BLL/RSS).

Toscana: 2001-2005; (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Marche:** (1851-1900); (385); **Lazio:** 1951-1975; (2169); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1976-2000; (2527); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (205); (3358); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (2066).

1126. - ***Anticlea badiata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (544); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (817); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Puglia:** 1951-2000; (2868); (3104); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2804).

1127. - ***Anticlea derivata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *nigrofasciaria* Goeze, 1781)

Nota - La citazione per la **Sicilia** va confermata.

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.IV.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto**

Adige: 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2227); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (269); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3305); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1900; (144).

1128. - ***Mesoleuca albicillata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per l'**Emilia:** (501) è errata; "la *Cidaria albicillata* segnalata per il Modenese mi pervenne in cambio da altre regioni e va necessariamente radiata dalle nostre Geometre" (525).

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 23.VII.1977 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1320); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1943).

1129. - ***Pelurga comitata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 11.IV.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (188); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; (1024); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Liguria:** 1926-1950; (3106); **Emilia:** 1976-2005; (2346); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Sicilia:** 1976-2000; (2967).

1130. - ***Lampropteryx suffumata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Valdieri (CN) 23.V.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (2136); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3428); **Umbria:** 1951-1975; (2085); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3467).

1131. - **(-)** ***Lampropteryx otregiata*** **(Metcalfe, 1917)**

Nota - Le citazioni per l'**Alto Adige:** (1274), (1752), sono errate.

1132. - ***Cosmorhoe ocellata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta A.VIII.1967 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 23.VI.1977 (GRL); Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 31.V.1982 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1975; 2001-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-2005; (385); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2000; (2202 (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3083).

1133. - ***Nebula salicata*** **(Hübner, 1799)**

Nota - Le citazioni per la **Romagna** di *N. achromaria* e di *N. salicata* vanno riferite a *N. ablutaria* (3429).

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-28.VII.1980 (BER, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.IV, 3.X.1965 (DBR, PRN). **Calabria:** Amantea 1.X.1995; Copanello IV.1995; Donnici 1-20.X.1994, 27.IV.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; (260); (807); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2005; (171); (3388); **Veneto:** 1901-1925; 1951-1975; (885); (2795); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (878); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (687); (2029); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3457); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3083); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

1134. - ***Nebula ablutaria*** **(Boisduval, 1840)**

Lombardia: 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-

2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2051); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-1975; (650); (1780); **Liguria:** 1801-1850; (114); **Emilia:** 1951-1975; (1551); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Marche:** 1901-1925; 1976-2000; (847); (2882); **Lazio:** 1976-2000; (3044); **Abruzzo:** 1976-2000; (2819); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (1274); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (2967); **Sardegna:** 1901-1925; (711); (781).

1135. - ***Nebula tophaceata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3421); **Lombardia:** 1851-1975; (260); (1502); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2325); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2005; (885); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); **Calabria:** 2001-2005; (3401).

1136. - ***Nebula nebulata*** **(Treitschke, 1828)**

Larentia mixtata è descritta su esemplari della Svizzera: Wallis e dell' **Alto Adige:** Trafoi (258).

Nota - *Larentia mixtata* Staudinger, è ssp. di *N. nebulata*: (765), (1024); è sinonimo della ssp. *vallesiaria*: (3174). La citazione per la **Romagna:** (1885) è errata, essendo la specie estiva e montana; l'esemplare è risultato essere *N. tophaceata* (2516).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (649); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); (1943); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Marche:** 1976-2000; (2538); (2882); **Lazio:** 1951-1975; (1684); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2738); **Puglia:** 1951-2000; (2868); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2868).

1137. - ***Nebula senectaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Larentia senectaria è descritta su un esemplare del "Tirolo" (100*); (3174).

Nota - Il luogo tipico di *L. senectaria* è probabilmente Fiume (1274). Le citazioni per l'**Alto Adige** sono errate; non è stanziale nella regione (1038).

Lazio: 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143).

1138. - (-) ***Nebula ludificata*** **(Staudinger, 1870)**

Nota - È citata genericamente per l'**Italia centrale** (753), (1388), (1752), citazioni errate.

1139. - ***Nebula achromaria*** **(de La Harpe, 1853)**

Nota - È citata per la **Romagna,** ma l'esemplare è di difficile riconoscimento, probabilmente si tratta di *N. salicata ablutaria* (2516).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1231); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); (603); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

1140. - ***Nebula ibericata*** **(Staudinger, 1871)** (= *alfacariata* Rambur, 1866)

Sicilia: 1901-1925; (622); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2786).

1141. - ***Eulithis prunata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *ribesaria* Boisduval, 1840)

Nota - La citazione per l'**Emilia:** (269) è probabilmente un errore di identificazione, non essendo presente nella collezione di Attilio Fiori (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-1950; (273); (1083); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1943); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Toscana:** 1801-1850; 2001-2005; (112); (3283); **Marche:** 1901-2000; (847); (2169); **Lazio:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1926-2005; (1231); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260).

1142. - ***Eulithis testata*** **(Linnaeus, 1761)**

Trentino: 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1951-1975; (1958).

1143. - ***Eulithis populata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *dotata* Linnaeus, 1758)

Nota - Le citazioni per le **Marche:** (385) e la **Calabria:** (277), sono molto dubbie, probabilmente da riferire a *E. pyraliata*.

Nuovo dato - **Alto Adige:** Dolomiti, Lago di Braies (BZ) 1500 m 7.VIII.1975 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (260); (2362); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (231); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2241); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (174); (1425); **Liguria:**

(1801-1850); (114); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; (19); (554).

1144. - ***Eulithis mellinata*** **(Fabricius, 1787)** (= *associata* Borkhausen, 1794)

Piemonte: 1751-1900; (20); (2362); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; (366); (1055).

1145. - ***Eulithis pyraliata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *dotata* Staudinger, 1871)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-15.VIII.1967 (GLL, PRN); Sestriere: Col Basset 2400 m 17.VIII.1979 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.VI.1976, 12.VI.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; (170); (1038); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1976-2000; (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1851-1925; 1976-2000; (277); (2868).

1146. - **(-)** ***Eulithis pyropata*** **(Hübner, 1809)**

Nota - È riportata come presente in **Italia** (57), citazione non attendibile.

1147. - ***Ecliptopera silaceata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 12.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VIII.1967 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 15.VII.1985, Valdieri 1300 m 13.VI.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2203); **Molise:** 1976-2000; (3457); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104);

Sicilia: 1976-2000; (2844); (2967).

1148. - ***Ecliptopera capitata*** **(Herrich-Schäffer, 1839)**

Piemonte: 1976-2000; (2968); **Lombardia:** 1951-1975; (3106); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1787); (2051); **Friuli:** 1926-1950; (1110).

1149. - ***Chloroclysta siterata*** **(Hufnagel, 1767)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-18.VIII.1980 (BER, PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1184); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (269); (1551); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2868); **Calabria:** 1951-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (388); (2967); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2066).

1150. - ***Chloroclysta miata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *coraciata* Hübner, 1799; *primaria* Stauder, 1929)

Cidaria primaria è descritta su una femmina dell'**Alto Adige:** Castelrotto, 1097 m (1143).

Nuovo dato - **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2241); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (629); (3283); **Toscana:** 1976-2000; (3191); **Umbria:** 1976-2000; (3283); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sardegna:** 1851-1900; 1951-1975; (301); (2041).

1151. - ***Dysstroma citrata*** **(Linnaeus, 1761)** (= *marmorata* Fabricius, 1794; *immanata* Haworth, 1809)

Phalaena marmorata è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (3174).

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-28.VIII.1980 (BER, PRN).

Veneto: Dolomiti: Cortina 30.VIII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1901-1925); 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2005; (919); (3411); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1976-2000; (2347); **Abruzzo:** 1951-2000; (2145); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2347).

1152. - ***Dysstroma truncata*** **(Hufnagel, 1767)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 2.VII.1976; St. Vincent 6.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Roascio (CN), 830 m, 30.VIII.1963 (GLL, PRN); Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN); Val Bognanco (VB) 30.VII.1980; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 18-30.VII.1985, 4.VII.1983 (GRL). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 8.VII.1969, 30.VIII.1956, 19.VIII.1962 (GLL, PRN); Nevegal (BL) 28.VI.1974 (GRL). **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1851-2005; (372); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1901-2000; (1038); (2241); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3040); **Emilia:** 1851-1925; (269); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1901-1925; 2001-2005; (811); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104).

1153. - ***Cidaria fulvata*** **(Forster, 1771)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 5.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Val di Susa, Rocciamelone 2000 m 15.VII.1978 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (269); (1004); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1950;

1976-2000; (147); (2967).

1154. - ***Plemyria rubiginata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *bicolorata* Hufnagel 1767; *variata* de Villers, 1789)

Nota - Nota - In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra variata* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. variata* è descritta su esemplari di Bressiae sylvis (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p, 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino). La citazione generica per la **Toscana:** (218) basata su un dato di Mann, è poco attendibile in quanto non figura fra le specie elencate da Mann per la Toscana. Citata con dubbio per il Lazio: (344), non presente nella regione. Riportata genericamente per la **Sicilia**, non risultano segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1851-1975; (1787); (2362); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (3283); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2804); **Emilia:** 1851-1900; 2001-2005; (269); (3301); **Sicilia:** (1976-2000); (2929), (2980).

1155. - ***Pennithera firmata*** **(Hübner, 1822)**

Nuovo dato - **Calabria:** Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3283); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1184); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Friuli:** (1976-2000); (2408); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (3283); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Lazio:** 1976-2000; (2143); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3401); **Sicilia:** 1976-2000; (2967).

1156. - ***Pennithera ulicata*** **(Rambur, 1834)**

Alto Adige: 1926-1975; (1053); (1572); **Liguria:** 1976-2000; (2293).

1157. - ***Thera obeliscata*** **(Hübner, 1787)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1951-1975); 2001-2005; (1943); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1926-2000; (1106); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Abruzzo:** (1851-1900); (448); (1139); **Basilicata:** 1976-2000; (2868).

1158. - ***Thera variata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 21.VII.1985; Val Bognanco (VB) 5.VII.1980 (GRL). **Alto Adige:** Dolomiti: Lago di Braies (BZ) 1500 m 9.VIII.1975. **Veneto:** San Vito di Cadore 1000 m IX.1959 (GLL, PRN); Nevegal (BL) 30.VII.1974 (GRL). **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 22.VIII.1970 (Flamigni in litt.).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (244); (3471); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1951-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1950; (893); (2770); **Romagna:** 1926-2000; (1388); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3380); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3156); (3260); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1047); (3401).

1159. - ***Thera britannica*** **(Turner, 1925)** (= *albonigrata* Gornik, 1942)

Nota - Le citazioni per la **Valle d'Aosta** ed il **Trentino** sono da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Trentino:** 1976-2000; (2475); **Alto Adige:** 1976-2000; (3024); **Veneto:** 2001-2005; (3471); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (1004); (3283); **Romagna:** 1951-2000; (3283); (3429); **Toscana:** 1976-2000; (2347); (3429); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); (3461); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Basilicata:** 1976-2000; (2868).

1160. - ***Thera cembrae*** **(Kitt, 1912)**

Piemonte: 1976-2000; (3378); **Trentino:** 1976-2000; (3024); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1024); (3293).f

1161. - ***Thera vetustata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *stragulata* Hübner, 1809)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3421); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1110); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3183); **Emilia:** (1976-2000); (3283); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868).

1162. - ***Thera cognata*** **(Thunberg, 1792)** (= *geneata* Feisthamel,

1835)

Chesias geneata è descritta su esemplari del **Piemonte:** Domo d'Ossola (recte Domodossola): Monte Cucco (74).

Nuovo dato - **Veneto:** Dolomiti: Cortina Pocol 1530 m 22.VIII.1972 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1801-1950; 1976-2005; (74); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Abruzzo:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (2169).

1163. - ***Thera juniperata*** **(Linnaeus, 1758)**

Larentia gibbiata è descritta su esemplari dell'**Emilia:** Monte Gibbio (834).

Nota - *L. gibbiata* è sottospecie di *T. juniperata* (1274), (1577); è buona specie secondo (3174).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (766); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (629); (1577); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085).

1164. - **(-)** ***Thera serraria*** **(Lienig & Zeller, 1846)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte:** (797) e la **Sicilia:** (360), (1340) sono errate; è una specie dell'Europa settentrionale.

1165. - ***Thera cupressata*** **(Geyer, 1831)**

Nuovo dato - **Toscana:** Ansedonia (GR) VI.1963, 18.IV, 25.VIII, 3-8.X.1965 (DBR, PRN).

Lombardia: 1951-2000; (1656); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (566); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1656); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1235); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1951-2005; (112); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3115); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (3104); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868);

(3104); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (2967); (3358); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (407); (2421).

1166. - ***Eustroma reticulata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1951-1975; (2021); **Trentino:** 1951-1975; (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1850; 1951-1975; (98); (2051); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106).

1167. - ***Electrophaes corylata*** **(Thunberg, 1792)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è certamente errata (3328).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (3328); **Lombardia:** 1926-2000; (2658); (3106); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1055); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943).

1168. - ***Colostygia aptata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni di *C. aptata* per la **Romagna:** (2516), (3062) vanno riferite a *C. olivata* (3283).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (244); (3433); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3283); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Marche:** 1951-2000; (2145); **Lazio:** 1851-1900; (344); **Abruzzo:** 1926-2000; (1231); (3305); **Sicilia:** (1801-1850); 1926-1950; (75); (1340).

1169. - ***Colostygia olivata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 9.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Albarasca (AL) 28.VIII.1980 (BER, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1081); (3433); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (410); (1425); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; (269); (2770); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3062); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (1047); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (2844); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

1170. - ***Colostygia aqueata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria:** (218) deriva dalla presenza nel Nizzardo. Le citazioni generiche per la **Toscana** sono da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 2001-2005; (218); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (218); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (170); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Toscana:** (1926-1950); (1388); (1943); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Molise:** 1976-2000; (3260).

1171. - ***Colostygia multistrigaria*** **(Haworth, 1809)**

Nuovo dato - **Calabria:** Monte Capezzuto (CS) 1100 m 23.XI.2000 (SCL).

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); (2014); **Trentino:** 1901-2000; (761); (2291); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (761); (5589); **Puglia:** 1976-2000; (2527); **Basilicata:** 1951-1975; (2527); **Calabria:** 1976-2000; (2527).

1172. - ***Colostygia turbata*** **(Hübner, 1799)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (244); (3328); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Emilia:** 1976-2000; (2606).

1173. - ***Colostygia kollariaria*** **(Herrich-Schäffer, 1848)**

Nota - La citazione per il **Piemonte:** Valle di Susa: Oulx 1120 m (Ashby, 1934) (3378); è errata; Ashby cita *Paedisca kollariaria* Htg., che è un Microlepidottero e non *Larentia kollariaria* H.S. La citazione per l'**Emilia:** Modenese (1388) è da riferire a *L. laetaria*.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1851-1900; (2580); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (807); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (239); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (181); (1425).

1174. - ***Colostygia austriacaria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Lombardia: 1901-1925; (807); **Trentino:** 1901-1925; (1038); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (273); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1926-1975; (1528).

1175. - ***Colostygia kitschelti*** **(Rebel, 1934)**

Larentia kitschelti è descritta su esemplari del **Trentino**: Monte Adamello (Zeitschrift des Österr. Entomologen - Vereines, 19 (11/12): 69) (1267).

Trentino: 1901-1925; 1951-2000; (1267); (2227).

1176. - ***Colostygia tempestaria*** **(Herrich-Schäffer, 1851)**

Trentino: 1851-1925; (218); (1038); **Alto Adige:** 1851-1925; (157); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); (2227); **Friuli:** (1851-1900); 1901-1975; (505); (1528).

1177. - ***Colostygia laetaria*** **(de La Harpe, 1853)**

Nota - L' esemplare di *C. tempestaria* che il Sig. Calberla dice di aver trovato nella collezione del Sig. Em. Pokorny, catturato nel Gruppo dell'Adamello (Tirolo S) in realtà è probabilmente un esemplare sciupato di *Cidaria kollariaria* var. *laetaria* (390 bis).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1004); (2606); **Toscana:** 1976-2000; (3283).

1178. - ***Colostygia pectinataria*** **(Knoch, 1781)** (= *viridaria* Fabricius, 1775; *miaria* Borkhausen, 1794)

Nota - La citazione generica per la **Sardegna** è da confermare; la specie è presente in Corsica.

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.IX.1976, 26.V.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (268); (3068); **Friuli:** 1901-1950; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3040); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3062); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1801-1850; (111); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sardegna:** (1801-1850); (114).

1179. - ***Hydriomena furcata*** **(Thunberg, 1784)** (= *sordidata* Fabricius, 1794)

Nota - La citazione generica per la **Calabria Ulteriore** è dubbia, da confermare.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa, Rocciamelone 1000 m 15.VII.1978

(CMC, PRN). **Lombardia:** Lago di Como 10.VII.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-1975; 2001-2005; (2051); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (410); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (893); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); (?) **Calabria**: (1851-1900); (156).

1180. - ***Hydriomena impluviata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *coerulata* Fabricius, 1777; *autumnalis* Ström, 1783; *autumnalis* Borkhausen, 1794)

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 17.VI.1977 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3394); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (268); (3433); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3429); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (811); (2868).

1181. - ***Hydriomena ruberata*** **(Freyer, 1831)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

1182. - ***Coenocalpe lapidata*** **(Hübner, 1809)**

Nota - È citata con dubbio per il **Piemonte:** (188), citazione ripresa in (1388), non risultano segnalazioni per la regione.

Trentino: 1926-1975; (1089); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 2001-2005; (3471); **Liguria:** 1901-1925; 1951-1975; (622); (3183).

1183. - **(?)** ***Coenocalpe millierata*** **(Staudinger, 1901)**

Nota - Una sola citazione per la **Liguria:** al confine presso Mentone (622), probabilmente oggi in territorio francese.

1184. - ***Horisme vitalbata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È riportata come probabilmente presente nell'**Arcipelago campano** a Capri (1274), dato ipotetico. Le citazioni generiche per la **Sardegna** vanno confermate, non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 14.IV.1977, 16.IX.1979, 1.VI.1982, 4.IV.1983. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 26.VI.1986 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1951-2000; (2203); (2488); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-2000; (817); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (1047); (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; (144); **Sardegna:** (1976-2000); (2929); (2980).

1185. - ***Horisme corticata*** **(Treitschke, 1835)**

Nota - La citazione per la **Toscana** va confermata (3283); anche le citazioni per la **Sicilia** sono da confermare.

Trentino: 1951-1975; (1787); **Toscana:** 1851-1900; (206); **Sicilia:** 1851-1900; (144); (247).

1186. - ***Horisme tersata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** di *H. tersata* v. *tersulata* vanno riportate a *H. exoletata* HS. Le citazioni per la **Sardegna:** di *H. tersata* vanno riportate a *H. radicaria insularis*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Basilicata:** Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1975; 2001-2005; (687); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (459); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (111); (2868); **Puglia:** 1926-1975; (1538); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (3104).

1187. - ***Horisme radicaria*** **(de La Harpe, 1855)** (= *laurinata* Schawerda, 1919)

Phybalapteryx tersata var. *laurinata* è descritta su un esemplare dell'**Alto Adige**: Waidbruck (891).

Nota - Nella cartina in (2240) sono indicati siti in **Emilia, Lazio** e **Puglia**; da confermare.

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca (AL) 18-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (2580); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (891); (2325); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2240); **Liguria:** 1976-2000; (2240); (3183); **Emilia;** (1976-2000); (2240); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3429); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Marche:** 1976-2000; (2538); (3044); **Lazio:** (1976-2000); (2240); **Abruzzo:** 1976-2005; (3324); (3462); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** (1976-2000); (2240); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (997); (2967); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (1476).

1188. - ***Horisme exoletata*** **(Herrich-Schäffer, 1839)**

Larentia exoletata è descritta su esemplari della **Sicilia** (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Heft 163, fig. 7) (83*); (3174).

Nota - Le citazioni di *H. exoletata* per la **Sardegna:** (711), (781), (2929), vanno riferite a *H. predotai* (2579).

Nuovo dato - **Sicilia:** Caccamo (PA): Bosco Artale 17.III.1997 (PRN).

Sicilia: (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (83*); (2967); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935).

1189. - ***Horisme predotai*** **Bytinski-Salz, 1937**

Sardegna: 1901-2000; (711); (2579).

1190. - ***Horisme aemulata*** **(Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (231); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2227); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528).

1191. - ***Horisme calligraphata*** **(Herrich-Schäffer, 1839)**

Nota - L'indicazione "**Sicilia** ?" riportata in (3174) come possibile luogo

tipico appare improbabile (3283).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (1609); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (398); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Toscana:** 1976-2000; (3283).

1192. - ***Horisme aquata*** **(Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (2476); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (797); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); **Liguria:** (1801-1850); (114).

1193. - ***Melanthia procellata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La **Sardegna** è riportata come luogo tipico di *Melanthia bicuspidaria* Ghiliani, sinonimo di *procellata* (3174); tale dato è errato sia perchè *M. bicuspidaria* è posta in sinonimia di *alaudaria* (2736), sia perchè il luogo tipico sono i boschi del piano Torinese.

Nuovo dato - **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 20.VII.1973 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); (3358); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1926-1950; (2770); **Romagna:** 1926-1975; 2001-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3324).

1194. - ***Melanthia alaudaria*** **(Freyer, 1846)** (= *bicuspidaria* Ghiliani, 1852)

Melanthia bicuspidaria è descritta su due maschi del **Piemonte**: boschi del piano Torinese (114).

Piemonte: 1801-1850; (114); (797); **Trentino:** 1901-2000; (1024); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (218); (231); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (244); (3328); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3328).

1195. - ***Pareulype berberata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Toscana** è da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1975; (260); (1502); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1901-1950; 1976-2000; (1007); (3197); **Liguria:** (1801-1850);

1901-1925; 1976-2000; (114); (2454); **Toscana:** 1801-1850; (112); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

1196. - ***Spargania luctuata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *lugubrata* Staudinger, 1871)

Nota - La citazione per l'**Emilia:** Madonna dell'Acero, in pianura (269) non è attendibile, essendo la specie di alta montagna. La citazione per le **Marche:** (385) è quasi certamente errata (3328).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3328); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3378); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (3328); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1083); **Veneto:** 1951-1975; (2051); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3183).

1197. - ***Rheumaptera hastata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per la **Romagna:** (1885) va riferita a *E. molluginata* (2516). La citazione per le **Marche:** (385) è molto dubbia.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (164); (807); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (239); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (81); (3068); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (181); (1193 bis); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

1198. - ***Rheumaptera subhastata*** **(Nolcken, 1870)**

Trentino: 1926-1950; (1320); **Alto Adige:** 1851-1950; (239); (1053); **Veneto:** 1851-1900; (244); **Friuli:** 1926-1950; (1193 bis); (1425); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106).

1199. - ***Rheumaptera montivagata*** **(Duponchel, 1830)**

Nota - La citazione per l'**Alto Adige:** Trafoi (Struve), è certamente errata (1038); quindi anche le citazioni: Trafoi (Struve) (273); Ortler (Trafoi 1548 m) (272); Tirolo S (566), tutte derivanti dalla citazione di Struve, sono errate; montivagata non è presente in **Alto Adige.** La citazione per le **Marche:** (385) è certamente un errore di identificazione.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (114).

1200. - ***Hydria cervinalis*** **(Scopoli, 1763)** (= *certata* Hübner, 1825)

Nota - La segnalazione per la **Toscana:** (3310) va riferita a *Triphosa dubitata* (3327). È citata per la **Toscana:** (112), (206), ma potrebbe essere stata confusa con *T. dubitata*, dato da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975;

(268); (2227); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1951-1975; (1524).

1201. - ***Hydria undulata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 2.VII.1983, 22.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (410); (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2606); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; (24); (518).

1202. - ***Triphosa sabaudiata*** **(Duponchel, 1830)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Valdieri (CN) 1375 m 23.V.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1950; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (218); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (244); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Liguria:** 1951-1975; (1524); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Toscana:** 1976-2000; (3191); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2830); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2169); **Abruzzo:** 1926-2000; (1453); (2327); **Molise:** 2001-2005; (3470); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868).

1203. - ***Triphosa dubitata*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2300); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (231); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2005; (1425); (3238); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (1060); (1273); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (544); (1660); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (3219); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2830); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (2694); **Abruzzo:** 1951-2005; (2169); (3470); **Molise:** 1976-2005; (2537); (3470); **Campania:** 1976-2000; (3470); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (144); (1340).

1204. - ***Philereme vetulata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2475); **Alto**

Adige: 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1951-1975; 2001-2005; (1551); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; (112); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305).

1205. - ***Philereme transversata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *rhamnata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 2001-2005; (3301); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2000; (112); (3428); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Sicilia:** 1976-2000; (2967).

1206. - ***Euphyia biangulata*** **(Haworth, 1809)** (= *picata* Hübner, 1813)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3394); **Trentino:** 1976-2000; (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Friuli:** 1926-1950; (1110); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Lazio:** 2001-2005; (3386); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305).

1207. - **(-)** ***Euphyia cupreata*** **(Herrich-Schäffer, 1839)**

Nota - *E. cupreata* è ssp. di *E. basochesiata* (2910).

1208. - ***Euphyia unangulata*** **(Haworth, 1809)**

Nota - La citazione per la **Romagna:** (1885) è errata, in quanto l'esemplare raccolto da Zangheri è una femmina di *Xanthorrhoe biriviata* (3429). La citazione per le **Marche:** (385) è poco attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1901-1950; (1053); (1110).

1209. - ***Euphyia adumbraria*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Lombardia: 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3064); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Abruzzo:** 1926-2000; (1139); (2143).

1210. - ***Euphyia frustata*** **(Treitschke, 1828)**

Nota - È citata con dubbio per la **Lombardia:** (218), da confermare. Manca in **Romagna,** perchè la segnalazione di Treitschke, riportata da Zangheri (1885), è in realtà *Nebula tophaceata* (2516).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 24.IX.1976 (GRL). **Calabria:** Sila Grande, Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2005; (231); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1493); (3064); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (2770); **Toscana:** 1976-2000; (2347); (3171); **Marche:** 1901-1925; 1951-2005; (847); (3409); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2005; (3260); (3403); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1951-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (2967); **Sardegna:** 1901-1950; 1976-2000; (781); (2249).

1211. - ***Euphyia mesembrina*** **(Rebel, 1927)**

Nota - La citazione generica per il **Tirolo meridionale**: (1425) è molto dubbia.

Friuli: 1951-1975; (1752).

1212. - ***Euphyia scripturata*** **(Hübner, 1799)**

Nota - È citata per l'**Emilia:** (1004), ma probabilmente è confusa con *Epirrhoe molluginata*, da confermare; Curò la riporta per la **Toscana** (218), secondo Mann, ma non figura presente nei due lavori in cui sono elencate le specie raccolte da Mann in Toscana (Zeller, 1849; Mann, 1873), probabile svista (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; (188); (649); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (807); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Abruzzo:** 1801-1850; 1926-1950; (712); (1139).

1213. - ***Epirrita dilutata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3421); **Lombardia:** 1851-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (629); (2770); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1951-

2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:** 1901-1925; (529); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

1214. - ***Epirrita christyi*** **(Allen, 1906)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1926-1975; (1320); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (1320); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3062); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Puglia:** 1951-1975; (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (2967).

1215. - ***Epirrita autumnata*** **(Borkhausen, 1794)**

Nota - La citazione per la **Romagna:** (2423) è dovuta ad un errore (3283). Gli esemplari della **Toscana:** Migliorini (518) sono in realtà *Solitanea mariae* Stdr. (3062).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1926-1950; 1976-2005; (1320); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3283); **Toscana:** 1976-2000; (3062); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169).

1216. - ***Operophtera brumata*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3433); **Friuli:** 1926-1975; (1528); (1530); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1975; (109); (1588); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3171); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1851-1900; 1926-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1901-1975; (1371); (1827); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1139); **Puglia:** 1926-2000; (1776); (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1901-2000; (1371); (3247); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (792); (3441).

1217. - ***Operophtera fagata*** **(Scharfenberg, 1805)**

Nota - Le citazioni di *O. fagata* per l'**Emilia:** (1885), (2423) sono da riferire a *O. brumata* (3429).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2000; (1279); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (812); (1958); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3429); **Toscana:** 1976-2000; (2347); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (3312); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3164); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1976-2000; (2844).

1218. - ***Solitanea mariae* (Stauder, 1921)** (= *erichi* Schawerda, 1922)

Acasis mariae è descritta su esemplari della **Calabria**: Monte Martinello (recte Martinella) (Paola, CS), 900-1000 m e Aspromonte: Montalto 1800 m (Societas Entomologica, 36 (8): 29) (947).

Nota - È citata per il **Veneto** in quanto *Larentia erichi* è stata descritta su un maschio di Schio 27.V.1911 ed uno di Corsica (973); la segnalazione di Schio è dubbia (2733). La citazione per l'**Alto Adige:** (1125) è molto dubbia.

Nuovo dato - **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Liguria: 1976-2000; (2733); (3183); **Romagna:** 1951-2005; (1733); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2203); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1733); (3453); **Basilicata:** 1951-2000; (2733); (2868); **Calabria:** 1901-2005; (947); (3347).

1219. - ***Martania taeniata* (Stephens, 1831)** (= *albimacularia* Freyer, 1849)

Acidalia albimacularia è descritta su esemplari di **Italia**: Alpi (106 bis*); (3342).

Trentino: 1901-1925; 1976-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (273); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 2001-2005; (3471); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (174); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

1220. - ***Perizoma affinitata* (Stephens, 1831)**

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (239); (2325); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Lazio:**

1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 2001-2005; (3421); **Molise:** 1976-2000; (3156); (3260).

1221. - ***Perizoma alchemillata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *rivulata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per l'**Emilia**: (110) è errata, in quanto la *Cidaria alchemillata* Tr. della coll. Bertoloni è in realtà *Epirrhoe alternata* (Flamigni in litt.). Le citazioni per la **Calabria** e la **Sicilia**, sono da confermare.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 22.VII-15.VIII.1969 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 22.VII.1985 (GRL). **Emilia:** Bargi; sopra Poggiolforato; Rifugio Cavone; Baita del Sole; 16.VII-26.VIII.1984/88 (FLM).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2591); **Trentino:** 1901-2000; (1024); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (231); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2591); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (174); (1425); **Venezia Giulia:** 1851-1950; (650); (3106); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (589); (1004); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3310); **Marche:** 1976-2000; (2538); (2882); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); **Calabria:** (1851-1900); (218); **Sicilia:** 1851-1900; (144); (1340).

1222. - ***Perizoma hydrata*** **(Treitschke, 1829)**

Nota - La citazione generica per la **Basilicata** va confermata.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (188); (3421); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (734); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1024); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2795); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2143); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1951-2005; (2143); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Basilicata:** (1951-1975); (1943).

1223. - ***Perizoma lugdunaria*** **(Herrich-Schäffer, 1855)**

Piemonte: 1901-1925; 2001-2005; (622); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (747); **Alto Adige:** 1851-1925; (1053); (1595); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3260).

1224. - ***Perizoma bifaciata*** **(Haworth, 1809)** (= *unifasciata* Haworth, 1809)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 14.IX.1979, 15.IX.1980, 4.IX.1981 (DBR, PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); (188); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1024); (1053); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (314); (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1976-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2005; (343); (3228); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (781).

1225. - ***Perizoma minorata*** **(Treitschke, 1828)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (2795); **Friuli:** 1851-1900; (174); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Toscana:** 1976-2000; (2347); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2429°).

1226. - ***Perizoma blandiata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *adaequata* Borkhausen, 1794)

Nota - Le citazioni per Raibl (**Friuli**) in (410) e (1425) sono errate, in quanto riprese da Hornig che ha cacciato nei dintorni di Raibl, ma ha catturato questa specie solo in Slovenia (Mangert e Rombon).

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 11.VII.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1900); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (446); (1943); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3421); **Emilia:** 1976-2000; (2606).

1227. - ***Perizoma albulata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *albularia* Boisduval, 1840; *candidaria* Costantini, 1922)

Larentia candidaria è descritta su esemplari dell'**Emilia:** Appennino di

Mutino, Fiumalbo: Le Pozze 9.VII.1910 (983).

Nuovo dato - **Lombardia:** Valcamonica: Passo del Tonale 5.VII.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-2000; (244); (2909); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (983); (1004); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1926-1950; (1350).

1228. - ***Perizoma flavofasciata*** **(Thunberg, 1792)** (= *decolorata* Hübner, 1799)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-15.VIII.1967 (GLL, PRN). **Basilicata:** Monte Vulture (PZ), 1000 m, 2.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (751); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1900; 1951-2005; (112); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; (344); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1926-1950; (1285); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2868); **Calabria:** 1951-1975; (1943); (2868).

1229. - ***Perizoma didymata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Emilia:** Budiara, Rifugio Cavone, Baita del Sole, 6-VIII-27-VIII-1988 (FLM).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3394); **Lombardia:** 1851-1900; (260); (2362); **Trentino:** 1926-2000; (1190); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3328); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3429); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); (3328).

1230. - ***Perizoma obsoletata*** **(Herrich-Schäffer, 1838)** (= *alpicolaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Larentia obsoletata è descritta su esemplari della **Sicilia** (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Regensburg, Heft 163: Tav. 13) (83*); (3174).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; (231); (1038); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (2051); **Friuli:** 1926-1975; (1493); (1528); **Liguria:** 1926-1950; (3106); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1951-2000; (2423); (3283); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Lazio:** 1976-2000; (2143); (2203); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); **Sicilia:** (1801-1850); (83*).

1231. - ***Perizoma incultaria*** **(Herrich-Schäffer, 1848)** (misspelling: *incultraria*)

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; (622); **Lombardia:** 1901-1925; (1053); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3328); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (157); (3328); **Veneto:** 1926-2005; (1081); (3328); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (410); (3342).

1232. - ***Perizoma barrassoi*** **(Zahm, Cieslak & Hausmann, 2006)**

Perizoma barrassoi è descritta su esemplari dell'**Abruzzo**: Valle Cannella, Manzini-Hütte, 2530 m (olotipo) e Gran Sasso: Campo Imperatore, 2050 m (3472)

Abruzzo; 1975-2005; (3472)..

1233. - ***Gagitodes sagittata*** **(Fabricius, 1787)**

Piemonte: 1976-2000; (3394); **Lombardia:** 1951-1975; (2014); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1975; (1038); (1633); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli**: 1926-1950; (1425).

1234. - ***Mesotype verberata*** **(Scopoli, 1763)** (= *bassiaria* Feisthamel, 1835; *rupestraria* Boisduval, 1840)

Acidalia bassiaria è descritta su esemplari di Domo d'Ossola (recte Domodossola) sul bordo della Toccia presso Mazera (recte Masera) (74).

Nota - La citazione generica per la **Toscana:** (218) è molto dubbia, da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (74); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1901-

1925; 1951-2000; (885); (2909); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3342).

1235. - ***Mesotype parallelolineata*** **(Retzius, 1783)** (= *parallelaria* de Villers, 1789; *vespertaria* Borkhausen, 1794; *subduplicaria* O.G. Costa, 1849)

Eubolia subduplicaria è descritta su individui dell'**Abruzzo:** Maiella: Valle di Orfenda (111).

Nota - In (3174) è riportato come luogo tipico di *Phalaena Geometra parallelaria* Brescia (Italia); tale citazione è errata in quanto *P. G. parallelaria* è descritta su esemplari di Bressiae sylvis (foresta di Bresse, presso Lyon), come precisato a p, 287, al n. 390 "in Bressia prope Lugdunum" (17), e non Brescia (Brixiae in latino).

Nuovo dato - **Piemonte:** Albarasca (AL) 10-28.VIII.1980 (BER, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); **Veneto:** 1801-2000; (98); (2241); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (544); (687); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1801-1850; (111); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1236. - ***Baptria tibiale*** **(Esper, 1791)**

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3421); **Alto Adige:** 1851-1925; (1053); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

1237. - ***Eupithecia tenuiata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - In **Romagna** è citata anche per Forlì (1885), ma tale esemplare è in realtà *E. extraversaria* (2516).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3283); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 2001-2005; (218); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (751); (3024); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (3106); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Basilicata:** (1951-1975); (1943); **Calabria:** 2001-2005; (3401).

1238. - ***Eupithecia inturbata*** **(Hübner, 1817)**

Nota - La citazione generica per il **Piemonte** è molto dubbia.

Piemonte: (1801-1850); (114); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053);

catturata dopo il 1970 (2973); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Toscana:** 1976-2005; (3191); (3429); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283); (3305); **Basilicata:** 2001-2005; (3467).

1239. - ***Eupithecia haworthiata*** **Doubleday, 1856** (= *isogrammaria* sensu Herrich-Schäffer, 1848)

Nota - Le citazioni generiche per la **Sicilia**, attendono conferma.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (3433); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1950; 2001-2005; (687); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3171); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3324); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (1565); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2610); (3104); **Sicilia:** (1926-1950); (1340); (3342); **Sardegna:** 1926-1950; (1476).

1240. - ***Eupithecia immundata*** **(Lienig & Zeller, 1846)**

Trentino: 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2818).

1241. - ***Eupithecia plumbeolata*** **(Haworth, 1809)**

Piemonte: 1926-1975; 2001-2005; (2021); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (366); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (174); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Toscana:** 1851-1900; (344); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283).

1242. - ***Eupithecia cuculliaria*** **Rebel, 1901**

Veneto: 1926-2005; (1681); (3380); **Lazio:** 1926-1950; 1976-2000; (1085); (2203); **Basilicata:** 1976-2000; (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1243. - ***Eupithecia abietaria*** **(Goeze, 1781)** (= *pini* Retzius, 1783)

Nota - Le citazioni per le **Marche** e la **Basilicata** sono poco attendibili.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3328); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (3328); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1926-2005;

(2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Marche:** 1851-1900; (385); **Basilicata:** (1951-1975); (1943).

1244. - ***Eupithecia analoga*** **Djakonov, 1926** (= *bilunulata* Prout, 1914; *europaea* Lempke, 1969)

Nota - La citazione generica per la **Basilicata:** (1943), è probabilmente errata (3342).

Lombardia: (1951-1975); (1943); **Trentino:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3293); **Alto Adige:** 1951-2000; (1958); (3241); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943).

1245. - ***Eupithecia linariata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-1950; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (893); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (690); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-1975; (3106); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (629); (1551); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (206); (3428); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1951-2005; (2203); (3386); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1851-1900; (135); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (2967).

1246. - **(?)** ***Eupithecia pulchellata*** **Stephens, 1831**

Nota - Le segnalazioni per l'**Italia** vanno verificate, perché *E. pulchellata* in **Italia** e **Sicilia** sarebbe sostituita da *E. pyrenaeata* secondo (3342).

Piemonte: 1976-2000; (3421); **Lombardia:** 1901-1925; (689); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-1975; (1684); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); **Puglia:** 1951-2000; (2610); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (3298); **Sicilia:** 1976-2000; (2967).

1247. - ***Eupithecia pyreneata*** **Mabille, 1871**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); (2014); **Trentino:** 1951-1975; (1943); **Alto Adige:** 1851-1975; (366); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868).

1248. - ***Eupithecia laquaearia*** **Herrich-Schäffer, 1848**

Nota - La citazione per la **Puglia:** Pulo di Altamura (2672) è errata,

non è presente nella regione.

Valle d'Aosta: 1901-1925; (797); **Piemonte:** (1851-1900); (218); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (231); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Basilicata:** 1976-2000; (3104); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3083); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

1249. - ***Eupithecia limbata*** **Staudinger, 1879** (= *irritaria* Staudinger, 1892)

Nota - Nella cartina in (3342) sono indicati due siti in **Italia centrale**, circa all'altezza del Lazio e dell'Abruzzo.

Venezia Giulia: 1901-1925; (970); (1060).

1250. - ***Eupithecia liguriata*** **Millière, 1884** (= *roederaria* Standfuss, 1888)

Eupithecia liguriata è descritta su esemplari della **Liguria**: Bordighera e Cannes (Revue d'Entomologie, 3 (1): 3) (315).

Nota - La citazione generica per la **Sicilia** è dubbia; non risultano segnalazioni per l'isola.

Liguria: 1851-1900; 1976-2000; (315); (3183); **Toscana:** 2001-2005; (3462); **Sicilia:** (1851-1900); (506); (2929).

1251. - ***Eupithecia pantellata*** **Millière, 1875** (= *luteostrigata* Staudinger, 1876; *tedaldiata* Fuchs, 1901)

Eupithecia pantellata è descritta su esemplari dell'**Arcipelago siciliano**: Isola di Pantelleria (in Ragusa: Bullettino della Società entomologica italiana, 7 (4): 253) (223). *Eupithecia luteostrigata* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo (225). *Acidalia tedaldiata* è descritta su esemplari della **Sicilia** (441).

Sicilia: 1851-1900; 1926-1975; (225); (2786); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; (223).

1252. - ***Eupithecia irriguata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Probabilmente la citazione di Verity per la **Toscana**: Forte dei Marmi: (517) è da riferire ad altra specie, trattandosi di una specie monovoltina a volo primaverile (3283). Le citazioni per il **Piemonte**, la **Sicilia** e la **Sardegna** sono da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1787); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:**

1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Basilicata:** 1951-2000; (2610); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; (144); **Sardegna:** (1801-1850); (114).

1253. - ***Eupithecia exiguata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione di *E. exiguata* per il **Piemonte:** (114) va considerata dubbia, in quanto un esemplare determinato da Ghiliani come *exiguata* è in realtà *G. rufifasciata* (3283). La citazione di *E. exiguata* per la **Romagna:** (2516) va riferita a *E. ochridata* (3283).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; (276); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943).

1254. - ***Eupithecia extremata*** **(Fabricius, 1787)**

Toscana: 1951-1975; (2968); **Sicilia:** 1901-1950; (2990); (3358).

1255. - ***Eupithecia insigniata*** **(Hübner, 1790)**

Nuovo dato - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1184); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** (1926-1950); (3283); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1976-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3342); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:** 1951-1975; (3327); (3358).

1256. - ***Eupithecia valerianata*** **(Hübner, 1813)**

Piemonte: (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (807); (3342); **Trentino:** 1926-1950; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Abruzzo:** 2001-2005; (3342).

1257. - ***Eupithecia pygmaeata*** **(Hübner, 1799)** (= *sidemii* Vojnits, 1973)

Nota - È citata per l'**Alto Adige**: Etschauen 1889 (1038); Schnalstal: Katharinaberg (2635 bis), e un esemplare in collezione Hartig etichettato 'S Tirolo'; si tratta di esemplari immigrati (1053). Le citazioni per il **Piemonte**: (114) e la **Toscana**: (112) sono dubbie. Le citazioni per **Puglia:** (2730), (2868) e **Basilicata:** (2730) sembra vadano riferite a *E. valerianata* (3342). La presenza è accertata solo per l'Italia nord-orientale (3342).

Alto Adige: 1851-1900; (1038); **Friuli:** (2001-2005); (3342).

1258. - ***Eupithecia undata*** **(Freyer, 1840)** (= *scriptaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Nota - La citazione per le **Marche:** (2143) è stata riportata erroneamente (2203).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1951-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2005; (218); (3378); **Trentino:** 1901-1950; (1024); (1190); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2635 bis); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; (174); (1425); **Lazio:** 1851-1900; (344); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (757*); (2143).

1259. - ***Eupithecia variostrigata*** **Alphéraky, 1876**

Molise: 1976-2000; (3349).

1260. - ***Eupithecia silenata*** **Assmann, 1848**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); **Piemonte:** 1976-2000; (3421); **Trentino:** 1926-1950; (1211); (2227); **Alto Adige:** 1851-1925; (275); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

1261. - ***Eupithecia dissertata*** **(Püngeler, 1905)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); (3342).

1262. - ***Eupithecia carpophagata*** **Staudinger, 1871** (= *cassandrata* Millière, 1874)

Nota - Le segnalazioni di *E. carpophagata* per la **Valle d'Aosta:** (2471) sono dovute ad un errore di identificazione; vanno riferite a *E. veratraria eynensata* (2514).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2000; (747); (3421); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1975; (566); (2227); **Alto Adige:** 1851-1925; (386); (1053); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1110); **Abruzzo:** 1901-2000; (901); (3342); **Basilicata:** 1976-2000; (3236).

1263. - ***Eupithecia venosata*** **(Fabricius, 1787)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2795); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (112); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Campania:** 1976-

2000; (2868); **Puglia:** 1976-2000; (3104); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (144); (2178); **Sardegna:** 1851-1950; (290); (1260); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1264. - ***Eupithecia schiefereri*** **Bohatsch, 1893**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Trentino:** 1901-1950; (1053); (1064); **Alto Adige:** 1901-2000; (690); (2818); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Puglia:** 1951-2000; (2527); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2527); **Sicilia:** 1926-2000; (2786); (3083); **Sardegna:** (1926-1950); (1275); (3342).

1265. - ***Eupithecia silenicolata*** **Mabille, 1867**

Piemonte: 1976-2000; (3421); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2000; (518); (3283); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1976-2000; (2203); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2203); **Abruzzo:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (901); (2203); **Campania:** 1976-2000; (2868).

1266. - ***Eupithecia alliaria*** **Staudinger, 1870**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Trentino:** 1976-2000; (2818); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Liguria:** 1976-2000; (2408); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Abruzzo:** 2001-2005; (3342); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (2868).

1267. - ***Eupithecia egenaria*** **Herrich-Schäffer, 1848**

Lombardia: 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1976-2000; (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Toscana:** 1976-2000; (3283); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Abruzzo:** 1951-1975; (1511).

1268. - ***Eupithecia extraversaria*** **Herrich-Schäffer, 1852**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (275); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1681); (2795); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1976-2000; (3191); (3428); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Abruzzo:** 1976-2005; (3283); (3402); **Basilicata:** 1976-2000; (2730).

1269. - ***Eupithecia centaureata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *oblongata* Thunberg, 1784)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.VII.1974, 17.VII.1978 (GRL). **Campania:** Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m,

30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 19.X.1987 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR); Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.VI.1993 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1975; 2001-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3367); **Molise:** 1976-2005; (3260); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1285); (2868); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (2868); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1901-2000; (792); (2249); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1270. - ***Eupithecia gueneata*** **Millière, 1862**

Nota - La citazione per il **Lazio** è da confermare (2203).

Lombardia: 1901-1925; 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (690); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (1004); **Toscana:** 1976-2000; (3191); **Marche:** 1976-2000; (2882); **Lazio:** 1901-1925 (1085); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-2000; (357); (3083).

1271. - ***Eupithecia gratiosata*** **Herrich-Schäffer, 1861**

Piemonte: 1901-1925; 2001-2005; (2990); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2871); **Emilia:** 1951-1975; (1577); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Puglia:** 1951-2000; (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Sicilia:** 1851-1950; (357); (3358); **Sardegna:** 1851-1950; (218); (1476).

1272. - ***Eupithecia breviculata*** **(Donzel, 1837)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (2227);

Trentino: 1926-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1926-1950; (1184); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2795); **Liguria:** 1951-2000; (1693); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); (687); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1976-2005; (3305); (3435); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-2005; (2230); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (3083); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-1950; (314); (1476).

1273. - ***Eupithecia thalictrata*** **(Püngeler, 1902)**

Lombardia: 1851-1900; (2990); **Alto Adige:** 1951-2000; (1958); (3342); **Friuli:** 1926-1975; (1528).

1274. - ***Eupithecia actaeata*** **Walderdorff, 1869**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Trentino:** 1926-1975; (1320); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2325); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Abruzzo:** (2001-2005); (3342).

1275. - ***Eupithecia selinata*** **Herrich-Schäffer, 1861**

Nota - Le citazioni per il **Tirolo meridionale:** (1943), (2973), vanno riferite al **Trentino.**

Piemonte: 2001-2005; (3378); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1787); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Toscana:** 1976-2000; (2971); (3283); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453).

1276. - ***Eupithecia trisignaria*** **Herrich-Schäffer, 1848**

Piemonte: 1951-2000; (2021); (3283); **Trentino:** 1951-1975; (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; (273); (1038); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Liguria:** 1976-2000; (3040); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Marche:** 1976-2000; (2538); (2882); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283); (3342).

1277. - ***Eupithecia intricata*** **(Zetterstedt, 1839)** (= *helveticaria* Boisduval, 1840)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3283); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3428); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (2203);

(3283).

1278. - ***Eupithecia veratraria*** **Herrich-Schäffer, 1848**

Nota - Gli esemplari di *E. veratraria* del Gargano (**Puglia**) (1538), (1565), appartengono a *E. semigraphata* (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (3073); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; (566); (1038); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1214); (1528); **Liguria:** 1951-1975; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (3283); **Toscana:** 1976-2000; (3283); **Marche:** 1976-2000; (2143); **Lazio:** 1976-2000; (2143).

1279. - ***Eupithecia cretaceata*** **(Packard, 1874)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2000; (747); (3394); **Trentino:** 1851-1925; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; (1053); (1231); **Veneto:** 1926-1975; (1231); (1943); **Friuli:** 1901-1975; (753); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Emilia:** 1976-2000; (2606); **Toscana:** 1976-2000; (2347); **Molise:** 1976-2000; (3260).

1280. - ***Eupithecia cauchiata*** **(Duponchel, 1830)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1851-1900); (188); **Trentino:** 1926-1975; (1053); (3328); **Alto Adige:** 1926-1950; (1184); (1083); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1926-1950; (1110); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Marche:** 1951-1975; (2085).

1281. - ***Eupithecia pernotata*** **Guenée, 1858**

Eupithecia pernotata è descritta su esemplari del Monte Rosa e di Monte Ossolano (in Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères, 10: 316) (136*); (3174).

Nota - Non è chiaro se le località tipiche siano situate in territorio italiano o svizzero.

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1976-2000; (136*); (2769); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; (188); (2990).

1282. - ***Eupithecia satyrata*** **(Hübner, 1813)** (= *italicata* Guenée, 1858)

Eupithecia italicata è descritta su esemplari del **Piemonte**: Domodossola (136*); (188).

Nota - In (3342) viene indicata erroneamente per Domodossola come regione la **Lombardia**. La citazione per la **Sicilia** (Schwingenschuss, 1942) in (3164) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1926-1975; (1787); (3106); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3283); **Alto Adige:**

1851-1975; (157); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Liguria:** 1851-1900; 1951-1975; (2362); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Toscana:** 1851-1900; 2001-2005; (206); (3429); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3164).

1283. - ***Eupithecia absinthiata*** **(Clerck, 1759)** (= *minutata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2005; (690); (3388); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (2795); **Friuli:** 1926-1950; (1214); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3040); **Emilia:** 1901-1925; (629); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1851-1900; (144).

1284. - ***Eupithecia expallidata*** **Doubleday, 1856**

Trentino: 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Toscana:** 1976-2000; (3429); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Abruzzo:** 2001-2005; (3342).

1285. - ***Eupithecia assimilata*** **Doubleday, 1856**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2957); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1926-2000; (1190); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Toscana:** (2001-2005); (3342); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203).

1286. - ***Eupithecia addictata*** **Dietze, 1908** (= *danielata* Schütze, 1959)

Friuli: 1976-2000; (3342).

1287. - ***Eupithecia vulgata*** **(Haworth, 1809)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); (1943); **Trentino:** 1926-2000; (1064); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1214); **Emilia:** 1901-1925; (893); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (2868).

1288. - ***Eupithecia tripunctaria*** **Herrich-Schäffer, 1852**

Piemonte: 1976-2000; (3421); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (637*); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Abruzzo:** 2001-2005; (3342).

1289. - ***Eupithecia denotata*** **(Hübner, 1813)** (= *campanulata* Herrich-Schäffer, 1861)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1951-1975; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3283); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3283); **Basilicata:** 1976-2000; (2730).

1290. - ***Eupithecia subfuscata*** **(Haworth, 1809)** (= *castigata* Hübner, 1813)

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1975; (1024); (2795); **Friuli:** 1926-2000; (1214); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3305); **Campania:** 1976-2000; (2610); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); **Calabria:** 2001-2005; (3401).

1291. - ***Eupithecia icterata*** **(de Villers, 1789)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-1975; 2001-2005; (1681); (3411); **Friuli:** 1926-1975; (1214); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (1004); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2203); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2000; (277); (3104); **Sicilia:** 1901-2000; (529); (2967).

1292. - ***Eupithecia succenturiata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le segnalazioni di *E. succenturiata subfulvata* per il **Trentino** in (2211), (2475), vanno riferite a *E. icterata subfulvata*, tranne quella di Lana. Le citazioni per l'**Alto Adige,** l'**Emilia** e la **Toscana** vanno riferite a *E. icterata subfulvata* (3433). La citazione per il **Veneto:** (98) va riferita ad altra specie (3433). Le citazioni per la **Sicilia** in (629), (1340), vanno anche riferite a *E. icterata subfulvata*.

Piemonte: 1801-1850; 2001-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Sicilia:** 1951-1975; (2967).

1293. - ***Eupithecia denticulata*** **(Treitschke, 1828)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1976-2005; (20); (3421).

1294. - ***Eupithecia impurata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia** sono da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (181); (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** 1851-1900; (357).

1295. - **(-)** ***Eupithecia lithographata*** **Christoph, 1887)**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** di *E. lithographata* e di *E. lithographata* ssp. *poecilata* Püngeler vanno riferite a *E. poecilata* buona specie.

1296. - ***Eupithecia poecilata*** **Püngeler, 1888**

Eupithecia poecilata è descritta su esemplari dei monti di Corsica e **Sardegna** (Stettiner Entomologische Zeitung, 49 (10-12): 349) (348).

Sardegna: (1851-1900); 1901-1950; (348); (1476).

1297. - ***Eupithecia orphnata*** **Petersen, 1909** (= *orphnata* Bohatsch, 1883)

Friuli: 1926-1950; 1976-2000; (1214); (3283); **Romagna:** 1976-2000; (3283); **Toscana:** 1976-2000; (3191); (3310); **Abruzzo:** 2001-2005; (3342); **Calabria:** (2001-2005); (3342).

1298. - **(-)** ***Eupithecia unitaria*** **Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Sardegna:** (188), (218), sono certamente errate.

1299. - ***Eupithecia subumbrata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *scabiosata* Borkhausen, 1794)

Nota la citazione per l'**Emilia:** (269) è probabile errore di identificazione

(3283). Le citazioni di *E. scabiosata* per la **Sicilia** vanno riferite a *E. semigraphata* HS. (= *nepetata* Mab.) (387).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (3378); (3394); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3040); **Toscana:** 1976-2000; (3191); (3283); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283); **Puglia:** 1976-2000; (3104).

1300. - ***Eupithecia semigraphata* (Bruand, 1845)**

Nota - La citazione per la **Liguria:** (1388) è ripresa da (218) che riporta la specie come probabilmente presente nel Nizzardo. La citazione per la **Sardegna:** (448) è molto dubbia.

Nuovo dato - **Calabria:** Sila Grande, Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (386); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (231); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3386); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1943); **Venezia Giulia:** 1851-1900; 1926-1950; (109); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Emilia:** 1901-1975; (629); (1551); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3277); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (148); (3083).

1301. - ***Eupithecia santolinata* Mabille, 1871**

Sardegna: 1901-1950; (781); (1476).

1302. - ***Eupithecia lentiscata* Mabille, 1869**

Sardegna: (2001-2005); (3342).

1303. - ***Eupithecia millefoliata* Rössler, 1866** (= *achilleata* Mabille, 1869; *maeoticaria* Bohatsch, 1893)

Nota - Le citazioni per la **Valle d'Aosta:** (2174), (2516) sono dovute ad errata identificazione (3145). Nel Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono conservati esemplari del **Tirolo meridionale** (2973). La citazione per la **Puglia:** Gargano, Foresta Umbra (1538) è

molto dubbia (3283). È citata genericamente per la **Sicilia:** (1340), citazione ripresa da molti autori, ma non risultano segnalazioni per l'isola.

Piemonte: 1976-2000; (3421); **Alto Adige:** (? 1926-1950); catturata dopo il 1970 (2973); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Marche:** 1976-2000; (2538); (2882); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** (1926-1950); (1340); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

1304. - ***Eupithecia spadiceata*** **Zerny, 1933**

Abruzzo: 1951-1975; (3342).

1305. - ***Eupithecia simpliciata*** **(Haworth, 1809)** (= *subnotata* Hübner, 1813)

Nota - Le citazioni generiche per il **Piemonte:** (114) e la **Lombardia:** (1388) sono da confermare.

Alto Adige: 1851-1925; (1038); (1053); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Marche:** 1951-1975; (2085).

1306. - ***Eupithecia druentiata*** **Dietze, 1902**

Lombardia: 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3342).

1307. - ***Eupithecia sardoa*** **Dietze, 1910**

Eupithecia sardoa è descritta su esemplari della **Sardegna**: Sassari (Biologie der Eupithecien, 1: Tav. 77, figs. 703, 704) (637*); (3174).

Toscana: 1976-2005; (3277); (3462); **Sicilia:** 1976-2005; (3466); **Sardegna:** 1901-1975; (637*); (2052).

1308. - ***Eupithecia distinctaria*** **Herrich-Schäffer, 1848**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1951-2000; (1512); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (807); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (276); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1950; (3283); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2203); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2610); **Puglia:** 1926-1950; (1538); (3283); **Basilicata:** 1976-2000; (2610); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1309. - ***Eupithecia sinuosaria*** **(Eversmann, 1848)**

Alto Adige: 1976-2000; (2325); (3328); **Veneto:** 1951-2000; (2582);

(3328); **Sicilia:** 1976-2000; (2582).

1310. - ***Eupithecia gemellata*** **Herrich-Schäffer, 1861** (= *schmidii* Dietze, 1872)

Eupithecia schmidii (sic) è descritta su esemplari dei dintorni dell'**Alto Adige:** Botzen: Kalvarienberg, Simoniskrone (recte Sigmundskrone), ecc., ex l. su *Tunica saxifraga* (193).

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria** probabilmente derivano dalla citazione per l'Alto Nizzardo (218).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2000; (797); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (6973*); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1926-1976); (1388); (1943); **Emilia:** 1901-1925; (629); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (206); (3283); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); **Puglia:** 1976-2000; (2672); (2730); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (2730); (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1975; (144).

1311. - **(-)** ***Eupithecia cooptata*** **Dietze, 1904**

Nota - È citata per la **Valle d'Aosta:** (2471); non presente nella regione (3145).

1312. - ***Eupithecia graphata*** **(Treitschke, 1828)**

Nota - È riportata una *E. graphata* Rambur per la **Sicilia:** Babaurra (CL) (3358); citazione da verificare.

Piemonte: 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (218); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (366); (2818); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1851-1900; (174); **Marche:** 1951-2000; (2145); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1901-1950; (637*); (1612).

1313. - ***Eupithecia riparia*** **Herrich-Schäffer, 1851** (= *drupisaria* Petersen, 1909)

Eupithecia drupisaria Petersen è stata descritta probabilmente su esemplari dell'**Abruzzo:** Majella (3174).

Marche: 1951-1975; (2085); (2144); **Abruzzo:** 1901-2000; (1035); (2203).

1314. - ***Eupithecia spissilineata*** **Mentzer, 1846**

Nota - È citata genericamente per le "**Romagne**" (314); non si hanno altri dati per queste regioni.

Toscana: (?) (2000-2005) (3342); **Lazio:** 1851-1950; 1976-2000; (344); (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (3342).

1315. - ***Eupithecia indigata*** **(Hübner, 1813)** (= *pliniata* Stauder, 1929)

Eupithecia pliniata è descritta su esemplari della **Campania**: Monte Faito, Boscoreale 450 m (1145).

Nota - *Eupithecia pliniata* sembra un ibrido fra *E. innotata* e *E. nanata* (1274); è riportata come sinonimo di *E. innotata* in (2868); è buona specie in (3174); è sinonimo di *E. indigata* in (3342). La citazione generica per il **Piemonte:** (114) è dubbia (188).

Lombardia: (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Campania:** 1926-1950; (1145); **Calabria:** 2001-2005; (3401).

1316. - ***Eupithecia pimpinellata*** **(Hübner, 1813)**

Nota; la citazione per la **Liguria** probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo. Citata con dubbio per la **Toscana:** (218).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1901-1975; (690); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Toscana:** 1976-2000; (218); (3283); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3283); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3283); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (757*); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sardegna:** 1951-1975; (1975).

1317. - ***Eupithecia pauxillaria*** **Boisduval, 1840** (= *euphrasiata* Herrich-Schäffer, 1861)

Nota - Gli esemplari di *E. oxycedrata* citati per l'**Arcipelago toscano:** Isola di Capraia in (2805), sono in parte *E. ericeata*, in parte *E. pauxillaria* (3283).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1951-1975; (2021); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); (2014); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (2818); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3327); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-1975; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (3044); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); **Marche:** 1976-2000; (3044); (3327); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2203); **Sicilia:** 1901-1925; (529); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

1318. - ***Eupithecia nanata*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria:** (1388) probabilmente deriva dalla citazione dubbia per il Nizzardo (218). La citazione per

l'**Arcipelago toscano:** Isola di Capraia (2805) è dovuta a errata identificazione (3283).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (3283); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1975; (171); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (2325); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2000; (1943); (3433); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1926-1950; 1976-2000; (3283); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (406); (3283); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Calabria:** 1976-2000 (3469).

1319. - ***Eupithecia innotata*** **(Hufnagel, 1767)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria:** (1388) probabilmente deriva dalla citazione dubbia per il Nizzardo (218). La citazione di *E. innotata* per San Donnino (**Romagna**) in (2516) va riferita a *E. ochridata* (3283). I due esemplari di *E. innotata* citati per la **Romagna** in (1885), sono da riferire uno a *E. pauxillaria* ed uno a *E. ochridata* (3429). Le citazioni di *E. innotata* per la **Toscana** in (2347), (2447) vanno riferite a *E. ochridata* (3283). *E. pliniata* Stauder, 1929 (2868) è stata citata come probabile sinonimo di *E. innotata,* in realtà sembra sia sinonimo di *E. indigata* (3342).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1951-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (1060); (2362); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (687); (3283); **Romagna:** 1951-2000; (2516); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (206); (3044); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Campania:** 2001-2005; (3283); **Puglia:** 1951-1975; (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3104); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; (343); (2786); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1260).

1320. - ***Eupithecia ochridata*** **Schütze & Pinker, 1968**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (2565); (3106); **Trentino:** 1926-1950; (3283); **Veneto:** 1951-2000; (3283); (3433); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2950); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Abruzzo:** 1951-2000; (3283); **Basilicata:** 1976-2000; (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1321. - ***Eupithecia unedonata*** **Mabille, 1868**

Liguria: 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2143); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (3283); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Lazio:** 1976-2000; (2143); (2203); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2143); **Calabria:** 2001-2005; (3347); (3401); **Sicilia:** (1976-2000); (2929); (3342); **Sardegna:** 1901-1925; (711); (781).

1322. - ***Eupithecia virgaureata*** **Doubleday, 1861**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; (690); (4949); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Toscana:** 1976-2005; (3171); (3462); **Marche:** 1976-2000; (2538); (3283).

1323. - ***Eupithecia abbreviata*** **Stephens, 1831**

Nuovo dato - **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1572); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1820); **Liguria:** 1951-2000; (3040); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1551); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3052); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Campania:** 1976-2000; (2610); **Puglia:** 1976-2000; (2610); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3104); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:** 1901-1925; (488).

1324. - ***Eupithecia dodoneata*** **Guenée, 1858**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Rocciamelone 15.VII.1978 (CMC, PRN). **Campania:** Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (276); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3433); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (193); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3275); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2203); (3052); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Campania:** 1976-2005; (2610); **Puglia:** 1951-1975; (2610); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2610); (3104); **Sicilia:** 1926-1950; (2786); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1260).

1325. - ***Eupithecia cocciferata*** **Millière, 1864**

Nota - La citazione per la **Valle d'Aosta** è da confermare (3283).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); **Lombardia:** 1951-2000; (2014); (2818); **Alto Adige:** 1976-2000; (2818); **Veneto:** 1951-1975; (2014); (2227); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2871); (3428); **Lazio:** 2001-2005; (3268); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Puglia:** 1951-1975; (2527); **Basilicata:** 1976-2000; (2527); **Sardegna:** 1976-2000; (2871).

1326. - **(-)** ***Eupithecia massiliata*** **Dardoin & Millière, 1865)**

Nota - È citata per il **Lazio:** (1085), ma è probabile che sia stata confusa con *E. ultimaria* (2203).

1327. - ***Eupithecia pusillata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *sobrinata* Hübner, 1817)

Nota - Le citazioni di *E. pusillata* o *E. sobrinata* per la **Romagna** e di *E. pusillata* per l'**Arcipelago toscano:** Isola di Capraia (2805) vanno riferite a *E. ericeata* (3283).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2005; (273); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (276); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (932); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (3283); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3283); **Lazio:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3283); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1328. - ***Eupithecia phoeniceata*** **(Rambur, 1834)**

Nota - È citata per la **Campania:** Napoli (1388), probabilmente si tratta della segnalazione per l'**Arcipelago campano**: Isola di Capri (1139).

Toscana: 1976-2000; (3044); **Umbria:** 1951-2000; (2143); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1139); **Sicilia:** 1851-2000; (357); (3083).

1329. - ***Eupithecia ericeata*** **(Rambur, 1833)**

Nuovo dato - **Molise:** Castel San Vincenzo (IS), 950 m, 22.IX.1999 (Zahm det.) (SCR).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1357); (3293); **Alto Adige:** 1976-2000; (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-

2000; (114); (3342); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (1781); (2892); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (218); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2805); (3322); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1976-2000; (2203); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2203); (3324); **Molise:** 1976-2000; **Calabria:** 1976-2000; (2868); (3104); **Sicilia:** (1926-1950); (1340); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1260).

1330. - ***Eupithecia scopariata*** **(Rambur, 1833)** (= *tenebrosaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Eupithecia tenebrosaria è descritta su esemplari della **Toscana:** Montenero (100*), (3174).

Nota - È segnalata per l'**Abruzzo:** San Faustino (2203); il dato va riferito all'**Umbria.**

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (2805); (3283); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sardegna:** 1926-1950; (1260).

1331. - ***Eupithecia oxycedrata*** **(Rambur, 1833)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria:** (1388) probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo (218). Le citazioni di *E. oxycedrata* per l'**Emilia** sono da riferire a *E. ericeata*; gli esemplari di *E. oxycedrata* citati per l'**Arcipelago toscano:** Isola di Capraia (2805) sono in parte *E. ericeata*, in parte *E. pauxillaria* (3283).

Piemonte: 1976-2005; (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2454); (3183); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3428); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3283); (3342); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3164); **Puglia:** 1951-2000; (2868); (3104); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2730); (3104); **Sicilia:** (2001-2005); (3342); **Sardegna:** 1851-1900; 1976-2000; (407); (2421).

1332. - ***Eupithecia lanceata*** **(Hübner, 1825)**

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; (114); (797); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3073); **Trentino:** 1926-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1951-1975; 2001-2005; (1787); (3471); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Puglia:** 1976-2000; (2730).

1333. - ***Eupithecia ultimaria*** **Boisduval, 1840**

Veneto: 1976-2005; (3433); **Toscana:** 1801-1850; (112); (1945);

Lazio: 1976-2000; (2143); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); (2868); **Sicilia:** (2001-2005); (3342); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226); **Sardegna:** (2001-2005); (3342).

1334. - ***Eupithecia lariciata*** **(Freyer, 1841)**

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Quart 29.VI.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3183); (3378); **Lombardia:** (1951-1976); (1943); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2000; (244); (3283); **Friuli:** 1926-2000; (1214); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (3283).

1335. - ***Eupithecia tantillaria*** **Boisduval, 1840** (= *subumbrata* Dietze, 1911; *pusillata* auct.)

Nuovo dato - **Emilia:** la Bettola (PC) 20.V.1998; Monte Capra (BO) 11.V.1985 (FLM/BST).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3421); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1320); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1528); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3429); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Molise:** 1976-2000; (3156); (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); **Calabria:** 1901-1925; (757*); (3174).

1336. - ***Eupithecia conterminata*** **(Lienig & Zeller, 1846)**

Molise: 1976-2000; (3164).

1337. - ***Gymnoscelis rufifasciata*** **(Haworth, 1809)** (= *tempestivata* Zeller, 1847; *pumilata* Hübner, 1813)

Larentia tempestivata è descritta su esemplari della **Sicilia:** Messina e Rodi (109).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.VIII, 9.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 26.III.1977 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT), Fossa Bradano 28.V.1996 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000, 4.IV.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (1851-.1900); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171);

(3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3433); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (603); (1820); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1975; (687); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1951-2005; (2203); (3402); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Campania:** 1851-2005; (1186); (2868); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (901); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2868); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1951-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (3231); **Sardegna:** 1851-2000; (318); (2421); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1338. - ***Chloroclystis v-ata*** **(Haworth, 1809)** (= *coronata* Hübner, 1813; *stabiensis* Stauder, 1929)

Eupithecia stabiensis è descritta su una femmina della **Campania:** Monte Faito, Castellammare di Stabia: Boscoreale sopra Quisisana 400 m (1144).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.VI.1975 (GRL). **Campania:** Amalfi (SA), Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 2001-2005; (687); (3301); **Romagna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1951-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2203); (3417); **Abruzzo:** 1976-2005; (3324); (3462); **Molise:** 1976-2000; (2991); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1144); (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3104); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sardegna:** (1851-1900); (188); (3342).

1339. - ***Pasiphila rectangulata*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Basilicata**: Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-1975; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900);

1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (2795); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 2001-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3305); **Campania:** 1926-1950; (1183); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (2868); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2868); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (144); (1340).

1340. - ***Pasiphila chloerata*** **(Mabille, 1870)**

Piemonte: 1976-2000; (3421); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (3106); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Lazio:** 1976-2000; (2143).

1341. - ***Pasiphila debiliata*** **(Hübner, 1817)**

Nota - La citazione generica per il **Piemonte** è dubbia (3328).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Trentino:** 1926-1950; (1053); (3328); **Alto Adige:** 1851-1925; (239); (1053); **Veneto:** 2001-2005; (3471); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (174); (1214); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Puglia:** 1976-2000; (2527); **Basilicata:** 1951-2000; (2527); (3298); **Calabria:** 2001-2005; (3401).

1342. - ***Anticollix sparsata*** **(Treitschke, 1828)**

Nuovi dati - **Friuli:** Cividale del Friuli (UD) località Picon, 170 m, 16.VI.1984 (coll. G. Fiumi). **Emilia:** Buca della Gaibola, 25.V.1985 (FLM).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; (273); (1053); **Veneto:** 1851-1900; (268); **Friuli:** 1976-2000; (2516); **Emilia:** 1976-2000; (3283); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3310).

1343. - ***Chesias legatella*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *spartiata* Fuessly, 1781)

Chesias (Eucestia) spartiata var. *capriata* è descritta su esemplari dell'Arcipelago campano: Isola di Capri (485).

Nota - La citazione generica per la **Sardegna** va confermata.

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Trentino:** 1926-1950; (3106); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925;

1951-1975; (687); (1551); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1951-2005; (218); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); **Arcipelago campano:** 1901-1925; 1976-2000; (485); (2511); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2005; (3104); (3347); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (506); (2967); **Sardegna:** (1801-1850); (114); (2929).

1344. - ***Chesias rufata*** **(Fabricius, 1775)**

Nota - Le citazioni di *C. rufata* per il **Friuli** e la **Venezia Giulia** vanno riferite a *Chesias angeri* Schaw.

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2227); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1577); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3428); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 1951-1975; (2868); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3104); **Calabria:** 1951-2000; (2195); (3104); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (2067).

1345. - ***Chesias angeri*** **Schawerda, 1919**

Chesias angeri è descritta su esemplari del **Friuli**: Vittorio Veneto: San Quirino (PN) (olotipo), Cervignano (UD): Muscola, Magredis (UD) (Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines, Wien, V: 24) (892).

Nota - In (3174) oltre alle tre località friulane è riportata fra i luoghi tipici anche la Herzegovina; Schawerda dice solo che "uno dei miei raccoglitori, Herrn A. Buchtik, che in precedenza aveva per più anni raccolto per me in Herzegovina, ha catturato un maschio di questa specie presso Vittorio (Veneto), il 5.V.1918 a San Quirino". La citazione generica per il **Veneto:** (1388) va riportata al Friuli.

Friuli: 1901-2005; (892); (3464). **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060).

1346. - **(-)** ***Chesias isabella*** **Schawerda, 1915**

Nota - La segnalazione di *C. isabella* per l'**Arcipelago campano** (2511), va riferita a *C. legatella capriata*.

1347. - ***Carsia sororiata*** **(Hübner, 1813)** (= *paludata* Thunberg, 1788 nec Linnaeus, 1767)

Nota - Le citazioni per il **Piemonte** e la **Lombardia** attendono conferma.

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1925; (1053); (1388); **Alto Adige:** 1851-1975; (273); (1572).

1348. - ***Carsia lythoxylata*** **(Hübner, 1799)**

Nota - La citazione per l'**Abruzzo:** Gran Sasso (3071), è di un esemplare della collezione Fiori, del 1898.

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3421); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (2606); **Toscana:** 1976-2000; (2166); **Abruzzo:** 1851-1900; (3071).

1349. - ***Aplocera plagiata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *duplicata* Fabricius, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta A.VIII.1967 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 11.IV.1974, 15.IV.1977 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 2.V.2001. **Calabria:** Sila Grande, Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998; Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (807); (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (218); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3260); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (72); (2868); **Arcipelago campano:** 1801-1850; 1951-1975; (72); (1589); **Puglia:** 1801-1850; 1926-2000; (72); (2575); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (2868); **Calabria:** 1851-1925; 1951-2000; (156); (2868); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (3083); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

1350. - ***Aplocera efformata*** **(Guenée, 1857)** (= *pallidata* Staudinger, 1871)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 23.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 11.IV.1974, 15.IV.1977. **Lazio:** Oriolo 29.IX.1984 (GRL). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.VI.1993 (PRN).

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1926-1975; (1089); (1787); **Alto Adige:** (1901-1925); 1926-1975; (1053); (1820); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1787); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia**

Giulia: 1901-1925; (1032); **Toscana:** 1951-2005; (2347); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2805); **Umbria:** 1951-2000; (2169); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2868); **Puglia:** 1951-2000; (1658); (2868); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sicilia:** 1926-2000; (1384); (2967); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (1260); (2067).

1351. - ***Aplocera corsalta*** **(Schawerda, 1928)** (= *sardalta* Bytinski-Salz, 1934)

Anaitis sardalta è descritta su un maschio della **Sardegna:** Gennargentu 1700 m (1260).

Sardegna: 1926-1950; (1260); (1303).

1352. - ***Aplocera praeformata*** **(Hübner, 1826)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** La Thuile 4.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Aquila di Giaveno (TO) 4.VII.1976 (CMC, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 6.VII.1983. **Veneto:** Monte Grappa 1700 m 9.VII.1989 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (2780); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (244); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (269); (2770); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3321); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (2868); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2868).

1353. - ***Aplocera simpliciata*** **(Treitschke, 1835)**

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (114 bis); (3394).

1354. - ***Odezia atrata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *chaerophyllata* Linnaeus, 1761)

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Formazza (VB) 20.VI.1977. **Alto Adige:** Val d'Ultimo 15.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1851-1950; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (2408); (3073); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1950; 1976-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (181); (392); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3321); **Umbria:** 1951-1975; (2968); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000;

(1684); (2169); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3312); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2730); (2868); **Calabria:** 1951-2000; (2730); (3104).

1355. - ***Schistostege decussata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per la **Romagna:** (2411), dato non attendibile (3314).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (6148); **Trentino:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2516); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (824); (1135); **Liguria:** 1976-2000; (3314); **Basilicata:** 1951-1975; (1839); (2868).

1356. - ***Lithostege griseata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Toscana:** (1388) è molto dubbia (3283). La citazione di *L. griseata* per la **Campania:** (2162), va riferita a *L. duponchelli.*

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Alto Adige:** 1851-1925; ex (244); estinta (2973); **Friuli:** 1851-1900; (181).

1357. - ***Lithostege farinata*** **(Hufnagel, 1767)**

Nota - La citazione per la **Toscana:** (218) è una probabile svista (3283). Le citazioni di *L. farinata* per la **Sicilia** e l'**Italia meridionale** (1388) sono da riferire a *L. duponchelli.*

Piemonte: (1851-1900); (188); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Veneto:** 1801-1850; 1951-1975; (98); (2051); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3183).

1358. - **(-)** ***Lithostege coassata*** **(Hübner, 1825)** (= *duplicata* Hübner, 1817)

Nota - "Secondo Duponchel, in **Italia**, Staudinger la dice propria della Russia meridionale ed Armenia. Costa cita una sua *L. Sudduplicaria* (Tav. XII, fig. 2), che dice prossima della *Duplicata* Hb., raccolta nell'agosto in un unico esemplare sulla Maiella" (218). La citazione di Curò è errata in quanto *E. sudduplicaria* è sinonimo di *M. parallelolineata* Retzius.

1359. - ***Lithostege duponchelli*** **Prout, 1938**

Lithostege duponchelli è descritta su esemplari della **Sicilia:** Nicolosi, della **Puglia:** Monte Gargano e della Francia meridionale (in Seitz: Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Suppl. Band 4: 239) (1274).

Campania: 1976-2000; (2162); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1274); (2938); **Basilicata:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1901-2000; (503); (2967).

1360. - ***Discoloxia blomeri*** **(Curtis, 1832)**

Friuli: 2001-2005; (3370).

1361. - ***Venusia cambrica*** **Curtis, 1839**

Valle d'Aosta: 1901-1925; (797); **Piemonte:** 1976-2005; (3328); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); (3073); **Trentino:** 1901-1950; (1038); (1320); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (388); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (3328); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

1362. - ***Euchoeca nebulata*** **(Scopoli, 1763)** (= *obliterata* Hufnagel, 1767; *hepararia* Hübner, 1799)

Nuovo dato - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago di Orta 27.VII-15.VIII.1967 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (2476); (3283); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (2804); (3283); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (2606); (3283); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Sicilia:** 1951-1975; (2967).

1363. - ***Asthena albulata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *candidata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovo dato - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1975; (629); (2029); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2203); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203); (3324); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2868); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1364. - ***Asthena anseraria*** **(Herrich-Schäffer, 1855)** (= *soldaria* Turati, 1879)

Cidaria soldaria è descritta su esemplari della **Lombardia:** Alzate (Brianza) (260).

Lombardia: 1851-1900; 1926-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1976-2000; (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925;

1951-1975; (629); (1781); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2203); **Abruzzo:** 1976-2000; (2203).

1365. - ***Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel, 1767)** (= *luteata* Denis & Schiffermüller, 1775; *sinuosata* Giorna, 1791)

Phalaena sinuosata è descritta su esemplari del **Piemonte:** dintorni di Torino (20).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2203); **Abruzzo:** 1976-2005; (3305); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (196); (1340).

1366. - ***Hydrelia sylvata* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *testaceata* Donovan, 1810)

Nota - È citata per l'**Italia centrale:** (1388); non rinvenuta in **Italia centrale:** (2203). È citata per l'**Emilia:** (110), ma gli esemplari sono in realtà *Scopula marginepunctata* (Flamigni in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; 2001-2005; (2051); (3471); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197).

1367. - ***Minoa murinata* (Scopoli, 1763)** (= *monochroaria* Herrich-Schäffer, 1848)

Minoa monochroaria è descritta su esemplari del **Piemonte**: Domo d'Ossola (oggi Domodossola) (100*), (990 bis).

Nota - Le citazioni di *M. murinata italicata* Mill. per **Piemonte, Lombardia** e **Liguria** vanno riferite a *Idaea deversaria* H.-S. (3376).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Cogne 16.VII.1975. **Piemonte:** Val Formazza (VB) 1000 m 20.VI.1977, Val Bognanco (VB) 23.VI.1977 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (146); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (161); (3433); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (803); (878); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:**

1851-1975; 2001-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1950; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (1885); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3052); **Abruzzo:** 1801-1900; 1951-2005; (111); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; (111); (1141); **Puglia:** 1976-2000; (2868); **Basilicata:** (1951-1976); (1943); **Calabria:** (1901-1925); 1976-2000; (459); (2868); **Sicilia:** 1851-1950; (144); (3358).

1368. - ***Lobophora halterata*** **(Hufnagel, 1767)** (= *hexapterata* Denis & Schiffermüller, 1775)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (687); (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2169); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2169); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3260); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2868); **Calabria:** 1976-2000; (3104).

1369. - ***Trichopteryx polycommata*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; (797); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; (114); (797); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2227); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943).

1370. - ***Trichopteryx carpinata*** **(Borkhausen, 1794)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; (114); (2362); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1551); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2169); **Abruzzo:** 1951-2000; (2169); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (2991); (3260); **Basilicata:** 1976-2000; (2730).

1371. - ***Epilobophora sabinata*** **(Geyer, 1831)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (2967) deriva da un errore di schedatura (2968).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3328); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (689);

Trentino: 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (424); (1572); **Veneto:** 1976-2005; (3328); **Friuli:** 1926-1950; (1214); (1425).

1372. - ***Pterapherapteryx sexalata*** **(Retzius, 1783)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; (797); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1926-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1976-2000; (3197).

1373. - ***Celonoptera mirificaria*** **Lederer, 1862** (= *paradoxaria* Staudinger, 1862)

Celonoptera mirificaria è descritta su esemplari della **Sicilia:** Messina (Berliner Entomologische Zeitschrift, 6: 59, Tav. I, figg. 1-4) (117).

Nuovi dati - **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Romagna: 1951-2000; (1684); (3283); **Toscana:** 1976-2000; (3062); (3283); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3283); **Lazio:** 1951-1975; (1684); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (2143); (3283); **Basilicata:** 1951-2000; (1931); (3104); **Calabria:** 1976-2000; (2868); **Sicilia:** 1851-1925; (117); (572).

1374. - ***Nothocasis sertata*** **(Hübner, 1817)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (2014); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2325); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (2795); **Liguria:** 1976-2000; (2408); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); **Romagna:** 1951-2000; (1788); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2347); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2169); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Campania:** 1976-2000; (2730); **Basilicata:** 1976-2000; (2730).

1375. - ***Acasis viretata*** **(Hübner, 1799)**

Piemonte: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3394); **Trentino:** 1976-2000; (2211); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (2051); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Liguria:** 1976-2000; (2454); **Abruzzo:** 1976-2000; (2429°).

1376. - ***Acasis appensata*** **(Eversmann, 1842)**

Alto Adige: 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2325).

Fam. Thaumetopoeidae

1377. - ***Thaumetopoea processionea*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 20.VIII.2005 (PRN).

Basilicata: fiume Camastra 25.VIII.1975; Pollino: sorgente Acquafredda 10-15.VIII.1980, Rotonda 10 e 16.VIII.1980; Terranova 10-15.VIII.1980; Cropani 12.VIII.1980 (PRN). **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 25.VII.1997 (SCL). **Sicilia:** Cefalù-Carbonara 3.IX.1986; Alpe Cucco 21.VIII.1984; Piana degli Albanesi 2.IX.1981 (GRL); Buseto Palizzolo (TP): Bosco Sorace A.IX.1996 (PRN).

Valle d'Aosta: (1976-2000); (3007); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (300); (3361); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3411); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1901-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1926-2000; (1185); (2539); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3007); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2000; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2142); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1851-1900; (298); (1185); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (2108); **Basilicata:** 1951-1975; (2108); **Calabria:** 1926-1950; 1976-2005; (1409); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (247); (2949).

1378. - ***Thaumetopoea pityocampa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Campania:** Scafati (SA) 1-5.IX.1983; Vesuvio: Osservatorio 21.VIII.1985 (SNN). **Puglia:** pineta costiera ionica, infestante negli anni 1989/92; Porto Cesareo (LE): Serra degli Angeli, 2 m, 10.VIII.1996; Castellaneta Marina, 2001-2005 (PRN). **Calabria:** Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 21-25.VIII.2001; Sila: Righitano, Lago Arvo 1300 m 16.VII.1998 (SCL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2592); (3387); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1975; (650); (1780); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3387); **Emilia:** 1901-2000; (501); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-2005; (1365); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-1975; (1365); (2504); **Umbria:** 1926-2000; (1530); (2539); **Marche:** 1926-2000; (1430); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (421); (3390); **Abruzzo:** 1926-2005; (1398); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1951-2000; (1680); **Puglia:** 1976-2005; (2108); (3413); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3412); **Calabria:** 1901-2005; (833); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (357); (3405); **Arcipelago siciliano:** 1851-

1900; 1976-2000; (223); (3055); **Sardegna:** 1926-1950; (1169).

1379. - **(-)** ***Thaumetopoea pinivora*** **(Treitschke, 1834)**

Nota - Le citazioni per il **Piemonte:** (2021), (2732) sono da riferire a *T. pityocampa*, non essendo *T. pinivora* presente in Italia.

Fam. Notodontidae

1380. - ***Clostera curtula*** **(Linnaeus, 1758)** (= *alticauda-alba* Retzius, 1783)

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 10.V.1969 (GLL, PRN). **Trentino:** Levico 28.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.VII.1974, 21.IV.1976, 16.VII.1979, 26.V.1984, 29.V.1986 (GRL). **Campania:** Aquilonia Scalo (AV) 6.IV.1988 (Bertaccini in litt.), Battipaglia (SA): Cioffi 8.III.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Volturara Appula (FG), 1995 (PAR); **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 24.IV.1978, 4.IV.2001 (SCR); Monte Vulture (PZ) 28.III.1977; Monticchio 6.IV.1983; Grotticelle 30.VIII.1978; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; fiume Mercure 8.VI.1980, 9.III, 6.VI.1981; Rotonda 14 e 28.IX.1979, 28.III.1981 (PRN). **Sicilia:** Giacalone 14.VI.1976 (GRL); Regione Iblea: fiume Manghisi 20.VII.1995 (BLL/RSS).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (298); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1976-2000; (2732); **Puglia:** 1976-2000; (2732); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2108); (3347); **Sicilia:** 1951-2000; (2844); (2949).

1381. - ***Clostera pigra*** **(Hufnagel, 1766)** (= *reclusa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 5.VIII.2005. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano A.VI.1993 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 30.V.1995; Amantea (CS): Monte Pellegrino 150 m 6.X.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1925;

1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (820); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** 1976-2000; (3007); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (262); (3099); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** 1976-2005; (2923); (3129); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** 1951-2000; (3007); (3247).

1382. - ***Clostera anachoreta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per la **Toscana:** (24); il *Bombyx anachoreta* di (24) è in realtà *Clostera curtula* (33). La citazione per la **Calabria** e le citazioni generiche per la **Venezia Giulia** e la **Sardegna** attendono conferma.

Piemonte: (1801-1850); 1976-2000; (114); (3007); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (164); (820); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (1038); (3007); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (2732); **Calabria:** (1801-1851); (70); **Sicilia:** 1851-1925; (144) (1340); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (2980).

1383. - ***Clostera anastomosis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria** è da confermare. La citazione per la **Sicilia:** Piana dei Greci (PA) (488) è molto dubbia.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 6.VII.1976. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 14.IV.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; **Piemonte:** 1801-1925; 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1038); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (3007); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (935); **Liguria:** (1976-2000); (2732); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (525); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3007); **Toscana:** 1976-2005; (3007); (3310); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (3129).

1384. - ***Cerura vinula*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 15.IV.1979. **Lazio:** Accumoli 7.VI.1981 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 28.IV, 19 e 26.V.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Peschici 30.IV.1978; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 11.V.1984; Castellaneta Marina 20.VII.1980. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ): località Grotticelle, 600 m, 30.III.1978, 19.IV.1980, 9.V.1981, 2.V.2001; Lago Sirino

28.V.1987; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Casa del Conte 18.VI.1982; Timpone Castellana 9.V.1981; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Lago Duglia 18.VI.1982; Rotonda 19.V.1979, 8.V.1981, 21.III, 17.V, 13.V.1982; Rotonda: fosso Paraturo 16.V.1983; fiume Mercure 8.VI.198, 8.V.1981, 18.V.1983; Rotondella 5.V.1978. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 15.VI.1989 (SCL). **Sicilia:** Piana degli Albanesi 16.V.1958; Ficuzza 23.V.1989, 26.V.1990; Mandria del Conte 15.III.1986 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2559); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3310); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3007); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1398); (2945); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; (70); (1350); **Puglia:** (1801-1850); 1926-2000; (70); (2690); **Basilicata:** 1951-2005; (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (2949); **Sardegna:** (1801-1900); 1926-1975; (114); (1975).

1385. - ***Cerura erminea*** **(Esper, 1783)**

Nota - La citazione per la **Campania:** (70) probabilmente va riferita a *C. vinula*. Le citazioni per la **Puglia:** (1538), la **Calabria:** (2732) e la **Sicilia:** (106) sono da riferire a *C. vinula*.

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Gesso: Terme di Valdieri ex l. 1994 (CMC, PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3007); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2889 **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3007); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1976-2000; (650); (935); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3099); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (3007); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (3007); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (2882); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142).

1386. - ***Furcula furcula*** **(Clerck, 1759)** (= *fuscinula* Hübner, 1803)

Nota - Tutti gli esemplari di **Sicilia** sarebbero in realtà *F. bifida*:

(3007); da verificare.

Nuovi dati - **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 3.VII.1972; Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 29.VIII.2001 (1 es.) (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; (110); (1781); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2142); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (3007); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2108); **Calabria:** 1976-2005; (2206); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (894); (2949); **Sardegna:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3007).

1387. - ***Furcula bicuspis*** **(Borkhausen, 1790)**

Nota - La citazione generica per la **Campania** va confermata.

Nuovo dato - **Lombardia:** Val Viola (SO) 7.VII.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2957); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (319); (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; (1038); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Campania:** (1976-2000); (2732); **Basilicata:** 1976-2000; (2108).

1388. - ***Furcula bifida*** **(Brahm, 1787)** (= *hermelina* Goeze, 1781)

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**; manca nell'isola (1917); da confermare.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1986 (GRL). **Umbria:** Sigillo (PG), Val di Ranco 25.VI.1983 (GRL). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT) : Ponte Cagnolino 10-20.IX.1992 (PRN). **Sicilia:** Monte Soro 30.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3007); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3462); **Umbria:** 1951-2000;

(2142); (2469); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2469); (3386); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** 1976-2000; (2108); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3007); **Calabria:** (1976-2000); 2001-2005; (2732); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (147); (3007); **Sardegna:** (1976-2000); (2732); (2931).

1389. - **(-)** ***Neoharpyia verbasci*** **(Fabricius, 1798)**

Nota - "Specie della Francia merid. stata catturata anche in vicinanza di Monaco dal Sig. Wagner, e quindi da ascriversi anche alla **Liguria occidentale"** (355); è una illazione, non rinvenuta sul territorio italiano.

1390. - ***Dicranura ulmi*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Sardegna** sono da confermare.

Nuovi dati - **Umbria:** Morrano (TR); San Faustino (TR). **Campania:** Aquilonia Scalo (AV) 4.IV.1986, 6.IV.1988 (Bertaccini in litt.). **Puglia:** Mellitto (BA) 16.V.1979; gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992 (NRD). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 22.IV.1985; Calciano scalo 22.IV.1976; Vaglio di Basilicata scalo 18.IV.1977; Albano scalo 18.IV.1977, 12.IV.1978; Trivigno scalo 18.IV.1977; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle 12.IV.1978; Pollino: Timpone Castellana 9.V.1981 (PRN). **Calabria:** Pollino: Civita, 400 m, 20.V.1979; Monte Moschereto, 800 m, 23.IV.1999 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-1975; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 2001-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3007); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3277); **Umbria:** 1976-2000; (2732); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (2732); **Puglia:** 1976-2000; (2732); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 1976-2000; (2232); **Sardegna:** (1976-2000); (2469), (3007).

1391. - ***Notodonta dromedarius*** **(Linnaeus, 1767)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 3.VII.1983; Noasca 10.VII.1973; Val Bognanco (VB) 5.VII. 1980. **Veneto:** Nevegal (BL) BL 27.VI.1974 (GRL). **Campania:** Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Monte Vulture (PZ) 10.VI.1982 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 29.V.1995; Carolei (CS) 600 m 1.X.1997 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1951-2005; (218); (3378); **Lombardia:** 1901-2000; (464); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3007); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3411); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2553); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (298); (3007); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3007); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3462); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Campania:** 1976-2005; (2923); (3007); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2923); **Calabria:** 1951-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2949); (3247).

1392. - ***Notodonta torva*** **(Hübner, 1803)** (= *tritophus* Esper, 1786)

Nota – La citazione generica per la **Liguria** attende conferma.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3007); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (1787); (2362); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3007); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (1528); (3007); **Liguria:** (1926-1950); (1388); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Abruzzo:** 1951-1975; (2469).

1393. - ***Notodonta tritophus*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *phoebe* Siebert, 1790; *tiefi* Bartel, 1902)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Bellon (Sarre) 2250 m 29.VII.1993. **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 15.VII.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 25.V.1987; Molinelli 6.VII.1987 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 10.VI.1997 (SCR). **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 5.V, 18.V.1978, 11.V.1979; Albano scalo 12.V.1978; Monte Vulture (PZ) 20.VI.1969, 19.IV.1980; Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; Grotticelle 19.IV.1980; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980, 9.V.1981; Lago Duglia 18.VI.1982; Rotonda 20.V, 23.VII.1979, 7.VI, 9 e 17.VII.1980, 28.III, 8.V.1981, 17.V.1982; fiume Mercure 8.VI.1980; Cropani 6.VI.1981 (PRN); Monte Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2001 (SCR). **Calabria:** San Giovanni in Fiore (CS); Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 21.V.1997, 3.VI.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (1004); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1788); (3007); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145);

Lazio: 1951-2000; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** (1976-2000); (2732); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2108); **Calabria:** 1976-2000; (2206); **Sicilia:** 1976-2000; (2949); (3247).

1394. - ***Notodonta ziczac*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Bellon (Sarre) 1850 m 19-29.VII.1993. **Piemonte:** Frabosa (CN) 5.VII.1983 (GRL). **Liguria:** Conna (SV) 3.VII.1982 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18 e 21.IV.1976 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 6.VI.1980, 8.V.1981; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980, 16.VI.1982; Lago Duglia 18.VI.1982, 15.VI.1983; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Lago Fondo 1700 m 15.V.1983; Rotonda 10.VI.1978, 19.V, 23-26.VII.1979, 7.VI, 16.VIII.1980, 8.V.1981, 13-17.V.1982; fosso Paraturo 16.V.1983; fiume Mercure 8.VI.1980, 6.VI.1981, 20.VI.1982, 18.V.1983; San Severino 23.VII.1982. **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) 11.V.1972; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN). Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 16.VII.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (935); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1788); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1398); (2945); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** 1976-2000; (3007); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2732); (3347); **Sicilia:** 1951-2000; (2844); (3007); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

1395. - ***Drymonia dodonaea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *trimacula* Esper, 1785)

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Rocciamelone 15.VII.1978 (CMC, PRN). **Umbria:** Sigillo (PG), Val di Ranco 8.VI.1981, 8.VI.1982, 25.VI.1983 (GRL). **Campania:** Amalfi (SA), Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001; Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 12.VI.1982, 5.VIII.2005. **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 18 e 26.VI.1979; Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Belvedere, radura di faggeta 16.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.XI.1981, 19.VI.1982; Timpone Castellana

6.VI.1980, 9.V.1981; Lago Duglia 6.VI.1981; Rotonda 20.V.1979, 8.V.1981, 17.V.1982 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Lago Arvo 12 VII. 1998; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 13.VI.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3007); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (820); (3007); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3007); **Emilia:** 1851-1925; (377); (629); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2586); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2005; (3007); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2005; (1538); (2108); **Basilicata:** 1951-2005; (1839); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347).

1396. - ***Drymonia ruficornis*** **(Hufnagel, 1766)** (= *chaonia* Hübner, 1800)

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 14.VI.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.IV.1976, 22.IV.1984 (GRL). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 30.IV.1978. **Basilicata:** Monte Vulture (PZ): Monticchio 750 m 30.IV.1983; Pollino: Timpone Castellana 9.V.1981; Rotonda 4.IV.1981, 19.IV.1982 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 24.IV.1992 (SCL). **Sicilia:** Ficuzza 15.V.1985 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (820); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (2553); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (629); (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3429); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (344); (3462); **Umbria:** (1951-1975); (1943); (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1851-1900; (298); **Puglia:** 1951-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (1931); (2108); **Calabria:** 1976-2005; (3007); (3347); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (488); (2844).

1397. - ***Drymonia melagona*** **(Borkhausen, 1790)** (= *obliterata* Esper, 1785)

Nota - È citata per la **Toscana:** (497) e la **Campania:** (1350); probabili errori di identificazione.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Trentino:** 1901-1975; (1787); (2475); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; (170); (1053).

1398. - ***Drymonia querna* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *danieli* Hartig, 1970)

Drymonia danieli è descritta su esemplari della **Basilicata:** Vulture; Valle dell'Ofanto; Monte Pollino 1300 m (1905).

Nuovi dati - **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 15.VII.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 16.VII.1979, 4.VI.1982 (GRL). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 8.VI.1981, 8.VI.1983 (GRL). **Abruzzo:** Riserva Naturale Lago di Penne (PE): collina di Collalto, 8.VI.2004 (1m) (Dell'Agata in litt.); **Puglia:** Parco delle Pianelle (TA) 22.V.1983 (PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR); Nemoli 17.VII.1979 (GRL); Pollino: Rotonda: Valli 18.VII.1980 (PRN). **Calabria:** Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 26.VIII.2001; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 28.V.1995 (SCL). **Sicilia:** Etna N: Pineta di Linguaglossa 1750 m 6.VII.1987 (BLL/RSS).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3007); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1976-2000; (2825); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1004); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (1905); (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (699); (3443); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Puglia:** 1976-2005; (2108); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (1905); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (1905); (3347); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (573); (2949).

1399. - ***Drymonia velitaris* (Hufnagel, 1766)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 15.VI.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 2.VI.1982, 1 e 9.VII.1987 (GRL). **Puglia:** Foresta Mercadante (BA) 28.IV.1989. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 6.VI, 17.VII.1980; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Terranova 15.VI.1982; Rotonda 10.VI.1978, 9.VIII.1980, 3.VIII.1981 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 10.VIII.1995; Amantea (CS): Monte Pellegrino 150 m 15.VII.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3007); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000;

(260); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1089); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (1038); (1958); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (629); (1577); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3007); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2142); **Abruzzo:** 1976-2000; (2945); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2108); **Calabria:** 1951-1975; 2001-2005; (2108); (3347).

1400. - ***Pheosia tremula*** **(Clerck, 1759)** (= *dictaea* Esper, 1786)

Nuovi dati - **Piemonte:** Torino 300 m 21.VIII.1981 (CMC, PRN); Torrazza Piemonte (TO) 25.IV.1971 (GRL). **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 10.IV.1996; Sila: Cava di Melis 1250 m 10.VIII.1996 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (406); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2005; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2005; (2923); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2923); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2949); (3007).

1401. - ***Pheosia gnoma*** **(Fabricius, 1777)** (= *dictaeoides* Esper, 1789)

Nota - È citata per la **Romagna:** Corniolo (FC): Valbonella 650 m 20.VI.1979 (2411); dato non attendibile (3429).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (164); (3007); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (566); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3007); **Liguria:** 1976-2000; (2410).

1402. - ***Paradrymonia vittata*** **(Staudinger, 1892)**

Venezia Giulia: 1901-1925; 1976-2000; (760); (3007).

1403. - ***Pterostoma palpina*** **(Clerck, 1759)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna** attende conferma.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 1.VII.1976. **Veneto:** Nevegal (BL) 28.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.VI.1972, 10.VII.1980 (GRL). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 12.VII.1985 (SNN); Battipaglia (SA): Cioffi 26.V, 7.VII.1983, 27.VIII.1984, Torre Lama 10.VIII.1984, 1.VII.1987, Roccadaspide (SA) 28.VIII.1986 (RTN, PRN). **Basilicata:** Vulture (PZ), località Grotticelle 30.III, 12.IV.1978; Monticchio 750 m 30.IV.1983; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979; sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980, 19.VI.1982; Lago Duglia 18.VI.1982; Rotonda 10.VI.1978, 19.V, 23.VII.1979, 7 e 21.VI, 16.VIII.1980, 17.V, 19.IV.1982, 16.V.1983; Cropani 26.IX.1981; San Severino 7.VII.1981; fiume Mercure 8.VI.1980, 29.III, 8.V.1981, 20.VI.1982; fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 26.VII.1979 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 21.V.1997; Lago di Tarsia (CS) 100 m 30.III.2000 (SCR). **Sicilia:** Nebrodi: San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** (1976-2000); (2732); (3007); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (99); **Puglia:** 1951-2005; (2108); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (2108); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (573); (2949); **Sardegna:** (1801-1850); (114); (2931).

1404. - ***Ptilophora plumigera*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 9.XII.1989. **Sicilia:** Madonie: Mandria del Conte 4.XII.1982 (GRL); Baucina (PA): Ficuzza 23.XI.1990; Baucina (PA): Masseria Suvarita 549 m 11-21.XI.1992 (PRN).

Piemonte: 1976-2005; (3007); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1089); (1682); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1038); catturata dopo il 1970 (2973);

Veneto: 1926-2000; (1682); (3068); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** 1976-2000; (2553); (2410); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2000; (110); (3007); **Romagna:** 1926-1950; 1976-2000; (1388); (3007); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Basilicata:** 1951-2000; (1839); (2108); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (357); (2949).

1405. - ***Leucodonta bicoloria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1976-2000; (3273); **Lombardia:** 1976-2000; (2782); (3007); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); catturata dopo il 1970 (2973).

1406. - ***Ptilodon capucina*** **(Linnaeus, 1758)** (= *camelina* Linnaeus, 1758; *giraffina* Hübner, 1804)

Nuovi dati - **Umbria:** Sigillo (PG), Val di Ranco 29.VI.1975, 8.VI.1982 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Belvedere 16.VII.1980, 27.VII.1982; Belvedere, radura di faggeta 16.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Lago Duglia 18.VII.1982, 15.VI.1983 (PRN). **Sicilia:** Nebrodi (ME): Monte Soro 1500 m 24.VII.1984 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (260); (2782); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3007); **Liguria:** 1976-2000; (2553); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2732); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2945); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (3007); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2108); **Calabria:** 1951-1975; (2108); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (3007).

1407. - ***Ptilodon cucullina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *cuculla* Esper, 1786)

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 7.VI.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 23.VI.1976. **Umbria:** Sigillo (PG), Val di Ranco 14.VI.1974. **Abruzzo:** Ovindoli 9.VII.1984 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.VII.1986 (RTN, PRN); Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992 (NRD). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano: Ponte Cagnolino 6-10.VIII.1992; Vulture (PZ), località Grotticelle 10.VI.1972, 18.VII.1976, 18.IV.1977; Monticchio 750 m

30.IV.1983; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1981, 18.VII.1982; Belvedere 27.VII.1982; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980, 3.VI.1981; Madonna del Pollino 27.VII.1982; Timpone Castellana 23.VII.1979, 6.VI, 17.VII.1980; fiume Mercure 8.VI.1980, 6.VI.1981; Rotonda 19.V.1979, 6-8.VI, 17.VII.1980, 5-7.VII.1981, 17.VI.1982, 16.V.1983; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Terranova 3.VI.1981, 19.VI.1982; Cropani 6.VI.1981; fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN). **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 7.VI.1995 (SCL); Pollino: Monte Moschereto 25.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN). **Sicilia:** Nebrodi (ME): Monte Soro 30.VI.1981; Ficuzza (PA) 23.VII.1982; Madonie (PA): Mandria del Conte 6.VI.1989, Piano Colla 13.IX.1979, 4.VI.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3007); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1951-2005; (114 bis); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2782); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3386); **Friuli:** 1976-2000; (3007); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1951-2000; (2553); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (406); (3462); **Umbria:** 1951-1975; (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (773); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1901-1925; 1976-2005; (1047); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2108); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (360); (2949).

1408. - ***Odontosia carmelita*** **(Esper, 1798)**

Nota - Le citazioni per la **Romagna:** (1885), (1788), sono da riferire a *Ptilodon capucina* (2516).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3007); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3007); (3273); **Lombardia:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3073); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3007); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3007); **Veneto:** 1951-1975; (1787).

1409. - **(-)** ***Rhegmatophila alpina*** **(Bellier, 1881)**

Nota - È citata dubitativamente per **Piemonte** e **Liguria:** (2732); non è presente in **Italia**.

1410. - ***Rhegmatophila ricchelloi*** **Hartig, 1939**

Rhegmatophila ricchelloi è descritta su esemplari della **Sardegna centrale**: Cantoniera Sa Casa, 950 m (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 17 (1938): 65) (1338).

Nota - È citata genericamente per l'**Italia** (2980) e la **Calabria:** (2052); citazioni errate.

Sardegna: 1926-2000; (1338); (3129).

1411. - ***Gluphisia crenata*** **(Esper, 1785)**

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1950; (1038); (1064); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (1681); (3068); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (501); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3007); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3428).

1412. - ***Phalera bucephala*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 16.VI.1969 (GLL, PRN). **Toscana:** Molinelli (AR) 17 e 23.V.1986 (GRL). **Campania:** Scafati (SA) 4-10.VI, 28-31.VIII.1983 (SNN); Battipaglia (SA): Cioffi 26.V.1983; Roccadaspide (SA) 26.VI.1982, 11.IV, 15.VI, 15 e 25.VIII.1986; Serino (AV) 30.VI, 19.VII, 11.VIII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 5.VIII.2005. **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Lago Duglia 18.VII.1982, 15.VI.1983; Piano Ruggio 22.VII.1979; sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 19.VI.1982; Timpone Castellana 17-27.VII.1980; Rotonda 10.VI.1978, 19-20.V, 23.VII, 14.IX.1979, 7.V, 9.VII, 16.VII.1980, 8.V., 5-7.VII, 8.VIII, 25.VIII.1981, 17.V.1982, 16.V.1983; fiume Mercure 8.VI.1980, 8.V.1981, 20.VI.1982, 18.V.1983; San Severino 7.VII.1981; Cropani 6.VI.1981; Terranova 18.VII.1982, 1-10.V.1983; Rotondella (MT) 5.V.1978. **Calabria:** Sila: Camigliatello 15-25.VI.1978, 5-15.VII.1979; foce torrente Coserie 8.V.1981; Pollino: Monte Cerviero: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980; Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN); Umbriatico 14.VII.1982; Santo Stefano di Rogliano 5-10.VII.1981; Sersale (CZ) 13-27.VII, 17.VIII.1985, 14-20.VII, 19.X.1986 (RTN, PRN); Donnici: Fosso Cucolo 550 m 19.V.1995, 22.VI.1996; Diamante 25.VIII.1982 (SCL). **Sicilia:** Casteldaccia: Solanto 25.VII.1978 (PRN); San Martino (PA) V.1961; Piana degli Albanesi 23.VI.1988, 8.VIII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-

1925; 1976-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (3007); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3390); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (99); (1350); **Puglia:** 1951-2005; (1549); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (156); (2108); **Sicilia:** 1801-1925; 1976-2000; (109); (3083); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

1413. - **(-)** ***Phalera bucephalina*** **Staudinger, 1901)**

Nota - È citata per la **Calabria** come *P. bucephala bucephalina*: Polsi 1100 m (1013); probabilmente si tratta di *P. bucephaloides* (3007).

1414. - ***Phalera bucephaloides*** **(Ochsenheimer, 1810)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria:** (1388) potrebbe derivare dalla presenza nel Nizzardo. La citazione generica per l'**Emilia** è da confermare.

Nuovi dati - **Liguria:** Rocco (SV), 200 m, ex l. 6.VIII.1981 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VI.1976, 16.VII.1976 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Terranova 18.VII.1982. **Calabria:** Pollino: Civita 19.VII.1981 (PRN); Domanico (CS) 800 m 28.VI.1997 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (298); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1975; (1053); (2469); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** (1976-2000); (2732); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3007); **Toscana:** 1926-2005; (1821); (3462); **Umbria:** 1951-1975; (1821); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (2142); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2142); **Abruzzo:** 1951-1975; (1821); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (1013); (2201).

1415. - ***Peridea anceps*** **(Goeze, 1781)** (= *trepida* Esper, 1786)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.V.1987; Molinelli (AR) 25.IV.1986 (GRL). **Campania:** Ariano Irpino 2.VI.1981 (leg. Monaco, PRN); Roccadaspide (SA) 11.IV.1986 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 30.V.1985 (SNN); Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Mellitto 16.V.1979; Porto Cesareo (LE): Serra degli Angeli 2 m 10.VIII.1996. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 24.IV.1978; Monte Caperino 2.VI.1972; Monte Vulture (PZ) 31.III.1972; fiume Camastra 1-12.V.1975, 5.IV, 29.V.1976, 15.VI.1977; Calciano scalo 5.IV.1976; Trivigno scalo 18.IV.1977; Brindisi di Montagna 18.IV.1977; Albano scalo 18.IV.1977,

12.IV.1978; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 26.VI.1979; Pollino: Lago Duglia 10 e 18.VI.1982, 15.VI.1983; sorgente Acquafredda 3.V.1981, 19.VI.1982; Timpone Castellana 6.VI.1980, 19.V.1981; Lago Fondo 1700 m 15.V.1983; fiume Mercure 18.V.1983; Rotonda 10.VI.1978, 19.V.1979, 17.VI.1980, 9 e 26.V.1981, 19.IV, 16-17.V.1982, 16.V.1983; Terranova 1-10.V.1983; fosso Paraturo 16.V.1983; Cropani 6.VI.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 18.IV.1977, 18.IX.1976, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Santo Stefano di Rogliano 8.VI.1981, 5-10.VII.1981; Pollino: Civita 29.V.1975 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 18.IV.1995 (SCL). **Sicilia:** Piana degli Albanesi 12.V.1986; Ficuzza 31.V.1991 (GRL); Nebrodi: San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (583); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (629); (2346); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (314); (3429); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3462); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1976-2005; (2732); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (506); (3083); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; (781); (1976).

1416. - ***Stauropus fagi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 22.VI.1977 (GRL). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 1.VIII.1969 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.VI.1974, 25.VI.1976, 5.VI.1990; Molinelli 26.IV.1986, 2.VI.1989. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 29.VI.1973, 2.VII.1976 (GRL). **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Fosso Bifurno 17.VII.1976, 26.VI.1979; Albano scalo 12.IV.1978; Pollino: Belvedere 16.IX.1979, 16.VII, 16.VIII.1980; Lago Duglia 18.VII.1982; sorgente Acquafredda 19.VI.1982, 3.VI.1981 ; Lago Fondo 1700 m 15.V.1983; Timpone Castellana 23.VII.1979, 9.V.1981; Rotonda 10.VI.1978, 23.VII, 16.IX.1979, 7 e 21.VI, 9 e 17.VII.1980, 8-9 e 26.V.1981; Rotonda: fosso Paraturo 16.V.1983; fiume Mercure 8.VI.1980; Cropani 6.VI.1981; San Severino 7.VII.1981. **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 9.VII.1971, 3.VII.1972; Sila:

Camigliatello 5-15.VII.1979; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN); Mendicino (CS) 450 m 25.VI.1992 (SCL). **Sicilia:** Contrada Traversa 30.VII.1978 (PRN); Piana degli Albanesi 2.VI.1978, 12.V.1986; Palermo 6.V.1975; Ficuzza 14.V.1979, 31.V.1991 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3411); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (893); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2005; (1684); (3419); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1851-1900; 2001-2005; (298); (218); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1951-1975; 2001-2005; (2108); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2949); **Sardegna:** 1951-1975; (1976).

1417. - ***Harpyia milhauseri*** **(Fabricius, 1775)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Gran Paradiso 7.VII.1976. **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 1.VII.1980. **Liguria:** Andora 16.VI.1986. **Emilia:** San Clemente (BO). Torrente Sillaro, 7.V.1991 (coll. Bertaccini). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 25.VII.1976, 18.V.1987 (GRL). **Campania:** Oliveto Citra (SA) 7.IV.1990 (Bertaccini in litt.); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 5.VII.1983 (ADD); Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980, 9.V.1981; sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 19.VI.1982; Belvedere 16.VII.1980; Rotonda 9-17.VII.1980, 26.V, 29.VI.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Cropani 6.VI.1981. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Sersale (CZ) 20.X.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Castrovillari 10.VI.1978 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 2.VI.1995 (SCL). **Sicilia:** Contrada Traversa 30.VII.1978; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 5.VIII.1978 (PRN); Alpe Cucco 20.VI.1982; Ficuzza 25.V.1979; Piana degli Albanesi 29.IV.1981 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (268); (3068); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183);

Emilia: 1976-2000; (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (207); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (2429°); **Molise:** 1976-2005; (2142); (3403); **Campania:** 1976-2005; (2732); **Puglia:** 1951-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-1975; (1976-2000); (1943); (2108); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (532); (3083); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2249).

1418. - ***Spatalia argentina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia**; non isultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VII.1973, 20.VII.1975, 22.IX.1975, 26.V.1987, 1.VII.1987. **Molise:** Pesche 23.V.1982 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8-21.VII, 15.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Mottola (TA): Bosco Sant'Antuono 13.VIII.1977 (PRN). **Basilicata:** Nemoli 18.VII.1979, 4.VI.1981; San Severino 23.VII.1982; Monte Caperino 10.VIII.1983; Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.198, 3.VI.1981, 19.VI.198; Piano Ruggio 22.VII.1979; Lago Duglia 18.VI.1982; Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Rotonda 10.VI.1978, 23-26.VII.1979, 21.VI.1980, 29.IV, 8-9 e 26.V, 7.VII.1981, 13.V, 20.VI, 5.VII.1982; Cropani 6.VI.1981; fiume Mercure 8.VI.1980, 18.V.1983; Rotonda: Valli 18.VII, 9.VIII.1980; Rotonda: fosso Paraturo 16.V.1983; Terranova 9.VI.1983. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1978; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Civita 29.V.1975; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (464); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3068); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2410); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1951-2005; (2196); (3428); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (3007); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** (1976-2000); (2931); (2980).

Famiglia Noctuidae

1419. - ***Oxicesta geographica*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - È citata per il **Piemonte:** (114) e la **Liguria:** (114), citazioni probabilmente da riferire a *O. chamaesyces* (218). La citazione per l'**Alto Adige:** Bolzano (170) è errata, manca nella regione (1038). Nella collezione del Museo Civico di Zoologia di Roma sono conservati due esemplari dell'**Alto Adige**, uno etichettato: Bolzano, IV.1906 (Zilli in litt.). Tali reperti rendono plausibile la citazione in (170).

Alto Adige: 1851-1925; (170).

1420. - ***Oxicesta nervosa*** **(de Villers, 1789)** (= *chamaesyces* Guenée, 1852)

Nota - La specie è stata catturata esattamente sul confine, col paletto piantato fisicamente in Francia ma la luce che prendeva anche in Italia nei dintorni del Col de Brouis (Alpes Maritimes), 850 m, 30.VII.1982 (P.Provera leg., coll: Mus. Civ. Zool. Roma) (Zilli in litt.). Questa cattura rende plausibili le citazioni per il Piemonte e la Liguria. È citata come *O. chamaesyces* per l'**Emilia:** (377); citazione dubbia.

Piemonte: 1801-1850; (114), **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114).

1421. - ***Moma alpium*** **(Osbeck, 1778)** (= *orion* Sepp, 1762)

Nuovo dato - **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 5.VI.1967 (GLL, PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (3068); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1976; 2001-2005; (1004); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2166); (3462); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Campania:** 1801-1850; (712).

1422. - ***Acronicta alni*** **(Linnaeus, 1767)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 8.VIII.1983, 19.VII.1985; Val Bognanco (VB) 23.VI.1977 (GRL); Miasino (NO) A.VII.1978. **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 5.VI.1967 (GLL, PRN). **Trentino:** Levico 26.VI.1974. **Friuli:** Castelmonte (UD) 600 m 5.VII.1989; Taipana 500 m 30.VI.1987 (GRL). **Campania:** Agerola (NA), località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (3068); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:**

1951-1975; (1659); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Lazio:** 1951-1975; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Campania:** 1801-1900; 2001-2005; (70); (233).

1423. - ***Acronicta cuspis*** **(Hübner, 1813)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** sono da confermare (3041); anche la citazione generica per la **Romagna** è da confermare.

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1572); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1787); **Liguria:** 1926-1950; (1445); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Romagna:** (1926-1950); (1388); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1340); **Sardegna:** 1901-1925; 1976-2000; (781); (2478).

1424. - ***Acronicta tridens*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (81); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1976-2000; (24); (3335°); **Umbria:** 1976-2000; (2968); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

1425. - ***Acronicta psi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 17.V.1967, 18.V.1969 (GLL, PRN); Val di Susa: Rocciamelone 15.VII.1978 (CMC, PRN). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Liguria:** Conna (SV) 300 m 3.VII.1982 (CMC, PRN). **Lazio:** Roma 29.V.1975; lido di Roma 24.IV.1963 (DBR, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 15.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Mottola (TA): gravina di Petruscio 20.VIII.1993 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 8.VI.1993; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR); Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Timpone Castellana 27.VII.1980; Rotonda 9.VII.1980, 9.IX.1981; fiume Mercure 8.VI.1980 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 27.V.1995 (SCL); Pollino: Monte Moschereto 15.VII.1980; Vallone Colloreto 6.VI.1981; Civita 19.VII.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979. **Sicilia:** Altavilla Milicia: Valle del Corvo 5.VIII.1978, 22 e 28.VIII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1975; (377); (1835); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2206); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (247); (3228); **Sardegna:** 1926-2000; (1476); (2587).

1426. - ***Acronicta aceris*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 9.VII.1983; Val Bognanco (VB) 17 e 21.VI.1977 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 2.VII.1980; Castellaneta Marina (TA)14.VII.1980 (PRN). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 17.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Rotonda 18.VII.1980; Rotonda: Valli 18.VII.1980, 8.V.1981; Cropani 6.VI.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (932); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; (110); (1004); **Romagna:** 1976-2005; (2423); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1926-2005; (1127); (3435); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1926-1950; 2001-2005; (1350); **Puglia:** 1951-2005; (2230); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2206); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254).

1427. - ***Acronicta leporina*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 30.VI, 5.VII.1976 (GRL).

Piemonte: Miasino (NO): lago d'Orta 18.V.1969 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 7.VII.1983; Val Bognanco (VB) 17.VI.1977 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m V.1968 (GLL, PRN). **Liguria:** Monte Ceppo (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (239); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (161); (3068); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (201); **Romagna:** 1976-2000; (2185); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3428); **Sicilia:** 1976-2000; (3254).

1428. - ***Acronicta megacephala*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 10.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 18.V.1969. **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1969 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 6.VII.1967 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 19.V.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Castellaneta Marina (TA), 10 m, 7-12.VII.1980. **Basilicata:** Pollino: Rotonda, 650 m, 10.VI.1978, 16.IX.1979, 8.VII.1981; fiume Mercure, 320 m, 8.VI.1980; San Severino, 700 m, 7.VII.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (517); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (2168); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (144); (1340).

1429. - ***Acronicta strigosa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1901-1925; (736); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1851-1900; (161); (268).

1430. - ***Acronicta menyanthidis*** **(Esper, 1789)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Lombardia** e la **Liguria** sono da confermare.

Lombardia: (1976-2000); (2372); **Trentino:** 1951-1975; (1943); **Alto**

Adige: 1901-1925; (1951-1975); (812); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Liguria:** (1976-2000); (2209).

1431. - ***Acronicta auricoma*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 5.VII.1980 (GRL). **Friuli:** Prepotto (UD) 15.VII.1975 (MRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (2362); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1926-1975; (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; (218); (517); **Lazio:** 1851-1900; (344); **Abruzzo:** 1976-2000; (2429°); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2800).

1432. - ***Acronicta euphorbiae*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *euphrasiae* Brahm, 1791)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 12.VII.1976 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 6.VIII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; San Severino 15.IX.1979; Rotonda 14 e 16.IX.1979 (PRN). **Calabria:** Pollino: Campotenese 2.VI.1981 (GRL). **Sardegna:** Gennargentu: Desulo 25.VII.1984 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (146); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (129); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1950; 1976-2005; (24); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (890); (3419); **Abruzzo:** 1901-2005; (890); (3402); **Molise:** 1976-2005; (2141); (3403); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (711); (1976).

1433. - **(?)** ***Acronicta cinerea*** **(Hufnagel, 1766)** (= *abscondita* Treitschke, 1835; *myricae* Guenée, 1852)

Nota - È citata per il **Piemonte:** (114) come *A. abscondita* Tr. e per l'**Alto Adige** come *A. euphorbiae* f. *myricae* Gn. (1053); citazioni probabilmente da riferire a *A. euphorbiae*. La citazione per la **Venezia Giulia** è da confermare.

Venezia Giulia: 1901-1925; (760).

1434. - ***Acronicta rumicis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 8.VII.1983 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 16.VIII.1967 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 28.VII.1973, 14.IV.1979, 20.IV.1984. **Lazio:** Oriolo 29.V.1984 (GRL); Monte Sacro 4.VII.1958, 6.VIII.1957, 11.IX.1939, 12.X.1964; Frascati 3.V.1968; lido di Roma 24.IV.1963 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 1.III, 27.IV, 17.VIII.1984, Torre Lama 10-17.VIII.1984; Roccadaspide (SA) 15 e 25.VIII.1986; Serino (AV) 30.VI.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Castellaneta Marina 7-14.VII.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 25.V.1986; agro Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Lago Sirino 22.VI.1980 (GRL); Metaponto (MT): San Marco 8.IV.1985; Rotonda 26.VII.1979, 8.VII, 25.VIII, 4 e 23.IX.1981, 20.VI.1982; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; San Severino 15.IX.1979; fiume Mercure 20.VI.1981 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; foce Torrente Coserie 20.VII.1981; Sersale (CZ) 27.VII, 24-27.VIII.1985; Pollino: sorgente Acquaformosa 25.VII.1979; Monte Moschereto 15.VI.1980 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sardegna:** Belvì (NU) 16.VI.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1900); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2283); **Friuli:** 1851-2000; (174); (2283); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); (3164); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2536); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (109); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

1435. - ***Craniophora ligustri*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Monte Mottarone 800 m 20.VIII.1935; Miasino (NO): Lago d'Orta 8.VIII.1968, 17.V.1969 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 14.VI.1985; Val Bognanco (VB) 5.VII.1980; Valdieri 13.VI.1985 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Alto Adige:** Vinschgau, 23.VI.1928 (ex coll. Astfäller, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 7-10.VII.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 27.VII.1973, 18.IX.1982 (GRL). **Puglia:** Mellitto 16.V.1979; Bari: Santa Fara 1-

15.VI.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 14-18.V.1986; agro Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: fiume Mercure 20.VI.1982; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 6.VI.1980, 23.VII.1979 (ssp. carbolucana Htg.); Rotonda 16.IX.1979, 7.VI.1980 (ssp. carbolucana Htg.), 4.IX.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Bradano: Santa Lucia 29.VIII.1976 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1951-2000; (1797); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (358); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (410); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1951-2005; (2272); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2000; (2968); (3222); **Campania:** 1976-2005; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1951-2005; (1839); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2587).

1436. - ***Craniophora pontica*** **(Staudinger, 1879)**

Basilicata: 1976-2000; (2168); (2528); **Calabria:** 1976-2000; (2195).

1437. - ***Simyra nervosa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *oxyptera* Esper, 1788)

Phalaena oxyptera è descritta su esemplari della **Toscana:** dintorni di Firenze (9*); (2576).

Nota - La citazione generica per il **Piemonte** va confermata.

Piemonte: (1976-2000); (2209); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Toscana:** 1751-1800; (9*); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1340).

1438. - ***Simyra albovenosa*** **(Goeze, 1781)**

Nuovi dati - **Lazio:** Focene (Roma) 27.VIII.1986 (GRL). **Puglia:** foce Fiume Candelaro (FG), 0-5 m, 1.VII.1980 (1m). **Basilicata:** Policoro (MT): Bosco Pantano, 10 m, 19.VI.1978 (PRN).

Piemonte: 1976-2000; (2957); **Lombardia:** 1951-1975; (3071); **Emilia:** 1951-2000; (1577); (2346); **Romagna:** 1951-2005; (2268); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (3044); (3365); **Lazio:** 1976-2000; (2141); (3268); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2168); **Calabria:** 2001-2005; (3467); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1340); (3254).

1439. - ***Cryphia receptricula*** **(Hübner, 1803)** (= *strigula*

Borkhausen, 1792)

Nota - La citazione generica per il **Trentino**: (1388) è da riferire all'**Alto Adige**.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 13.VII.1974, 25.VI, 18.VII.1976, 16 e 18.VII.1978, 2.VII.1979, 29.VI.1982 (GRL).

Piemonte: (1801-1850); (114); **Lombardia:** (1851-1900); (2362); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2000; (514); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-1950; (1127); **Abruzzo:** 1926-1975; (1127); (2141); **Campania:** 1801-1850; (109); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1851-1925; (388); (543).

1440. - ***Cryphia fraudatricula*** **(Hübner, 1803)**

Nota - La citazione generica per la **Toscana** è molto dubbia.

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (2410); **Trentino:** 1951-1975; (1820); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1820); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (2410); **Toscana:** (1926-1950); (1388).

1441. - ***Cryphia simulatricula*** **(Guenée, 1852)** (= *zobeli* Heinrich, 1923)

Bryophila fraudatricula var. *simulatricula* è descritta su un esemplare della **Toscana**: Firenze (in Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes. Species Géneral des Lépidoptères, V. Noctuelites, I: 26, N. 24, Pl. 3, 4) (120*); (2576).

Trentino: 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1951-1975; (1958); (1633); **Veneto:** 1951-1975; (1734); **Liguria:** 1951-1975; (3183); **Toscana:** 1851-1900; (120*).

1442. - ***Cryphia algae*** **(Fabricius, 1775)** (= *degener* Denis & Schiffermüller, 1775; *calligrapha* Borkhausen, 1792; *chloris* Borkhausen, 1792; *mendacula* Hübner, 1813)

Phalaena Noctua calligrapha e *Phalaena Noctua chloris* sono descritte su esemplari di **Toscana:** Firenze (16*), (2576);

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20 e 27.VII.1975, 15.VII e 20.IX.1976, 13 e 25.VI.1977, 14 e 16.VII.1979, 18.VI.1985, 26.VII.1988 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 13.VIII.1984 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 9.VII.1990 (SCL); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sardegna:** (f. calligrapha Bkh.) Belvì (NU) 6.IX.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:**

1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (16*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (344); (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (314); (3443); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3222); (3403); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (218); (2249).

1443. - ***Cryphia pallida*** **(Béthune-Baker, 1894)**

Toscana: 1976-2005; (3044); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Lazio:** 1951-2000; (1471); (3268); **Abruzzo:** 1951-1975; (1471); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Puglia:** 1951-1975; (2350); **Sicilia:** 1976-2000; (3254); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1444. - ***Cryphia ochsi*** **(Boursin, 1940)**

Nuovi dati - **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7 e 22-24.VII.1986 (TRG, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): ponte Cagnolino 11-20.IX.1992 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1951-1976); (1943); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1471); (1787); **Alto Adige:** 1926-1975; (1471); (1787); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1445); (3183); **Emilia:** 1926-1950; (1353); (1471); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3171); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-2000; (1353); (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (979); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1976-2005; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (2597); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1445. - ***Cryphia ravula*** **(Hübner, 1813)**

Nota - "*C. rectilinea* e *C. ravula* sono due elementi affini a gravitazione rispettivamente est- ed ovest-mediterranea; secondo Boursin (1952) in Italia sarebbe presente l'entità orientale, ma l'esatta attribuzione delle popolazioni italiane deve essere ancora definita con certezza" (2931). "*Cryphia ravula*, *rectilinea* e *vandalusiae* sono una tripletta di

specie molto simili. Secondo Boursin (1952) la *ravula* f. *medio-ochracea* Bytinski-Salz di Sardegna sarebbe la specie E-mediterranea (*rectilinea*) ma Dufay (1978) e Rungs (catalogo Corsica) correggono Boursin in merito alla presenza di *rectilinea* nelle Alpes Maritimes ed in Corsica, attribuendo i reperti a *vandalusiae*. Dufay lascia intendere che anche alcune popolazioni italiane di *ravula* e/o *rectilinea* e quelle sarde potrebbero essere *vandalusiae"* (Zilli in litt.). Le citazioni generiche per **Piemonte** e la **Lombardia:** (218) e le citazioni per l'**Alto Adige:** (390), (1038), (1083), sono da verificare, probabilmente da riferire a *C. rectilinea* (2931). Le citazioni per l'**Emilia:** (1235) e la **Romagna:** (1010) sono da riferire a *C. rectilinea* (2516). Le citazioni di **Sicilia:** (1328) e **Sardegna:** (1260) sono da confermare.

Nuovo dato - **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1996 (TRG, PRN).

Toscana: 1901-1925; (517); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1926-2950); (1328); **Sardegna:** 1926-1950; (1260); (?) (2931).

1446. - **(?) *Cryphia vandalusiae* (Duponchel, 1842)**

Nota - È citata genericamente per l'**Italia**: (2980), per l'**Italia settentrionale**: (2931) e dubitativamente per la **Sardegna:** (2931), (2980); non risultano altre citazioni per l'**Italia**. Dufay lascia intendere che anche alcune popolazioni italiane di *ravula* e/o *rectilinea* e quelle sarde potrebbero essere *vandalusiae* (Zilli in litt.).

1447. - ***Cryphia ereptricula* (Treitschke, 1825)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia:** Palermo (357) e la **Sardegna:** (218) sono poco attendibili. Le citazioni per la **Romagna** e la **Toscana** sono da confermare.

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; (218); (736); **Lombardia:** (1851-1900); (218); (1943); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (2014); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (2014); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Romagna:** (1951-1975); (1943); **Toscana:** 1851-1900; (206).

1448. - ***Cryphia rectilinea* (Warren, 1909)**

Emilia: 1926-1975; (1235); (1577); **Romagna:** 1901-1925; 1951-1975; (1010); (1885); **Toscana:** 2001-2005; (3429); **Sardegna:** 1926-1950; (1288).

1449. - ***Cryphia raptricula* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *divisa* Esper, 1791; *raptriculoides* Turati, 1912)

Bryophila raptriculoides è descritta su esemplari della **Sardegna**: Aritzo e della **Sicilia**: Ficuzza (745) & (781).

Nota - È citata per il **Regno di Napoli** (70). La citazione generica per la **Campania** va confermata.

Nuovi dati- **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 8.VII.1980 (GRL). **Puglia:** Polignano 29.VI.1979; Castellaneta Marina 10-14.VII.1980. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980, 23.VII, 13.IX.1979; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; sorgente Acquafredda 15.VIII.1980; Piano Ruggio 18.VII.1977; Terranova 10-13.VIII.1980, 11.X.1983; Rotonda 18.VII.1980. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN). **Sardegna:** Belvì 10.VII, 9.VIII.1975 (HTG, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 2001-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (9*); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2160); (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-1975; 2001-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (314); (3443); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** (1926-1950); (1943); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (324); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

1450. - ***Cryphia petricolor*** **(Lederer, 1870)** (= *amoenissima* Turati, 1909)

Bryophila amoenissima è descritta su individui dell'**Abruzzo:** Maiella (622).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (462); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (314); (807); **Liguria:** 1976-2000; (2825); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2599); **Lazio:** 1926-1950; 1976-2000; (1085); (2141); **Abruzzo:** 1901-2000; (622); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3222).

1451. - ***Cryphia domestica*** **(Hufnagel, 1766)** (= *perla* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - *Bryophila perla* è citata genericamente per tutto il **Regno di Napoli** (70). Le citazioni per l'**Emilia**, la **Toscana** e la **Calabria** vanno confermate.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:**

(1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (129); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; (110); **Toscana:** (1751-1800); (24); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (2141); **Calabria:** 1801-1850; (70); **Sicilia:** (1851-1900); 1926-2000; (1384); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2249).

1452. - ***Cryphia muralis*** **(Forster, 1771)** (= *glandifera* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Liguria:** Caprieto di Vobbia 11.VII.1977 (CMC, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 15.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 2.VII.1973, 2.IX.1976, 24.VI.1977, 18.IX.1982 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986; Battipaglia (SA): Torre Lama 10.VIII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Mola (BA) 11.VII.1979; Bari 10-15.IX.1980 (f. par Hb.); Putignano (BA): Bosco Petruzzi 22-24.VII.1986; gravina di Riggio 20.VIII, 19 e 29.IX.1991; gravina di Petruscio 12.VIII.1983, 13.VIII.1985, **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Rotonda 14.IX.1979, 1.VIII, 15.IX.1980; Rotonda: Valli 16.VII.1980; Terranova 24.IX.1981. **Calabria:** Camigliatello: Il Cupone 19.IX.1985; Sersale (CZ) 20.X.1985 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sardegna:** Belvì (NU) 5.VIII.1976 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (840); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (367); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (72); (2536); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (72); (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1801-1850); 1976-2005; (70); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (330); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2249).

1453. - ***Bryonycta pineti*** **(Staudinger, 1859)**

Nota - È riportata per l'**Italia settentrionale** (2931), (2980). Un individuo è stato catturato sulle Alpi Liguri da Luigi Cassulo (Zilli in litt.).

Liguria: (1976-2000).

1454. - ***Orectis massiliensis*** **(Milliére, 1864)** (= *euprepiata* Dannhel, 1933)

Orectis euprepiata è descritta su esemplari del **Lazio**: Tivoli e fiume Anio presso Subiaco (1231).

Nota - La citazione di *O. massiliensis* per la **Sicilia:** (2980) è da riferire a *O. proboscidata*.

Liguria: 1901-1925; (894); (3272); **Toscana:** 1976-2000; (3190); (3428); **Lazio:** 1926-1950; (1231); (2642); **Abruzzo:** 1926-1950; (3326).

1455. - ***Orectis proboscidata*** **(Herrich-Schäffer, 1851)** (= *barteli* Turati, 1907)

Orectis barteli è descritta su esemplari della **Sicilia**: Etna, Serra Pizzuta (Nicolosi) (553).

Nota - La citazione per la **Liguria:** (894) va riferita a *O. massiliensis* (2947).

Piemonte: 1901-1925; (736); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (390); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3064); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (650); **Lazio:** 1926-1950; (1085); (2143); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (360); (3254).

1456. - ***Idia calvaria*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna** va confermata.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (424); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2642); **Emilia:** 1851-1900; (377); (262); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (218); (3428); **Lazio:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1900; (343); (2597); **Sardegna:** (1801-1850); (114); (2931).

1457. - ***Simplicia rectalis*** **(Eversmann, 1842)**

Lombardia: 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-

1900; 1951-1975; (171); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1681); (1787); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Marche:** 1951-1975; (2085).

1458. - ***Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794)** (= *derivalis* Hübner, 1796; *glaucinalis* auct. nec Linnaeus, 1758)

Phalaena tristalis è descritta su esemplari di **Italia** (Entomologica Systematica, II: 224) (22*); (2609).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 10.VII.1979 (GRL). **Piemonte:** Val di Susa: Rocciamelone 15.VII.1978 (CMC, PRN). **Campania:** Serino (AV) 19.VII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.VI.1985 (SNN). **Basilicata:** fiume Camastra 11.VIII.1975; Pollino: San Severino 7.VII.1981 ; fiume Mercure 6.VI.1981; Cropani 6.VII.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Aspromonte: Gambarie 8.VIII.1971, 13.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 2001-2005; (269); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1951-1975; 1951-2005; (314); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1976-2005; (2429°); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; (99); (1350); **Puglia:** 1951-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (3272); (2168); **Sicilia:** 1851-1900; (310); (144); **Sardegna:** 1901-1925; 1976-2000; (841); (2587).

1459. - ***Nodaria nodosalis* (Herrich-Schäffer, 1851)** (= *aethiopalis* Herrich-Schäffer, 1851)

Herminia nodosalis è descritta su esemplari della **Sicilia** (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 2: 388, Taf. 108, f. 605) (100*); (2576).

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 20.X.1988 (RTN, PRN). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 10.X.1986, 10.XI.1987, 25.V.1988 (PRT, PRN). **Calabria:** foce torrente Coserie 4.VI.1981 (PRN).

Piemonte: 1976-2000; (2642); **Liguria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (430); (3183); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** (1976-2000); (2725); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344);

(3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2642); **Calabria:** 1976-2005; (2350); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (100*); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1926-2000; (1476); (2587); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1460. - ***Macrochilo cribrumalis*** **(Hübner, 1793)** (= *cribralis* Hübner, 1796)

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1976-2000; (2642); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (834); (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2268); (2643); **Toscana:** 1976-2000; (2268); **Lazio:** 1976-2000; (2465); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3349).

1461. - ***Herminia tarsicrinalis*** **(Knoch, 1782)**

Nota - È citata per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati -**Basilicata:** Pollino: fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980, 20.VI, 26.VII.1982 (PRN).

Piemonte: 1851-1925; 1976-2005; (2603); (3414); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (3241); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2000; (98); (3068); **Friuli:** 1901-1950; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2642); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (836); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

1462. - ***Herminia grisealis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *nemoralis* Fabricius, 1775)

Piemonte: 1801-1850; 1901-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1926-2000; (1064); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (446); (2591); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2346); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (1839); (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); (3324); **Campania:** 18011850; (72); **Arcipelago campano**: 1801-1850; (72); **Puglia:** 18011850; (72); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 2001-2005; (3401); (3347).

1463. - ***Herminia tenuialis*** **(Rebel, 1899)**

Zanclognatha tenuialis è descritta su esemplari dell'**Alto Adige**: Bolzano (luogo tipico), **Piemonte:** Savigliano (CN) e Slovenia (Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 49 (2/3): 168, Tav. IV, fig. 6) (424).

Piemonte: 1851-1900; 1976-2005; (424); (3414); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (807); (3300); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (1951-1975); (424); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1976-2000; (2440); **Liguria:** 1976-2000; (2642); **Emilia:** 1901-1925; 2001-2005; (836); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2390); (2643); **Toscana:** 1901-1925; (517).

1464. - ***Polypogon tentacularia*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per **Toscana:** (19), (206), **Puglia:** Terra d'Otranto (70) e **Sicilia:** Valle Corta (76), (144), sono poco attendibili.

Piemonte: (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (218); (2362); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1801-1900; (98); (244); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (181); (1425).

1465. - ***Polypogon gryphalis*** **(Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - La citazione generica per il **Trentino**: (1388) è da riferire all'**Alto Adige**.

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (807); (1787); **Trentino:** 1951-1975; (1787); (2014); **Alto Adige:** 1851-1925; (1951-1975); (390); (2342); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1976-2000; (3068); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Lazio:** 1926-1950; (7428); (1207).

1466. - ***Polypogon plumigeralis*** **(Hübner, 1825)** (= *barbalis* Denis & Schiffermüller, 1775; *crinalis* Treitschke, 1829)

Nota - Le illustrazioni di *P. plumigeralis* di Berio in (2642) sono *P. crinalis;* tutti gli esemplari di **Italia** esaminati sono *P. crinalis* (3041). "Secondo alcuni autori (Fibiger & Hacker, 1991; Vives Moreno, 1994) i due nomi non si riferirebbero alla medesima specie, come ritenuto da lungo tempo, ma a due entità distinte; le popolazioni italiane necessitano quindi di una precisa attribuzione" (2931).

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 20.VI.1977. **Liguria:** Andora 23.VIII.1981. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 21 e 22.IX.1976 (GRL). **Campania:** Portici (NA): parco della Reggia 18.VI.1983, Serino (AV) 30.VI.1984, Battipaglia (SA): Cioffi 27.VIII.1984 (RTN, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Mola (BA) 19.VI.1980; Bari: Campus 10-15.IX.1980, 10.VI.1982 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 4.X.1986, 9.V.1988 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 4.VI.1992 (NRD). **Basilicata:** Vulture (PZ):

Monticchio 6.VI.1983; Pollino: San Severino 7.VII.1981(PRN); Policoro (MT): bosco Pantano 14.VI.2000; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Sicilia:** Casteldaccia VIII.1919 (leg. Dannehl, INE).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (1502); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); **Veneto:** 1801-1850; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (2648); **Emilia:** 1851-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (99); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (365); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3272).

1467. - ***Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758)** (= *barbalis* Clerck, 1759; *palpalis* Fabricius, 1775)

Nota - La citazione per il **Regno di Napoli** (70) è molto dubbia. La citazione per il **Lazio** va confermata.

Piemonte: 1976-2000; (2642); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (2051); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (410); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2000; (19); (3335°); **Marche:** 1976-2000; (2642); **Lazio:** 1851-1900 (344).

1468. - ***Pechipogo flavicrinalis* (Andreas, 1910)** (= *gigantea* Turati, 1911)

Herminia gigantea è descritta su esemplari della **Sardegna:** Aritzo 1000 m (708).

Nota - "*Herminia gigantea* Turati, 1911 viene comunemente considerata sinonimo di *Herminia flavicrinalis* Andreas, 1910, ma alcune differenze nei palpi indicherebbero la validità specifica del taxon descritto da Turati. Entrambe le entità risulterebbero pertanto presenti in **Sardegna"** (2931).

Sardegna: 1901-1950; (708); (1476).

1469. - ***Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763)** (= *ventilabris* Fabricius, 1787; *tarsiplumalis* Hübner, 1796; *tarsipennalis* Hübner, 1796)

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (278) è molto dubbia.

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Trisa 23.VII.1947 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 28.VI.1980 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 11.VIII.1986, Serino (AV) 5.V.1984 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (2642); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2642); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (262); (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2593); (3435); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (70); (2350).

1470. - ***Zanclognatha zelleralis* (Wocke, 1850)** (= *tarsicristalis* Herrich-Schäffer, 1851)

Nuovi dati - **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 30.VII.1986 (TRG, PRN); gravina di Petruscio 20.VIII.1991 (NRD). **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR), 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (1787); (3272); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-1950; 1976-2000; (1085); (3044); **Abruzzo:** 1976-2000; (2422°); **Campania:** 1901-1925; (1047); **Puglia:** 1951-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1951-2000; (2232); (2350); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (343); (3254).

1471. - ***Zanclognatha tarsipennalis* (Treitschke, 1835)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1976-2005; (2642); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (446); (2795); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2642); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (262); (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Lazio:** 1851-1900; (344); **Abruzzo:** 1901-1925; 2001-2005; (817); (3324); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

1472. - ***Hypenodes kalchbergi* Staudinger, 1876**

Hypenodes kalchbergi è descritta su esemplari della **Sicilia:** Castelbuono: Cappella di San Guglielmo (Entomologische Zeitung,

Stettin, 37: 139) (225).

Sicilia: 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (225); (3254).

1473. - ***Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850** (= *turfosalis* Wocke, 1850)

Nota - Manca in **Italia** (3041). Le citazioni per la **Toscana:** (218), le **Marche:** (385) e la **Sicilia:** (2597) sono dubbie.

Alto Adige: 1976-2000; (3241); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1474. - ***Schrankia costaestrigalis* (Stephens, 1834)** (= *hartigi* Berio, 1991)

Nuovi dati - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.VI.1983 (PRN); Policoro (MT): bosco Pantano 4.IV.2001 (SCR).

Piemonte: 1976-2005; (2642); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2591); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (765); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (760); **Liguria:** 1926-1950; (1445); (2642); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3462); **Marche:** 1976-2000; (2882); **Lazio:** 1951-2005; (2143); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (233); (2350); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (148); (3254); **Sardegna:** 1926-2000; (1260); (2642).

1475. - **(-)** ***Schrankia hartigi* Berio, 1991)**

Schrankia hartigi è descritta su un esemplare della **Sardegna:** Musei (CA), 120 m (2642).

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** di *Schrankia hartigi* in (2642), (2931), vanno riportate a *S. costaestrigalis*, di cui è sinonimo (2980).

1476. - ***Schrankia taenialis* (Hübner, 1809)** (= *albistrigatus* Haworth, 1809)

Nota - Le citazioni per l'**Emilia**e la **Sicilia** attendono conferma.

Piemonte: 1976-2005; (2642); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Trentino:** 1976-2000; (3293); **Alto Adige:** 1976-2000; (3293); **Emilia:** 1851-1900; (377); **Sicilia:** 1851-1900; (205); (2597); **Sardegna:** 1976-2000; (2642).

1477. - ***Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *italica* Fabricius, 1781)

Noctua italica è descritta su esemplari di **Italia** (11*); (2567).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 10.IX.1963, 25-30.VIII.1965, 27.VII.1974 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 31.V.1976 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 21.IV, 7 e 28.VII, 27.VIII.1984, Torre Lama 2-

27.VIII.1984, 1-22.IX.1988; Roccadaspide (SA) 15 e 21.VII, 15 e 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** San Severo (FG) 14.VII.1983; Bitritto 23.IV.1983; Bari: Santa Fara 21.IV.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7 & 22-24.VII, 17-19.IX.1986; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Manduria 20.VII.1977 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 11.VIII.1986, 14.V.1988; agro Gallipoli (LE) 14.VIII, 10.IX.1986 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 18-24.IX.1992, 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 27.VI.1979; 5.VII.1983; Metaponto: San Marco 19.V.1985; Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Rotonda 16.IX.1979, 1-4.IX.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Terranova 20.VI.1983 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 2.V.2001, 9 e 25.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII.1985; foce torrente Coserie 8.V.1982; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2968); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (2060); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (181); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-1975; (125); (3250); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-2000; (1741); (3138); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3443); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2005; (2516 (3462); **Molise:** 1976-2005; (3222); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); **Puglia:** 1901-2005; (921); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2249).

1478. - ***Aedia funesta*** **(Esper, 1786)**

Nota - Citata con dubbio per la **Toscana:** (218); probabilmente questa citazione è dovuta alle segnalazioni di Rossi di *Noctua leucomelas* L. in (19) o di *N. alchymista* F. in (24), considerate entrambe sinonimi di *Catephia alchymista* Schiff. da Treitschke: (45). Pertanto questa specie non è ancora segnalata in **Toscana.**

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1901-1925; (3272); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); (218); **Lazio:** 1926-1950; (1085).

1479. - ***Aedia leucomelas*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Alto Adige:** Bolzano 12.VII (coll. Floriani). **Toscana:**

Ansedonia (GR) 16.VIII.1961, 22.VIII.1962, 5 e 15-24.VIII, 10.IX.1963 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 30.X.1983, 17.VIII.1984, Torre Lama 1-15.IX.1988; Portici 2.VI.1982 (RTN, PRN). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 29.IX.1982, 22.V.1983; gravina di Petruscio 13.VIII.1985, 4.VIII.1991; Ceglie Messapico 25.IX.1983. **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; fiume Mercure 6.X.1980 (PRN). **Sicilia:** Pantani di Vendicari (SR) 8.VI, 1.VIII, 7.IX, 5.X.1997, 13.VIII.1999, 20.V, 22.VIII.2001 (BLL/RSS).

Piemonte: 1976-2005; (2642); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1901-1975; (2847 (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (812); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1801-1850; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2642); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1976-2005; (2593); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2091); (2536); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (197); (3254); **Sardegna:** 1851-1900; 1926-2000; (331); (2249).

1480. - ***Catephia alchymista*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 1 e 18.VII.1975, 15.VII.1976, 10.VII.1981, 25.VII.1986, 1.VII.1987 (GRL). **Campania:** Portici: Parco della Reggia 16.VI.1983 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 12-13.VII.1985 (SNN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino E.VIII.1992; Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980 (PRN). **Calabria:** fiume Sarmento 7.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (2346); **Romagna:** (1851-1900); 1951-2005; (314); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2599); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 2001-2005; (3435); **Molise:**

1976-2000; (3222); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (207); **Puglia:** 1976-2000; (3466); **Basilicata:** 1976-2000; (2642); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1851-2000; (301); (2249).

1481. - ***Zethes insularis*** **Rambur, 1833** (= *bruzzanaria* Petagna, 1863)

Geometra bruzzanaria è descritta su esemplari della **Calabria**: Valle di Bruzzano (156).

Nuovi dati - **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 5.VII.1983, 12.VII.1983 (ADD); Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 11-15.VI, 26-312.VIII.1992 (PRN). **Puglia:** Pianelle 14.VIII.1971, 16.VIII.1973 (PRN); gravina di Petruscio 13.IX.1991 (NRD); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR).

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2642); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2575); **Basilicata:** 1976-2000; (2075); (2642); **Calabria:** 1801-1900; 1976-2000; (156); (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (197); (3228); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (218); (3331).

1482. - ***Pandesma robusta*** **(Walker, 1858)**

Friuli: 1976-2000; (3209); **Lazio:** 1976-2000; (3268); **Calabria:** 1976-2000; (3221); **Sicilia:** 1976-2005; (3127); (3320); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226).

1483. - ***Ophiusa tirhaca*** **(Cramer, 1777)** (= *vesta* Esper, 1789)

Phalaena Noctua vesta è descritta su esemplari dell'**Italia centrale** e della Francia meridionale (9*) (3079).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 10.VI.1972 (DBR, PRN). **Puglia:** Lido Silvana (TA) 12.IX.1967; Bosco delle Pianelle (TA) 16.V.1969; gravina di Laterza (TA) 29.IX.1982, 28.IV.1992; gravina di Petruscio (Mottola, TA), 100-150 m, 21.VI.1991; gravina di Riggio (Grottaglie, TA), 350-400 m, 20.VIII.1991 (NRD); Otranto (LE), 19.IV.2000 (PRN). **Basilicata:** Fiume Noce (PZ), 23.VI.1998; Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto (CS), 800 m, 7.X.1980 (PRN); Praia a Mare (CS), 10 m, 10.VIII.1982; Amendolea (RC), 65 m, 9.IX.2000; Civita (CS): Gole del Raganello, 100 m, 12.IX.1989; Staletti (CZ): Copanello, 80 m, 17.IX.1998 (SCR); **Sardegna:** Musei (CA) 8.X.1972 (HRT, PRN).

Lombardia: 1926-2000; (1238); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1681); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (358); (2060); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1734); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1551); (2648); **Emilia:** 1926-2000; (1551); (3158); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (2950); **Toscana:** 1801-1900; 1951-2005; (45); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-

2005; (1741); (3275); **Umbria:** 1951-1975; (1716); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (3053); (3356); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1951-1975; (1853); (1961);); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (783 bis); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2642); **Calabria:** 1976-2000; (3468); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (75); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1801-1925; 1951-2000; (114); (2249).

1484. - ***Minucia lunaris*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 13.IV.1963, 18.IV.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 31.V.1973, 3.V.1975, 3.VI.1988 (GRL). **Lazio:** Ostia 27.IV.1963 (DBR, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 9.V, 6.VI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 4.IV.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2642); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2005; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (1047); (2232); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (603); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3272).

1485. - **(-)** ***Clytie syriaca*** **(Bugnion, 1837)**

Nota - È citata genericamente per l'**Italia** (3041) e la **Sicilia:** (448), citazioni da riferire ad altra specie.

1486. - ***Clytie illunaris*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la **Liguria** va confermata.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 3.VIII.1961, 5.VIII.1964, 24.VII.1969 (DBR, PRN). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 20.VII.1985, 11.VIII.1986, 9.V.1988; agro Gallipoli (LE) 14.VIII.1986 (PRT, PRN); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 5.VII, 12.VII.1983; Matera 1.VIII.1982; Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 6-15.VI.1992 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Diamante (CS) 25.VIII.1982; foce torrente Coserie 4.VI, 20.VII.1981 (PRN). **Sardegna:** Musei (CA) 13-

21.VI, 6.VII.1974 (HRT, PRN).

Alto Adige: 1851-1900; (170); (566); **Veneto:** 1951-1975; (2051); **Liguria:** (1801-1850); (114); (566); **Emilia:** 1976-2000; (2286); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1900; 1926-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1945); **Marche:** 1926-1975; (1945); (2725); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1976-2005; (2593); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2642); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (1945); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (1945); (2201); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (197); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1926-2000; (1476); (2249).

1487. - ***Dysgonia torrida*** **(Guenée, 1852)**

Nuovo dato - **Puglia:** Latiano (BR), 98 m, 20.VI.1998 (PRN).

Lazio: 1901-1950; (3052); **Puglia:** 1976-2000; (2800); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-2000; (813); (2800).

1488. - ***Dysgonia algira*** **(Linnaeus, 1767)** (= *achatina* Sulzer, 1776)

Noctua achatina è descritta su esemplari del **Piemonte** (8*); (2576).

Nuovi dati - **Veneto:** Cison di Valmarino 1.IX.1963 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.VII.1973, 10.VI.1981 (GRL). **Lazio:** Roma 31.V.1964 (DBR, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 11.IV, 15.VII, 15 e 25.VIII.1986; Serino (AV) 21-28.VII.1984; Battipaglia (SA): Torre Lama 2-27.VIII.1984, 8.IX.1987, 1-8.IX.1988; Portici 30.VI.1983 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 6-12.VII, 21.VIII.1985 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Palazzo d'Ascoli (FG) 4.X.1985; Terlizzi 25.V-28.VI.1978; San Giorgio (BA) 15.VI.1981; Putignano (BA): bosco Petruzzi 18.VI.1985, 5-7.VII.1986; gravina di Petruscio 12.VIII.1983, 13.IX.1991; gravina di Riggio 19 e 29.IX.1991; Fiume Lato 13.VI.1991; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Lequile (LE) 26.VI.1983 (PRN); Gallipoli (LE): Baia verde 20.VII.1985, 25.VI, 11.VIII.1986 (PRT, PRN); Veglie: Torre Lupomonaco 2-10.VII.1961 (Hartig in litt.). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Piana San Francesco 24.IX.1981; Rotonda 23.VII, 26.VII.1979, 9.VIII.1980, 1-4.IX.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 28.V.1983 (PRN); Cropani 6.VI.1981; San Severino 7.VII.1981; fiume Mercure 26.VII.1982 (ADD); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; Sersale (CZ) 27.VII-7.IX.1985; Pollino: Vallone Colloreto 6.VI.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Frascineto 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1751-1851);

1951-2005; (8*); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (932); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3419); **Abruzzo:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1751-1900; 1926-2005; (15); (2536); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1516); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2168); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1489. - ***Grammodes bifasciata*** **(Petagna, 1786)** (= *geometrica* auct. nec Fabricius, 1775; *parallela* Cyrillus, 1787; *chalciptera* Borkhausen, 1792; *ammonia* Esper, 1794)

Noctua bifasciata è descritta su esemplari della **Calabria:** Quinquefrondi (*recte* Cinquefondi) (Specimen Insectorum Ulterioris Calabriae: 38, n. 197, f. 26) (13). *Noctua parallela* è descritta su esemplari della **Campania:** Camillani (Napoli) (15). *Phalaena Noctua chalciptera* è descritta su esemplari dell'**Italia meridionale** (16*); (2576). *Phalaena Noctua ammonia* è descritta su esemplari della **Sardegna** (9*); (3079).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 10.IX.1967 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 3.VI.1988 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 27.VIII.1984, Torre Lama 17.VIII.1984, 22.IX, 6.X.1988 (RTN, PRN). **Puglia:** Bari: campus Università 15-20.IX.1980; VI.1983; Porto Cesareo (LE): Serra degli Angeli 2 m 10.VIII.1996 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 4.X.1986, 17.V, 10-20.VII.1987 (PRT, PRN); Lecce Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 6-10.X.1992. **Calabria:** foce torrente Coserie (Rossano, CS) 4.VI, 20.VII.1981 (PRN).

Piemonte: 1851-1925; 2001-2005; (176); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (566); (2014); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1801-1900; (114); (3272); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1901-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Marche:** 1901-1925; (847); **Lazio:** 1851-1925; 1951-

2000; (344); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1751-1850; 1951-2000; (15); (1542); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2077); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1751-1850; 1976-2005; (32); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Sardegna:** (1751-1850); 1851-2000; (9*); (2249).

1490. - ***Grammodes stolida*** **(Fabricius, 1775)**

Nota - È citata per il **Piemonte:** Mandria (218), segnalazione errata (736).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 19.IX.1963, 20 e 25.VIII.1965 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 22.IX.1988; Portici 20.VI, 21.IX.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Castellaneta Marina 7-14.VII.1980 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999. **Basilicata:** Policoro (MT): bosco Pantano 14.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); **Piemonte:** 2001-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1797); (1787); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1975; (171); (2060); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1787); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1787); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (218); (2648); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); (3138); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1801-1900; 1926-2005; (109); (3419); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2417); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2987); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (97); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (2587).

1491. - ***Euclidia glyphica*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Torrazza 11.VIII.1968 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 22.VII.1977 (GRL); Bienza Chiaverano (TO) 12.V.1977; Ivrea: Bienca 12.V.1974; Valdieri 1350 m 10.VI.1979; Val di Susa: San Giacomo Entracque 1250 m 17.VI.1982; Bardonecchia: Valle della Rho 1650 m 21.VI.1985; Ivrea (TO) 12.V.1979; Camasco (VC) 29.V.1978 (CMC, PRN). **Trentino:** Tione 560 m 26.VI.1974. **Toscana:** Passo della Consuma 20.VI.1984; Pieve a Maiano (AR) 15.IV.1979, 22.IV.1981; Pratomagno (AR) 28.V.1982 (GRL). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 15.VI.1974 (GRL). **Lazio:** Roviane 14.V.1965 (DBR, PRN). **Basilicata:** Monte Sirino 11.VI.1988 (GRL); Pollino: Senise 3.VI.1981; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Terranova 16.V.1983; fiume Mercure 8.VI.1980. **Calabria:** Sila: Fossiata 20.V.1979; Pollino: Colle del Dragone16.VII.1980; Monte

Moschereto 1000 m 6.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2642); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; (1285); **Puglia:** 1926-1975; (1538); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (1565); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254).

1492. - ***Euclidia mi*** **(Clerck, 1759)** (= *litterata* Cyrillus, 1787)

Phalaena litterata è descritta su esemplari della **Basilicata**: monti (15).

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 8.VII.1983; Val Bognanco (VB) 18 e 22.VI.1977, 5.VII.1980; Valdieri 13.VI.1985 (GRL); Caselette (TO) 25.VI.1981, 22.VI.1984 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 24.VI.1981. **Lazio:** Terminillo 2100 m 26.V.1982 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Anticristo 10.VI.1978. **Calabria:** Oriolo 9.VI.1979; Pollino: Colle del Dragone 16.VII.1980; Monte Moschereto 1000 m 6.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; (239); (1081); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (2290); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (603); (2290); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (501); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2968); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2516); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2141); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (2642); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1851-1900; 1926-1950; (135); (1350); **Basilicata:** (1751-1800); 1951-2000; (15); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (811); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3254).

1493. - ***Euclidia triquetra*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per l'**Alto Adige:** Etschthal (170); non presente nella regione (1038).

Piemonte: 1901-1925; (736).

1494. - ***Drasteria cailino*** **(Lefebvre, 1827)**

Heliotis cailino è descritta su due esemplari maschi della **Sicilia**: Palermo, Orto botanico (Mémoires de la Société Linneénne de Paris, 6 (2): 94, pl. 5, fig. 1) (48).

Nota - Boisduval ritiene di aver visto *Heliotis cailino* presso Godart che sembra l'abbia ricevuta dal **Piemonte:** (48); da confermare.

Nuovi dati - **Basilicata:** Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII.1985 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3461 bis); **Liguria:** 1901-1925; 1951-1975; (1659); (3272); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (687); (3301); **Toscana:** 1976-2005; (3190); (3310); **Umbria:** 1951-2000; (1716); (2141); **Marche:** 1976-2000; (2643); **Abruzzo:** 2001-2005; (3369); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (2350); **Sicilia:** 1801-1850; 1976-2000; (48); (2844).

1495. - ***Catocala fulminea*** **(Scopoli, 1763)** (= *paranympha* Linnaeus, 1767)

Nota - È citata con dubbio per la **Liguria:** (218); dubbie o dovute a presenze accidentali anche le vecchie citazioni per la **Toscana:** (19) e le **Marche:** (385).

Nuovo dato - **Alto Adige:** Merano: Naturns ex ovo 27.VII.1951 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1850; (20); (114); **Lombardia:** (1976-2000); (2643); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1053); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

1496. - ***Catocala nymphaea*** **(Esper, 1787)** (= *vestalis* Geyer, 1835)

Nota - *Noctua vestalis* Geyer, 1835, descritta su esemplari di Provence (52*), è sinonimo di *C. nymphaea,* mentre *Catocala vestalis* Boisduval, 1829, descritta su esemplari dell'Etruria (**Toscana**) (60*), è buona specie (2576).

Nuovi dati - **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia10.VII.1983 (ADD); Pollino: Belvedere 25.VII.1982; San Severino 23.VII.1982 (PRN). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR).

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2642); **Trentino:** 1901-2000; (566); (2475); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** (1801-1850); 1951-2005; (60*); (3310); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:**

1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1926-2005; (1231); (3435); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (2350); (2642); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2642); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (2350); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (114); (2587).

1497. - (-) ***Catocala disjuncta*** **(Geyer, 1828)**

Nota - È riportata come presente in **Italia** (3041); citazione non attendibile.

1498. - ***Catocala conversa*** **(Esper, 1787)** (= *agamos* Hübner, 1813)

Phalaena Noctua conversa è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 4 (1): 368, Taf. 105, Noct. 26B, figg. 1-3) (9*); (3079).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 25.VII.1974 (DBR, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 22-24.VII.1986 (TRG, PRN); Otranto 12.VI.1999; gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sardegna:** Musei (CA) 14.VII, 20.VIII.1974; Desulo 25.VII.1981 (HRT, PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1851-1925; (114); (736); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1975; (1787); (2362); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1926-2005; (9*); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1926-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (3053); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2230); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2642); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2000; (277); (2206); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-2000; (97); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

1499. - ***Catocala nymphagoga*** **(Esper, 1787)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 12.VII.1963, 20.VII.1966 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 1.VII.1975, 16.VII.1976, 3.VII.1978 (GRL). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1986; gravina di Petruscio 10.VII.1985, 4.VIII.1991 (PRN). **Basilicata:** Pollino: Belvedere 27.VII.1982; Timpone Castellana 23.VII.1979; Rotonda 26.VII.1979, 9.VIII.1980; Cropani 23.VII.1982 (PRN); Terranova 14.VII.1984 (GRL); calanchi di Ferrandina 5.VII.1983 (ADD); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Sila:

Camigliatello 10.VII.1979; Sersale (CZ) 13-20.VII.1985; Pollino: Vallone Colloreto 6.VI.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Civita 19.VII.1981 (PRN); Monte Moschereto 28.VII.1982 (ADD).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2394); (3145); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1901-1975; (1038); (1958); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1801-1850; 1926-2000; (114); (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (517); (3462); **Arcipelago toscano**: 1976-2005; (2599); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2005; (3222); (3403); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2005; (1538); (3439); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (2642); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1500. - ***Catocala diversa*** **(Geyer, 1827)**

Noctua diversa è descritta su esemplari di **Sicilia** (in Hübner: Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noct. 3, Taf. 158, figg. 737-740) (52*); (1619).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Trentino:** 1901-1925; (1038); (1053); **Alto Adige:** 1851-1975; (358); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2643); **Toscana:** 1976-2000; (2968); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2642); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (52*); (3254).

1501. - ***Catocala hymenaea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per il **Piemonte** (20), mai più trovata (114).

Trentino: 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); (1038); **Veneto:** 1926-1950; (1681).

1502. - ***Catocala fraxini*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Introd ex o. 24.VI.1987, 17.VI.1993 (CMC, PRN). **Lombardia:** Valcuvia VIII.1967 (GLL, PRN). **Molise:** dintorni Campobasso (Rotundo in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (2553); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (2642); **Romagna:** 1976-

2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Marche:** 1951-1975; (1939); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 2001-2005; (3466); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1951-2000; (2206); (2350).

1503. - ***Catocala conjuncta*** **(Esper, 1787)**

Phalaena Noctua conjuncta è descritta su esemplari dell'**Italia meridionale** (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (1): 129, Tav. 100, Noct. 21, figg. 1, 2 e Anhang: 367, Taf. 99 B: 3, 4) (9*); (3079).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 30.VII.1964 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 9.IX.1987 (GRL). **Puglia:** Gargano: San Giovanni Rotondo 27.VIII.1998; Martina Franca 1.IX.1998 (PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980; Belvedere 25.VII.1982; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Cropani 26.IX.1981; San Severino 900 m 15.IX.1979 (PRN). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 27.VII, 20.VIII.1975; Musei (CA) 28-29.VII.1974 (HRT, PRN).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (298); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (566); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1656); **Veneto:** 1951-2005; (1656); (3380); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1801-1900; (110); (298); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (45); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-2005; (1741); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (656); (3419); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; (99); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2232); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (97); (3254); **Sardegna:** 1801-2000; (114); (2587).

1504. - ***Catocala nupta*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna** sono molto dubbie.

Nuovi dati - **Basilicata:** Matera 8.IX.1996; Pollino: fiume Mercure 6.X.1980 (PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 5.X.1985 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (164); (3300); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2968); **Liguria:** 1976-2000; (2642); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3462); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344);

(3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3466); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2000; (156); (2642); **Sardegna:** 1901-1925; (841); (886).

1505. - ***Catocala electa*** **(Vieweg, 1790)**

Nota - La citazione di *C. electa* per la **Sicilia:** (357) va riferita a *C. dilecta* (506). Le citazioni per la **Sardegna** sono molto dubbie.

Nuovi dati - **Piemonte:** San Rocco (CN) 600 m 14.VIII.1963 (leg. Vigna Taglianti, PRN); Torre Pellice 20.VIII.1934. **Trentino:** Caldonazzo (TN) IX.1963 (GLL, PRN). **Veneto:** Cison di Valmarino, 300 m, 1.IX.1963 (PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VII.1983, 21.IX.1984 (GRL). **Marche:** Valcaldara: Pievetorina (MC) 600 m 23.VIII, 6.IX.1980 (leg. Trolese, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2642); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; (260); (1279); **Trentino:** 1901-1975; (566); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2659); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Romagna:** 1976-2000; (2185); **Toscana:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sardegna:** 1901-1925; (841); (886).

1506. - ***Catocala elocata*** **(Esper, 1787)** (= *nurus* Hübner, 1822)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 15-24.VIII, 10.IX.1963 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 22.IX.1976, 21.IX.1984 (GRL); Montepulciano (SI) 10.IX.1975 (PRN). **Lazio:** Borgo San Donato (LT) 650 m 25.VIII.1963, 17.IX.1964 (DBR, PRN). **Puglia:** Mattinata (FG) 20.VIII.1992; Santeramo 21.VII.1998; Locorotondo 13.VIII.1991; Ostuni 10.VIII.1991; Latiano (BR) 98 m 25.VIII.1998; Veglie (LE) 16.VIII.1981; Otranto 10.VII.1999. **Basilicata:** Pisticci 20.VII.1987; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979 (PRN); Pollino: Belvedere 27.VII.1982 (ADD). **Calabria:** Sersale (CZ) 5.X.1985 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (603); (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1901-

1925); 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (406); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1900; 1976-2000; (99); (2350); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2350); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1851-1900; 1976-2000; (277); (2350); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Sardegna:** 1851-1925; 1951-2000; (301); (2587).

1507. - ***Catocala puerpera* (Giorna, 1791)** (= *pellex* Hübner, 1809)

Phalaena puerpera è descritta su esemplari del **Piemonte**: contorni di Torino (Calendario Entomologico, Torino: 142) (20).

Nuovi dati - **Emilia:** Parma 2.VIII.1953 (RBR, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.VIII.1981; Pratovecchio 12.VIII.1981 (GRL). **Calabria:** Roggiano Gravina (CS) 15.IX.1985 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1943); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3310); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (344); (2085); **Lazio:** 1901-2000; (618); (2141); **Abruzzo:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (3466); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987).

1508. - ***Catocala dilecta* (Hübner, 1808)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 10.IX.1963 (DBR, PRN). **Puglia:** Mottola (TA): gravina di Petruscio 10.VII.1985. **Basilicata:** Pollino: Rotonda 5.X.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2000; (2642); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1734); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (1060); (1898); **Liguria:** 1976-2000; (2553); (3183); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (45); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1741); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2232);

Sicilia: 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3320); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1509. - ***Catocala sponsa*** **(Linnaeus, 1767)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Pollino: Madonna del Pollino 21.VII.1982; Belvedere 25.VII.1982 (PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 27.VII.1975; Musei (CA) 14 e 20.VIII.1974 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1801-1900; 1976-2000; (44); (2642); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); **Veneto:** 1801-1900; 2001-2005; (81); (3470); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (?) (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (298); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1901-1925; (990); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1926-2000; (1398); (3305); **Campania:** 1851-1900; (298); **Puglia:** 1976-2000; (3466); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3320); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (188); (2110).

1510. - ***Catocala promissa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VII.1973, 14.VII.1976 (GRL). **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 17.VII.1976; Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Sardegna:** Musei (CA) 20.VII.1974 (HRT, PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (377); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (2642); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2642).

1511. - ***Catocala lupina*** **Herrich-Schäffer, 1851**

Nuovo dato - **Marche:** Valcaldara: Pievetorina (MC) 600 m 6.IX.1980 (leg. Trolese, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2394); (3145); **Piemonte:** 1901-1925;

1976-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2642); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1734); **Liguria:** 1976-2000; (2553); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3062); **Toscana:** 1951-2005; (3190); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (2642); **Basilicata:** 1976-2000; (2075); (3298).

1511 bis - (-) (***Catocala pacta*** (Godart, 1828))

Nota - La citazione per il Piemonte: (6) è da riferire probabilmente a *C. sponsa* o *C. nupta*: (20), è da riferire a *C. elocata* (non può essere *C. pacta* Linnaeus, perchè non è specie nostrana; non può essere *C. pacta* Schiff. nè *C. pacta* Hufnagel, 1767, perchè non ancora descritte; resta *P. pacta* Scopoli = *elocata*). Anche le citazioni per la Lombardia: (164) ed il Veneto: (10), (98), citazioni errate da riferire ad altre specie.

1512. - ***Catocala optata*** **(Godart, 1824)**

Nota - La citazione generica per la **Valle d'Aosta** va confermata.

Valle d'Aosta: (1901-1925); (736); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3461 bis); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1445); (2825).

1513. - ***Laspeyria flexula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Veneto:** Nevegal (BL) 27.VI.1974 (GRL). **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 6.X.1981; Pollino: Terranova 10.VI.1982 (PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1901-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (181); (2968); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2968); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3443); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2642); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

1514. - ***Arytrura musculus*** **(Ménétriés, 1859)**

Friuli: 2001-2005; (3379).

1515. - ***Exophyla rectangularis*** **(Geyer, 1828)**

Trentino: 1851-1925; 1951-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1734); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650).

1516. - ***Lygephila lusoria*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:**

(1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1976-2000; (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; (400); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1850; (110); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1951-2000; (2272); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2642); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1340); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (886).

1517. - ***Lygephila ludicra*** **(Hübner, 1790)**

Trentino: 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); (1038).

1518. - ***Lygephila pastinum*** **(Treitschke, 1826)** (= *astragali* Herrich-Schäffer, 1847; *lusoria* auct.)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (? 1851-1900); 1976-2005; (188); (3414); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2659); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2346); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Lazio:** 1976-2000; (2642).

1519. - ***Lygephila viciae*** **(Hübner, 1822)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Sicilia** sono da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2005; (1024); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1901-1925; (1010); **Campania:** 1901-1925; (1047); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1976-2000); (2931), (2980); **Sardegna:** 1901-1925; (792); (781).

1520. - ***Lygephila craccae*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VI.1974, 19.X.1989 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 7.VII, 16.IX, 5.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 12-16.VII, 21.VIII.1985 (SNN). **Puglia:** Polignano 6.VI.1979 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 10.XI.1987 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pietrapertosa 9.VIII.1983 (ADD); Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 28.VI.1993; Vulture (PZ): Monticchio 20.VI.1969; Pollino: Piano Ruggio 20.VI.1982; Cropani 6.VI.1981; Lago Duglia 18.VI.1982; Timpone Castellana 9.IX.1978, 23.VII.1979; Rotonda 23 e 26.VII.1979, 5.X.1980 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 4.VI, 20.VII.1981; Rossano Lido 20.VII.1981; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980. **Sardegna:** Monte Ferru 700 m 22.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800;

(1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1901-1950; 1976-2000; (1047); (2536); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (247); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1851-2000; (841); (2587).

1521. - ***Lygephila procax*** **(Hübner, 1813)** (= *limosa* Treitschke, 1826)

Nuovi dati - **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 5.VII.1983; Pietrapertosa 9.VIII.1983; Monte Caperino 10.VIII.1983 (ADD); Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Terranova 10-13.VIII.1980, 24.IX.1981, 22.VII.1982, 31.X.1983; San Severino 7.VII.1981 (PRN).

Piemonte: 1926-1950; (1445); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (424); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1901-1925); 1976-2000; (687); (2642); **Emilia:** 1901-1925; (629); (687); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2950); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2005; (3467); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2642); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** 1926-1950; (1340); (1384); **Sardegna:** 1976-2000; (2478).

1522. - ***Lygephila exsiccata*** **(Lederer, 1855)**

Umbria: 1976-2000; (2141); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2143); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1340); (3128); **Sardegna:** 1951-1975; (2041); (2803).

1523. - ***Autophila hirsuta*** **(Staudinger, 1870)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3378); **Piemonte:** 1976-2005; (2636); (3378); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-2000; (366); (2157); **Veneto:** 1976-2000; (2129).

1524. - ***Autophila limbata*** **(Staudinger, 1871)**

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2642); **Basilicata:** 1976-2000; (2642); (2800); **Calabria:** 1976-2005; (3331); (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (354); (3254).

1525. - ***Autophila dilucida*** **(Hübner, 1808)**

Nota - La citazione per l'**Abruzzo** è molto dubbia (2141).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 10-26.VII.1961 (DBR, PRN). **Puglia:** San Severo (FG) 26.VI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (2029); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; (110); (1551); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2280); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; (344); **Campania:** 1901-1975; (712); (4372); **Puglia:** 1976-2000; (2350); (2642); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2350); (3469); **Sicilia:** 1801-2000; (109); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (792); (2587).

1526. - ***Autophila rosea*** **(Staudinger, 1888)**

Sicilia: 1926-1950; (2636).

1527. - ***Autophila cataphanes*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la **Venezia Giulia:** Trieste, Miramare (1060) è poco attendibile.

Liguria: 1976-2000; (2642); (2832); **Toscana:** 1851-1900; (206); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2280); **Lazio:** 1901-1925; 1976-2000; (807); (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2156); (2642); **Campania:** 1951-1975; (1591); **Puglia:** 1851-1900; (712); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2642); **Sicilia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (357); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1976-2000; (2249).

1528. - ***Autophila anaphanes*** **Boursin, 1940**

Sicilia: 1926-1975; (1340); (2089).

1529. - ***Apopestes spectrum*** **(Esper, 1787)** (= *socrus* Giorna, 1791)

Phalaena Noctua spectrum é descritta su esemplari dell'**Italia meridionale** (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (1), Taf. 100, Noct. 21, figg. 3, 4) (9*); (3079). *Phalaena socrus* è descritta su esemplari del **Piemonte:** Torino, nei sotterranei delle

case di campagna (20).

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora 18.VII, 13.X.1984 (CMC, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.IV.1965 (DBR, PRN); Molinelli 20.IV.1985; Pieve a Maiano (AR) 8.X.1985 (GRL). **Umbria:** Orvieto 23.VI.1960 (DBR, PRN). **Lazio:** Santa Marinella 25.VII.1961; Oriolo (VT) 30.IX.1984 (GRL). **Campania:** Monte Acero (BN) 28.VIII.1988. **Puglia:** Ginosa 30.VIII.1983; gravina di Petruscio 23.IV.1983. **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 1400 m 10-16.VIII.1980; Timpone Castellana 27.III.1981; Piana San Francesco 24.IX.1981; fiume Mercure 29.III.1981 (PRN). **Calabria:** Amendolara 31.VII.1983; Sila: Fossiata 22.VII.1981 (SCL).

Piemonte: 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1184); **Veneto:** 1801-1900; 1926-1975; (98); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (262); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (720); (3219); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3469); **Molise:** 1976-2005; (3222); (3469); **Campania:** 1801-1850; 1926-2000; (99); (3469); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2642); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1801-1850; 1951-2000; (70); (3419); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (106); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2587).

1530. - ***Calyptra thalictri*** **(Borkhausen, 1790)** (= *capucina* Esper, 1789)

Nuovi dati - **Alto Adige:** Merano ex l. 3.VII.1937 (AST, PRN). **Lazio:** Terminillo: Campolongua 1850 m 14.VII.1965 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (161); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (3068); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1541); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (262); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; (517); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (1035); (2642); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (1035); (2141).

1531. - ***Scoliopteryx libatrix*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Torino 31.XII.1989 (CMC, PRN). **Basilicata:** Pietrapertosa 9.VIII.1983 (ADD); Pollino: Timpone Castellana

27.III.1981, 27.III.1986; Piano Ruggio 12.IX.1979, 17.VII.1980; sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Rotonda 18.VII.1980; San Severino 23.VII.1982. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1950; 1976-2005; (19); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2141); (3219); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2821); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3469); **Campania:** 1801-1850; 1951-2000; (99); (3469); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1951-2000; (114); (2587).

1532. - ***Rhynchodontodes antiqualis*** **(Hübner, 1809)**

Nota - La citazione per le **Marche** è da confermare.

Lombardia: 1901-1925; 1951-2000; (734); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (840); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (566); (1734); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); (878); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; (144).

1533. - ***Hypena proboscidalis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Bardonecchia 1350 m 31.VIII.1990 (CMC, PRN); Moncalieri (TO) 8.IX.1968 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 6.VII.1983; Val Bognanco (VB) 3-6.VII.1980; Valdieri 9.VII.1983 (GRL). **Liguria:** Caprieto di Vobbia 4.IX.1977 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.VI.1985 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 5.X.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 20.VI.1982. **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980, 3.VI.1981; Rotonda: Valli 16.VII.1980; Terranova 13.VIII.1980; Rotonda 16.VII.1980; fiume Mercure 6.X.1980; Cropani 26.IX.1981 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 5.X.1985; Pollino: Mormanno 11.IX.1977 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (244); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950;

1976-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (99); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (148); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; (818).

1534. - ***Hypena rostralis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione generica per la **Sardegna** è da confermare.

Nuovo dato - **Lazio:** Oriolo 29.IX.1984 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-1900; 1926-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1925; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2280); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2642); **Abruzzo:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); (3470); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (97); (2907); **Sardegna:** (1801-1900); (114); (2931).

1535. - ***Hypena obesalis*** **Treitschke, 1829** (= *crassalis* Hübner, 1796)

Nota - È citata per la **Sicilia** e genericamente per la **Sardegna**; citazioni da confermare.

Nuovo dato - **Lombardia:** Ponte di Legno VIII.1964 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (2448 (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (244); (3024); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2642); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Lazio:** 1901-1925; (807); **Sicilia:** 1851-1900; (144); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (2980).

1536. - ***Hypena obsitalis*** **(Hübner, 1813)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 24.IX, 19.X.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Foti (AR) 5.X.1989 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 27.VIII.1984; Portici 6, 10, 14 e 18.VI.1983 (RTN, PRN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Foggia 9.X.1980; Bitonto 3.I.1980; Ruvo VIII.1984; Bari: Santa Fara 13, 24 e 30.IV, 6.V, 23.V-30.VI.1980; Lecce XII.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; (566); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (2725); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-1975; (110); (1551); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (112); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3052); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2141), **Molise:** 1976-2000; (3222); (3469); **Campania:** 1926-2005; (1183); (3469); **Arcipelago campano:** 1951-2000; (1589); (2511); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2729); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (833); (2232); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (365); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1537. - ***Hypena palpalis*** **(Hübner, 1796)** (= *extensalis* Guenée, 1854)

Nota - Le citazioni generiche per l'**Emilia** ("Romagne") e per la **Sardegna** sono da confermare.

Piemonte: 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Veneto:** 1801-1900; (98); (161); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1926-1975; (314); (1524); **Romagna:** (1851-1900); 1951-1975; (314); (1885); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2000; (112); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2143); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3470); **Puglia:** 1801-1850; (70); **Calabria:** 1901-1925; 2001-2005; (156); (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (205); (3254); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (2980).

1538. - **(-)** ***Hypena trigonalis*** **(O. G. Costa, 1836)**

Pyralis Hypena trigonalis è descritta su esemplari della **Campania**: dintorni di Napoli (Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte

prima. Lepidotteri Diurni, Crepuscolari ed alcune famiglie de' Notturni: 180) (70).

Nota - È buona specie secondo (2117); non è citata in nessun altro lavoro, neanche come sinonimo.

1539. - ***Hypena lividalis*** **(Hübner, 1796)** (= *dimeralis* Rossi, 1792)

Phalaena dimeralis è descritta su esemplari della **Toscana:** Pisa (24).

Nuovi dati - **Campania:** Portici (NA): parco della Reggia 21.VIII.1983 (RTN, PRN); Scafati (SA) 1-5.VIII, 1-5.IX.1983 (SNN). **Puglia:** Valenzano (BA) 24 e 30.IX.1983; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 19-23.X.1985, 2.X.1991; Mottola (TA): gravina di Petruscio 16.VIII.1983; Grottaglie (TA): gravina di Riggio 22.X.1990 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 13.VII, 24.VIII.1986, 28.V, 16.VII.1988; agro Gallipoli (LE) 14.VIII, 12.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: Fiume Mercure 2.XI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; San Severino 15.IX.1979 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 13.IX.1989; Pollino: Civita 13.IX.1989 (SCL). **Sicilia:** Porto Rosa (Tonnarella - ME) 18.VIII.1994 (VTL).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (70); (3461 bis); **Liguria:** 1851-1900; 1951-2000; (2362); (3183); **Toscana:** 1751-1850; 1976-2005; (24); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1976-2000; (2642); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (72); (2536); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (72); (2230); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (349); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1540. - ***Hypena crassalis*** **(Fabricius, 1787)** (= *frontis* Thunberg, 1788; misspelling: *fontis*)

Nota - La citazione per la **Puglia** va confermata.

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 10.VI.1981, 31.V.1982, 28.V.1986 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2642); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Puglia:** 1801-1850; (70).

1541. - (-) ***Phytometra sanctiflorentis*** **(Boisduval, 1834)**

Nota - L'esemplare di *P. sanctiflorentis* di **Toscana:** Forte dei Marmi IX.1903 (517) è risultato essere *Phytometra viridaria* f. *fusca* Tutt (3235).

1542. - ***Phytometra viridaria*** **(Clerck, 1759)** (= *aenea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Liguria:** Passo Giovi, 2000 m, 8.VII.1975; Andora 17.VI.1987. **Toscana:** Passo della Consuma 20.VI.1974; San Giminiano 31.V.1982 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.VII.1986; Serino (AV) 11.VIII.1984 (RTN, PRN). **Basilicata:** Monte Sirino 18.VII.1979 (GRL); Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979, 10-15.VIII.1980, 3.VI.1981, 19.VI.1982; Rotonda: Valli 16.VII.1980 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Fiume Sarmento 6.VII.1981; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 6.VI, 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (824); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); (1350); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (2844); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3020).

1543. - ***Rivula sericealis*** **(Scopoli, 1763)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.VIII.1965 (DBR, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 28.V.1993; Pollino: Fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980, 2.XI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-

2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2642); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (148); (3254); **Sardegna:** 1926-1950; (1303).

1544. - ***Parascotia nisseni*** **Turati, 1905**

Toscana: 2001-2005; (3462); **Lazio:** 1976-2005; (3268); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); **Calabria:** 1976-2005; (3347); (3469); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (343); (3228); **Sardegna:** 1901-1950; 1976-2000; (781); (2587).

1545. - ***Parascotia fuliginaria*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - Le segnalazioni di *P. fuliginaria* per la **Sicilia** vanno riferite a *P. nisseni*, sola specie presente nella collezione di Failla-Tedaldi, che non era ancora stata descritta nel 1888 (3268).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (3272); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (112); (3462); **Lazio:** 1976-2000; (3268); **Sardegna:** 1976-2000; (2642).

1546. - ***Colobochyla salicalis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (2795); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; (114); (1445); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1751-1850; 1976-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2642); **Abruzzo:** 1976-2005; (3324); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987).

1547. - ***Zebeeba falsalis*** **(Herrich-Schäffer, 1839)**

Hypena falsalis è descritta su esemplari della **Sicilia** (Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna), Regensburg, Heft 166: 1) (83*); (2576).

Nuovi dati - **Campania:** Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m,

29.V.2001. **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001, 9 e 25.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR).

Venezia Giulia: 1976-2000; (3209); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3335°); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 2001-2005; (1350); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1976-2005; (2168); (2642); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (83*); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-2000; (448); (2587).

1548. - ***Eutelia adulatrix* (Hübner, 1813)** (= *aetnea* Costa, 1839)

Eriopus aetna è descritta su un esemplare della **Sicilia:** falde meridionali dell'Etna (89).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 1-21.VIII.1965, 4, 11 e 25.VIII.1961, 15.VII.1963, 10-14.VIII.1966. **Lazio:** Fregene VII.1961 (DBR, PRN). **Puglia:** agro Gallipoli (LE) 14.VIII.1986; Gallipoli (LE): Baia Verde 18.V.1986, 5.IV-21.V.1988 (PRT, PRN); Bari: Santa Fara 6-18.V.1980; gravina di Riggio 1.IV.1990, 20.VIII.1991; gravina di Petruscio 13.VIII.1985, 31.V.1991; Porto Cesareo (LE): Serra degli Angeli 2 m 10.VIII.1996; Monteroni (LE) VII.1983. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fosso Bradano 16-20.V.1993; calanchi di Ferrandina 5 e 15.VII.1983; Metaponto: San Marco 28.IV.1985; Pollino: Rotonda 8.V.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Cropani 6.VI.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII, 20.X.1985 (RTN, PRN); Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN).

Piemonte: (1901-1925); 1976-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1901-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; (41); (1060); **Liguria:** (1851-1900); (1901-1925); 1976-2000; (2603); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (629); (3043); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1926-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (807); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1183); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2642); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (89); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); **Sardegna:** (1801-1850);

1926-2000; (114); (2587).

1549. - (-) ***Eutelia blandiatrix*** **Hampson, 1912**

Nota - "Per completezza va ricordata una citazione per la **Sicilia** di *Eutelia blandiatrix* Hampson, 1912, da parte di Guenée (1852. Species général des Lépidoptères, 6), certamente dovuta a confusione sulla località di provenienza di *Eurhipia blandiatrix* (nomen nudum) da parte di Boisduval (1840. Genera et Index methodicus europaeorum Lepidopterorum)" (2931).

1550. - ***Abrostola tripartita*** **(Hufnagel, 1766)** (= *urticae* Hübner, 1817; *triplasia* Linnaeus, sensu auct.)

Nuovi dati - **Piemonte:** Cesana 25.VII.1985; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 20.VII.1985 (GRL). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 6 e 23.VI.1983; Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980; Rotonda 4.IX.1981; San Severino 7.VII.1981 (PRN); Terranova 12.VI.1983 (GRL); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2642); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2642); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (1996); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2642); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; (97); (1384); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (188); (1975).

1551. - ***Abrostola asclepiadis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 12.V.1968 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 6.VII.1983; Valdieri 13.VI.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.X.1980, 28.V.1983, 7.VI.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1801-1850; (1851-1900); 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (410); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2000; (2272); (2516); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:**

1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (656); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141).

1552. - ***Abrostola agnorista*** **Dufay, 1956**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 13.IX.1969 (GLL, PRN). **Basilicata:** Matera 8.IX.1987; Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 26-31.V.1992; Pollino: fiume Mercure 20.VI.1982; Rotonda 18.VII, 19.V, 26.VII, 23.VII, 14-16.IX.1979, 16.VIII.1980, 29.VI, 4.IX.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1951-2005; (1577); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-1975; (1577); (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2044); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1577); (3183); **Emilia:** 1926-1975; (1577); (2642); **Romagna:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3044); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2729); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (2597); (3254).

1553. - ***Abrostola triplasia*** **(Linnaeus, 1758)** (= *trigemina* Wernerburg, 1864)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 14.VII.1968, 17.V.1969 (GLL, PRN); Torino 14.VI.1992 (CMC, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA) 10.VIII.1984 (1f) (RTN, PRN). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 23.V.1977; Oasi WWF San Giuliano (MT): fosso Bradano 11-25.V.1994; Pollino: Piano Ruggio 18.VII.1977; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; 1976-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1851-1925; (410); (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (1004); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3044); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2206); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (343); (3228); **Arcipelago siciliano:**

1976-2000; (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (2587).

1554. - ***Trichoplusia ni*** **(Hübner, 1803)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 14.VIII.1961, M.X.1962, M-E.VIII.1965, M.IX.1967, 1-13.VIII.1972. **Lazio:** Palombara Sabina 14.VI.1964 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 5 e 19.V, 7.VII.1983, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 20.X.1988; Roccadaspide (SA) 15.VII, 15.VIII.1986; Serino (AV) 8.IX.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Veglie: Torre Lupomonaco 9.VI-15.VII.1961 (Hartig in litt.); Taranto: Mar Piccolo 2.VII.1980; gravina di Laterza (TA) 16.VI.1989; gravina di Riggio 20.VIII, 29.IX.1991; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 20.VII.1985, 3.V.1986, 9.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 22.IV.1985; Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Cropani 6.VI.1981; Fiume Mercure 8.VI.1980; Rotonda 23 e 26.VII, 14.IX.1979, 9 e16.VII.1980, 8.VIII.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; San Severino 15.IX.1979; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 27.VII.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Frascineto 25.VII.1979; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN). **Arcipelago sardo:** Isola di Sant'Antioco 5-28.VII.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-2000; (1038); (2739); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (262); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (517); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-2000; (1741); (2768); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3419); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (109); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (1658); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2201); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3228); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587); **Arcipelago sardo**: 1976-2000.

1555. - ***Thysanoplusia orichalcea*** **(Fabricius, 1775)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte:** (1388), **Lombardia:** Milano (470), **Alto Adige:** Ulten (170) ed **Emilia:** Modenese (1388), sono dubbie, da confermare.

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2768); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Campania:** 1901-1925; 1976-

2000; (477); (2350); **Puglia:** 1976-2000; (2350); (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2642); (3347); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (792); (2587).

1556. - ***Thysanoplusia daubei*** **(Boisduval, 1840)**

Nuovo dato - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 16-20.IX.1992 (PRN).

Liguria: 1926-2000; (1445); (2642); **Toscana:** 1951-1975; 2001-2005; (929 (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3275); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2141); (3044); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Sardegna:** 1926-2000; (1303); (2587).

1557. - ***Thysanoplusia circumscripta*** **(Freyer, 1831)**

Noctua circumscripta è descritta su esemplari della **Sicilia** (Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur, I (IV): 42, Taf. 23, fig. 2) (66*) (2607).

Nuovi dati - **Puglia:** Otranto 6.V.2000. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981. **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V, 20.VII.1981 (PRN).

Puglia: 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (66*); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (1975); (2587).

1558. - ***Ctenoplusia accentifera*** **(Lefebvre, 1827)** (= *L-aureum* Freyer, 1831)

Plusia accentifera è descritta su esemplari della **Sicilia**: Madonie (Mémoires de la Société Linneénne de Paris, VI (2): 96, Pl. 5, fig. 2) (48). *Plusia L-aureum* è descritta su esemplari della **Sicilia** (66*); (2607);

Nuovi dati - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 12.VIII.1991; Pollino: Fosso Paraturo 2.XI.1981 (PRN). **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V.1981; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Piemonte: 1851-1900; (293); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1198); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3043); **Toscana:** 1976-2005; (3171); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Lazio:** 1901-2005; (807); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2642); **Calabria:** 1951-2005; (1733); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (48); (3228); **Sardegna:** (1901-1925); 1926-2000; (586); (2642).

1559. - ***Chrysodeixis chalcites*** **(Esper, 1789)** (= *bengalensis* Rossi, 1794)

Phalaena Noctua chalcytes è descritta su esemplari dell'**Italia centrale** (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2): 447, Abschn. I, Taf. 141, Noct. 62, fig. 3) (9*); (3079). *Noctua bengalensis* è descritta su esemplari dell'Etruria (**Toscana**) (24).

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 4.XI.1971; Torino ex ovo 20-30.X.1997. **Liguria:** Capo Mele (SV) 10.IX.1977 (CMC, PRN). **Emilia:** Bologna 27.VIII.1952 (RBR, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 25.VIII.1961, 20-30.VIII.1963, M-E.VIII, 3.X.1965. **Umbria:** Todi 22.X.1962 (DBR, PRN). **Lazio:** Roma città 17.X.1962 (DBR, PRN), **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 28.VII.1983, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 15.IX.1998; Portici (NA) 16.VII, 21.IX.1983; Roccadaspide (SA) 8.VII.1986; Serino (AV) 7.VII, 27.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 21.VIII.1985 (SNN). **Puglia:** Bari: Santa Fara (BA) 24-25.XI.1979, 1-5.X.1980; Valenzano 13.X.1984; Bari 29.I.2003 ex l. su Geranium (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 25.IV.1986, 10.XI.1987; Gallipoli (LE) 10.IX.1986 (PRT, PRN); Castro Marina (LE) 8.VII.1986 (CMC, PRN). **Basilicata:** Pollino: Piana San Francesco 24.IX.1981; Lago Duglia 1.XI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Civita 19.VII.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (1820); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** (1851-1900); 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-2005; (24); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-2000; (72); (3256); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2005; (72); (2938); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2206); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (97); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2564).

1560. - ***Macdunnoughia confusa*** **(Stephens, 1850)** (= *circumflexa* Denis & Schiffermüller, 1775; *circumflexa* Esper, 1787; *clavata* Cyrillus, 1787; *gutta* Guenée, 1852)

Phalaena Noctua circumflexa Esper è descritta su esemplari di **Italia**,

Francia, Austria, Ungheria e Germania (9*); (3079). *Noctua clavata* è descritta su esemplari della **Campania:** Napoletano, colli (15).

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 27.V.1970; Miasino (NO) 470 m 11.V.1968, 17.V.1969 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 8.VII.1973, 3.VII.1983 (GRL); Torino 10.VII.1984 (CMC, PRN). **Lombardia:** Val Cuvia VII.1967 (GLL, PRN). **Alto Adige:** Vinschgau, 700 m, 4.X.1929 (AST, PRN). **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 750 m 15.VII.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 24.VI.1977 (GRL); Ansedonia (GR) 15.VII.1962. **Lazio:** Borgo San Donato (LT) 26.VIII.1963 (DBR, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.VII, 15.VIII.1986, Serino (AV) 21-28.VII, 18-28.VIII.1984, Battipaglia (SA): Cioffi 27.IV, 25.X.1984, Torre Lama 3-10.VIII.1984 (RTN, PRN). **Basilicata:** Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 13.IX.1979, 17.VII.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1851-1900); 1901-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1751-1900; 1976-2000; (15); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (247); (3254).

1561. - ***Diachrysia chryson*** **(Esper, 1789)** (= *orichalcea* sensu Hübner, 1821, nec Fabricius)

Phalaena (Noctua) chryson è descritta su esemplari dell'**Italia centrale** (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2): 446, Abschintt I, Taf. 141, fig. 2) (9*); (2756).

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 7.VII.1968, 5.IX.1969 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000;

(1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (262); (2346); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2987); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347).

1562. - ***Diachrysia chrysitis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 5.IX.1969 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 2-9.VII.1983, 14.VI.1985; Val Bognanco (VB) 30.VI.1980 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1969 (GLL, PRN). **Veneto:** Nevegal (BL) 26.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 24.IX.1976, 29.V.1982, 3.VII.1987 (GRL). **Lazio:** Borgo San Donato (LT) 26.VIII.1963 (DBR, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986; Serino (AV) 7.VII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** gravina di Petruscio 12.VIII.1983; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979, 17.VII.1980; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Rotonda 23.VII, 14 e 28.IX.79, 7 e 21.VI, 9.VII.1980, 26.IX.1981; fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980; Cropani 26.IX.1981. **Calabria:** foce torrente Coserie 20.VII.1981; Sila: Fossiata 24.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2378); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); (2642); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1161); (2536); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (2249).

1563. - ***Diachrysia stenochrysis*** **(Warren, 1913)** (= *tutti* Kostrowicki, 1961)

Nota - Le citazioni come *chrysitis juncta* per la **Lombardia:** (3272) ed il **Lazio:** (3272), sono da verificare. La citazione generica per la **Sicilia** va confermata. È citata per l'**Alto Adige:** (3388) ed il **Lazio:** (3386), come "*chrysitis* ? f. *juncta* = *tutti*", da verificare. Permane il dubbio sulla validità di segnalazioni basate su singoli individui sempre frammisti a popolazioni di *D. chrysitis*, tipicamente molto variabile nel

fenotipo e negli apparati copulatori, il che non consente una agevole identificazione.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1975-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; (3272); **Alto Adige:** (?) 2000-2005; (3388); **Veneto:** 1801-1900; 2000-2005; (3272); (3471); **Toscana:** 1976-2000; (3310); **Lazio:** 1901-1925; 2000-2005; (3272); (3386); **Campania:** (?) 1926-1950; 1976-2000; (1161); (2642); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); (3298); **Sicilia:** (1976-2000); (2980); **Sicilia;** (1976-2000); (2980).

1564. - ***Diachrysia nadeja*** **(Oberthür, 1880)**

Nota - È riportata genericamente per la **Sicilia:** (488), citazione poco attendibile.

Piemonte: (2001-2005); (3331); **Friuli:** 1976-2000; (3331).

1565. - ***Diachrysia zosimi*** **(Hübner, 1822)**

Nota - È citata per la **Campania:** (1161); dalla descrizione sembra essere *D. chalcites f. juncta*; la segnalazione potrebbe riferirsi a *D. stenochrysis*.

Piemonte: 1801-1850; 1926-1950; (114); (1198); **Friuli:** 1976-2000; (3331).

1566. - ***Euchalcia variabilis*** **(Piller & Mitterpacher, 1783)** (= *illustris* Fabricius, 1787)

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 1350 m 25.VII.1966, 7.VIII.1981; Val Formazza (VB) 30.VII.1967 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 19.VII.1985 (GRL). **Alto Adige:** Stelvio, 1000 m, 18.VII.1931 (AST, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (689); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1081); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (410); (1963); **Emilia:** 1901-1925; (629); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1951-1975; (1885); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-1975; (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2429°); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222).

1567. - **(-)** ***Euchalcia galloi*** **Berio, 1989**

Euchalcia galloi è descritta su esemplari del **Piemonte**: Alpi Cozie, Val Varaita, Castello (Bollettino della Società entomologica italiana, Genova, 121 (1): 64) (2550).

Nota - *E. galloi* è posta in sinonimia di *E. variabilis* da Nowacki & Fibiger in (2980), in seguito è posta in sinonimia di *E. bellieri* (2716), (3331).

1568. - ***Euchalcia bellieri*** **(Kirby, 1900)** (= *galloi* Berio, 1989)

Piemonte: 1951-1975; 2001-2005; (2550); (3378).

1569. - (-) ***Euchalcia siderifera*** **(Eversmann, 1846)**

Nota - Solo esemplare certo, una femmina di Avezzano (**Abruzzo**), tutte le altre citazioni di *E. siderifera* per l'Italia vanno riferite a *E. italica* (2141). La citazione di *siderifera* (s.str.) per l'**Abruzzo:** (1836), è basata su un esemplare di dubbia provenienza (leg. Dannehl) (2931).

1570. - ***Euchalcia italica*** **(Staudinger, 1882)** (= *calberlae* Standfuss, 1884)

Plusia beckeri var. *italica* è descritta su individui degli **Abruzzi** 2000 m (Entomologische Nachrichten, VIII (21): 292) (287). *Plusia calberlae* è descritta su individui degli Appennini dell'**Italia centrale**: Majella e alti monti di **Abruzzo**, 1500-2500 m (312).

Nota - "Poiché è stata riscontrata una notevole variabilità nella morfologia degli apparati copulatori di *Euchalcia siderifera*, vi è la possibilità che *E. italica* rientri nel campo di variazione di *E. siderifera*, con la quale in passato veniva posta in combinazione subspecifica" (2931).

Lazio: 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (287); (2642).

1571. - ***Euchalcia modestoides*** **Poole, 1989** (= *modesta* Hübner, 1786)

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Formazza (VB) 22-29.VII.1967 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (2014); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1836); (2642); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1951-2000; (1943); (2642); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Lazio:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2141); **Abruzzo:** 1901-2000; (1053); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3156); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298).

1572. - ***Polychrysia moneta*** **(Fabricius, 1787)**

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; (188); (747); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (157); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943).

1573. - ***Panchrysia deaurata*** **(Esper, 1787)** (= *chryson* Borkhausen, 1792; *aurea* Hübner, 1803)

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Formazza (VB) 2800 m 27.VII.1967 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1951-2000; (736); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-1975; (114); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (566); (2475); **Alto Adige:**

1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2143); **Abruzzo:** 1926-2000; (1085); (2141); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2642); **Calabria:** 1976-2000; (2206); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (343); (3083).

1574. - ***Panchrysia v-argenteum*** **(Esper, 1795)** (= *mya* Hübner, 1803)

Phalaena Noctua v-argenteum è descritta su esemplari del **Piemonte:** strada per Fenestrelle (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2): 29, Taf. 188, Noct. 109, fig. 3) (9*); (3079).

Nota - Le citazioni per la **Romagna:** in (2411), (2516), non sono attendibili (3429).

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 1400 m 6.VIII.1981 (CMC, PRN). **Veneto:** Sappada 25.VIII.1960; Dolomiti: Falcade 17.VIII.1960 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (9*); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (273); (3388); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3411); **Liguria:** 1976-2000; (2410).

1575. - ***Lamprotes c-aureum*** **(Knoch, 1781)** (= *concha* Fabricius, 1787)

Piemonte: 1751-1800; (1801-1850); (20); (114); **Trentino:** 1976-2000; (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Toscana:** 1976-2005; (3191); (3428); **Lazio:** 1951-2000; (2143).

1576. - ***Plusidia cheiranthi*** **(Tauscher, 1809)**

Liguria: 1976-2000; (2155); **Abruzzo:** 1926-1950; (2143); **Calabria:** 1976-2000; (2168).

1577. - ***Autographa gamma*** **(Linnaeus, 1758)** (= *messmeri* Schadewald, 1992; *voelkeri* Schadewald, 1992)

Nota - *Autographa messmeri* e *Autographa voelkeri* Schadewald, 1992, sono poste in sinonimia della forma nominale (2782 bis). *A. voelkeri* è citata per la **Sardegna:** (2712).

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 31.VII.1985; Noasca 10.VII.1973 (GRL); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Lombardia:** Valtellina: Val Viola 7.VII.1979 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) M.IV, M.VIII, 9.X.1965, 14-25.VII.1967 (DBR, PRN). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.XI.1984, 11.IV, 15-22.VI, 15.VII, 15-25.VIII.1986; Battipaglia (SA):

Cioffi 13.IV-26.V, 30.X.1983, 27.IV, 11 e 27.VIII, 25.X.1984, Torre Lama 3-27.VIII.1984, 1-15.IX.1988; Serino (AV) 30.VI, 19.VII, 16.IX, 27.X.1984; Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 12-16.VII.85; Eboli 4.V.1984; Portici 26.III, 22.IV-25.VI.1983 (PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Bari: Campus 1-5.X.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 8-13.X.1985; gravina di Petruscio 23.IV, 26.X.1983, 21.III.1992; Castro Marina (LE) 10.IX.1987; Porto Cesareo (LE): Serra degli Angeli 2 m 10.VIII.1996; Castellaneta Marina (TA) VII-VIII.2001-2005 (PRN); Gallipoli (LE): Baia verde 13.VII, 11 e 28.VIII, 10.IX.1986, 10.VII, 19.X, 28.XI.1987 (PRT, PRN). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 6 e 22.IV.1985; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980, 27.III.1981; Lago Duglia 1.XI.1981; Lago Fondo 1700 m 16.V.1983; Terranova 1.XI.1981; Cropani 6.VI.1981; fiume Mercure 8.VI.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981, 16.V.1983 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979; Sersale (CZ) 17-24.VIII.1985; Pollino: Campotenese 14.IX.1991; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (650); (1588); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1951-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1901-1925; 1951-2000; (990); (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (817); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (99); (2536); **Arcipelago campano:** (1801-1850); 1976-2000; (91); (2511); **Puglia:** 1851-2005; (160); (2924); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1756-1800; 1851-1925; 1951-2005; (13); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3247); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (3226); **Sardegna:** (1801-1900); 1901-2000; (114); (2712).

1578. - ***Autographa pulchrina*** **(Haworth, 1809)** (= *v-aureum* Guenée, 1852)

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Formazza (VB) 1800 m 28.VII.1967. **Lombardia:** Ponte di Legno VII.1964 (GLL, PRN). **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Rotonda 25.VIII, 4.IX.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2968); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1951-2005; (747); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2005; (366); (3388); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2642); **Friuli**: 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2642); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2206); **Sardegna:** 1976-2000; (2478).

1579. - ***Autographa jota*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2559); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2642); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2642); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (2974); **Liguria:** 1976-2000; (2642); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (262); (589); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1751-1800; (1851-1900); (19); (218); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1951-1975; (2141); **Sardegna:** 1976-2000; (2478).

1580. - ***Autographa aemula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Romagna:** Casanuova dell'Alpe (FC) 950 m 29.VI.1979 (2411), riportata come La Lama VI (2516), non è attendibile (3429).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2642); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973).

1581. - ***Autographa bractea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri, 22-28.VI.1966; Val Formazza (VB) 2800 m 29.VII.1967 (GLL, PRN); Noasca 10.VII.1973 (GRL). **Veneto:** Cortina d'Ampezzo 22.VIII.1962; Monte Baldo: Bocca di Navene, 1400 m, 15.VI.1969 (GLL, PRN); Monte Grappa 10.VII.1984. **Friuli:** Sappada 8.VII.1989 (GRL),

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1951-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2553); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Toscana:** 1976-2000; (2272); (3171); **Umbria:** 1976-2000; (2538); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Molise:** 1976-2000; (3222).

1582. - ***Cornutiplusia circumflexa*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - La citazione per la **Toscana:** (*circumflexa* L.) (Rossi, 1794) in (45) è errata, in quanto Rossi cita *circumflexa* F. e non L., quindi sinonimo di *Macdunnoughia confusa*. La citazione per la **Calabria:** (2672) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Sicilia: 1901-1925; 1976-2000; (622); (3254).

1583. - ***Syngrapha devergens*** **(Hübner, 1813)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Aymavilles 9.VIII.1986. **Alto Adige:** Pfitscher Joch 2100 m 19.VII.1990 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (2713); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (231); (2642); **Trentino:** 1951-1975; (1734); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (1083).

1584. - ***Syngrapha hochenwarthi*** **(Hochenwarth, 1785)** (= *divergens* Fabricius, 1787)

Nota - Le citazioni per la **Sardegna:** (841), (886) sono molto dubbie.

Nuovo dato -**Veneto:** Dolomiti: Monte Faloria 2200 m 13.VIII.1957 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (231); (2642); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (244); (2909).

1585. - ***Syngrapha ain*** **(Hochenwarth, 1785)**

Nota - La citazione per la **Romagna:** (2411) va confermata (3429). Per la **Toscana** è indicato un sito in (3460).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Aymavilles 25-30.VII.1989; Pré St. Didier 6.VIII.1973; Cogne 1554 m 15.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Valdieri (CN) 25-28.VII.1966; Val Formazza (VB) 25.VII.1967. **Veneto:** Dolomiti: Cortina 1300 m 29.VII.1951, 10.VII.1959 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1951-2000; (1943); (2642); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2411); (3460); **Toscana:** (1976-2000); (3460).

1586. - ***Syngrapha interrogationis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia** e la **Toscana** sono probabilmente errate.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Formazza (VB) 2800 m 25.VII.1967. **Veneto:** Dolomiti: Cortina 1230 m 5.VIII.1951 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3411); **Friuli:** 1851-1900; (181); **Liguria:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (501); **Toscana:** (1750-1800); (19); (218).

1587. - ***Plusia festucae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - La citazione per il **Trentino**: (1338) va riferita solo all'**Alto Adige.** È citata genericamente per la **Sardegna**, ma non si hanno indicazioni per l'isola in (3460). La citazione generica per la **Liguria** va confermata.

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 19.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2475); **Alto Adige:** 1901-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (2268); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3310); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Calabria:** 2001-2005; (3467); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (3331).

1588. - ***Plusia putnami*** **Grote, 1873**

Nota - In (3460) sono indicati solo due siti, uno in **Piemonte** e uno in **Liguria.**

Piemonte: 1976-2000; (2957); **Trentino:** 1951-1975; (2011); **Alto Adige:** 1951-1975; (2011); **Veneto:** 1951-1975; (2011); (2014); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Lazio:** 1951-1975; (1833).

1589. - ***Emmelia trabealis*** **(Scopoli 1763)** (= *sulphurea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 7-10.VIII.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 28.VII.1973, 13.VII.1974, 4.VII.1978, 3.VII.1987 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7.VII.1983, 27.VIII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 8.IX.1987, 1-15.IX.1988; Portici 10.VI.1983; Roccadaspide (SA) 11.IV, 15 e 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Castel del Monte 1.V.1981; Pulo di Altamura 28.VII.1983; Mola (BA) 25.VI.1968; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1996; gravina di Petruscio 12.VIII.1983; Villa Castelli 15.V.1975; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 11.VIII.1986 (PRT, PRN); Presicce Marina (LE) 6.VI.2000; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 27.VI.1979; Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980; Terranova

11.VIII.1980; Rotonda: Valli 18.VII.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980, 20.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1976-2000; (1044); (3138); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (99); (2536); **Puglia:** 1901-1925; 1951-2000; (921); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; (349); **Sardegna:** (1801-1900); 1926-2000; (114); (2587).

1590. - ***Acontia lucida* (Hufnagel, 1766)** (= *solaris* Denis & Schiffermüller, 1775; *albicollis* Fabricius, 1781; *sexmaculata* Cyrillus, 1787; *aprica* Hübner, 1822; *caloris* Hübner, 1822)

Noctua albicollis è descritta su esemplari di **Italia** (11*); (2576). *Noctua sexmaculata* è descritta su esemplari della **Campania:** aree ruderali e incolte del Napoletano, precisando che si tratta di una Noctua e non di una Tinea, come indicato in tav. II, fig. 6 (15). Sono state descritte *Noctua aprica* Hübner, 1822 e *Noctua caloris* Hübner, 1822, su esemplari di **Italia** (45).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 15.VII.1978 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.VII.1962, 15-24.VIII, 1-12.IX.1963, 30.VIII.1965, 15.VIII.1966 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 27.VIII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 1.VII.1987; Roccadaspide 15 e 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Palazzo d'Ascoli Satriano (FG) 4.X.1985; Valenzano (BA) 8.X.1984; Castellaneta Marina (TA) 7-14.VII.1980; Avetrana (TA) 22.IX.1987 (PRN); Fiume Lato (TA) 1.VI.1991 (NRD); Gallipoli (LE): Baia Verde 10.IX.1986; agro Gallipoli (LE) 14.VIII.1986 (PRT, PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 26-30.VI.1993; calanchi di Ferrandina 7.VII.1983; Montalbano jonico 22.V.1983; Metaponto: San Marco 19.V.1985; Pollino: Terranova 11.VIII.1980; Rotonda 16.IX.1979; Rotonda: Valli 18.VII.1980 (PRN). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; Sersale (CZ) 27.VII, 3 e 24.VIII, 7.IX, 20.X.1985; Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Oriolo

9.VI.1978; Umbriatico 14.VII.1982; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1951-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1900; 1951-1975; (171); (1820); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (367); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (2648); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3138); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3443); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1751-1900; 1976-2000; (15); (2536); **Puglia:** 1901-2000; (921); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (2232); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1951-2000; (1654); (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1591. - **(-)** ***Acontia titania*** **(Esper, 1798)** (= *urania* Frivaldszky, 1835)

Nota - La citazione di *A. titania* per l'**Italia** (59) e le citazioni di *A. urania* per la **Puglia:** (921) e la **Sicilia:** (1388) sono da riportare ad *A. lucida*.

1592. - ***Pseudozarba bipartita*** **(Herrich-Schäffer, 1850)**

Miana bipartita è descritta su esemplari della **Sicilia** e della **Sardegna** (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, II: 285, fig. 175, fig. 7 e 8) (100*); (2576).

Marche: 1951-1975; (3326); **Lazio:** 1976-2000; (2465); (3268); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (3469); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2005; (100*); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2907); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (100*); (2587).

1593. - **(?)** ***Ozarba moldavicola*** **(Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - Nella collezione Costa presso il Museo Zoologico dell'Università di Napoli è presente un esemplare di Lecce (**Puglia**) della f. *euboica* Mill. (712). La f. *euboica* Mill. è citata genericamente anche per la **Calabria:** (448); dati da confermare.

1594. - ***Phyllophila obliterata*** **(Rambur, 1833)** (= *wimmerii* Treitschke, 1835)

Piemonte: 1901-1925; 1951-2005; (2021); (3461 bis); **Lombardia:**

(1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (131); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1951-1975; 2001-2005; (1577); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3171); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2642); **Lazio:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (2143); **Molise:** 1976-2000; (3222); (3349).

1595. - ***Protodeltote pygarga*** **(Hufnagel, 1766)** (= *fuscula* Denis & Schiffermüller, 1775; *fasciana* auct.)

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna,** ma non si hanno segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 9.VI.1981, 28.V.1982, 18.VI.1985 (GRL). **Basilicata:** Monte Sirino 18.VII.1979 (GRL); Bosco di Policoro (MT) 18.V.1979; Pollino: Rotonda 16.IX.1979, 8.V.1981, 20.VI.1982; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; fiume Mercure 20.VI.1982 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 27.V.1994 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (164); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (446); (3068); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (541); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1976-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 1976-2005; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2642); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** (1926-1950); (1388); (2931).

1596. - ***Deltote deceptoria*** **(Scopoli, 1763)**

Nota - La citazione per il **Trentino**: (1338) va riferita solo all'**Alto Adige.** Le citazioni per la **Sardegna:** (841), (886) sono dovute a errata identificazione. Le citazioni generiche per il **Piemonte** e la **Liguria** sono da confermare.

Nuovi dati - **Alto Adige:** Stelvio, 1700 m, 10.VII.1975. **Veneto:** Monte Grappa 9.VII.1989; Nevegal (BL) 30.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:**

1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2795); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (392); (3197); **Liguria:** (1801-1850); (114).

1597. - ***Deltote uncula*** **(Clerck, 1759)**

Piemonte: 1801-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (1038); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2591); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Emilia:** 1851-1900; (377); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Umbria:** 1951-1975; (2141); **Lazio:** 1976-2000; (2642).

1598. - ***Deltote bankiana*** **(Fabricius, 1775)** (= *olivana* Denis & Schiffermüller, 1775; *argentula* Hübner, 1787)

Nota - La citazione generica per la **Liguria** va confermata.

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 16.VI.1977 (GRL).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (1787); (2362); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2209); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); **Liguria:** (1851-1900); (218); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (262); (3099); **Romagna:** 1951-2000; (2346); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (19); (3462); **Lazio:** 1926-2000; (2141); (2642).

1599. - ***Alvaradoia numerica*** **(Boisduval, 1840)**

Sardegna: 1901-1950; 1976-2000; (2100); (2249).

1600. - ***Pseudeustrotia candidula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pusilla* Vieweg, 1790)

Nuovo dato - **Alto Adige:** Vinschgau, 700 m, 25.VII.1946 (AST, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2378); **Trentino:** 1851-1975; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (244); (3068); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Emilia:** 1951-2005; (1781); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2346); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3310); **Marche:** 1851-1900; (385); **Puglia:** 1976-2000; (2350).

1601. - ***Coccidiphaga scitula*** **(Rambur, 1833)**

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora 22.VII.1968, 25 e 30.VI.1987 (CMC, PRN).

Liguria: 1901-1925; 1951-2000; (2648); (3272); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:**

1976-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2168); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1925; 1951-2005; (310); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3231); **Sardegna:** 1926-2000; (1303); (2587).

1602. - ***Odice arcuinna* (Hübner, 1790)** (= *inamoena* Hübner, 1803)

Nota - La citazione generica per le "**Romagne**": (314) è dubbia.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1038); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (2642); **Lazio:** 1851-1900; 1926-1975; (344); (2143).

1603. - ***Odice suava* (Hübner, 1813)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 13.VII.1974 (GRL). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano A.VI.1993 (PRN); Trecchina (PZ), 320 m, 23.VI.1998; Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 6-20.VII, 3-17.VIII, 20.X.1985 (RTN, PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 2.VII.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 2001-2005; (114 bis); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 2001-2005; (3272); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2160); (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (2350); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

1604. - ***Odice jucunda* (Hübner, 1813)**

Nota - La citazione generica per la **Lombardia** va confermata.

Nuovo dato - **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora 5.VIII.1987 (CMC, PRN).

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; (736); (3272); **Lombardia:** (1926-1950); (1388); **Liguria:** 1851-1925; 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Sardegna:** 1976-2000; (2249).

1605. - ***Calymma communimacula* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Lombardia: 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1184); (1734); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1572); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** 1901-1925; 1951-1975; (1659); (3272); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (2642); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (712); (2141); **Abruzzo:** (1801-1850); 1951-2000; (712); (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2350).

1606. - ***Eublemma minutata*** **(Fabricius, 1794)** (= *noctualis* Hübner, 1796; *paula* Hübner, 1809)

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1976-2000); (2209); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1900; (170).

1607. - ***Eublemma viridula*** **(Guenée, 1841)** (= *hamata* Rossi, 1790; *minuta* Zeller, 1847; *caprearum* Draudt, 1933)

Phalaena hamata è descritta su esemplari dell'Etruria (**Toscana**) (24). *Erastria minuta* è descritta su esemplari del **Lazio:** Roma, Itri sui monti, delle **Marche**: Tolentino e della **Sicilia**: Siracusa, strada fra Noto e Rosolini, fra Siracusa e Avola, Messina: il Castellaccio (109).

Nuovi dati - **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 28.V.1988 (PRT, PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN).

Piemonte: 1951-1975; (1659); **Liguria:** 1801-1850; 1951-2000; (114); (2312); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (2642); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); (3138); **Umbria:** 1951-2000; (2143); **Marche:** 1801-1850; 1976-2000; (109); (3044); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1233); **Puglia:** 1951-2000; (2611); (2642); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2168); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (833); (2168); **Sicilia:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (3254); **Sardegna:** 1976-2000; (2642).

1608. - **(-)** ***Eublemma caprearum*** **Draudt, 1933)**

Eublemma caprearum è descritta su esemplari dell'**Arcipelago campano**: Isola di Capri (Entomologischen Rundschau, 50 (14): 187, Taf. 2, fig. 15) (1233).

Nota - Probabilmente è solo una forma di *E. viridula* (1207).

1609. - ***Eublemma elychrysi*** **(Rambur, 1833)**

Nota - Le citazioni di *Eublemma elychrysi* per **Puglia, Basilicata** e **Calabria:** (2168) vanno riferite per la maggior parte a *E. viridula* (2642). Le citazioni generiche per la **Sicilia** sono da confermare.

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Liguria:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (2312); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1004); (2642); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1925;

1976-2005; (206); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2642); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2422°); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1951-1975; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** (1851-1900); (131); (2931); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1610. - ***Eublemma candidana*** **(Fabricius, 1794)** (= *minuta* Hübner, 1808; *perlana* Frölich, 1830)

Tortrix perlana è descritta su esemplari della **Lombardia:** Pavia (25*), (2576).

Nuovi dati - **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000; Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (114); (2642); **Lombardia:** 1801-1850; (25*); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (687); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (517); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (1044); (2768); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (1658); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2642); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (3469); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (148); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (2587).

1611. - **(-)** ***Eublemma pannonica*** **(Freyer, 1840)**

Nota - La citazione di *Eublemma pannonica* per la **Sicilia:** (3299) è errata, va riferita a *E. cochylioides* (3466).

1612. - ***Eublemma cochylioides*** **(Guenée, 1852)**

Sicilia: 1976-2000; (3466).

1613. - ***Eublemma ostrina*** **(Hübner, 1808)** (= ? *tripunctalis* Costa, 1836)

Pyralis (Nymphula) tripunctalis è descritta su esemplari della **Campania**: Spianata di San Martino (Napoli) e del **Lazio**: Torra (sic) d'Orlando (Gaeta) (70)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 9.X.1965 (DBR, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 25.VII, 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Statte 17.IX.1971; gravina di Riggio 18.V.1990; gravina di Petruscio 23.IV.1983 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 28.XI.1987 (PRT, PRN). **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Umbriatico 14.VII.1982 (RTN, PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 26.V.1995, (f. *carthami* H.-S.) 11.VIII.1990 (SCL). **Sardegna:** Oristano, larve su Carciofo IX-X.1996 (Ortu in litt.).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378);

Lombardia: (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** (1926-1950); 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1958); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1943); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1781); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); (3138); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (2642); **Lazio:** 1801-2000; (70); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (70); (1183); **Puglia:** 1951-2000; (1658); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (3231); **Sardegna:** 1851-2000; (331); (2587).

1614. - ***Eublemma porphyrinia*** **(Freyer, 1845)**

Nota - È citata con dubbio per la **Sicilia:** (2141); "è altamente probabile che le citazioni per l'**Italia** (e.g. Provera, 1978) vadano ricondotte alla congenere *E. ostrina*" (2931).

Lazio: 1926-1975; (1085); (2143); **Abruzzo:** 1926-1950; (2143); **Calabria:** 1976-2000; (2141).

1615. - ***Eublemma parva*** **(Hübner, 1808)** (= *transversalis* O.G. Costa, 1832/36; *minuta* sensu Duponchel, 1836)

Nymphula transversalis è descritta su esemplari della **Campania:** Terra di Lavoro (70).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 29.VIII.1962 (DBR, PRN). **Puglia:** Castellaneta Marina 7-14.VII.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 10 e 28.XI.1987 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000. **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001; Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR).

Piemonte: 1976-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1926-1975; (1184); (1734); **Alto Adige:** 1901-2000; (1184); (2325); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (377); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2882); **Lazio:** 1801-2000; (109); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Molise:** 1976-2000;

(3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; (70); (1183); **Puglia:** 1951-2000; (1658); (2575); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (3469); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (126); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1851-1900; 1926-2000; (1260); (2587).

1616. - ***Eublemma rosina* (Hübner, 1803)** (= *rosea* Hübner, 1790)

Nota - La citazione per la **Venezia Giulia** è dubbia, da confermare.

Piemonte: 1901-1925; (797); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2350).

1617. - ***Eublemma respersa* (Hübner, 1790)** (= *amoena* Hübner, 1803)

Nota - "È citata per il **Piemonte:** Valle di Susa (Rocci, 1911), da allora non è stata più rinvenuta" (3378). Rocci dice testualmente "assegnata dal Curò all'Italia settentrionale. Non so se venne trovata in **Piemonte** (Ghiliani la dà soltanto per la **Sardegna** e la **Liguria)**" (736). Mariani la cita per il **Piemonte** rifacendosi al Rocci, ma la specie in realtà non è mai stata segnalata per la regione. Citata erroneamente anche per le **Marche:** Bolognola (Verity, 1915) (2085); la citazione del Verity si riferisce a *Caradrina respersa* e non a *Eublemma respersa*.

Nuovo dato - **Toscana:** Ansedonia 13.VII.1969 (DBR, PRN).

Trentino: 1851-1900; 1951-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1900; (170); (171); **Liguria:** 1801-1850; (114); **Toscana:** 1951-1975; (2168); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3138); **Lazio:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Puglia:** 1951-2000; (1658); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2987); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3254); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-1900; 1926-2000; (114); (2587).

1618. - ***Eublemma purpurina* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (114) è molto dubbia.

Nuovi dati - **Liguria:** Conna (SV) 29.V.1982 (CMC, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA)15.VI.1986, Battipaglia (SA): Torre Lama 3.VIII.1984 (RTN, PRN); Tempone Zerrillo 630 m 7.VI.1998 (DMR, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano: Fossa Bradano 22.V-10.VI.1993; Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980, 23.VII.1979; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Rotonda 9.VII.1980; Terranova 13.VI.1982 (PRN). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2903); (3145); **Piemonte:** 1801-1851; (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata

dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (2642); **Liguria:** 1801-1850; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (2642); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2642); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3417); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (72); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (1047); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (126); (3254).

1619. - ***Eublemma pura*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la **Lombardia:** (260) è errata (314).

Nuovo dato - **Liguria:** Bordighera 31.VII.1950 (GLL, PRN).

Liguria: (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Lazio:** 1926-1950; (2143).

1620. - **(?)** ***Eublemma himmighoffeni*** **(Millière, 1867)**

Nota - È segnalata in **Liguria:** Val Nervia (IM) M.VII.1962 (1693), citazione da confermare.

1621. - **(-)** ***Eublemma pusilla*** **(Eversmann, 1837)** (= *concinnula* Boisduval, 1840)

Nota - La citazione di *E. pusilla* per il **Trentino:** (1053) va riferita a *E. candidula*.

1622. - ***Eublemma ragusana*** **(Freyer, 1844)** (= *cinerina* Ghiliani, 1852)

Anthophila ragusana è descritta su esemplari della Dalmazia: Ragusa (Freyer: Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur, V: 92, Tab. 437, fig. 1) (97 bis*); (2607). *Anthophila cinerina* è descritta su un maschio della **Sardegna:** Oristano: Cabras (114).

Nota - In (2576) è riportato erroneamente per *ragusana* come luogo tipico **Sicilia:** Ragusa.

Lazio: 1951-1975; (2143); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-1950; (506); (1340); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-1925; (114); (555).

1623. - ***Glossodice polygramma*** **(Duponchel, 1842)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.VII.1975 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 18.VII.1977; Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Terranova 3.VI.1981; Cropani 4.VI.1981; Rotonda 16.VII.1980. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 13.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925;

1976-2005; (747); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (807); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (893); (3272); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (218); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1901-2000; (1085); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3053); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168).

1624. - ***Araeopteron ecphaea*** **(Hampson, 1914)**

Toscana: 2001-2005; (3348); **Calabria:** 2001-2005; (3347); (3348); **Sicilia:** 1976-2005; (3466).

1625. - **(?)** ***Rhypagla lacernaria*** **(Hübner, 1813)** (= *glarea* Treitschke, 1826; *cretula* Freyer, 1847)

Nota - In (2576) è riportata erroneamente come luogo tipico di *Anthophila cretula* Ragusa (**Sicilia);** in realtà è Ragusa in Dalmazia. La presenza della specie in Italia è dubbia; è citata per **Liguria:** Golfo della Spezia (114), **Marche:** Osimo (385) e "**Italia centrale**" (448), (2141).

1626. - ***Metachrostis velox*** **(Hübner, 1813)** (= *mendaculalis* Treitschke, 1829)

Trentino: 1926-1950; (1184); (1681); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1038); **Veneto:** 1951-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (3183); (3272); **Emilia:** 1951-1975; (1577); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2642); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1231); (2141); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); **Calabria:** 1976-2000; (3469); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (337); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (2587).

1627. - ***Metachrostis velocior*** **(Staudinger, 1892)**

Thalpochares velox var. *velocior* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo, Libano: Beirut e Taurus (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", V: 288) (382).

Basilicata: 1976-2000; (2987); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (382); (3254).

1628. - ***Metachrostis dardouini*** **(Boisduval, 1840)** (= *mendacula*

Freyer, 1841)

Nota - È citata per l'**Arcipelago siciliano** (337); l'esemplare di Lampedusa citato da Failla e identificato da Staudinger come *dardouini* è in realtà *Thalpochares velox* (488).

Nuovo dato - **Calabria:** Donnici 25.V.1995 (det. Fibiger) (SCL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (206); (3335°); **Lazio:** 1951-1975; (2141); **Calabria:** 1951-2000; (1733).

1629. - ***Trisateles emortualis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Frabosa (CN) 7.VII.1983 (GRL).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2000; (114); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (3068); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Liguria:** 1951-2000; (1445); (2410); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2166); (3462); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

1630. - ***Xanthodes albago*** **(Fabricius, 1794)** (= *malvae* Esper, 1796)

Phalaena Noctua malvae è descritta su esemplari di **Italia** (9*); (59).

Nuovo dato - **Puglia:** Castellaneta Marina (TA) 7-14.VII.1980, 5.VIII.2004 (PRN).

Piemonte: 1901-1925; (660); **Toscana:** 1951-2000; (2168); (3171); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2642); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1976-2000; (2642); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (712); (2536); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (310); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (781); (2587).

1631. - ***Cucullia formosa*** **Rogenhofer, 1860**

Lombardia: 1926-1950; (1279); **Trentino:** 1951-1975; (1656); (1734); **Veneto:** 1926-1975; 2001-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (1577); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

1632. - ***Cucullia absinthii*** **(Linnaeus, 1761)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1801-1850;

1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2373); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141).

1633. - ***Cucullia argentea*** **(Hufnagel, 1766)**

Piemonte: 1901-1925; (736).

1634. - ***Cucullia cineracea*** **Freyer, 1841**

Piemonte: 1976-2005; (3461 bis); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2950); **Toscana:** 1976-2005; (2516).

1635. - ***Cucullia artemisiae*** **(Hufnagel, 1766)** (= *abrotani* Denis & Schiffermüller, 1775)

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1801-1900; (98); (400); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2950); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (3403).

1636. - **(-)** ***Cucullia mixta*** **Freyer, 1841**

Nota - Le citazioni per l'**Emilia:** (1235) e l'**Abruzzo:** (2877) sono errate.

1637. - ***Cucullia cemenelensis*** **Boursin, 1923**

Liguria: 1951-2000; (2877); (3183).

1638. - ***Cucullia xeranthemi*** **Boisduval, 1840**

Piemonte: 1976-2005; (2373); (3461 bis); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1976-2000; (2904); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Liguria:** 1951-2000; (1445); (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (983); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Marche:** 1976-2000; (2882); **Lazio:** 1976-2000; (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2195).

1639. - ***Cucullia lactucae*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per **Liguria**, **Emilia**, **Toscana**, **Marche** e **Lazio**, sono probabilmente errate, da confermare. Citata con dubbio per la **Sicilia:** (2931); la segnalazione per la **Sardegna:** (2373) probabilmente è dovuta a errata identificazione.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (372); (3378);); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1787); (3024); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (2373); **Friuli:** 1926-

1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Toscana:** 1851-1925; (206); (554); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1951-1975; (2373).

1640. - ***Cucullia lucifuga*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni di *C. lucifuga* per la **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.IV.1965 (2168) e la **Basilicata:** Calciano scalo (2168), vanno riferite a *C. santolinae* (2800).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 19.VII.1979; St. Vincent 12.VII.1977. **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 1.VII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2000; (2373); **Lazio:** 1951-2000; (2373); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2373).

1641. - ***Cucullia umbratica*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia**, ma non si hanno segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Piemonte:** Cuneo: San Rocco, Castello 14.V.1963; Moncalieri (TO) 3.VIII.1970 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 18.VI.1977 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m VI.1978 (GLL, PRN). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Belvedere 16.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; San Severino 27.VII.1982. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (262); (3043); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (? 1851-1900); 1976-2005; (218); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2968); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2875); **Campania:** 1901-1925; (1047); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); **Sicilia:** (1976-2000); (2877), (2931).

1642. - ***Cucullia campanulae*** **(Freyer, 1831)**

Nota - È citata dubitativamente per la **Sicilia:** (2373), (2904), (2931); citazioni da confermare.

Nuovo dato - **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (689); (3073); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (239); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373).

1643. - ***Cucullia santolinae* Rambur, 1834**

Nota - In **Sardegna** *C. santolinae* è sostituita da *C. hartigi* (2877). La citazione per la **Romagna:** (2350) va riferita all'**Emilia.**

Nuovo dato - **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 13.III.1991 (1f) (SCL).

Piemonte: 1976-2000; (2373); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); **Alto Adige:** (1976-2000); (2535); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (2535); **Emilia:** 1951-2000; (1551); (2373); **Toscana:** 1951-1975; (2168); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2373); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2800); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-2000; (1340); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226).

1644. - ***Cucullia hartigi* G. & L. Ronkay, 1988**

Cucullia hartigi è descritta su esemplari della **Sardegna**: Belvi, 700 m (Gennargentu) (Bollettino del Museo regionale di Scienze Naturali di Torino, 5 (2): 643, Tav. I: 8 e II:9-10 e figg. 25-30) (2535).

Sardegna: 1801-2000; (114); (2877).

1645. - ***Cucullia calendulae* Treitschke, 1835** (= *wredowi* O.G. Costa, 1836; *dellabrunai* Berio, 1980)

Cucullia chamomillae var. *calendulae* è descritta su esemplari della **Sicilia** (in Ochsenheimer: Die Schmetterlinge von Europa, 10 (2): 127) (75). *Cucullia wredowi* è descritta su esemplari del **Regno di Napoli** (70). *Cucullia dellabrunai* è descritta su un maschio della **Toscana:** Ansedonia (GR) (2183).

Nuovi dati - **Puglia:** Polignano (BA) 30.I.1978 (PRN); gravina di Petruscio (TA) 8.I.1992 (NRD).

Lombardia: 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1926-1950; (1198); **Toscana:** 1951-1975; (2183); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3138); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1139); **Puglia:** 1951-2000; (2350); (2535); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2800); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (75); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (818); (2587).

1646. - ***Cucullia chamomillae* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *residua* Berio, 1992)

Cucullia residua è descritta su esemplari della **Sardegna**: Santa Margherita di Pula (olotipo), **Venezia Giulia** e **Toscana** (Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 10 (2): 245) (2700).

Nuovi dati - **Lazio:** Lido di Roma 27.IV.1973 (DBR, PRN). **Puglia:** gravina di Petruscio (TA) 8.I.1992 (NRD).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1926-1975; (1787); (2013); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); (2700); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1976-2000; (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2373); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3417); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2373); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2373); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2373); **Calabria:** 1976-2005; (3347); (3469); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (1198); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2907); (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2587).

1647. - ***Cucullia santonici*** **(Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2574); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2141); (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2143).

1648. - ***Cucullia gnaphalii*** **(Hübner, 1813)**

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (621); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Liguria:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (688); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2950); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3310); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373).

1649. - ***Cucullia tanaceti*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2904); **Alto Adige:** 1901-1950; (1024); (1081); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1926-1950; (1445); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (110); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516);

Toscana: 1851-1900; 1976-2005; (171 bis); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Campania:** 1926-1950; (1350); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2373); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-1975; (114); (2877).

1650. - ***Cucullia dracunculi* (Hübner, 1813)** (= *incana* Eversmann, 1842; *anthemidis* Guenée, 1852)

Piemonte: 1976-2005; (3461 bis); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1734); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (1004); (1577); **Toscana:** 1976-2000; (3310); **Sicilia:** 1901-1950; (553); (1340).

1651. - ***Cucullia asteris* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Romagna** è dubbia.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1926-1950; 1976-2000; (1320); (2475); **Alto Adige:** 1901-2000; (1024); (2373); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (161); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); **Romagna:** (1951-1975); (1943).

1652. - ***Shargacucullia scrophulariphaga* (Rambur, 1833)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia:** (553), (1340) sono dubbie (2931). La citazione per l'**Emilia:** Regium Lepidi (983) è molto dubbia.

Sardegna: 1901-1925; 1976-2000; (781); (2421).

1653. - ***Shargacucullia caninae* (Rambur, 1833)** (= *blattariae* auct., nec Esper, 1786; *scrophularivora* auct., nec Guenée; *erythrocephala* auct., nec Wagner)

Nota - "*Cucullia caninae* e *C. blattariae* sono due specie estremamente affini a gravitazione rispettivamente ovest- ed est-mediterranea, entrambe citate per quasi tutta l'Italia. L'esatta attribuzione delle popolazioni italiane va però ancora definita, dal momento che le opinioni degli specialisti sono spesso in disaccordo e senza l'osservazione delle larve gli adulti risultano pressocché indeterminabili. Vi è inoltre la concreta possibilità che più specie gemelle siano frammiste" (2931). La citazione di *Cucullia barthae* Boursin, 1933, per l'**Abruzzo:** (1356) va riferita a *C. blattariae* (2549). La citazione di *C. caninae* per il **Piemonte**: (3461 bis) va riferita a *C. blattariae* (ex verbis Cabella).

Nuovi dati - **Trentino:** Stenico (TN) 600 m 20.V.1989. **Toscana:** Marina di Massa 20.V.1991 ex p.; Alpi Apuane: Rescetto (Massa) 6.V.1988 ex l. (GRL). **Marche:** Macerata ex l. su *Scrophularia* 19.V.1982 (PRN). **Puglia:** Pulo di Altamura (BA) 4.V.1979 (PRN).

Piemonte: (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3378); **Trentino:** 1901-

1925; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1976-2005; (2373); (3380); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2373); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1926-2000; (1356); (3324); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); (2800); **Arcipelago campano:** 1926-1950; 1976-2000; (1233); (2877); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2800); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2907); **Sardegna:** (? 1851-1900); 1976-2000; (188); (2373).

1654. - ***Shargacucullia blattariae* (Esper, 1790)**

Phalaena Noctua blattariae è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV: 518, Taf. 154, Noct. 75, fig. 4) (9*); (45).

Nota - Il tipo di **Toscana** è dubbio (2877). Esistono due sintipi di Firenze nella collezione Esper (3079). Le citazioni di *C. blattariae* per **Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Arcipelago campano**, **Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia** e **Sardegna** vanno riferite a *C. caninae* (2877). Probabilmente anche le citazioni per il **Piemonte** e la **Lombardia** vanno riferite a *C. caninae*.

Piemonte: 1901-1925; 1976-2005; (747); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2685); **Trentino:** 1851-1975; (390); (1943); **Alto Adige:** (1943); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2549); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (2549); **Toscana:** 1751-1800; 2001-2005; (9*); (3310).

1655. - ***Shargacucullia scrophulariae* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (164); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (161); (2373); **Liguria:** (? 1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; (110); (1577); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1951-2005; (2168); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2373); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2373); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2800); **Basilicata:** 1976-2000; (2373); (2800); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (2373); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

1656. - **(?) *Shargacucullia gozmanyi* Ronkay G. & Ronkay L.,**

1994

Nota - Nella cartina in (2877) è coperto l'estremo NE dell'**Italia settentrionale** ed è riportata genericamente come nuova per l'**Italia** (3209); non risultano altre citazioni, da confermare.

1657. - ***Shargacucullia thapsiphaga*** **(Treitschke, 1826)** (= *lanceolata* de Villers, 1789)

Nota - Le citazioni di *Cucullia thapsiphaga* per l'**Arcipelago campano**, la **Basilicata,** la **Calabria** e una parte di quelle per la **Puglia** vanno riferite a *C. caninae* (2800).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2964); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1064); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1577); (2373); **Toscana:** 1976-2000; (2373); (2447); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2373); **Abruzzo:** 1926-2000; (1356); (2373); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2800); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (75); (2714); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1658. - ***Shargacucullia lychnitis*** **(Rambur, 1833)** (= *rosamaria* Kostrowicki, 1956; *symaea* Koutsaftikis, 1974)

Nuovo dato - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1064); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2890); **Abruzzo:** 1976-2000; (2373); **Campania:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2373); (3298); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1975; (114); (1976).

1659. - ***Shargacucullia verbasci*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Toscana:** La Rocca (Massa) 1.VI.1989; Alpi Apuane: Rescetto 450 m 14.III.1990 ex l. (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 13.IV.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Valenzano 20.IV.1984; Bari: Santa Fara 1-15.V.1980. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT):

Fossa Bradano 28.V.1993; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981; Rotonda 19.IV.1982 (PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 15.V.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2964); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2000; (10); (2373); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2373); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1951-1975; (156); (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (2006); (2587).

1660. - ***Shargacucullia prenanthis*** **(Boisduval, 1840)**

Nota - La citazione generica per la **Basilicata** è dubbia, da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2000; (2373); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2373); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Liguria:** 1951-1975; (1659); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Basilicata:** (1951-1975); (1943).

1661. - ***Calophasia lunula*** **(Hufnagel, 1766)** (= *linariae* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1975, 1.VI.1982 (GRL).; Bagni di Lucca 31.V.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2168); (3428); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2373); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1231); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3466); **Puglia:** 1951-1975; (2168);

Basilicata: (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (886).

1662. - **(?)** ***Calophasia hamifera*** **Staudinger, 1863**

Nota - È citata per la **Sicilia:** Etna (622), (1340); da confermare.

1663. - ***Calophasia platyptera*** **(Esper, 1788)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 7.VI.1982 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 15.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Castellaneta Marina 14.VII.1980 (PRN); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980; Sersale (CZ) 20.V.1985; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2373); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1951-2005; (2168); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1664. - ***Calophasia almoravida*** **de Graslin, 1863**

Sicilia: 1901-1925; 1976-2000; (894); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (894); (2587).

1665. - ***Calophasia opalina*** **(Esper, 1794)** (= *casta* Borkhausen, 1793)

Phalaena Noctua opalina è descritta su esemplari di **Italia** (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2/2): 11, Taf. 182, Noct. 103, fig. 3) (9*); (3079).

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria** e la **Sardegna** sono probabilmente errate.

Nuovo dato - **Toscana:** Ansedonia (GR) V.1968, 30.VIII.1962 (DBR, PRN).

Piemonte: 1901-1925; (736); **Trentino:** 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1900; (171); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Toscana:** 1851-1900; 1951-1975; (206); (2373); **Arcipelago toscano:** 1901-

1925; (3322); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Sardegna:** (1801-1850); (114).

1666. - ***Omphalophana antirrhinii*** **(Hübner, 1803)**

Nuovi dati - **Lazio:** Ostia lido 20.V.1963; Roviano 5.VI.1966 (DBR, PRN). **Puglia:** Grottaglie (TA): gravina di Riggio 1.IV.1990; Mottola (TA): gravina di Petruscio 10.IV.1991 (NRD); Gallipoli (LE): Baia Verde 27.IV.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fosso Bradano 16-20.V.1993; Metaponto: San Marco 28.IV-11.V.1985; Pollino: fiume Mercure 8.VI.1980; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Terranova 13 e 18.V, 9.VI.1983 (PRN); Lago Sirino 22.VI.1980 (GRL). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 3.VI.1995 (SCL); Pollino: Campotenese 2.VI.1981 (GRL); Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980 (PRN).

Piemonte: 1801-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); **Trentino:** 1901-1925; (1038); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (687); (2373); **Romagna:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2373); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (811); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144): (3254).

1667. - ***Omphalophana serrata*** **(Treitschke, 1835)**

Cleophana serrata è descritta su esemplari della **Sicilia** (in Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa, Suppl. X (2): 121) (75).

Basilicata: 1976-2000; (2373); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (75); (3228); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (2587).

1668. - ***Omphalophana anatolica*** **(Lederer, 1857)**

Nuovi dati - **Lazio:** Lido di Roma, 27.IV.1963 (DBR, PRN). **Puglia:** Grottaglie (TA): gravina di Riggio 10.IV.1990; Mottola (TA): gravina di Petruscio 23.IV.1983. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980, 9.V.1981 (PRN). **Calabria:** Pollino: Campotenese (CS) 2.VI.1981 (GRL).

Lazio: 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (712); (2141); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2075); (2373); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (712); (3469); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (712); (3254); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

1669. - ***Sympistis funebris*** **(Hübner, 1809)** (= *funesta* Paykull, 1793)

Nota - Nel Museo di Pest è presente una femmina nella collezione Ochsenheimer ottenuta con l'acquisto della collezione Radda; il Sig. von Radda però la ebbe dal Sig. Wallner di Genf come proveniente dagli alti monti del Piemonte e della Svizzera (45); È citata per le **Marche:** (385); identificazione errata.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (?) (1751-1800); 2001-2005; (45); (3378); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (273); (1038).

1670. - **(-)** ***Sympistis heliophila*** **(Paykull, 1793)** (= *melaleuca* Thunberg, 1791)

Nota - Le citazioni di *S. melaleuca* per il **Piemonte:** (114), (188), sono dubbie, probabilmente da riferire a *S. nigrita*. La citazione per il **Trentino** di *S. melaleuca* f. *rupestralis* Hb. (1320) è da riferire a *Hadula. melanopa*.

1671. - ***Sympistis nigrita*** **(Boisduval, 1840)** (= *zetterstedti* Staudinger, 1857)

Piemonte: (1901-1925); (736); **Lombardia:** 1851-1925; (231); (1053); **Trentino:** 1851-1900; 1951-1975; (218); (1857); **Alto Adige:** 1851-1975; (231); (1857).

1672. - ***Calliergis ramosa*** **(Esper, 1786)**

Nota - È citata per la **Toscana:** sopra Stia (AR) XII (1m), esemplare in coll. Fiorini; probabile errore di cartellinatura, da confermare (3429).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 2001-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2373); **Alto Adige:** 1851-2000; (216); (3024); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2209).

1673. - ***Epimecia ustula*** **(Freyer, 1835)**

Nuovo dato - **Toscana:** Ansedonia (GR) 10.IX.1963 (DBR, PRN).

Piemonte: 1901-1925; (622); **Lombardia:** 1901-2000; (622); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (1053); (1734); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; (448); (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1656); (2795); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (622); (3183); **Toscana:** 1951-2000; (2141); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-2000; (622); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222).

1674. - ***Teinoptera olivina*** **(Herrich-Schäffer, 1852)** (= *ferrieri* Bellier, 1857)

Cleophana ferrieri è descritta su due maschi del **Piemonte** (128).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (2780); **Piemonte:** 1851-1925; 1951-2005; (128); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2373); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1734); **Emilia:** 1976-2000; (2268); **Romagna:** 1976-2000; (2346); (3108); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2800); **Calabria:** 1976-2000; (2373).

1675. - ***Cleonymia baetica* (Rambur, 1837)** (= *choenorrhini* Duponchel, 1839; *penicillata* Herrich-Schäffer, 1850)

Sicilia: 1901-2000; (1340); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (88); (2587).

1676. - ***Cleonymia yvanii* (Duponchel, 1833)**

Liguria: 1901-1925; 1976-2000; (553); (2238).

1677. - ***Amephana anarrhini* (Duponchel, 1840)**

Piemonte: 1926-1950; 1976-2005; (1445); (3461 bis); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3183); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

1678. - ***Amephana aurita* (Fabricius, 1787)** (= *dejeani* Duponchel, 1827)

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**, ma non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992 (NRD); gravina di Petruscio 23.IV.1983 (PRN).

Liguria: (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Marche:** 1851-1900; (385); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2575); **Calabria:** 1951-2000; (2075); (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** (1976-2000); (2931), (3222).

1679. - **(-)** ***Amephana dalmatica* (Rebel, 1919)**

Nota - È citata per la Sardegna: Belvì (NU) (2373); con dubbio per la **Sicilia** e la **Sardegna:** (2931), (2980). Non è citata per la **Sicilia,** bensì per la **Sardegna:** (3222). Peraltro, la segnalazione di *A. dalmatica* per la **Sardegna:** (2373) va riferita a *T. baetica* (3222).

1680. - ***Omia cymbalariae* (Hübner, 1809)**

Nuovi dati - **Liguria:** Passo di Boutia 26.VI.1976; Caprieto di Vobbia 6.VI.1976 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (218); (1787); **Trentino:** 1901-1975; (1184); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (216); (2373); **Liguria:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183);

Emilia: 1851-1900; 1926-2000; (218); (2373); **Romagna:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (830); (3429); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2643); **Lazio:** 1851-1925; 1976-2000; (344); (2373); **Abruzzo:** 1801-1850; 1951-2000; (712); (2141); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; (712); (3272); **Calabria:** 1976-2000; (2373).

1681. - **(?) *Omia banghaasi* Stauder, 1930**

Omia banghaasi è descritta su un maschio della **Campania**: Castellammare di Stabia: Pimonte (sic!) 150 m (Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a. M., 44 (1): 3) (1178).

Nota - Potrebbe trattarsi di un esemplare aberrante di *O. cyclopea* (2761). Viene confermata la validità della specie, indicando però come luogo tipico Napoli (2936).

1682. - ***Omia cyclopea* (de Graslin, 1837)**

Piemonte: 1851-1900; (114 bis); **Abruzzo:** 1976-2000; (2465).

1683. - ***Recoropha canteneri* (Duponchel, 1833)**

Liguria: 1976-2000; (2893); (3314).

1684. - ***Metopoceras omar* (Oberthür, 1887)** (= *maritima* Failla-Tedaldi, 1890)

Metopoceras maritima è descritta su esemplari della **Sicilia:** Finale (360).

Puglia: 1801-1850; (712); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2350); (3469); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2005; (360); (3228).

1685. - ***Metopoceras khalildja* Oberthür, 1884**

Sicilia: 1926-2000; (1307); (3320).

1686. - ***Lamprosticta culta* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *viridana* Walch, 1779)

Nuovi dati - **Friuli:** Castelmonte (UD) 600 m 5.VII.1989 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 15.VIII.1986 (RTN, PRN). **Basilicata:** Pollino: Cropani 6.VI.1981; Casa del Conte 18.VI.1982; sorgente Acquafredda 19.VI.1982. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2607); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1926-2000; (1445); (2373); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2141);

Campania: 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2075); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2206).

1687. - ***Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766)** (= *cassinia* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È riportata per la **Sardegna:** (841), (886), citazioni poco attendibili.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2000; (1184); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (845); (2373); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (377); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2968); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2209); **Lazio:** 1926-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2005; (3156); (3447); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (3298).

1688. - ***Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (736); (3378); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943).

1689. - ***Pyrois cinnamomea* (Goeze, 1781)**

Nota - Le citazioni generiche per il **Piemonte** e la **Sardegna** vanno confermate.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Umbria:** 1951-1975; (2141); **Abruzzo:** 1951-1975; (2141); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Sardegna:** (1901-1925); (1044); (2931).

1690. - ***Pyrois effusa* (Boisduval, 1829)**

Amphipyra effusa è descritta su esemplari della **Sicilia** (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 68) (59).

Nuovi dati - **Puglia:** Crispiano (TA): Grotta delle perle 16.VI.1986; grotta di Foggia Nuova IX.1982; Latiano (BR): grotta di Leucaspide 15.VI.1981, grotta di Grottole II.1983 (coll. Museo del Sottosuolo di Latiano). **Sicilia:** Catania 14.XII.1998 (PRN).

Piemonte: 1951-1975; (2968); **Veneto:** 1951-1975; (1943); (1734); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1524); (3183); **Toscana:** 1926-1950; 1976-2005; (1235); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (3322); **Umbria:** 1951-1975; (2141); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (2141); (2156); **Molise:** 1976-2000; (3470); **Campania:** 1951-2000; (1591); (3470); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (3419); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (59); (3254);

Arcipelago siciliano: 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1691. - ***Amphipyra pyramidea*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni di *A. pyramidea* per la **Sardegna** vanno riferite ad *A. berbera*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Caselette (TO) 12.VI.1988; Val di Susa: Bardonecchia 1350 m 26.VIII.1989 (CMC, PRN). **Veneto:** Cison di Valmarino (TV) 1.IX.1963 (GLL, PRN). **Toscana:** Montepulciano (SI) 3.VIII.1988 (PRN). **Puglia:** Gargano: Sannicandro (FG) 27.VIII.1985; Serracapriola (FG) 11.VII.1994; Selva di Fasano (BR) 22.VII.1994; Castellaneta Marina (TA) 20.VII.1981. **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; sorgente Acquafredda 10-15.VIII.1980 (PRN). **Calabria:** Scala Coeli (CS) 26.VI.1999 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2886); **Trentino:** 1851-2000; (170); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3411); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (3104); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-2005; (24); (3277); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2422°); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3466); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1801-1900; 1926-1950; (70); (5320); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (106); (3254).

1692. - ***Amphipyra berbera*** **Rungs, 1949**

Nota - In Italia è presente con la ssp. *svennsoni* Retcher, 1968. Citata con dubbio per la **Sicilia:** (2980); non vi sono altre segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Basilicata:** fiume Camastra 31.VII.1975. **Sardegna:** Belvì (NU) 700 m 6.X.1975; S'Arcu de Tascussi (Desulo) 28.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 2001-2005; (2603); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1976-2000; (3024); **Alto Adige:** 1976-2000; (3024); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 2001-2005; (3462); **Basilicata:** 1951-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2587).

1693. - ***Amphipyra perflua*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - È citata con dubbio per l'**Emilia:** Modenese (377).

Piemonte: 1901-1925; (736); **Lombardia:** 1951-1975; (1797); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (2325); **Veneto:** 1951-1975; 2001-2005; (1787); (3455); **Friuli:** 1951-1975; (3455).

1694. - ***Amphipyra livida*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1801-1850; (114); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (1787); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; (24); (514); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Lazio:** 1851-1900; (344); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (3467).

1695. - ***Amphipyra tragopoginis*** **(Clerck, 1759)**

Nuovi dati - **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 25.VI.1986. **Lazio:** Oriolo (VT) 29.IX.1984 (GRL). **Campania:** Portici (NA): parco della Reggia 30.VI.1983; Roccadaspide (SA) 15.VII.1986; Serino (AV), 600 m, 5.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 12-13.VII.1985 (SNN). **Puglia:** Canosa (BA) 22.VII.1991; Bitonto (BA) 14.VI.1982; Pulo di Altamura (BA) 20.IX.1980; Gravina in Puglia (BA) 11.VIII.1984. **Basilicata:** calanchi di Ferrandina (MT) 27.VI.1979, 5.VII.1983; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Vulture (PZ): Lagonegro 13.VII.1980; Monticchio 23.VI.1983; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980, 19.VI.1982; Timpone Castellana 17.VII.1980. **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 17.VII.1984; Pollino: Monte Moschereto 15.VII.1980. **Sicilia:** Etna: Galvarina (CT), 1800 m, 22.VII.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (262); (1835); **Romagna:** 1951-2005; (1835); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1951-2005; (24); (3277); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1408); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1801-1925; 1951-2000; (70); (2232); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (106); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1696. - ***Amphipyra tetra*** **(Fabricius, 1787)**

Nota - La citazione per il **Trentino**: (1338) va riferita solo all'**Alto Adige.**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1976-2005;

(3378); (3461 bis); **Trentino:** 1976-2000; (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (2342); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1734); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650); (1820); **Liguria:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (2410); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2000; (518); (2272); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (218); (3254).

1697. - ***Diloba caeruleocephala*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Puglia:** Bari: Santa Fara 28.XI.1979; Valenzano 24.XI.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 8-14.XII.1985, 5-11.I.1986; gravina di Petruscio 5.X.1984. **Basilicata:** Pollino: Piana San Francesco 24.IX.1981; Lago Duglia 1.XI.1981; Timpone Castellana 9.XI.1979, 5.X.1982; Rotonda 9.XI.1979, 16.XI.1980; Terranova 1.XI.1981; Cropani 1.XI.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 10.XI.1981 (PRN). **Sicilia:** Ficuzza 2.XI.1982, 26.X.1984, 7.XII.1985, 8 e 12.XI.1988; Madonie: Mandria del Conte 4.XI.1978, 20.X.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (1238); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1734); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (935); (1898); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1551); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** (1951-1975); (1827); **Puglia:** 1901-2000; (1040); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254).

1698. - ***Condica viscosa*** **(Freyer, 1831)** (= *indelicata* Turati, 1934; *europaea* Parenzan, 1980)

Mythimna viscosa è descritta su esemplari della **Sicilia** (Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde, I (4): 39, Taf. 21, fig. 3, Taf. 34, fig. 3) (66*); (2576). *Condica europaea* è descritta su un esemplare della **Calabria**: Rossano lido (2201).

Nuovo dato - **Puglia:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 6-10.X.1992 (1m) (PRN).

Puglia: 1976-2000; (2800); (2924); **Calabria:** 1976-2005; (2201); (3469); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005;

(66*); (3254).

1699. - ***Panemeria tenebrata*** **(Scopoli, 1763)** (= *arbuti* Fabricius, 1775; *heliaca* Denis & Schiffermüller, 1775; *jocosa* Ze9ler, 1847)

Anarta jocosa è descritta su esemplari della **Sicilia**: Siracusa, Messina (109).

Nuovi dati - **Emilia:** Piacenza III.1961 (RBT, PRN). **Lazio:** Zagarolo (RM) 21.IV.1961 (DBR, PRN). **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 20.VI.1982 (1f); San Severino 8.VI.1980 (1m) (PRN); Monte Vulture (PZ), 1000 m, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo, 550 m, 19.V.1995 (1 es.); Longobucco (CS): Vallone dei Ronzi, 600 m, 5.V.1997 (1 es.); Rossano (CS): Campi, 800 m, 10.V.1998; Monte Cocuzzo (CS), 1050 m, 20.V.2004; Bianchi (CS), 1010 m, 28.V.2004 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (3043); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (367); (3068); **Friuli:** 1851-1975; (392); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1926-2000; (1885); (3062); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1976-2005; (24); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1231); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1951-1975; (99); (2168); **Puglia:** 1951-1975; (1538); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1047); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3254).

1700. - ***Aegle semicana*** **(Esper, 1798)** (= *vespertalis* Hübner, 1813)

Phalaena Noctua semicana è descritta su esemplari del **Piemonte**: dintorni di Torino (ex coll. de Prunner) (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 4 (2/2): 34, Noct. 110, Taf. 189, fig. 5) (9*); (3079).

Nota - Il tipo di *Phalaena Noctua semicana,* conservato presso lo ZSM, è di **Toscana**: Firenze (3080); consideriamo valido come luogo tipico Torino, come indicato anche in (2576).

Nuovi dati - **Puglia:** Palagiano (TA) 3.VII.1991 (NRD); gravina di Riggio (TA) 20.VIII.1991 (PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Policoro (MT): Bosco Pantano 19.VI.1977; Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano A.VI.1993 (PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 17.VIII.1985 (RTN, PRN).

Piemonte: 1751-1800; (9*); **Toscana:** (1751-1800); (9*); (3080); **Romagna:** 1926-1950; (2725); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1901-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-

1950; (1183); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3272); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (2206); **Sicilia:** 1801-1925; 1951-2000; (97); (3254); **Sardegna:** 1926-1950; (1260).

1701. - **(-)** ***Aegle vespertinalis*** **(Rambur, 1813)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia:** (147), (3272) aono da riferire a *A. semicana*.

1702. - ***Aegle agatha*** **(Staudinger, 1861)**

Basilicata: 1976-2000; (3467); **Calabria:** 1951-1975; (2636).

1703. - ***Aegle kaeckeritziana*** **(Linnaeus, 1766)** (= *flava* Hübner, 1809)

Nota - È riportata con dubbio per l'**Alto Adige:** (172); citazione errata (1038). Le citazioni per l'**Emilia:** (3272) e la **Toscana:** (2075) sono probabilmente da riferire a *A. semicana*. Citata anche per la **Sicilia:** (343), molto dubbia.

Puglia: 1951-2000; (2075); (2230); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (2168).

1704. - ***Synthymia fixa*** **(Fabricius, 1787)** (= *monogramma* Hübner, 1808)

Nuovi dati - **Puglia:** Mottola (TA): gravina di Petruscio 20.V.1985, 31.V.1991; gravina di Laterza (TA) 8.V.1992 (NRD). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 1-5.VI.1992, Fosso Bradano 26-30.V.1983; Metaponto: San Marco 11.V.1983, 19.V.1985; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979, 17.VII.1980; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Terranova 18.VI.1982; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Cropani 6.VI.1981; fiume Mercure 8.VI.1980 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V.1981; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Piemonte: 1976-2000; (2168); **Liguria:** 1801-1850; 1951-2000; (114); (3183); **Abruzzo:** 1976-2000; (2465); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2938); **Calabria:** 1851-1900; 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-2000; (89); (3254); **Sardegna:** 1851-1950; 1976-2000; (290); (2587).

1705. - ***Schinia cardui*** **(Hübner, 1790)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Poggio di Carasco (Val Curone, AL) 11.VII.1981 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1925; (1038); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1038); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3378); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2410); **Emilia:** 1951-1975; (1781); **Romagna:** (1851-1900); 1901-

1925; 1976-2000; (314); (3108); **Marche:** 1976-2000; (2882); **Lazio:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1851-2000; (344); (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2350).

1706. - **(?)** ***Schinia cognata*** **(Freyer, 1833)**

Nota - La citazione per la **Lombardia:** (164) è considerata dubbia (218). La cattura in **Alto Adige:** Merano (170) è accidentale (1038).

1707. - ***Schinia scutosa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; (114); (736); **Trentino:** 1851-1900; (171); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1734); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (2014); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (3469); **Sicilia:** 1976-2000; (3466).

1708. - ***Heliothis viriplaca*** **(Hufnagel, 1766)** (= *dipsacea* Linnaeus, 1767)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 29.VI.1976, 11.VII.1979; St. Vincent 15.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Poggio di Carasco (Val Curone, AL) 3.VII.1982 (CMC, PRN). **Friuli:** Castelmonte (UD) 600 m 5.VII.1989 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 31.V.1962, 10.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 9.IX.1974, 20.VII.1975 (GRL). **Puglia:** Fiume Lato 12.VIII.1991 (NRD). **Basilicata:** Pollino: Rotonda 8.V.1981; San Severino 6.VII.1980 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Pollino: Vallone Colloreto 6.VI.1982; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1943); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1943); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (206); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2005; (3222); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); (2940); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3254).

1709. - ***Heliothis maritima*** **de Graslin, 1855**

Nota - La citazione generica per la **Sicilia:** (506) non è attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1976-2000; (2211); **Alto Adige:** (1976-2000); (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** 1901-1925; (3272); **Lazio:** 1901-1925; (3272).

1710. - ***Heliothis ononis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per la **Toscana:** (218) e la **Sicilia:** (148), (2867); citazioni dubbie, probabilmente da riferire a *H. armigera*.

Nuovo dato - **Piemonte:** Bardonecchia 11.VI.1977 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** (1901-1925); 1951-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787).

1711. - ***Heliothis peltigera*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *florentina* Esper, 1788)

Phalaena Noctua florentina è descritta su esemplari della **Toscana**: dintorni di Firenze (9*); (3079).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 15.VIII.1961, 7-10.VII.1962, 5.IX.1963, 1-30.VII, 9.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1985, 3.VI.1988 (GRL). **Lazio:** Palombara Sabina (RM) 14.VI.1964; Roma: La Storta 5.V.1964 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7 e 28.VII.1983, Torre Lama 10 e 29.VIII.1984, 8.IX.1987, 8.IX.1988; Portici (NA): bosco della Reggia 5 e 23.V, 15.VI.1983; Roccadaspide (SA) 11.IV, 15 e 28.VI.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Taranto: Mar Piccolo 6.VII.1980; Mottola (TA): gravina di Petruscio 10.VII.1985 (PRN); gravina di Riggio (TA) 29.IX.1991 (NRD); Gallipoli (LE): Baia Verde 4.X.1986, 14.V.1988; agro Gallipoli (LE) 14.VIII.1986 (PRT, PRN); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999; gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979, 6.VI.1980; Cropani 6.VI.1980; fiume Mercure 8.VI.1980; Metaponto: San Marco 11-19.V.1985 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1452); (2283); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-

1925; 1951-2005; (9*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-2005; (3275); (3327); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2000; (99); (2536); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (783 bis); **Puglia:** 1801-1900; 1951-2000; (72); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (156); (2201); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (223); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (50); (2587).

1712. - ***Heliothis nubigera*** **Herrich-Schäffer, 1851**

Nuovi dati - **Puglia:** Grottaglie (TA): gravina di Riggio 20.VIII.1991; Ginosa Marina 8.VII.1998 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1641); (1787); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1951-1975; (1641); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3314); **Emilia:** 1901-1925; (983); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2000; (3190); **Marche:** 1951-1975; (2085); (3326); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-2005; (506); (3254); **Sardegna:** 1926-1975; (1476); (1735).

1713. - ***Helicoverpa armigera*** **(Hübner, 1808)** (= *obsoleta* auct. nec Fabricius, 1775; *barbara* Fabricius, 1794)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 25.VIII.1961, 20.IX.1962, 10.IX.1965; Argentario (GR) 1-5.IX.1963, 19-20.X.1963 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 21.X.1986 (GRL); Montepulciano (SI) 10.IX.1975 (PRN). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 20-29.IX.1983 (SNN); Battipaglia (SA): Cioffi 2.X.1980, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 1-22.IX.1988; Roccadaspide (SA) 22.VI, 25.VIII.1986; Portici (NA): parco della Reggia 21.IX.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Bari: Campus 1-5.X.1980; Fiume Lato 12.VIII.1991 (NRD); gravina di Laterza (TA) 18.IX.1992, 16.VI.1999; Grottaglie (TA): gravina di Riggio 12.XI.1989, 22.X.1990, 29.IX.1991; Porto Cesareo (LE): Serra degli Angeli 2 m 10.VIII.1996 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 11.VIII, 4 e 12.X.1986, 19.X.1987; agro Gallipoli (LE) 14.VIII.1986 (PRT, PRN); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 13.VII.1979; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; San Severino 15.IX.1979 (PRN); calanchi Ferrandina 12.VII.1983; Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ),

località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII, 7.X.1980 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (164); (2014); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (342); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (433 bis); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3356); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-2000; (1161); (2536); **Puglia:** 1851-2000; (160); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (1938); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (109); (3247); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3231); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (2587); (3272); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1714. - ***Pyrrhia umbra*** **(Hufnagel, 1766)** (= *marginata* Fabricius, 1775)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 8-13.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Moncalieri (TO) 15.V.1968; Miasino (NO): lago d'Orta 14.VII.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 1.IX.1961 (DBR, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; fiume Mercure 8.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-1975; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (262); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-2005; (314); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3466); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (144); (2597); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (1260); (2587).

1715. - **(-)** ***Pyrrhia purpurina*** **(Esper, 1804)**

Nota - È citata per la **Lombardia:** (164), (218); identificazione errata.

1716. - **(-)** ***Periphanes treitschkei*** **(Frivaldsky, 1835)**

Nota - *Periphanes treitschkei* f. *petricolor* Turati (1004), e *Periphanes treitschkei* ssp. *italica* Berio (1376), descritte su esemplari dell'**Emilia**, sono da riferire a *Hadula. pugnax*. *Periphanes treitschkei* non fa parte della fauna italiana.

1717. - ***Periphanes delphinii*** **(Linnaeus, 1758)**

Piemonte: 1751-1850; 1901-1925; (20); (736); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1950; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1787); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1787).

1718. - ***Chazaria incarnata*** **(Freyer, 1838)**

Toscana: 1901-1925; (514).

1719. - ***Brithys crini*** **(Fabricius, 1775)** (= *pancratii* Cyrillus, 1787; *encausta* Hübner, 1808)

Noctua pancratii è descritta su esemplari della **Campania:** litorale di Napoli (15).

Nota - *B. encausta* è posta in sinonimia di *B. crini* (2763). *B. encausta* è citata con dubbio per l'**Arcipelago siciliano** (218). La citazione in (2168) è dovuta ad una svista; è ripresa da (1545) che segnala la presenza del *Pancratium maritimum*, pianta ospite, ma non il lepidottero.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 24.VII.1965 (DBR, PRN); Castiglione della Pescaia 8.VII-1.VIII.1990 ex larva (GRL). **Molise:** Termoli 3.VIII.1985 ex larva (leg. Fiumi, PRN). **Puglia:** Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR).

Liguria: 1801-1850; (114); **Toscana:** 1951-2000; (2141); (3277); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1189); (2298); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1751-1800; (15); (99); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1235); (2899); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3128); **Sardegna:** 1801-1850; (114).

1720. - ***Elaphria venustula*** **(Hübner, 1790)**

Nota - È citata con dubbio per la **Sicilia:** (2980), non ancora segnalata nell'isola.

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.V, 3.VI.1982 (GRL).

Piemonte: 1976-2005; (2957); (3414); **Lombardia:** 1951-2005; (1787); (3461 bis); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2346); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000;

(2168); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

1721. - ***Haemerosia renalis*** **(Hübner, 1813)**

Umbria: 1976-2000; (2141); **Lazio:** 1901-2005; (622); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (575); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1976-2000; (3254).

1722. - ***Acosmetia caliginosa*** **(Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516).

1723. - ***Caradrina morpheus*** **(Hufnagel, 1766)**

Nuovo dato - **Campania:** Scafati (SA) 2.VII-31.VIII.1983; Vesuvio: Osservatorio 6.VI.1985 (SNN). **Basilicata:** Vulture: Monticchio 20.VI.1969 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2005; (807); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2553); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (834); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Campania:** 1976-2000; (2350); (2536); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2350); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1340).

1724. - ***Platyperigea montana*** **(Bremer, 1861)** (= *cinerascens* Tengstrom, 1869)

Caradrina rougemonti è descritta su esemplari della **Valle d'Aosta:** Alpi Graie: Gran Paradiso (581).

Nota - In Italia è presente la ssp. *rougemonti* (Spuler, 1908).

Nuovo dato - **Alto Adige:** Merano (BZ) 300 m II.1932 ex larva (Fibiger det.) (AST, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (581); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2000; (747); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1901-2000; (3090); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Campania:** 1901-1925; (983).

1725. - ***Platyperigea albina*** **(Eversmann, 1848)**

Nota - "A causa di numerose incertezze tassonomiche e zoogeografiche su *P. montana* (Bremer, 1861) (= *cinerascens* Tengström, 1869) e *P. albina* (Eversmann, 1848) l'esatta attribuzione delle popolazioni italiane (e.g. *rougemonti* Spuler, 1908) va ancora definita con certezza" (2931). Le citazioni di *P. albina* per **Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto** e **Lazio,** vanno riferite a *P. montana*; probabilmente anche quella per la **Campania:** (983).

Liguria: 1976-2000; (3183).

1726. - ***Platyperigea grisea*** **(Eversmann, 1848)**

Alto Adige: 1901-1925; (1053).

1727. - ***Platyperigea terrea*** **(Freyer, 1840)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Sicilia:** 1901-1950; (488); (1340); **Sardegna:** 1951-2000; (1975); (2587).

1728. - ***Platyperigea aspersa*** **(Rambur, 1834)** (= *culoti* Turati, 1913)

Caradrina culoti è descritta su esemplari della **Sardegna:** Gennargentu 1200 m (780).

Nuovi dati - **Liguria:** Conna (SV) 300 m 3.VII.1982 (CMC, PRN). **Puglia:** Pulo di Altamura (BA) 29.VII.1979; Mottola (TA): gravina di Petruscio 16.VIII.1983, 12.VIII.1985. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Piano Ruggio 25.VII.1982; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Rotonda 24.VII.1979; Terranova 10-13.VIII.1980, 3.VI.1981. **Calabria:** Santo Stefano di Rogliano 23.IX.1981; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980, 28.VII.1982; Vallone Colloreto 6.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; (218); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (390); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** (1901-1925); 1951-2000; (448); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (983); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3419); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3357); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (218); (2587).

1729. - ***Platyperigea kadenii*** **(Freyer, 1836)**

Nota - Le citazioni di *P. kadenii* per la **Sardegna** vanno riferite a *Paradrina fuscicornis*, sola specie presente nell'isola (1287). La

citazione per il **Trentino**: (1338) va riferita solo all'**Alto Adige.**

Nuovi dati - **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 30.IX.1983; Pollino: fiume Mercure 6.X.1980, 20.VI.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1976-2000; (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (566); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (2410); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1835); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2536); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1925; (109); (609).

1730. - ***Platyperigea proxima*** **(Rambur, 1837)**

Sicilia: 1976-2000; (2907); (3254).

1731. - ***Platyperigea germainii*** **(Duponchel, 1835)**

Alto Adige: 1926-1950; (1207); **Puglia:** 1951-2000; (2350); (2924); **Sicilia:** 1851-2000; (205); (3254); **Sardegna:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (448); (2587).

1732. - ***Platyperigea ingrata*** **(Staudinger, 1897)**

Sicilia: 1901-1925; (506); (2597).

1733. - ***Paradrina selini*** **(Boisduval, 1840)** (= *selinoides* Bellier, 1862)

Nuovi dati - **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 28.IX.1983 (SNN); Battipaglia (SA): Cioffi 2-27.VIII.1984; Serino (AV) 30.VI, 7.VII, 16.VIII, 8.IX.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Terlizzi (FG) 15-25.V.1978; Bari: Campus 14.VII, 14.X.1980; Valenzano (BA) 19-25.VIII.1984; Mottola (TA) gravina di Petruscio 23.IV.1983; Torre Guaceto (BR) 24.IX.1976, 5.X.1977. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 1-5.IX.1992, 11-20.IV.1993, Fossa Bradano 20-25.V.1994; Bosco di Policoro (MT) 18.V.1979; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Vulture (PZ): Monticchio 27.V.1969; Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Piano Ruggio 20.VI.1982; Rotonda 19.V.1979; Terranova 15.V, 16.VI.1982, 1-10.V, 9 e 16.VI.1983. **Calabria:** Pollino: Campotenese 17.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:**

1901-1925; 1951-2000; (750); (3293); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (2648); (3375); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (688); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1951-2005; (2968); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3375); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (3375); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3375); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1901-1925; 1976-2000; (3375); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (3375); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3375); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (3375); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (205); (3375); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1975; (218); (3375).

1734. - ***Paradrina suscianja*** **von Mentzer, 1981**

Toscana: 2001-2005; (3375); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3375); **Lazio:** 1951-1975; 2001-2005; (3359); (3375); **Abruzzo:** 1951-1975; 2001-2005; (3359); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3375); **Calabria:** 1976-2000; (3375).

1735. - ***Paradrina fuscicornis*** **(Rambur, 1832)** (= *pseudoterrea* De Laever, 1980)

Paradrina pseudoterrea è descritta su esemplari della **Sardegna:** Arbatax, Monte Ortobene (2188).

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Trentino:** 1901-1950; (1184); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1901-1950; (609); (1340); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-2005; (114); (3375).

1736. - ***Paradrina abruzzensis*** **(Draudt, 1933)**

Athetis selini f. *abruzzensis* è descritta su individui dell'**Abruzzo**: Pescocostanzo (Entomologischen Rundschau, 50 (14): 186, Taf. 2, figg. 11, 12) (1233).

Nota - *Caradrina abruzzensis* è buona specie di **Italia centrale** e **meridionale** (3375). La citazione per la **Calabria:** (3375) va riferita alla **Basilicata.**

Lazio: 1951-1975; (1684); **Abruzzo:** 1926-1950; (1233); (3375); **Basilicata:** 1976-2000; (3375); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (3375).

1737. - ***Paradrina clavipalpis*** **(Scopoli, 1763)** (= *cubicularis* Denis & Schiffermüller, 1775; *quadripunctata* Fabricius, 1794)

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 24.VII.1974, 9.X.1968 (GLL, PRN). **Liguria:** Capo Mele (SV): Andora 27.VIII.1994 (CMC, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.IV.1955, 15.VIII.1966 (DBR, PRN). **Campania:** Portici (NA) parco della Reggia 10.V.1983; Roccadaspide (SA) 15.VI, 8.VII.1986; Serino (AV) 4.VII, 16.IX.1984 (RTN, PRN); Scafati (SA) 24.III, 24.V, 28.IX.1983; Vesuvio: Osservatorio

28.IX.1983 (SNN). **Puglia:** Foggia 1.V.1982; Zapponeta 18.V.1979; Mellitto 16.V.1978; Bari: Campus 10-15.IX, 5.XI.1980; Bari: Santa Fara 15-30.V.1980; Valenzano 2.XI.1983, 6.X, 8.XI.1984; gravina di Riggio 18.V.1990; Statte 17.IX.1971; gravina di Petruscio 23.IV.1983 (PRN); Gallipoli (LE) 1.XI.1984, 18.V.1986; Baia Verde 10.XII.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 6-20.V, 21-25.VI, 16-20.VII.1992, Ponte Cagnolino 11-20.IX.1992, 11-20.IV.1993, Fossa Bradano 22-25.V, 16-20.VI.1994; calanchi di Ferrandina 5.VII.1983; Bosco di Policoro (MT) 21.IX.1979; Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; Pollino: Terranova 24.IX.1981. **Calabria:** Rossano lido (CS) 20-30.VII.1980, 23.VIII.1981 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 28.V.1995 (SCR). **Sardegna:** Belvì (NU) 6.X.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (174); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (262); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); (2768); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); (3375); **Campania:** 1976-2000; (3375); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (3375); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3375); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (1047); (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1738. - ***Paradrina wullschlegeli* (Püngeler, 1903)** (= *aostae* De Laever, 1986)

Paradrina aostae è descritta su esemplari della **Valle d'Aosta**: fra Aygnaville (*recte* Aymavilles) e Vieiges (sic!), 1000-1500 m (2436).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2436); (3375); **Alto Adige:** 1926-2000; (2623); (3375); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768).

1739. - ***Paradrina noctivaga* (Bellier, 1863)**

Nota - L'esemplare citato come *Paradrina selini* v. *noctivaga* per la **Romagna:** (1885), è *P. selini* (2516). Citata per il **Lazio:** (344), non rinvenuta (2141).

Nuovo dato - **Sardegna:** Belvì (NU) 10.VII.1978 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Trentino:** 1901-1925; (1038); (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (273); (1053); **Emilia:** 1901-1925;

(1004); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (3298); **Basilicata:** 1976-2000; (3298); **Calabria:** 1951-1975; (2168); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (247); (3375); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1740. - ***Paradrina levantina*** **(Hacker, 2004)**

Puglia: 1951-2000; (3375); **Sicilia:** 1976-2000; (3375).

1741. - ***Paradrina flavirena*** **(Guenée, 1852)** (= *jacobsi* sensu auct. nec Rothschild, 1914; *infusca* Constant, 1900)

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Petruscio 12.VIII.1983; Valenzano 18.VIII, 1.IX, 8.XI.1984; Polignano 26.VIII, 9.X.1978, 19.V.1979; gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992; Bari: Campus 10-15.IX.1980. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 21-25.IV.1992, Ponte Cagnolino 16-20.IX.1992, 16-20.IV.1993; Pollino: Rotonda 16.VIII.1980 (PRN). **Calabria:** Donnici: Fosso Cucolo 5.X.1994 (SCL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3375); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1951-2000; (1681); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1926-1975; (1230); (3043); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3375); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3375); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2422°); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (3375); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (3375); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3375); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (409; (3375); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (3375).

1742. - ***Eremodrina vicina*** **(Staudinger, 1870)**

Emilia: 1926-1950; 1976-2000; (3327); **Romagna:** 1976-2000; (2215); (2643); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); **Sicilia:** 1926-1975; (3327).

1743. - ***Eremodrina gilva*** **(Donzel, 1837)**

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia:** (2980); non si hanno altre segnalazioni per l'isola.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (240); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (539); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Marche:** 1901-1925; 1976-2000; (847); (2141); **Lazio:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000;

(2141); (2422°); **Molise:** 1926-1950; (1127).

1744. - ***Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781)** (= *alsines* Brahm 1791; *alsinides* Costantini, 1922; *noguera* De Laever, 1976)

Caradrina alsinides è descritta su esemplari dell'**Emilia:** Monte Gibbio: Mutina; Regium Lepidi; Sestola (983).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 6 e 10.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Valdieri 28.VII.1956; Miasino (NO): lago d'Orta 14.VII.1968 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Bossea (CN) 15.VI.1985; Frabosa (CN) 2.VII.1983 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN); Vione (BS), 1250 m, 4.VII.1979 (GRL). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 12.VII.1959, 20.VII.1960 (GLL, PRN). **Campania:** Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Monte Caperino 27.VII.1974; Laghi di Monticchio 20.VI.1969; Pollino: Lago Duglia 6.VI.1981; sorgente Acquafredda 3.VI, 3.VII.1981; Timpone Castellana 23.VII.1979; Belvedere 16.VII.1980; fiume Mercure 6.VI.1981, 20.VI.1982 (PRN); Rionero in Vulture (PZ): località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1950; (983); (2725); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1976-2005; (2987); **Puglia:** 1976-2005; (2987); (3426) **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2987); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (2597); (3254); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

1745. - ***Hoplodrina blanda* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *taraxaci* Hübner, 1813)

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 3.VII.1983, 20.VII.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 24.X.1981 (GRL). **Basilicata:** Lago Sirino 17.VII.1979 (GRL); Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 10-15.IX, 1-5.XI.1992; Pollino: sorgente Acquafredda 25.VII.1989; Lago Duglia 6.VI.1981; Rotonda 9.VIII.1980, 25.VIII.1981; Terranova 18.VI.1980; Cropani 26.IX.1981. **Calabria:** Sersale (CZ) 17.VIII.1985; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998

(SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (689); (3043); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (3043); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; 2001-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; (792); (2041).

1746. - ***Hoplodrina superstes*** **(Ochsenheimer, 1816)** (= *blanda* Hübner, 1803)

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Piana San Francesco 24.IX.1981; sorgente Acquafredda 25.VII.1976; Lago Duglia 18.VI.1982; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Cropani 26.IX.1981; fiume Mercure 16.V.1983; Rotonda 14.IX.1979, 16.VIII.1980; Terranova 6.VI.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; 2001-2005; (1943); (3411); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3335°); (3429); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3419); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3357); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254).

1747. - **(-)** ***Hoplodrina hesperica*** **Dufay & Boursin, 1959)** (= *pseudoambigua* Zerny, 1927)

Nota - *H. blanda* ab. *pseudoambigua* Z. è citata per la **Sicilia:** Petralia Sottana (1384), dato da riferire probabilmente a *H. blanda*.

1748. - ***Hoplodrina respersa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Sicilia** è da confermare.

Nuovo dato - **Basilicata:** Pollino: Rotonda 20.VI.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925;

1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3411); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2005; (1356); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2938); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1901-1925); (506); (2931).

1749. - ***Hoplodrina ambigua*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *plantaginis* Hübner, 1813)

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 11.IX.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 5.VI, 3.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 10.VI.1981 (GRL). **Marche:** Fano: Torrette 6.IX.1954 (ex coll. Fiori, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 26.V.1983, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 15 e 22.IX.1988; Eboli 4.V.1983; Portici 16.V-20.VI.1983; Roccadaspide (SA) 22.VI, 25.VIII.1986; Serino (AV) 22.IX.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 30.V, 6.VI.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Bari: Campus 1-5.X.1980; Bari: Santa Fara 14.V.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 30.IX-31.X.1985, 17-19.IX.1986; Parabita (LE) 16.IX.1986 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 18.V.1986, 9-28.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 11.V.1985; Monticchio 6.VI.1983; Pollino: Piana San Francesco 24.IX.1981; Cropani 5.VI.1981; San Severino 15.IX.1979; Terranova 25.IX.1981, 10.VI.1982, 31.V.1983; Rotonda 23.IX.1981; fiume Mercure 6.X.1980; Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 22-29.VI.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979. **Sicilia:** Altavilla Milicia (PA): Valle del Corvo 305 m 12-15.V.1997; Caccamo (PA): Bosco Artale 650 m 15.V.1997 ; Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 7.X.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2005; (164); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (1898) (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (517); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488);

Marche: 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3465 bis); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2005; (2417); (3046); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2924); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (343); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1750. - ***Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766)** (= *trilinea* Denis & Schiffermüller, 1775; *erubescens* Turati, 1909)

Grammesia trigrammica f. *erubescens* è descritta su esemplari della **Sicilia**: Ficuzza (622).

Nota - *Grammesia trigrammica* f. *erubescens*, elevata al rango di buona specie: (2329), è posta in sinonimia della forma nominale: (2607).

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 14.VI.1985; Val Bognanco (VB) 19.VI.1977 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.V.1975 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 6.VI, 17.VII.1980; fiume Mercure 8.VI.1980; Cropani 6.VI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Terranova 15.V.1983 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (218); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1901-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); 7 (3222); **Campania:** 1976-2005; (3467); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (2597); (3254).

1751. - ***Atypha pulmonaris* (Esper, 1790)** (= *fuscago* Esper, 1791)

Phalaena Noctua fuscago è descritta su esemplari di **Italia** (9*); (3079).

Nuovo dato - **Piemonte:** Frabosa (CN) 3 e 20.VII.1983, 18.VII.1985 (GRL).

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1958); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Friuli:** 1976-2000; (2968);

Venezia Giulia: 1901-1925; (650); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (629); (3043); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (3053); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 1976-2005; (2536); (3453); **Basilicata:** 2001-2005; (3467); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3254).

1752. - ***Spodoptera exigua*** **(Hübner, 1808)** (= *fulgens* Geyer, 1832; *junceti* Zeller, 1847)

Noctua exigua è descritta senza indicare il luogo tipico (Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noctuae, 2 e 3, Taf. 78, fig. 362) (23*), ma il luogo tipico è **Italia**, in quanto la specie è stata descritta su un esemplare della collezione di Mazzola, conservato presso il Museo di Vienna (70). *Caradrina junceti* è descritta su esemplari della **Sicilia:** Siracusa, Catania (109).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 1-30.VIII, 9.X.1965, 3 e 9.VIII.1961, 13.VII, 10.IX.1963, 24.VII.1964; Argentario (GR) 19-20.X.1962. **Lazio:** Palombara Sabina 14.VI.1969 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 21 e 28.IV.1983, 18.I, 27.VIII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 20.X.1988; Portici 22.IV-22.V, 2-30.VI.1983; Roccadaspide (SA) 8.VII, 28.VIII.1986; Serino (AV) 25.VIII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 13-21.VIII.1985 (SNN). **Puglia:** Palazzo d'Ascoli 4.X.1985; Bari: Santa Fara 18.VI.1980; Valenzano 30.IX.1983; Palagiano 20.VIII.1991; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; gravina di Petruscio 12.VIII.1983, 23.XI.1991; gravina di Ginosa 22.X.1989; gravina di Riggio VIII.1990, 29.IX.1991; Villa Castelli 8-15.V.1975; Monteroni (LE) 23.IX.1981; Parabita 16.IX.1986 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 13.VII, 10-11.VIII, 12.X, 16.XI.1986, 19.X e 10.XI.1987, 17-21.V.1988; agro Gallipoli (LE) 14.VIII, 4-12.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; fiume Mercure 8.VI.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Diamante (CS) 25.VIII.1982; Rossano lido 25.III, 20-30.VII.1980; Sersale (CZ) 17-24.VIII.1985; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1982 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (566); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-1975; (1898); (1490); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000;

(1029); (2600); **Toscana:** 1851-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (1490); (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1950; 1976-2005; (70); (1655); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (1490); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (52*); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1753. - ***Spodoptera cilium*** **Guenée, 1852** (= *cycloides* Guenée, 1852; *capicola* Herrich-Schäffer, 1850)

Nuovo dato - **Campania:** Battipaglia (SA): La Lama 20.X.1988 (RTN, PRN).

Romagna: 2001-2005; (3465 bis); **Toscana:** 1976-2000; (3268); **Lazio:** 1976-2005; (3268); **Arcipelago laziale:** 1951-1975; (3268); **Campania:** 1976-2000; (2350); (2496); **Puglia:** 1976-2000; (2275); **Basilicata:** 1976-2000; (2275); **Calabria:** 1976-2005; (3347); (3469); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); (3254); **Sardegna:** 1976-2000; (3268).

1754. - ***Spodoptera littoralis*** **(Boisduval, 1833)**

Nota - La citazione generica per l'**Emilia:** (2350) è un errore di trascrizione, non è presente nella regione.

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora 21.VII.1987, 2 e 5.IX.1991, 14.VIII.1992 (CMC, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 8.IX.1987, 1-22.IX, 20.X.1988 (RTN, PRN). **Sardegna:** Musei (CA) 120 m 23.IX.1974 (HRT, PRN); San Sperate 5.X.1994 (leg. Luciano, PRN); Oristano, larve su Carciofo IX-X.1996 (Ortu in litt.).

Lombardia: 1976-2000; (2090); **Liguria:** 1951-2000; (1803); (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2272); (2806); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Campania:** 1976-2000; (2495); (3169); **Puglia:** 1976-2005; (2350); (3450); **Basilicata:** 2001-2005; (3450); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1951-2005; (1843); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (1975).

1755. - ***Pseudoxestia apfelbecki*** **(Rebel, 1901)**

Marche: 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3156); (3447); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2075); (3298); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (3254).

1756. - ***Chilodes maritima*** **(Tauscher, 1806)**

Nuovo dato - **Toscana:** Ansedonia (GR) 16.VIII.1967 (DBR, PRN).

Trentino: 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1951-2000; (1572); (3241);

Emilia: 1976-2000; (2268); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Toscana:** 1901-1925; 1951-1975; (517); **Lazio:** 1951-2000; (2465); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2465); (2800); **Sicilia:** 1976-2000; (3254).

1757. - ***Athetis gluteosa*** **(Treitschke, 1835)**

Nota - È citata per il **Lazio:** (1085), non rinvenuta nella regione (2141).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (2851 (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 2001-2005; (1388); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1835); (2516); **Marche:** 1951-1975; (2085).

1758. - ***Athetis furvula*** **(Hübner, 1808)** (= *lenta* Treitschke, 1825)

Trentino: 1976-2000; (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (983); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (269); (1781); **Romagna:** 1901-1925; (1010).

1759. - ***Athetis pallustris*** **(Hübner, 1808)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1091); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2325); **Veneto:** 1951-1975; (1734); (1787); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (656); (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2206); (2350).

1760. - ***Proxenus hospes*** **(Freyer, 1831)**

Noctua hospes è descritta su esemplari della **Sicilia** (Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur, 1: 40, Taf. 21, fig. 4) (66*); (2576).

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 19.V.1983, 2-27.VIII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 8.IX.1987, 22.IX, 20.X.1988; Serino (AV) 11 e 25.VIII.1984; Portici (NA): parco della Reggia 23-28.V, 2-15.VI, 20-25.VI, 21.IX.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Bari, Campus Università 10-15.IX.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 2-6.IX.1986 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 3-25.V, 10.IX.1986, 9-28.V.1988 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 21-25.VI.1992, Fossa Bradano 16-20.V.1996 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V, 4.VI, 20.VII.1981 (PRN). **Sardegna:** Musei (CA) 29.IX.1972 (HRT, PRN).

Piemonte: 1976-2005; (2378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2005; (1681); (3300); **Trentino:** 1951-1975; (1681); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** 1951-2000; (1681); (3183); **Emilia:** 1901-2005; (629); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (314); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (3044); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1976-2000; (2538); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2536); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (66*); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3231); **Sardegna:** 1926-2000; (1476); (2587).

1761. - ***Proxenus lepigone*** **(Möschler, 1860)**

Piemonte: 1926-1950; (1445).

1762. - ***Dypterygia scabriuscula*** **(Linnaeus, 1758)** (= *pinastri* Linnaeus, 1761)

Nota - Le citazioni generiche per la **Sicilia** e la **Sardegna**, sono da confermare.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.IV, 27.VI, 14.VII.1976, 27.VII.1986 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 30.VI, 7.VII, 18.VIII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 30.V, 12.VI.1985 (SNN). **Basilicata:** fiume Mercure 8.VI.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1851-1925; (181); (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1975; (1350); (2168); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206); **Sicilia**: (1926-1950); (1340); **Sardegna:** 1901-1925; (841), (886).

1763. - ***Rusina ferruginea*** **(Esper, 1785)** (= *umbratica* Goeze, 1781; *tristis* Retzius, 1783)

Nuovi dati - **Piemonte:** Ceresole (TO) 17.VIII.1981 (CMC, PRN). **Friuli:** Udinese, VII.1987-1992. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR)

9.VI.1981, 7.VI.1982. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 29.VI.1973 (GRL). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 3.VIII.1973; Sellata: La Maddalena 26.VI.1980; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; Rotonda 18.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Casa del Conte 18.VI.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1081); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (2346); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (344); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (1565); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-1975; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

1764. - ***Anthracia ephialtes*** **(Hübner, 1822)**

Lazio: 1851-1900; 1926-2000; (344); (2141); **Sicilia:** 1851-1900; (324); (343); **Sardegna:** 1851-1900; 1976-2000; (331); (2587).

1765. - ***Heterophysa dumetorum*** **(Geyer, 1834)**

Nota - La citazione per le **Marche:** Monte Fiorentino (Osimo) (385) è errata. L'esemplare dell'**Abruzzo**: Arapietra (983) è risultato essere identificato correttamente, pertanto la specie fa parte della fauna italiana (3235).

Abruzzo: 1851-1900; (983).

1766. - ***Mormo maura*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Veneto:** Cison di Valmarino, 1.IX.1963 (DBR, PRN). **Toscana:** Pratovecchio VIII.1983 (GRL). **Puglia:** San Severo (FG) 2.VII.1983 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 11.VII.1984 (GRL); Rionero in Vulture (PZ):Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001; Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR); **Sicilia:** Casteldaccia (PA) 2.VII.2004 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1951-1975; (10); (2795); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060);

Liguria: 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Romagna:** 1851-1900; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1951-2005; (24); (3277); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (817); (3053); **Molise:** 1976-2005; (3222); (3469); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; (70); (1458 bis); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1801-1850; 1976-2005; (70); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2005; (97); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1767. - ***Polyphaenis viridis*** **(de Villers, 1789)** (= *sericata* Esper, 1787 nec Goeze, 1781; *sericina* Esper, 1790)

Phalaena Noctua sericata nel 1787 e *Phalaena Noctua sericina* nel 1790 sono descritte su esemplari dlla **Toscana:** Firenze (9*); (2576).

Nuovi dati - **Lombardia:** Poggio di Carasco (Val Curone, AL) 11.VII.1982 (CMC, PRN). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1996; Castellaneta Marina 1 e 14.VII.1980 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 1 e 14.VII.1980; Terranova 10-15.VIII.1980, 3.VI.1981; fiume Mercure 6.VI.1981; Rotonda 16.VII.1980, 9.VIII.1980, 7.VI.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 29.VI, 16.VII.1995, 4.VII.1996 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (358); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 2001-2005; (377); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2829); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (9*); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1976-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sicilia:** 1851-2000; (505); (3083).

1768. - ***Polyphaenis xanthochloris*** **Boisduval, 1840** (= *alliacea* Germar, 1842)

Polyphaenis xanthochloris è descritta su esemplari della **Sicilia** (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 128) (88). *Mythimna alliacea* è descritta su esemplari della **Sicilia** (35*), (2576).

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 10.VIII.1984;

Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Sicilia:** Giacalone (PA) 16.IX.1995 (GRL).

Lazio: 1951-1975; (2143); **Abruzzo:** 1951-1975; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3156); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (3298); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (88); (3254).

1769. - ***Thalpophila matura*** **(Hufnagel, 1766)** (= *texta* Esper, 1787)

Phalaena texta è descritta su esemplari di **Italia** (9*); (2576).

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 12.VIII.1978 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.IX.1976, 19.IX.1982, 21.IX.1984, 3.IX.1987. **Lazio:** Albano 13.IX.1988. **Abruzzo:** Pescasseroli 14.VIII.1990 (GRL). **Puglia:** Toritto (BA): località Quasano 4.X.1980; Foresta Mercadante (BA) XI.1987; gravina di Laterza (TA) 29.IX.1982. **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Terranova 10-15.VIII.1980, 25.IX.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 7.IX.1985; Cosenza 8.IX.1983; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (812); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (935); **Liguria:** 1976-2000; (2168); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1835); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (9*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2005; (385); (3409); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1926-2005; (1127); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sardegna:** 1901-1925; (781).

1770. - ***Thalpophila vitalba*** **(Freyer, 1834)**

Calabria: 1976-2000; (2931); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (80); (3254).

1771. - ***Trachea atriplicis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 8.IX.1968 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 5 e 8.VII.1983, 26.VII.1985 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 29.III.1984 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (231); (1572); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (410); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2987); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2350); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (144); (1340).

1772. - ***Euplexia lucipara*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 1-12.VIII.1968, 15.V.1969, M.IX.1970 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 22.VI.1977 (GRL). **Basilicata:** Pollino: fiume Mercure 8.VI.1980; Rotonda 7.VI.1980, 25.VIII.1981; San Severino 7.VII.1981, 23.VII.1982. **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII.1985; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII, 14.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (656); (3386); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1538); (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (3254).

1773. - ***Phlogophora meticulosa*** **(Linnaeus, 1758)** (= *lamii* Schadewald, 1992)

Nota - *Phlogophora lamii* Schadewald, 1992, citata per il **Trentino** e la **Liguria:** (2711), è posta in sinonimia (2782 bis).

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 11.X.1968 (GLL, PRN); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 23.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 12.IV.1979. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 16.VI.1974 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 29.III, 13 e 27.IV, 1.XI.1984, Torre Lama 3.VIII.1984; Roccadaspide

(SA) 8.XI.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 21.VIII.1985 (SNN). **Puglia:** Palazzo d'Ascoli Satriano (FG) 4.X.1985; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 28-31.X.1985; Torre a Mare (BA) 28.III.1969; gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992; Grottaglie (TA): gravina di Riggio 12.XI.1989, 22.X.1990; Otranto (LE) 9.IV.1999. **Basilicata:** Metaponto (MT): San Marco 22.IV.1985; Rifreddo (PZ) 20.V.1985; Sellata (PZ): La Maddalena 26.VI.1979; Serra di Calvello: Fosso Bifurno 25.VI.1979; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Piana San Francesco 14.VIII.1980; fiume Mercure 8.VI.1980; San Severino 15.IX.1979. **Calabria:** Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Lorica 8-13.X.1978; Camigliatello 15-25.VI.1978; Pollino: Castrovillari 10.VI.1978 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN). **Sardegna:** Oristano, larve su Carciofo IX-X.1996 (Ortu in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (98); (3411); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1951-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1951-1975; **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1053); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-2000; (70); (2536); **Arcipelago campano:** 1801-1850; 1976-2000; (72); (2511); **Puglia:** 1801-1900; 1951-2000; (72); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (2206); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (114); (2587).

1774. - ***Phlogophora scita*** **(Hübner, 1790)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria** è da confermare.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Formazza (VB), 2800 m, E.VII.1967; Terme di Valdieri, 1400 m, 28.VIII.1966, 6.VIII.1981 (GLL, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (114); (747); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; 2001-2005; (1681); (3411); **Friuli:** 1926-1950; (1214); **Liguria:** (1801-1850); (114).

1775. - ***Hyppa rectilinea*** **(Esper, 1788)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria** è da confermare.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2000; (114); **Lombardia:** 1951-2000; (2658); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-1950; 1976-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Liguria:** (1801-1850); (114).

1776. - ***Auchmis detersa*** **(Esper, 1787)** (= *comma* Denis & Schiffermüller, 1775; *petroriza* Borkhausen, 1792)

Nota - La citazione generica per la **Toscana:** (1943) è la citazione per la **Sicilia:** San Martino (144), ripresa in (1388), (2931), ed altri, sono poco attendibili.

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 4.VII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (2725); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1851-1950; 1976-2000; (392); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

1777. - ***Actinotia polyodon*** **(Clerck, 1759)** (= *perspicillaris* Linnaeus, 1761)

Nota - L'esemplare citato da Ghiliani come *C. perspicillaris* è *A. radiosa* (2603). La citazione generica per la **Toscana** va confermata.

Nuovo dato - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 17.V.1969 (GLL, PRN).

Piemonte: 1751-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (3068); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (2974); **Emilia:** 1976-2000; (2268); **Romagna:** 1976-2005; (2829); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); (24).

1778. - ***Actinotia radiosa*** **(Esper, 1804)**

Phalaena Noctua radiosa è descritta su esemplari della Francia: Alta Savoia: Berg Mole in Faucigny presso Genev (9*), (3079);

Nota - È riportato erroneamente che *Phalaena Noctua radiosa* sarebbe stata descritta su esemplari della **Liguria**: Genova (2576); il luogo tipico è presso Genev, in Savoia (3079).

Nuovi dati - **Piemonte:** Monte Moro (VB) 1700 m 3 e 8.VII.1983 (GRL). **Liguria:** Pigna (IM): Colla Melosa 27.VI.1976 (CMC, PRN). **Lazio:** Monti Simbruini 26.VI.1941 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (1053); (1787); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** 1976-2000; **Marche:** 1951-2000; (2085); (2295); **Lazio:**

1926-2000; (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); **Calabria:** 1976-2000; (2899).

1779. - ***Actinotia hyperici*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Liguria:** Andora 13.VI.1987 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) VI.1963, 24.VII, 23-30.VIII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 16.VII.1979, 7.IV.1980 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 18.VIII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Foresta Mercadante (BA) 28.IV.1989; Bari: Santa Fara 24.IV.1980; Valenzano 12.IX.1983; Mottola (TA): gravina di Petruscio 23.IV.1983, 20.V.1985 (PRN); Grottaglie (TA): gravina di Riggio 18.V.1990 (NRD); agro Gallipoli (LE) 1.V.1979; Gallipoli (LE): Baia Verde 27.IV.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Metaponto (MT): San Marco 8 e 28.IV, 11-19.V.1985; Pollino: Timpone Castellana 9.V.1981, 23.VII.1979; Fiume Mercure 8.VI.1980, 16.V.1983; Rotonda (PZ): Valli 18.VII.1980; San Severino 15.IX.1979; Terranova (PZ) 22.IV, 15.V.1983 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 6-13.VII.1985; Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979; Pollino: Monte Moschereto (CS) 800 m 15.VII.1980; Monte Cerviero (CS): Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN). **Sardegna:** Belvì 30.IV.1975; Gennargentu: S'Arca de Tassoni 28.VII.1981 (HTG, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (626); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (554); (3277); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2725); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1780. - ***Callopistria juventina*** **(Stoll, 1782)** (= *purpureofasciata* Piller & Mitterpacher, 1783; *manicata* de Villers, 1789; *pteridis* Fabricius, 1794)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta A.VIII.1968 (GLL, PRN). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Trecchina (PZ), 320 m, 23.VI.1998 (SCR).

Piemonte: 1751-1925; 2001-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-

2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-1975; (98); (2795); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1951-2000; (1693); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (687); (2346); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2005; (1231); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (99); (2987); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1926-1950; (1476).

1781. - ***Callopistria latreillei*** **(Duponchel, 1827)**

Nuovi dati - **Liguria:** Andora 300 m 16.VI.1987 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.IX.1982, 18.VII.1985; Massa: La Rocca 7.X.1989, 21.VIII.1992 (GRL). **Puglia:** Valenzano 28.IX.1983, 8.XI.1984 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Rotonda 10.IX.1977; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981 (PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 7.X.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 2001-2005; (114 bis); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (390); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (131); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2000; (2272); (3171); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Campania:** 1926-1950; (1183); (1350); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-1975; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (197); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1926-2000; (1260); (2587).

1782. - ***Eucarta amethystina*** **(Hübner, 1803)**

Nota - La segnalazione generica per la **Liguria** probabilmente è dovuta alla presenza nel Nizzardo.

Nuovo dato - **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; (114); (1445); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1851-2000; (161); (2475); **Alto Adige:** 1901-1975; (1038); (1734); **Veneto:** 1801-1900;

1926-2005; (45); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); (218); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (262); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2268); (2829); **Toscana:** 1901-1925; (517).

1783. - ***Eucarta virgo*** **(Treitschke, 1835)** (= *spencei* Boisduval, 1840)

Placodes spencei è descritta su esemplari dell'**Italia boreale** (sic) (88).

Nota - In (2576) è riportata la **Lombardia** come luogo tipico.

Nuovo dato - **Lombardia:** Cittiglio (VA), Val Cuvia 1-5.VI.1967 (GLL, PRN).

Piemonte: 1901-1925; 1951-2005; (736); (3414); **Lombardia:** (1801-1850); 1951-2005; (88); (3300); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1787); **Liguria:** 1951-2000; (1787); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1781); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2346); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3310).

1784. - ***Ipimorpha retusa*** **(Linnaeus, 1761)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (807); (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (358); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Emilia:** 1951-2005; (1781); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2005; (2350); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

1785. - ***Ipimorpha subtusa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovo dato - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (2362); (2591); **Trentino:** 1926-2000; (1089); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (544); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3428); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1951-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347).

1786. - ***Enargia paleacea*** **(Esper, 1788)**

Nota - Le citazioni per la **Liguria**, probabilmente sono dovute alla presenza nel Nizzardo.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (275); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; 2001-2005; (812); (3388);); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (367); (3411); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1851-1900); (218), (2850).

1787. - ***Enargia abluta*** **(Hübner, 1808)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è errata.

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; (114); (736).

1788. - ***Parastichtis suspecta*** **(Hübner, 1817)** (= *iners* Germar 1817)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); **Trentino:** 1976-2000; (2475); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (1943); (3380); **Emilia:** 1976-2005; (2346); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; (554); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3222).

1789. - ***Parastichtis ypsillon*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *fissipuncta* Haworth, 1809)

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**, ma non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovo dato - **Piemonte:** Cesana 25.VII.1985 (GRL).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2475); **Alto Adige:** 1901-1950; (1053); (1572); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (2051); (1787); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 2001-2005; (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (3052); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (3254); **Sardegna:** (1976-2000); (2980).

1790. - ***Mesogona acetosellae*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Abruzzo:** Aragno (AQ) 21.IX.1989 (GRL). **Puglia:** Gioia del Colle 15.IX.1991; Putignano (BA): bosco Petruzzi 18.IX.1996 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (765); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (377); (1781); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516);

Toscana: 1976-2005; (2968); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3156); (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (2350); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254).

1791. - ***Mesogona oxalina*** **(Hübner, 1803)**

Nota – La citazione generica per la Liguria attende conferma. Le citazioni per la **Sicilia:** sono da riferire a *M. acetosellae* (2931).

Nuovo dato - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-1975; (807); (2014); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2325); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1926-1950); (1388); **Emilia:** 1851-1925; (377); (629); **Romagna:** 1951-2000; (2423); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1976-2000; (2465); **Abruzzo:** 1976-2000; (2758); (3324); **Basilicata:** 1976-2005; (2075); (3298).

1792. - ***Dicycla oo*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 15-17.VI.1974, 19.VI.1975, 25-26.VI.1976, 12.IV.1977, 29.IV.1983, 1.VII.1987 (GRL). **Puglia:** Santeramo 21.VI.1998 (PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (81); (1734); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); (2362); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1951-2005; (2168); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; 1951-1975; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (3254).

1793. - ***Cosmia diffinis*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - È citata dubitativamente per la **Liguria:** (218); non è segnalata per la regione. La citazione generica per le "**Romagne**" (314) va confermata per la **Romagna.**

Nuovo dato - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR).

Piemonte: 1801-1850; (1851-1900); (114); (243); **Lombardia:** (1851-1900); (2362); **Trentino:** 1976-2000; (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (358); (1572); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Toscana:** 1951-2000; (2968); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); **Calabria**: 1976-2000; (3469).

1794. - ***Cosmia confinis*** **Herrich-Schäffer, 1849**

Friuli: 1976-2000; (3209).

1795. - ***Cosmia affinis*** **(Linnaeus, 1767)**

Phalaena (Noctua) affinis è descritta su esemplari di **Italia** (Systema Naturae (Ed. 12), 1 (2): 848) (7*); (2609).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 14.VII.1978 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (1787); (2362); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (368); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Liguria:** (? 1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (2516); **Toscana:** (? 1851-1900); 1976-2000; (218); (2968); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2005; (2350).

1796. - ***Cosmia pyralina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata genericamente per la **Basilicata**, non risultano segnalazioni per la regione.

Nuovo dato - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 24.VI.1970 (GLL, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (566); (1943); **Alto Adige:** 1901-1950; (812); (3272); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Emilia:** 1951-2005; (1835); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2516); **Lazio:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (2268); **Basilicata:** (1951-1975); (1943).

1797. - ***Cosmia trapezina*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 19-20.VII.1966 (DBR, PRN). **Campania:** Serino (AV), 600 m, 26.VIII, 8.IX.1984 (RTN, PRN).

Basilicata: Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII, 14.IX.1979. **Sardegna:** Belvì (NU) 2 e 10.VII.1975 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (298); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3419); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3357); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1408); **Puglia:** 1951-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1851-1900; 1926-2000; (301); (2587).

1798. - ***Calamia tridens*** **(Hufnagel, 1766)** (= *virens* Linnaeus, 1767)

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Quart 28.VI.1976 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (1787); (2362); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3402) **Molise:** 1976-2000; (3466); **Campania:** 2001-2005; (3466).

1799. - ***Crypsedra gemmea*** **(Treitschke, 1825)**

Nota - È citata per il **Lazio:** (2209), (2567); non è chiaro su quali elementi si basino tali indicazioni (2931).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (218); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2373); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3411); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410).

1800. - ***Staurophora celsia*** **(Linnaeus, 1758)**

Piemonte: 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; (20); (900); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (2014).

1801. - ***Helotropha leucostigma*** **(Hübner, 1808)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Emilia:** 1976-2000; (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Lazio:** 1976-2000; (2143); (2465); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Sardegna:** 1951-1975; (1975).

1802. - ***Eremobia ochroleuca*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7.VII.1983, Roccadaspide (SA) 28.VI, 15.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Mellitto 4.VI.1979; Valenzano 25-30.VI.1984 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella (Centro Visita) 16-20.VI.1992, Fossa Bradano 16-20.VI.1993; Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Rotonda 23-26.VII.1979, 16-18.VII.1980, 5-7.VII.1981; Rotonda: Valli 16.VII.1980; San Severino 6.VII.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980, 7.VII.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Piemonte: 1801-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (1053); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (2168); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (262); (687); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (514); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (833); (2168); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3254).

1803. - ***Gortyna flavago*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *ochracea* Hübner, 1786)

Nota - Le citazioni di *G. flavago* per la **Puglia:** (2137), (1776) vanno riportate a *G. xanthenes*, in quanto *G. flavago* nel Meridione è presente solo a quote elevate.

Dato inediti - **Marche:** Colle San Ginesio 4.XI.1972 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (268); (2659); **Liguria:** 1951-2000; (1478); (2410); **Emilia:** 1901-2000; (687); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1851-1900; 1951-

2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Basilicata:** 1951-2000; (2137); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1384); **Sardegna:** 1926-1975; (1413); (1976).

1804. - ***Gortyna xanthenes*** **Germar, 1842**

Hydroecia xanthenes è descritta su esemplari della **Sicilia** (Fauna Insectorum Europae, pl. 22) (35*); (2576).

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.XI.1984; Battipaglia (SA): Cioffi 6.IX-20.X.1980; 20 e 30.X.1983, 25.X, 1 e 8.XI.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Bari 20.X.1980; Valenzano 13-18.X, 1-8.XI.1984; gravina di Riggio 12.XI.1989 (PRN); Putignano (BA): Bosco Petruzzi 19-23.X.1985 (TRG, PRN).

Liguria: 1901-1925; 1976-2000; (2648); (3272); **Lazio:** 1901-1925; 1976-2000; (2143); (2822); **Molise:** 1976-2000; (3156); **Campania:** 1951-2000; (1848); (3256); **Puglia:** 1926-2000; (1776); (2924); **Basilicata:** 1901-1925; 1951-1975; (1556); (3272); **Calabria:** 1976-2005; (3347); (3469); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (35*); (3083); **Sardegna:** 1851-2000; (793); (2587).

1805. - ***Gortyna franciscae*** **(Turati, 1913)**

Hydroecia franciscae è descritta su esemplari della **Sardegna**: Aritzo (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3-4): 265) (781) & (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 25 (1): 16) (782).

Nota - *G. franciscae* è considerata ssp. di *G. xanthenes* (1471), (2137); sinonimo di *G. xanthenes* (2561), (2576), (2931); buona specie (745), (1975), (1976), (3272), (3461).

Nuovi dati - **Sardegna:** Musei 26.IX.1972; Belvì 6.X.1975; Tempio Pausania 30.X.1965; Oristano, larve su Carciofo IX-X.1996 (Ortu in litt.).

Sardegna: 1901-2000; (782); (3461).

1806. - ***Gortyna puengeleri*** **(Turati, 1909)** (= *turatii* Costantini, 1913)

Hydroecia puengeleri è descritta su esemplari della **Sicilia:** Ficuzza (Il Naturalista Siciliano, 21: 98, Tav. 1, figg. 17-18) (633). *Hydroecia püngeleri* f. *turatii* è descritta su esemplari dell'**Emilia**: una femmina di Modena e un maschio di Montegibbio (755).

Nota - A questa specie vanno ricondotte le citazioni di *Gortyna moesiaca* H.-S. per l'**Italia** (2931). È citata per la **Sardegna:** (2980); per l'isola sono noti due soli esemplari la cui identità è dubbia e richiede un esame più approfondito (3461).

Lombardia: 1851-1925; 1951-2000; (1004); (3461); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1883); **Veneto:** 1951-2005; (1883); (3380);

Venezia Giulia: 1951-2000; (1883); (3461); **Liguria:** 1926-2000; (1708); (2825); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (755); (2574); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2574); **Umbria:** 2001-2005; (3461); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1901-2000; (529); (2907).

1807. - ***Gortyna borelii*** **Pierret, 1837** (= *leucographa* auct. nec Borkhausen, 1792; *fiori* Berio, 1936; *galassi* Berio, 1963)

Gortyna fiorii e *Gortyna galassii* sono descritte su esemplari della **Liguria:** Nervi (GE) (1708).

Nota - Le femmine di **Liguria:** Pigna (IM) 12.X, 9.X.1910, Recco (GE) X.1981, e di **Emilia,** appartengono a *Gortyna fiorii umbrosa* Warren (3272). *G. fiorii* e *G. galassii* sono sinonimi di *G. borelii lunata* (2137), (2931).

Liguria: 1901-1925; 1951-2000; (983); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (983); (1708); **Basilicata:** 1976-2000; (2987).

1808. - ***Hydraecia micacea*** **(Esper, 1789)**

Nota - Secondo la cartina in (3461) sarebbe diffusa in **Italia settentrionale** e **centrale**, inclusa la **Campania** e la **Puglia settentrionale**. La citazione generica per la **Toscana** va confermata.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3414); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Toscana:** (1926-1950); (1388); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175).

1809. - **(?)** ***Hydraecia ultima*** **Holst, 1965**

Nota - Presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum sono presenti esemplari del **Tirolo meridionale** catturati fra il 1950 ed il 1969 (2973); da confermare.

1810. - ***Hydraecia petasitis*** **Doubleday, 1847**

Nota - In (3461) la **Sicilia** è coperta nella cartina; non si hanno altre segnalazioni per l'isola.

Emilia: 1901-1925; (1004); (3272); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (983); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2465); **Basilicata:** 1976-2000; (2075); (3298); **Sicilia**: (2001-2005); (3461).

1811. - ***Hydraecia osseola*** **(Staudinger, 1882)** (= *hucherardi* Mabille, 1907)

Nota - Nella cartina in (3461) è riportata come diffusa nelle regioni appenniniche e adriatiche dell'**Italia settentrionale** e **centrale**.

Romagna: 1976-2000; (2271); (2829); **Toscana:** 1976-2000; (3044); **Basilicata:** 1976-2000; (2275); (2528); **Sardegna:** 1926-1950; (1303).

1812. - ***Amphipoea fucosa*** **(Freyer, 1830)**

Nota - *A. fucosa* manca in **Romagna**; la citazione in (1885) va riferita ad *A. oculea* (2516). La località corretta del **Piemonte** citata in (3461 bis) è Morano sul Po (nec Pozzolo Formigaro, ec verbis Cabella),

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1951-1975; (1734); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1734); (1787).

1813. - ***Amphipoea oculea* (Linnaeus, 1761)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (147); segnalazione molto dubbia.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 14.VII, A.VIII.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 30.V-18.VI.1970 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1951-1975; (1659); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1951-1975; **Marche:** 1951-1975; (2085); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Campania:** 1901-1925; (1047).

1814. - ***Luperina dumerilii* (Duponchel, 1826)** (= *amenata* Germar, 1842)

Hadena amenata è descritta su esemplari di **Sicilia** (35*), (2576).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.IX.1982, 5-13.X.1989 (GRL). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 3-23.X.1985, 17-19.IX.1996; gravina di Laterza (TA) 27.IX.1982 (ab. uniformis Warren). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 8.IV.1983; Fiume Mercure 6.X.1980; Terranova 24.IX.1981; Cropani 26.IX.1981; Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Camigliatello: Il Cupone 19.IX.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN). **Sardegna:** Oristano, larve su Carciofo IX-X.1996 (Ortu in litt.).

Piemonte: 1901-1925; 1976-2005; (797); (3461 bis); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (777); (935); **Liguria:** 1951-2000; (1693); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (314); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (35*); (3254);

Sardegna: 1901-2000; (781); (3461).

1815. - ***Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *curoi* Berio, 1983)

Luperina curoi è descritta su esemplari dell'**Arcipelago toscano**: Isola di Capraia (olotipo) e Isola del Giglio (2768).

Nota - *L. curoi* è sinonimo di *L. testacea* (3461). Gli esemplari di *L. testacea* della collezione P. Zangheri in (1885) sono da verificare perché molto simili a *L. irritaria* (2516); pertanto le citazioni in (1885) per la **Romagna** e la **Toscana**, molto probabilmente vanno riferite a *L. tiberina.*

Nuovo dato - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana, 13.IX.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (377); (3043); **Romagna:** 1901-1975; 2001-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2000; (554); (3335°); **Arcipelago toscano:** 1926-1950; 1976-2000; (3461); (2768); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2000; (1139); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (343); (3461).

1816. - ***Luperina siegeli* Berio, 1986**

Luperina siegeli è descritta su esemplari della **Sardegna**: San Giovanni in Sinis (Tharros) (Oristano) 0-20 m ("Nuove specie, sottospecie e forme di Noctuidae della **Sardegna:** (Lepidoptera)" Pubblicato dall'Autore, c/o Istituto Grafico S. Basile s.a.s. di G. Basile & C. - Genova: 3) (2428).

Sardegna: 1976-2000; (2428); (3461).

1817. - ***Luperina kruegeri* Turati, 1912**

Luperina (*Apamea*) *kruegeri* è descritta su esemplari della **Sardegna**: Gennargentu, 1400-1800 m (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 24: 305) (745); è ridescritta come *Apamea* (*Luperina*) *kruegeri* (Atti Società italiana di Scienze Naturali, Milano, 51 (1912) (3-4): 265, Tav. A, figg. 14-15 (1913)) (781).

Nota - Le citazioni per il **Piemonte** e la **Liguria:** (1445) sono dubbie (2931).

Sardegna: 1901-2000; (745); (3456).

1818. - **(-)** ***Luperina irritaria* (A. Bang-Haas, 1912)** (= *sohnretheli*

Draudt, 1931)

Nota - *Luperina sohnretheli* e *L. dannehli*, ritenute ssp. di *L. irritaria*, sono sinonimi di *L. tiberina*, endemismo italiano; *Luperina irritaria* è invece sinonimo di *L. dayensis* Oberthür, 1881, di Algeria (3461). Pertanto le citazioni di *L. irritaria* per l'**Italia** vanno riferite a *L. tiberina*.

1819. - ***Luperina tiberina*** **(Sohn-Rethel, 1929)** (= *sohnretheli* Draudt, 1931; *dannehli* Draudt, 1933)

Palluperina tiberina è descritta su esemplari dell'**Arcipelago campano**: Isola di Capri (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", Dresden, 43: 11) (1139). *Palluperina sohn-retheli* è descritta su esemplari dell'**Abruzzo:** Majella e Gran Sasso, 1200 m (1188).

Lombardia: 1951-1975; (1787); (2014); **Trentino:** 1951-1975; (1787); (2014); **Veneto:** 1926-2000; (1787); (3209); **Friuli:** 1976-2000; (3209); **Liguria:** 1976-2000; (2968); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (3456); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1926-2000; (2143); (3456); **Abruzzo:** 1926-2000; (1188); (3305); **Campania:** 1976-2000; (2536); (2987); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1139); (3456); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (3298); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (1232); (3083).

1820. - **(-)** ***Luperina nickerlii*** **(Freyer, 1845)**

Nota - Le citazioni di *L. nickerlii* per **Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata** e quelle di *L. testacea* v. *gueneei* e di *L. nickerlii* per la **Sicilia** vanno riferite a *L. tiberina* (3461). Probabilmente anche le citazioni per **Valle d'Aosta:** (3145), **Piemonte:** (2957), (3461 bis), **Lombardia:** (1787), **Veneto:** (1681) e **Liguria:** (1693) vanno riferite a *L. tiberina* (3461).

1821. - ***Luperina rubella*** **(Duponchel, 1838)**

Nota - La citazione per la **Liguria:** (1388) deriva da una ipotesi di presenza espressa in (218).

Nuovi dati - **Campania:** Serino (AV) 5.X.1984 (RTN, PRN); Cusano Mutri (BN): località Bocca della Selva (Matese), 1400 m, 22.IX.2001 (SCR).

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1693); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (983); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3461); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2005; (2350); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2350); (3461); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2350).

1822. - ***Luperina samnii*** **(Sohn-Rethel, 1929)**

Palluperina samnii è descritta su individui del Sannio (**Abruzzo**) (Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris", Dresden, 43: 12, Taf. 1, figs. 5-8) (1139).

Nota - Specie di dubbia validità, probabilmente da riportare a *L. rubella* (2931); è confermata come specie valida (3461). La **Sicilia** è coperta nella cartina in (3461), ma si tratta di uno sbaglio del disegnatore (Zilli in litt.).

Lazio: 1926-1950; 1976-2000; (2141); (3461); **Abruzzo:** 1926-2005; (1139); (3461); **Molise:** 1976-2000; (3461); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); (3298).

1823. - ***Pseudluperina pozzii*** **(Curò, 1883)** (= *standfussi* Wiskott, 1894)

Luperina pozzii è descritta su esemplari dell'**Emilia**: Lesignana (MO) e Collegara (Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze, 15 (4): 297) (302).

Nota - La citazione generica per il **Piemonte** è dubbia. La citazione per il **Lazio** è da confermare (2141).

Valle d'Aosta: 1901-1925; (827); **Piemonte:** (1926-1950); (1388); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Trentino:** 1901-1925; (533); **Alto Adige:** 1901-1950; (1038); (3461); **Emilia:** 1851-1925; (302); (963); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Lazio:** 1901-1925; (1085).

1824. - ***Fabula zollikoferi*** **(Freyer, 1836)**

Trentino: 1951-1975; (1646); (1653); **Alto Adige:** 1951-1975; (1646); (1787).

1825. - ***Rhizedra lutosa*** **(Hübner, 1803)**

Nuovo dato - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 1-5.X, 21-25.X.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (3378); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (501); (3099); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (3190); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3052); **Abruzzo:** 1976-2000; (2268); **Molise:** 1976-2000; (3349); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2528); **Sicilia:** 1976-2000; (3128); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2587).

1826. - ***Nonagria typhae*** **(Thunberg, 1784)** (= *arundinis* Fabricius, 1787)

Nuovi dati - **Puglia:** Fiume Lato 22.XI.1991; Palagiano 30.X.1991 (NRD); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 16-20.VI.1993 (PRN).

Piemonte: (1801-1850); (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1851-1900; (161); (268); **Liguria:** 1976-2000; (2553); **Emilia:** 1901-2000; (1577); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (3310); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2350); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2249).

1827. - ***Phragmitiphila nexa*** **(Hübner, 1808)** (= *insularis* Turati, 1913)

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 22.IX.1976, 20.IX.1982 (GRL).

Piemonte: 1976-2005; (2957); (3378); **Lombardia:** 2001-2005; (3300); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2166); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2175); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2141); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); **Sardegna:** 1901-1925; (782); (1207).

1828. - **(-)** ***Phragmitiphila insularis*** **(Turati, 1913)**

Nonagria (Phragmatophila) insularis è descritta su esemplari della **Sardegna:** Aritzo (781) & (782).

Nota - *P. insularis* è sinonimo o sottospecie di *P. nexa* (3461); a questa specie vanno riferite le citazioni di *P. insularis* per la **Sardegna**.

1829. - ***Arenostola phragmitidis*** **(Hübner, 1803)** (= *semicana* auct. nec Esper)

Phalaena Noctua semicana è descritta su esemplari del **Piemonte**: Torino (9*); (2576).

Nota - Nello ZSM di Monaco è presente con il numero 1324 una femmina, indicata come *semicana*, che però è un esemplare sciupato di *Aegle vespertalis* Hb. (2609).

Trentino: 1901-1925; (1038); **Alto Adige:** 1901-1925; (812).

1830. - ***Lenisa geminipuncta*** **(Haworth, 1809)** (= *paludicola* Hübner, 1817)

Nota - La citazione generica per il **Veneto** è dubbia. In (3461) la **Sicilia** è coperta nella cartina; da confermare.

Nuovo dato - **Lazio:** Focene 10 m 26.VI.1982 (leg. Prola, PRN).

Piemonte: (1901-1925); 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** (1926-1950); (1388); **Emilia:** 1976-2000; (2268); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2268); (2643); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1976-2000); (3461); **Sardegna:** 1951-1975; (1975); (2041).

1831. - ***Archanara neurica*** **(Hübner, 1808)**

Alto Adige: 1976-2000; (3241); **Emilia:** 1976-2000; (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2390); (2643); **Toscana:** 1976-2000; (2465); **Lazio:** 1976-2000; (2465); (3268); **Calabria:** 1976-2000; (2275); **Sicilia:** 1976-2000; (3128).

1832. - ***Archanara dissoluta*** **(Treitschke, 1825)**

Lombardia: 1976-2000; (2658); **Emilia:** 1976-2000; (2268); **Romagna:** 1976-2000; (2268); (2829); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-1975; (2268); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

1833. - ***Coenobia rufa*** **(Haworth, 1809)**

Nota - L'**Italia nordorientale** è coperta nella cartina: (3461); non risultano altre citazioni per questo settore.

Romagna: 1976-2000; (2390); (2643); **Toscana:** 1976-2000; (2465).

1834. - ***Oria musculosa*** **(Hübner, 1808)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) E.V-M.VI.1970 (DBR, PRN). **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 17-21.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 16-20.VI.1993, Masseria Zagarella 1-5.V, 11-31.VI.1992; Pollino: Rotonda 9-18.VII.1980, 29.VI.1981, 20.VI.1982; fiume Mercure 7.VII.1981, 20.VI.1982 (PRN). **Sardegna:** Musei (CA) 1.VI.1972 (HRT, PRN).

Lombardia: 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Toscana:** 1851-1900; 1951-1975; (206); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (2141); **Puglia:** 1951-2000; (1937); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sicilia:** 1801-1900; 1976-2000; (109); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (2935); **Sardegna:** 1851-1900; 1926-2000; (318); (2587).

1835. - ***Denticullus pygmina*** **(Haworth, 1809)**

Piemonte: 1926-1950; 2001-2005; (1445); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1951-1975; (1787); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (502); (650); **Emilia:** 1901-

1925; 1976-2000; (893); (2268); **Romagna:** 1976-2005; (2268); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3462); **Marche:** 1851-1900; (385); **Lazio:** 1951-2005; (2143); (3268); **Puglia:** 1976-2000; (2800); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (343); (3128); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (1976).

1836. - ***Denticullus mabillei*** **(D. Lucas, 1907)** (= *libyoides* Boursin, 1963)

Sardegna: 1976-2000; (2587); (3461).

1837. - **(?)** ***Photedes fluxa*** **(Hübner, 1809)** (= *junci* Boisduval, 1840)

Nota - È citata per le **Marche:** (385), errata identificazione, probabilmente da riferire a *Denticullus pygmina*. È citata con dubbio per la **Sicilia:** (188) e la **Sardegna:** (2980). Riportata per l'**Italia settentrionale** (2931), (1747); nella cartina (3461) è coperto l'estremo Nordest. Nessun dato di cattura; specie la cui presenza in Italia è da confermare.

1838. - ***Photedes captiuncula*** **(Treitschke, 1825)**

Piemonte: 1901-1925; 1976-2000; (736); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Trentino:** 1851-1925; 1951-1975; (273); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1958); **Veneto:** 1951-1975; (1943); (2051); **Emilia:** 1976-2000; (3043); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144).

1839. - ***Photedes minima*** **(Haworth, 1809)** (= *arcuosa* Haworth, 1809)

Nota - È citata genericamente per la **Toscana**, la **Sicilia** e la **Sardegna**; non si hanno altri dati per queste regioni.

Trentino: 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Toscana:** (1926-1950); (1388); **Sicilia**: (1976-2000); (2931), (3461); **Sardegna**: (1976-2000); (2931), (3461).

1840. - ***Photedes morrisii*** **(Dale, 1837)** (= *bondii* Knaggs, 1861)

Tapinostola sohn-retheli è descritta su esemplari dell' **Abruzzo:** Majella e Gran Sasso, 1200 m (551).

Nota - In **Italia** è presente *P. sohnretheli* e non *P. morrisii* (3110), (3429). *Photedes morrisii sohnretheli* (Püngeler, 1907), stat. rev., comb. n. (3461). In **Italia settentrionale** e **centrale** è presente *P. morrisii* ssp. *sonhretheli*; nella cartina, ma non nel testo, anche in **Italia meridionale** e **Sicilia:** (3461).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 21.VI.1974, 24.VI.1976, 10.VII.1980 (GRL). **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR, Zilli det.).

Veneto: 1976-2005; (3380); **Friuli:** (1976-2000); (3110); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (2447); **Romagna:** 1901-1925; 1976-

2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (554); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1901-2000; (551); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3164); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2447); (2987); **Sicilia:** 1926-1950; (1340).

1841. - **(-)** ***Photedes extrema*** **(Hübner, 1809)**

Nota - È riportata per il **Tirolo meridionale** (569); citazione molto dubbia. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

1842. - ***Capsula sparganii*** **(Esper, 1790)**

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; (114); (736); **Lombardia:** (1851-1900); (218); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); **Veneto:** (1901-1925); (461); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1951-1975; (2051); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (3403); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1951-2000; (2907); (2986); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2249).

1843. - ***Capsula algae*** **(Esper, 1789)** (= *cannae* Ochsenheimer, 1816)

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Emilia:** 1801-1850; (110); **Romagna:** 1976-2000; (2390); (3108); **Toscana:** (1976-2000); (2209); **Marche:** 1976-2000; (2538).

1844. - ***Pabulatrix pabulatricula*** **(Brahm, 1791)**

Nota - Nella cartina in (3461) è coperto anche l'estremo Nordest.

Trentino: 1901-1925; (812); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053).

1845. - ***Apamea remissa*** **(Hübner, 1809)** (= *oscura* Haworth, 1809; *gemina* Hübner, 1813)

Nota - È citata per la **Sardegna:** (2041), (2478); da confermare (3461). Data l'ecologia della specie, l'assenza in Corsica, la somiglianza con numerosi altri nottuidi e numerosi errori di determinazione nella collezione Prota la sua presenza in **Sardegna** è assai dubbia (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (1053); (3241); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1951-2000; (1528); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2143); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

1846. - ***Apamea epomidion*** **(Haworth, 1809)** (= *hepatica* auct.; *characterea* Hübner, 1803)

Nota - La citazione per il **Trentino**: (1338) va riferita solo all'**Alto**

Adige. La citazione generica per la **Sardegna** è da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2211); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3429); **Abruzzo:** (1976-2000); (2447); **Molise:** 1976-2005; (3156); (3447); **Campania:** 1801-1850; (99); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (3298); **Sardegna:** (1926-1950); (1388); (2931).

1847. - ***Apamea aquila* Donzel, 1837** (= *funerea* Heinemann, 1859)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650).

1848. - ***Apamea crenata* (Hufnagel, 1766)** (= *rurea* Fabricius, 1775; *alepecurus* Esper, 1788)

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri: Valle Valletta 1750 m 4.VIII.1981 (CMC, PRN); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Veneto:** Monte Grappa 10.VII.1989; Nevegal (BL) 28.VI.1974 (GRL). **Toscana:** Valle Fagana (LU) 1700 m 10.VIII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3461); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3411); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2166); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2882); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2195).

1849. - ***Apamea anceps* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *sordida* Borkhausen, 1792; *infesta* Treitschke, 1825; *siegeli* Berio, 1985)

Enargia siegeli è descritta su esemplari della Sardegna: San Giovanni in Sinis (2372).

Nota - *E. siegeli* è sinonimo di *A. anceps* (2655), (3461).

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 7.VII.1983. **Abruzzo:** Ovindoli 10.VII.1984 (GRL). **Basilicata:** Pollino: fiume Mercure 8.VI.1980, 16.V.1983; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Terranova 31.V.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto**

Adige: 1851-1925; 1951-1975; (157); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1681); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (2410); **Romagna:** 1901-1925; (1010); **Toscana:** 1976-2000; (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3461); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1901-1925; (488); (2597); **Sardegna:** 1976-2000; (2372); (2587).

1850. - ***Apamea sordens*** **(Hufnagel, 1766)** (= *basilinea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 17.V.1969 (GLL, PRN). **Alto Adige:** Vinschgau, 700 m, 3.VI.1929 (AST, PRN). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 2.VII.1978, 24.VI.1986. **Basilicata:** Lago Sirino 22.VI.1980 (GRL); Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 16.VI.1982; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1926-2000; (1231); (3461); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** (2001-2005); (3461).

1851. - ***Apamea illyria*** **Freyer, 1846**

Nuovo dato - **Toscana:** Valle Fegana (LU) 500 m 20.V.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1214); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3461); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2232).

1852. - ***Apamea unanimis*** **(Hübner, 1813)**

Nota - "Citata da Carrara per Trieste, in base al manoscritto di Vogel, quasi certamente errata perchè non trovata nelle regioni adiacenti"

(935); non è citata in (1060). Le citazioni per l'**Emilia:** (262) e la **Sardegna:** (114) sono dubbie.

Lombardia: 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1976-2000; (2211); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (1053); (1958); **Veneto:** 1951-2005; (1943); (3380).

1853. - ***Apamea scolopacina*** **(Esper, 1788)**

Nuovo dato - **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-1975; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Emilia:** 2001-2005; (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2166); (3462); **Umbria:** 1951-1975; (2143); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2350).

1854. - ***Abromias oblonga*** **(Haworth, 1809)**

Nota - L'esemplare citato da Ghiliani come *Hadena satura* è *A. oblonga* (2603).

Nuovo dato - **Piemonte:** Noasca 1060 m 10.VII.1973 (GRL).

Piemonte: (1801-1900); 1951-1975; (114); (2603); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1053); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (935); (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); (218); **Emilia:** 1801-1850; (110); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141).

1855. - ***Abromias monoglypha*** **(Hufnagel, 1766)** (= *polyodon* Linnaeus, 1761)

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 4.VI, 1.VII.1980. **Veneto:** Dolomiti: Cortina 15.VIII.1958, 16.VIII.1959; San Vito di Cadore 6.IX.1959; Nevegal (BL) 31.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 3.VI.1986 (GRL). **Lazio:** Borgo San Donato (LT) 15.VII.1953, 22.VIII.1963 (DBR, PRN); **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 12.VI.1982. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 6-7.VII.1980; Casa del Conte 18.VI.1982; Piano Ruggio 20.VI.1982; Piana San Francesco 14.VIII.1980, 24.IX.1981; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Pollino: Rotonda 23 e 26.VII.1979, 8.VI, 9.VII, 16.VII.1980, 20.VI.1982; Rotonda: Valli 18.VII.1980; fiume Mercure 8.VI.1980; Cropani 6.VI.1981; Terranova 11.VIII.1980; San Severino 7.VII.1981 (PRN). **Calabria:** Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979; Pollino: Frascineto 25.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (544); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1976-2005; (24); (3321); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1926-2000; (1231); (2141); **Abruzzo:** 1926-2005; (1231); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3461).

1856. - ***Abromias sicula* (Turati, 1909)** (= *indiges* Turati, 1926; *syriaca* auct. nec Osthelder, 1933)

Hadena monoglypha ssp. *sicula* è descritta su esemplari della **Sicilia:** Sciacca della Busambra sopra Ficuzza 1200 m (Il Naturalista Siciliano, 21 (1-8): 89, Tav. 6, figg. 2-3 (nec 3-4)) (622).

Nota - *A. sicula* e *A. syriaca* sono specie distinte, entrambi presenti in **Sicilia**; le citazioni di *A. sicula* per l'**Italia** (Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria) vanno riferite a *A. syriaca* (3461).

Nuovo dato - **Sicilia:** Castelbuono, 10.VI.1995 (Zilli in litt.).

Sicilia: 1901-1950; 1976-2000; (622); (3254).

1857. - ***Abromias syriaca* (Osthelder, 1933)** (= *tallosi* Kovacs & Varga, 1969)

Nuovi dati - **Abruzzo:** San Potito 17.VII.1939 (DBR, PRN). **Sicilia:** Randazzo (CT), 850 m, 23.V.1995 (Pantini & Valle leg.); Buccheri (SR), 870 m, 20.V.1995 (Pantini & Valle leg.) (Zilli in litt.).

Veneto: 1951-1975; (2968); **Lazio:** 1926-1950; (2184); (3461); **Abruzzo:** 1926-1975; 2001-2005; (2184); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Basilicata:** 1951-2000; (2350); (3461); **Calabria:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1976-2000; (3461).

1858. - ***Abromias lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *lithoxylea* Fabricius, 1787)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3461); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-1975; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (2350); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-2005; (751); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3321); **Marche:**

1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3461); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1926-1950; (1476).

1859. - ***Abromias sublustris* (Esper, 1788)** (= *horrida* Dannehl, 1929)

Nuovo dato - **Trentino:** Levico 500 m 26.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3183); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1975; (1024); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Lazio:** 1951-1975; (2141); (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); (2429°).

1860. - ***Abromias arabs* (Oberthür, 1881)** (= *standfussi* Turati, 1907)

Hadena standfussi è descritta su esemplari della **Sicilia:** Busambra, Neviera del Senato; Madonie: Sparviero (553).

Sicilia: 1901-1925; 1976-2000; (503); (3254).

1861. - ***Abromias furva* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valtournanche 18.VIII.1969 (GLL, PRN). **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Lombardia:** Ponte di Legno VII.1968. **Veneto:** Cortina 27.VIII.1962 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: (1801-1850); 1951-2000; (114); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (736); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (273); (3388); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1851-1900; (410); (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3321); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1901-2000; (797); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Sardegna:** 1951-1975; (1976).

1862. - ***Abromias platinea* (Treitschke, 1825)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (531); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (164); (632); **Trentino:** 1976-2000; (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; (1038); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Toscana:** 1976-2000; (2272); (3062); **Romagna:** 1976-2000; (3190); **Marche:** 1976-2000; (2141); (2538); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); (3461); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 2001-2005; (3401);

Sicilia: 1851-1900; 1926-1950; (388); (1340).

1863. - ***Abromias lateritia*** **(Hufnagel, 1766)**

Nota - "La var. *decolor* Stertz è stata descritta su esemplari di Capri (**Arcipelago campano)**" (2576). Stertz in realtà riferisce di aver ricevuto dal sig. Otto Sohn-Rethel di Capri tre esemplari (due maschi e una femmina) da lui catturati in **Abruzzo** a Pescocostanza (*recte* Pescocostanzo) nel luglio 1910 (825).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Brusson 16.VII.1988; Cogne 10.VII.1986; Pré St. Didier 1.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Ferriere di Berrezio 2000 m 25.VII.1963 (GLL, PRN); Ceresole (TO) 1600 m 17.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (146); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (216); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (146); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222).

1864. - ***Abromias maillardi*** **(Geyer, 1834)**

Nuovo dato - **Alto Adige: Schnalstal, 1580 m, VIII.1937 (AST, PRN).**

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1951-2000; (736); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3461); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3461); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1825); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1851-1900; (406); **Marche:** 1951-2000; (2144); (2538); **Abruzzo:** 1951-2005; (2143); (3461).

1865. - ***Abromias zeta*** **(Treitschke, 1825)** (= *clandestina* Boisduval, 1829; *exulis* Lefebvre, 1836)

Nota - La citazione generica per la **Toscana** va confermata.

Nuovi dati - **Piemonte:** Ceresole (TO) 17.VII.1985; Noasca (TO) 10.VII.1973; Val Bognanco (VB) 4.VII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (215); (689); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (131); (3293); **Veneto:** 1976-2000; (3461); **Friuli:** 1926-1950; (1214); (1425); **Toscana:** (1801-1850); (59); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3356).

1866. - ***Abromias rubrirena*** **(Treitschke, 1825)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri: Valle della Valletta 1750 m 4.VIII.1981 (CMC, PRN). **Alto Adige:** Val Gardena: San Cristino

1800 m 8.VIII.1954 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3073); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (3024); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1926-1950; (1214); **Liguria:** 1976-2000; (2410); **Lazio:** 1976-2000; (3461); **Sicilia:** 1951-1975; (2907).

1867. - ***Lateroligia ophiogramma* (Esper, 1794)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2465); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (424); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3099); **Umbria:** 1976-2000; (2465); **Lazio:** 1976-2000; (2465); (2143); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); (2536).

1868. - ***Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758)** (= *didyma* Esper, 1788)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 11.VII.1979; St. Vincent 15.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Frabosa (CN) 3.VII.1983, 21.VII.1985; Val Bognanco (VB) 6.VII.1980 (GRL). **Trentino:** Levico 24.VI.1974 (GRL). **Friuli:** Castelmonte (UD) 600 m 5.VII.1989 (GRL). **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 15.VII.1985 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.X.1964 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 25.VI, 22.VII.1975, 15.VII.1976, 18.VII.1985 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 16.VII.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2462); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-2000; (1024); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (410); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (776); (3324); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1851-1900; 1951-2005; (277); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1869. - ***Mesapamea secalella* Remm, 1983** (=*didyma* auct. nec

Esper, 1788)

Nuovi dati - **Puglia:** Fiume Lato 22.VI.1991 (NRD). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1976-2005; (306); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (306); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2968); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2350); **Basilicata:** 1951-2000; (2350); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2350); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (354); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1901-1925); 1976-2000; (631); (2587).

1870. - **(-) *Mesapamea remmi* Rezbanyai-Reser, 1985**

Nota - "Data l'estrema rarità dei ritrovamenti, alcuni autori (e.g. Fibiger & Hacker, 1991) presumono che si tratti di individui ibridi fra le altre due specie di *Mesapamea* Heinicke, 1959; va tuttavia notato che le caratteristiche degli esemplari non appaiono intermedie" (2931). *M. remmi* è un ibrido *M. secalis* x *M. secalella* (3461). Le segnalazioni di *M. remmi* per l'**Italia** (Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Abruzzo e Lazio) vanno riferite a queste due specie.

1871. - ***Xylomoia stangelmaieri* Mikkola, 1998**

Xylomoia stangelmaieri è descritta su esemplari della **Venezia Giulia** (sic!): Caorle (VE) (Systematic Entomology, 23: 182, figg. 7, 8, gen. fig. 16) (3100).

Nota - La località tipica è nel **Veneto.**

Veneto: 1976-2000; (3100).

1872. - ***Litoligia literosa* (Haworth, 1809)** (= *faroulti* Rothschild, 1914)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 6.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Valdieri 28.VII.1956 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 2.VII.1983, 14.VI.1985; Val Bognanco (VB) 5.VII.1980 (GRL); Val di Susa: Rocciamelone 1000 m 15.VII.1978 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.VII.1973, 29.VI, 22.VII.1975, 12.VII.1977, 29.V.1989 (GRL). **Basilicata:** Nemoli 4.VI.1981; Pollino: Piano Ruggio 23.VII.1976, 18.VII.1977; Belvedere 16 e 22.VII.1980; Timpone Castellana 17.VII.1980 (PRN); Monte Sirino 18.VII.1979; Terranova 10.VI.1982 (GRL). **Calabria:** Sila: Fossiata 24.VII.1979; Pollino:

Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1951-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (3073); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (2795); **Friuli:** 1976-2000; (2968); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1950; (893); (1235); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (517); (3310); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3402); **Molise:** 1976-2000; (2968); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1538); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (247); (3254).

1873. - ***Mesoligia furuncula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *bicoloria* de Villers, 1789)

Nuovi dati - **Liguria:** Conna (SV) 1.IX.1978 (CMC, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.VII.1986 (RTN, PRN)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2005; (1024); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1901-1950; 1976-2005; (518); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (1377); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (388); (3254).

1874. - ***Oligia strigilis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 30.VI, 6.VII.1980; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 2.VII.1983. **Lombardia:** Valtellina: Val Viola 6.VII.1979 (GRL). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 18.VII.1959 (GLL, PRN). **Basilicata:** Monticchio 7.VII.1981; Pollino: Terranova 20.VI.1982 (GRL); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (171); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000;

(114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (3062); (3321); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2225); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2907); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (3461).

1875. - ***Oligia latruncula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 26.V.1987 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 25.VII.1986 (RTN, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 20.VII.1992; Monte Vulture (PZ) 1200 m 10.VI.1982; Monticchio 6.VI, 6.VII.1983; Monte Sirino 18.VII.1979; Pollino: Terranova 16.VI.1982; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 25.V.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3043); **Trentino:** (1901-1925); 1926-2000; (812); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3321); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2005; (2536); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2225); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3083).

1876. - ***Oligia versicolor*** **(Borkhausen, 1792)**

Nuovi dati - **Veneto:** Dolomiti: Cortina 18.VII.1959 (GLL, PRN). **Friuli:** Monte Matajur (UD) 1200-1400 m, 20.VII.1988 (MRN). **Toscana:** Passo della Consuma 20.VI.1974 (GRL). **Basilicata:** Monticchio 26.VI.1983; Pollino: Lago Duglia 18.VII.1982; fiume Mercure 20.VI.1982; Terranova 20.VI.1983; San Severino 7.VI.1981 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1951-1975; 2001-2005; (1779); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1897); (2658); **Trentino:** 1926-1975; (1943); (2014); **Alto Adige:** 1926-2000; (1357); (2325); **Veneto:** 1951-1975; (1897); (2043); **Friuli:** 1976-2000; **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1897); **Romagna:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3465 bis);

Toscana: 1951-2005; (2272); (3428); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (1213); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2005; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1926-2000; (3254); (3272).

1877. - ***Oligia dubia*** **(Heydemann, 1942)**

Nota - La citazione per la **Romagna:** (2412) è molto dubbia (3429). La citazione per l'**Abruzzo:** (1377) è probabilmente errata.

Lombardia: 1976-2000; (3461); **Trentino:** 1951-2000; (2081); (3461); **Veneto:** 1951-2005; (2081); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (2081); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3461).

1878. - ***Oligia fasciuncula*** **(Haworth, 1809)**

Nota - La citazione per il **Lazio:** Monterotondo (Calberla, 1888), (2141), è errata perché in Calberla è citata *Hadena bicoloria* Vill. ab. *furuncula* Hb. che non è questa specie bensì *O. furuncula* Hb.

Liguria: 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1901-1925; (554).

1879. - ***Sesamia cretica*** **Lederer, 1857**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 3.VIII.1961 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 19.V, 17.VIII.1983, Torre Lama 2-27.VIII.1984 (RTN, PRN). **Basilicata:** Pollino: Rotonda 26.VII.1979. **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V, 22.VI.1981; Oriolo 26.VII.1979; Diamante (CS) 25.VIII.1982; Pollino: Monte Moschereto 15.VII.1980 (PRN).

Piemonte: 1926-1950; (1420); **Lombardia:** 1851-1900; (300); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Veneto:** 1926-1950; (1270); (1277); **Friuli:** 1926-1950; (1430); (1457); **Venezia Giulia:** 1926-1975; (1270); (1490); **Emilia:** 1926-1975; (1270); (1478); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1277); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1900; 1926-2005; (421); (3462); **Umbria:** 1926-2000; (1270); (2320); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (3096); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-2000; (1277); (2536); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2000; (1776); (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (1776); (3298); **Calabria:** 1926-2000; (1430); (2168); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (343); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1926-1950); 1951-1975; (1270); (1975).

1880. - ***Sesamia nonagrioides*** **(Lefèbvre, 1827)**

Cossus nonagrioides è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo, Orto botanico (Mémoires de la Société Linneénne de Paris, VI (2): 98, Pl. 5, fig. 3) (48).

Nota - Le citazioni generiche per il **Veneto**, la **Liguria** e la **Romagna**

sono da confermare.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 28.VII.1961 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 16.X.1980, 25.X.1984, Torre Lama 2-27.VIII, 25.X.1984, 8.IX, 20.X.1987, 1.IX-20.X.1988; Roccadaspide (SA) 8.XI.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Valenzano 12.IX.1983; Torre Guaceto 15 e 20.IX.1979 (PRN); Gallipoli (LE): Baia verde 14.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 16-25.IV, 11-15.VI, 7.IX, 1-5.X.1992 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V, 4.VI.1981 (PRN).

Veneto: (1951-1975); (1805); **Liguria:** (1951-1975); (1805); **Emilia:** 1926-1950; (1270); **Romagna:** (1926-1950); (1270); **Toscana:** (1926-1950); 1951-2005; (1270); (3462); **Umbria:** (1926-1950); 1951-2000; (1270); (2141); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** (1951-1975); 1976-2000; (1805); (2878); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-2005; (48); (2986); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

1881. - ***Eremohadena chenopodiphaga*** **(Rambur, 1832)**

Liguria: 1801-1850; 1926-1950; (114); (1316); **Molise:** 1976-2000; (3470); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (573); (3254).

1882. - **(-)** ***Eremohadena halimi*** **(Millière, 1877)**

Nota - Una sola citazione generica per la **Liguria:** (1388), non attendibile. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

1883. - ***Hadula pugnax*** **(Hübner, 1824)** (= *treitschkei* Boisduval, 1827)

Nota - È citata per **Puglia:** (2373), **Basilicata:** (1943) e **Sicilia:** (631); dati dubbi (3081).

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 3.VII.1983 (GRL). **Veneto:** (ssp. italica Berio) Valtellina: San Salvatore 19.VI.1960 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1926-2005; (293); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1681); (1787); **Veneto:** 1926-2000; (1681); (2373); **Liguria:** 1926-2000; (1376); (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (983); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145).

1884. - ***Hadula odontites*** **(Boisduval, 1829)** (= *marmorosa* Borkhausen, 1792, nec Esper, 1788; *microdon* Guenée, 1852; *nana* auct. nec Hufnagel)

Nuovi dati - **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Basilicata:** Pollino: Belvedere 16.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: (1801-1850); 1951-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2005; (218); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (424); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1083); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1751-1800; 1976-2000; (16*); (2373); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3321); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2738); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; (388).

1885. - ***Hadula dianthi* (Tauscher, 1809)** (= *chenopodii* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per la **Toscana:** (2373) è dovuta a errata identificazione, l'esemplare è di *Hadula trifolii* (3081).

Nuovi dati - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 1-5.IV, 9-20.IX, 24.IX.1992, 10-20.VI.1993, Masseria Zagarella (Centro Visita) 21-25.X.1995 (PRN).

Basilicata: 1976-2000; (2168); (3081); **Calabria:** 1976-2000; (2168).

1886. - ***Hadula trifolii* (Hufnagel, 1766)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 11.IX.1968 (GLL, PRN); Poggio di Carasco (Val Curone, AL) 11.VII.1981; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 3.VII.1983 (GRL). **Emilia:** Podenzano 17.VIII.1962 (RBR, PRN). **Marche:** Fano: Torretta 7.IX.1954 (ex coll. Fiori, PRN). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7.VII1983, 27.VIII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 24.VII.1987, 15-22.IX.1988 (RTN, PRN). **Puglia:** San Severo (FG) 3.V.1983; Bari: Santa Fara 1-15.VI.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 11-17.X.1987; gravina di Riggio 12.XI.1989, 1.IV, 18.V.1990, 20.VIII, 29.IX.1991; gravina di Petruscio 23.IV.1983 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Fiume Lato 22.VI.1991; Palagiano 17.VII.1991 (NRD); Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 27.VI.1979, 12.VII.1983; Metaponto: San Marco 7.IV.1985; Monte Vulture (PZ) 27.V.196; Pollino: Cropani 6.VI.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:**

1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1951-2005; (2968); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1926-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2000; (109); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2355); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (144); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1887. - ***Hadula stigmosa*** **(Christoph, 1887)**

Nota - Le citazioni di *H. stigmosa* per la **Sardegna:** (331), (2980), vanno riferite a *H. sodae*.

Nuovo dato - **Lazio:** Sabaudia: Lago di Caprolace 20.V.1979 (PRN).

Veneto: 1951-2000; (1615); (3081); **Emilia:** 1976-2000; (2346); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2000; (2184); (3277); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2373); **Molise:** 1976-2000; (3222); (3349); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2184); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2184); **Calabria:** 2001-2005; (3467).

1888. - ***Hadula sodae*** **(Boisduval, 1829)**

Nota - Le citazioni di *H. sodae* per **Veneto:** (2051) e **Lazio:** (2143) vanno riferite a *H. stigmosa*.

Liguria: 1801-1850; (114); **Sardegna:** 1851-1900; 1951-2000; (331); (2587).

1889. - ***Hadula melanopa*** **(Thunberg, 1791)**

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (2373); (3288); **Trentino:** 1851-1925; 1976-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2325); **Abruzzo:** 1851-1925; (344); (3081).

1890. - ***Anarta myrtilli*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - La citazione generica per l'**Abruzzo** è da confermare.

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 18.VII.1987. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.VII.1975, 14.VII.1976, 18.VII.1978, 16.VII.1979, 27.V.1982, 24.VII.1989 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1926-1975; (1184); (1787); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1081); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2373); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (174); (2373); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (377);

Romagna: 1951-2000; (1885); (2373); **Toscana:** 1751-1800; 1926-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2143); (2373); **Marche:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** (1976-2000); (2209).

1891. - ***Coranarta cordigera*** **(Thunberg, 1788)**

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Gran San Bernardo 1600 m 15.VII.1978 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1951-2000; (1943); (2373); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

1892. - ***Cardepia sociabilis*** **(de Graslin, 1850)**

Nota - È riportata da Herrich-Schäffer come specie italiana (218).

Sicilia: 1976-2005; (2636); (3254); **Sardegna:** 1976-2000; (2428); (2587).

1893. - ***Cardepia affinis*** **Rothschild, 1913**

Sardegna: 1976-2000; (3081).

1894. - ***Cardepia hartigi*** **Parenzan, 1981**

Cardepia hartigi è descritta su esemplari della **Puglia**: Mar Piccolo (TA), palude La Vela e Grecia: Preveza (Entomologica, Bari, 16: 97, figg. 4a-f, 6, 7, 8h, 9b) (2235).

Puglia: 1976-2000; (2235); (2350).

1895. - ***Polia bombycina*** **(Hufnagel, 1766)** (= *advena* Denis & Schiffermüller, 1775; *nitens* Haworth, 1809)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Brusson 16.VII.1981; Cogne 7.VII.1983. **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 6.VII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (268); (2373); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Lazio:** 1951-1975; (2143); **Abruzzo:** 1951-1975; (2143); (2373).

1896. - ***Polia hepatica*** **(Clerck, 1759)** (= *trimaculosa* Esper, 1790; *tincta* Brahm, 1791)

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria:** (114), l'**Emilia:** (1388), la **Toscana:** (1943) e la **Campania:** (2162) sono dubbie, da confermare.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Brusson 14.VII.1988 (GRL). **Piemonte:** Val Formazza (VB) 1800 m 22-25.VII.1967; Terme di Valdieri 1350 m 25-28.VII.1966 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900);

1901-1925; 1976-2000; (164); (2373); **Trentino:** 1926-2000; (1184); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (268); (2373); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (410); (1425).

1897. - ***Polia nebulosa*** **(Hufnagel, 1766)**

Nota - La citazione per la **Sicilia** è da confermare.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta V.1970 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 5.VII.1980 (GRL). **Lombardia:** Val Cuvia: Cittiglio (VA) 1-5.VI.1967 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2373); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1951-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (1787); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (446); (2659); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3429); **Umbria:** 1951-1975; (2968); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2373); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (656); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 2001-2005; (3447); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1901-1925; (632); **Sicilia:** 1851-1900; (144).

1898. - ***Polia serratilinea*** **Treitschke, 1825**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1976-2005; (372); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (218); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1787).

1899. - ***Pachetra sagittigera*** **(Hufnagel, 1766)** (= *leucophaea* Denis & Schiffermüller, 1775; *fulminea* Fabricius, 1777)

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna** non si hanno altri dati per l'isola.

Nuovi dati - **Liguria:** Col di Nava 12.VI.1985 (GRL). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Rotonda 7 e 21.VI.1980, 17.V.1982; Cropani 6.VI.1981; Terranova 10.VI.1982, 15.V.1983. **Calabria:** Sila: Camigliatello 25.VI.1978; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980, 15.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (125); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (262); (1577); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3321); **Umbria:** 1951-1975; (2968); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-

1925; 1951-2000; (890); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (632); (2206); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (343); (3254); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (3288).

1900. - ***Lacanobia w-latinum*** **(Hufnagel, 1766)** (= *genistae* Borkhausen, 1792)

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 19.VI.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 2.VII.1973, 6.V.1975, 29.V, 5.VI.1982, 30.V.1987, 3.VI.1988. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 16.VI.1974 (GRL). **Lazio:** Roviano 22.VI.1938; Anticoli Corrado 28.VI.1939 (DBR, PRN); Accumoli 7.VI.1981 (GRL). **Abruzzo:** Pescara 1.VI.1952 (leg. Fiori, PRN); Gran Sasso 24.VI.1980, 6.VI.1981 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Rotonda, Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (108); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3428); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (2206); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3254).

1901. - ***Lacanobia thalassina*** **(Hufnagel, 1766)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 20.VI.1977 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1064); (3293); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1850; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (1060); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3321); **Lazio:** 1851-1900; 1951-1975; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-1975; (2141).

1902. - ***Lacanobia contigua*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta VI, 1-12.VIII.1968, 11-18.V.1969 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 2-3.VII.1983 (GRL).

Lombardia: Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m 1.VI.1967; Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN); Valtellina: Val Viola 7.VII.1989. **Veneto:** Nevegal (BL) 27.VI.1974 (GRL). **Basilicata:** (ssp. griseomontana Htg.) Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (3068); **Friuli:** 1976-2000; (2974); (3197); **Liguria:** 1926-2000; (1445); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2373); **Toscana:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Basilicata:** 1951-2000; (1905); (2168); **Calabria:** 1951-2000; (1905); (2373).

1903. - ***Lacanobia suasa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *dissimilis* Knoch, 1781; *leucographa* Esper, 1786)

Nota - La citazione generica per la **Basilicata** va confermata.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 11.VII.1979. **Piemonte:** Moncalieri 20.VIII.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 26.VI.1983 (GRL). **Marche:** Fano: Torretta 3.IX.1954 (ex coll. Fiori, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Basilicata:** (1951-1975); (1943).

1904. - ***Lacanobia oleracea*** **(Linnaeus, 1758)** (= *spinaciae* Borkhausen, 1792)

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 27.VIII.1968, 10.VII.1970. **Trentino:** Mattarello VII.1928. **Veneto:** Padova 11.IX.1964 (GLL, PRN). **Liguria:** Capo Mele (SV) ex l. 24.VI.1970 (CMC, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 15.VII.1962, 13.VIII.1963 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 25.VI.1976, 6.VI.1985, 9.VI.1988 (GRL). **Lazio:** Oriolo 29.IX.1984 (GRL); Roma 2 e 5.X.1959 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7.VII.1983, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 15 e 22.IX.1988, Eboli 4.V.1983, Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986, Serino (AV) 22.IX, 13.X.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Fonterosa (FG) 5.IX.1992; gravina di Castellaneta 26.VI.1980;

Gallipoli (LE): Baia Verde 27.IV-29.V.1986, 17.V.1987, 26.IV, 9-28.V.1988 (PRN); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Scanzano Ionico 12.IV.1983; Pollino: Rotonda 23.VII, 14.IX.1979, 16.VII.1980, 8.VII, 23.IX.1981, 13.V.1982; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; San Severino 15.IX.1979, 7.VII, 26.IX.1981; fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980, 20.VI.1982. **Calabria:** Torrente Coserie 8.V, 4.VI.1981; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1801-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1851-1900; 1926-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1925; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1951-2000; (1879); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

1905. - ***Lacanobia splendens*** **(Hübner, 1808)**

Nuovo dato - **Puglia:** Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR).

Piemonte: 1976-2005; (2957); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-1925; (1064); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Puglia:** 1976-2000; (2636).

1906. - ***Lacanobia aliena*** **(Hübner, 1809)**

Nota - Le citazioni per la **Romagna** vanno riferite a *L. suasa* (2516).

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 6 e 15.VII.1978 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2373); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2767); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2141).

1907. - ***Lacanobia blenna*** **(Hübner, 1824)** (= *peregrina* Treitschke, 1825)

Nota - È citata per l'**Alto Adige:** Gries, Mendel, probabilmente esemplari immigrati (1053), e per la **Liguria**, dato da confermare.

Nuovi dati - **Puglia:** Foce Candelaro (FG) 1.VII.1980; Margherita di Savoia 20.IX.1992 (PRN); Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR).

Veneto: 1851-1900; 1951-1975; (268); (3288); **Liguria:** 1801-1850; (114); **Emilia:** 1976-2000; (2346); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3465 bis); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Molise:** 1976-2000; (3349); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** (1801-1850); 1976-2000; (75); (3128); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (50); (2587).

1908. - ***Melanchra persicariae*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - È riportata genericamente per la **Sardegna**, non si hanno altre segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 14.VII, A-M.VIII.1968 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 4.VII.1983, 19.VII.1985; Val Bognanco (VB) 20.VI.1977. **Trentino:** Levico 26.VI.1974 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR), 24.X.1965 (DBR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2373); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2373); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (1004); (3043); **Romagna:** 1976-2005; (2423); (3429); **Toscana:** 1951-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2005; (890); (3435); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2168); **Basilicata:** 2001-2005; (3467); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sardegna:** (1976-2000); (2931), (3288).

1909. - ***Ceramica pisi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per la **Toscana:** Passo dei Mandrioli (AR) (2373); gli esemplari della collezione Fiori sono etichettati: Fiumalbo, località Mandriole (MO) (**Emilia**) e non Passo dei Mandrioli (AR) (3429). La citatazione per la **Sicilia:** (1665); è probabile errata identificazione.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 550 m 11.VII.1979 (GRL). **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2373); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2000; (10); (2373); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2000; (262); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2166); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (19); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2373); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141).

1910. - ***Papestra biren*** **(Goeze, 1781)** (= *glauca* Hübner, 1809)

Nota - La citazione per la **Sardegna:** (2373) è probabilmente dovuta a errata identificazione (2931). La citazione generica per la **Liguria** va confermata.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Cogne 11.VII.1988. **Piemonte:** Valdieri 13.VI.1985 (GRL); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Lombardia:** Valtellina: Val Viola 7.VII.1979; Vione 1200 m 4.VII.1979 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (2362); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (239); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1943); (2373); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Liguria:** (1976-2000); (2209); **Toscana:** 1976-2000; (3190).

1911. - ***Hada plebeja*** **(Linnaeus, 1761)** (= *nana* Hufnagel, 1766; *dentina* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per la **Sardegna:** (1260), (1476); non presente in **Sardegna:** (3288).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Cogne 12.VI, 11.VII.1988; Pré St. Didier 6.VII.1976; Quart 11.VII.1979. **Lombardia:** Valtellina: Val Viola 7.VII.1979. **Veneto:** Dolomiti: Cortina 9.VII.1959, 18-24.VII.1960; Sappada 8.VII.1979 (GRL). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 3 e 21.VI.1982; Belvedere 16.VI.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (1120); (2769); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (161); (2373); **Friuli:** 1851-1975; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1901-1925; (589); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1976-2005; (24); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2968); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2738); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sardegna:** 1926-1950; (1260); (1476).

1912. - ***Hyssia cavernosa*** **(Eversmann, 1842)** (= *gozmanyi* Kovacs, 1968)

Piemonte: 1901-1950; 1976-2000; (736); (2373).

1913. - ***Mamestra brassicae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 21.VI.1968 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 4 e 10.VII.1980 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Veneto:** Teolo (PD) 13.VII.1973 (GRL). **Liguria:** Caprieto di Vobbia (GE) 3.IX.1977 (BER, PRN). **Romagna:** Ravenna 14.V, 2.IX.1959; Forlì 8.IX.1963, 17.VIII.1964 (DBR, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.IV.1976, 10.VI.1981 (GRL). **Lazio:**

Roma 13.IX.1959 (DBR, PRN). **Campania:** Portici (NA): parco della Reggia 6.VI, 16.VII, 21.IX.1983 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1588); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (890); (3268); **Abruzzo:** 1901-2000; (1139); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-2000; (99); (2799); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1139); **Puglia:** 1926-2000; (1776); (2987); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (97); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1975; (114); (1975).

1914. - ***Sideridis lampra*** **(Schawerda, 1913)** (= *anapheles* Nye, 1975; *evidens* Hübner, 1808)

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Rocciamelone 15.VII.1978 (CMC, PRN). **Lazio:** Monti Reatini: il Bracciaro 1700 m 2.VII.1990 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3378); **Lombardia:** 1901-2000; (734); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2000; (1681); (2373); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Liguria:** (1951-1975); (1943); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2373); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2968).

1915. - ***Sideridis turbida*** **(Esper, 1790)** (= *albicolon* Hübner, 1813)

Nota - Rinvenuta in **Campania**, probabilmente giunta accidentalmente (1161). La citazione generica per la **Basilicata** è da confermare.

Valle d'Aosta: (1801-1850); 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3461 bis); **Lombardia:** (? 1850-1900); 1951-1975; (218); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Campania:** 1926-1950; (1161); **Basilicata:** (1976-2000); (2209); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (2636); (3254).

1916. - ***Sideridis rivularis*** **(Fabricius, 1775)** (= *cucubali* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 11.VII.1979 (GRL). **Piemonte:** Miasino (NO) 470 m 12.V, 14 e 31.VII, 1-12.VIII.1968, 17.V.1969 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850);

1901-1925; 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (260); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2373); **Liguria:** 1801-1850; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (19); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3044); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3053); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** 1976-2000; (2373); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1976-2000; (781); (2373).

1917. - ***Sideridis reticulata*** **(Goeze, 1781)** (= *calcatrippae* Vieweg, 1790; *saponariae* Borkhausen, 1792)

Nota - È citata per la **Toscana:** Passo dei Mandrioli (AR) (2373); gli esemplari della collezione Fiori sono etichettati: Fiumalbo, località Mandriole (MO) (**Emilia**) e non Passo dei Mandrioli (AR) (3429).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Cogne 10.VII.1986; St. Vincent 6.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Lombardia:** Valtellina: Val Viola 7 e 9.VII.1979. **Alto Adige:** Vinschgau, 1100 m, 1.VI.1930 (AST, PRN). **Veneto:** Monte Grappa 10.VII.1989. **Marche:** Monti Sibillini: Monte Prata 8.VII.1989 (GRL).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (2725); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (2362); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (410); (2373); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1950; 1976-2000; (589); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2373); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2968); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3461); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2350).

1918. - ***Sideridis kitti*** **(Schawerda, 1914)**

Nuovo dato - **Alto Adige:** Naturns, 31.VII.1965 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Trentino:** 1951-2000; (2211); (2373); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1024); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1943).

1919. - **(-)** ***Saragossa implexa*** **(Hübner, 1809)**

Nota - È riportata come presente in **Italia:** (3041); non si hanno altre citazioni. Le segnalazioni di *S. implexa* per la **Sicilia:** (75), (88), vanno riferite a *Mithymna viscosa* (701).

1920. - ***Conisania poelli*** **(Stertz, 1915)** (= *ostrogovichi* Draudt, 1933)

Conisania (Mamestra) leineri var. *pölli* è descritta su esemplari dell'**Alto Adige**: Vintschgau, Naturns (Deutsche Entomologische Zeitschrift, "Iris", 29: 127) (825).

Nota - "Specie di dubbia validità, probabilmente riconducibile a *C. leineri* (Freyer, 1836)" (2931). Zilli (in litt.) conferma la validità della sua distinzione da *C. leineri.*

Valle d'Aosta: (1976-2000); (3288); **Alto Adige:** 1901-2000; (825); (3288).

1921. - ***Conisania renati*** **(Oberthür, 1890)**

Piemonte: 1926-1950; (3288); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (2636); (3183).

1922. - ***Conisania luteago*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 17.V.1969. **Lombardia:** Cittiglio (VA): Val Cuvia 400 m A.V-E.VI.1969 (GLL, PRN). **Friuli:** Povoletto (UD) 29.VI.1987 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 10.VI.1970 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 1.VII.1987. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 24.VI.1983. **Lazio:** Accumoli 7.VI.1981. **Abruzzo:** Ovindoli 10.VII.1984 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 3.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 24.VII.1987; Portici 21-28.V, 2-20.VI.1983; Roccadaspide (SA) 11.IV, 22.VI.1986; Serino (AV) 30.VI, 7 e 19.VII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 12 e 29.VI, 6-8.VII.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992; gravina di Ginosa 15.VI.1987; gravina di Riggio 10.IV.1990; gravina di Petruscio 30.IV.1983, 20.V.1985 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 26.IV, 9.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 13.IV-11.V.1983; Campomaggiore scalo 30.V.1976; Pollino: Timpone Castellana 9.V.1981; Casa del Conte 18.VI.1982; fiume Mercure 26.V.1983; Rotonda 8.VI.1980; Cropani 6.VI.1981 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (734); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (269); (3301); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3465 bis); **Toscana:** 1951-2005; (2272); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3138); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3461); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:**

1976-2005; (2536); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2969); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2969); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (2740).

1923. - ***Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)** (= *serena* Denis & Schiffermüller, 1775; *placida* Esper, 1791; *par* Donovan, 1801)

Phalaena Noctua placida è descritta su esemplari di Germania e **Italia** (9*); (3079).

Nota - La citazionie di *H. bicolorata* ssp. *weissi* Drdt. per l'**Arcipelago toscano** (2768), va riferita a *H. weissi*.

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 22.VII.1975 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 15.IV.1963, 20.V-18.VI.1970, 16-31.IV.1965, 31.IV.1967, 14.VIII.1960 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 20.VII.1975, 18.IV.1976, 9.VI.1982 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 21-28.VII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 30.V, 10.VI.1985 (SNN). **Puglia:** Gravina in Puglia, Bosco di Pulicchie 28.V.1980; gravina di Petruscio 23.IV.1983, 31.V.1991, 11.IV.1992; Castellaneta Marina 14.VII.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 3.V.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 16-20.VI.1993; Metaponto: San Marco 13-28.IV, 11.V.1985; Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Rotonda 16.VIII.1980, 23.VII.1974, 15.IX.1980, 8.V.1981, 8.VI.1986; San Severino 7.VII.1981; Cropani 6.VI.1981 (PRN). **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980; foce Torrente Coserie 8.V.1981; Pollino: Civita 19.VII.1981 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (2648); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (517); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); (2536); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2232); (2373); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (144); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

1924. - ***Hecatera corsica*** **(Rambur, 1832)**

Nota - Le citazioni di *H. corsica* ssp. *weissi* Drdt. per **Toscana, Puglia, Basilicata** e **Sicilia** e di *H. corsica* per la **Sicilia** vanno riferite a *H. weissi* (3288).

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2768); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1925. - ***Hecatera weissi*** **(Draudt, 1934)**

Liguria: 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2272); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1951-1975; (2987); **Sicilia:** (1851-1900); 1951-2000; (343); (3254).

1926. - ***Hecatera dysodea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *spinaciae* Vieweg, 1789; *chrysozona* Borkhausen, 1792)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28.V.1985, 29.V.1990. **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 15.VI.1974 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** gravina di Petruscio 23.IV.1983. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Cropani 6.VI.1981; Terranova 10-15.VIII.1980 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2005; (406); (3277); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2725); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3461); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); **Puglia:** 1951-2000; (1658); (2575); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206); (3469); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (2587).

1927. - ***Hecatera cappa*** **(Hübner, 1809)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS) Fosso Cucolo 550 m 2.VIII.1996 (SCL).

Piemonte: 1976-2000; (2373); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (1004); (1577); **Romagna:**

1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3310); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2373); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2429°); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** (1851-1900); 1926-1950; (147); (1340); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1928. - ***Enterpia laudeti*** **(Boisduval, 1840)**

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (797); (2769); **Piemonte:** 1926-1950; 1976-2000; (1388); (2969); **Liguria:** 1976-2000; (2825); (3183); **Toscana:** 1901-1925; (517); (520).

1929. - ***Hadena bicruris*** **(Hufnagel, 1766)** (= *capsincoloides* Standfuss, 1893)

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri (CN) 13.VI.1985 (GRL). **Campania:** Portici (NA): parco della Reggia 6.VII.1983 (RTN, PRN). **Puglia:** Bari: Campus Università 10-15.IX.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 25.IV.1985. **Basilicata:** Oasi San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 250 m 21-25.IV.1992. **Calabria:** Camigliatello: Il Cupone 19.IX.1985 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2005; (372); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (2969); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (2648); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1385); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2373); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3429); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3275); (3322); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2969); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1930. - ***Hadena capsincola*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Veneto: 1851-1900; (446); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935).

1931. - ***Hadena magnolii*** **(Boisduval, 1829)**

Nuovi dati - **Liguria:** Conna (SV) 300 m 29.V.1982 (CMC, PRN). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 29.VI.1986 (GRL). **Puglia:** Mottola (TA) 9.V.1995. **Basilicata:** Metaponto (MT): San Marco 28.IV.1985; Pollino: sorgente Acquafredda 19.VI.1981; Casa del Conte 18.VI.1982; Rotonda (PZ) 10.VI.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** 1926-2000; (1445); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1255); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (88); (3254).

1932. - ***Hadena compta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 11.VII.1979; Pré St. Didier 12.VII.1976. **Piemonte:** Frabosa (CN) 21.VII.1985; Val Bognanco (VB) 20.VI.1977 (GRL); Val di Susa: Rocciamelone 15.VII.1978 (CMC, PRN). **Friuli:** Castelmonte (UD) 600 m 5.VII.1989 (GRL). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Lago Duglia 22.VII.1982; Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 17.VII.1980 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2969); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (553); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-1975; (218); (1976).

1933. - ***Hadena confusa*** **(Hufnagel, 1766)** (= *conspersa* Denis & Schiffermüller, 1775; *nana* Rottemburg, 1776)

Nuovi dati - **Piemonte:** Ceresole (TO) 17.VII.1985; Alpi Marittime: Frabosa (CN) 15.VI.1985. **Veneto:** Monte Grappa 9.VII.1989 (GRL); Dolomiti: Cortina 9.VII.1959 (GLL, PRN). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992; gravina di Riggio 10 e 20.IV.1990; gravina di Petruscio 23.IV.1983. **Basilicata:** Pollino: Rotonda 19.V.1979, 17.V.1982. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 9.VII.1980.

Sardegna: Musei (CA) 10.V.1974 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (164); (3073); **Trentino:** (1851-1900); 1901-2000; (273); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** (1851-1900); 1926-2000; (273); (3068); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; (174); (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (687); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2206); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587).

1934. - ***Hadena adriana* (Schawerda, 1912)** (= *armeriae* sensu auct. nec Guenée, 1852)

Nota - È citata per la **Sicilia:** (2373), (3288), ma gli esemplari determinati da Berio come *H. armeriae* in realtà sono *H. compta* f. *galactina* (2931).

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 7.V.1976, 28.IV.1992 (NRD). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano: Fossa Bradano 3.V (1f), 18.V.1993 (1m) (PRN).

Liguria: 1901-1925; 1951-1975; (2969); (3288); **Abruzzo:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2295); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2075).

1935. - ***Hadena guenéei* (Staudinger, 1901)**

Umbria: 1951-1975; (2141); (2373); **Lazio:** 1926-1975; (2141); (2969); **Abruzzo:** 1926-1950; (2373); (2969); **Puglia:** 1976-2000; (2373).

1936. - ***Hadena albimacula* (Borkhausen, 1792)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Ceresole (TO) 1600 m 17.VII.1985 (GRL); Val di Susa: Rocciamelone 15.VII.1979 (CMC, PRN). **Toscana.** San Paolo (AR) 4.VI.1988 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 6.VI, 17.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1951-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (589); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (514); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2005; (1684); (3419); **Abruzzo:** 1951-

2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** (1926-1950); 1976-2000; (1340); (3254); **Sardegna:** 1901-1950; 1976-2000; (781); (2373).

1937. - ***Hadena vulcanica* (Turati, 1907)**

Dianthoecia vulcanica è descritta su esemplari della **Sicilia**: Monte Etna, Serra Pizzuta (Nicolosi) (Il Naturalista Siciliano, 20 (1-3): 24, Tav. VI, fig. 6) (553).

Nota - A questa specie vanno ricondotte le citazioni per la **Sicilia** di *Hadena melanochroa* (1340) e quella, con riserva, di *H. clara* in (1623), (2931).

Sicilia: 1901-1950; 1976-2000; (553); (3254).

1938. - ***Hadena luteocincta* (Rambur, 1834)** (= *kruegeri* Turati, 1907; *dubia* Turati, 1911)

Dianthoecia kruegeri è descritta su esemplari della **Sicilia:** Busambra: Neviera del Senato, 1400 m (553). *Harmodia dubia* è descritta su esemplari del **Lazio:** Monte Autore, 1200 m e della **Sardegna**: Monte Gennargentu, 1000 m (708).

Nota - È citata dubitativamente per la Liguria occidentale (218).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Trentino:** 1926-2000; (1734); (3288); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (891); (2969); **Veneto:** 1951-2000; (1734); (2969); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1901-1950; (708); (2969); **Abruzzo:** (1851-1900); 1926-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Campania:** 1901-1950; (1047); (2969); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2350); **Sicilia:** 1901-1925; (553); **Sardegna:** 1901-2000; (708); (2969).

1939. - ***Hadena filograna* (Esper, 1788)** (= *filigrama* Esper, 1796)

Nuovo dato - **Basilicata:** Lago Sirino 800 m 5.VI.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2969); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1926-2000; (1445); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (629); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2185); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3321); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2373); **Calabria:** 1976-2000;

(2350); (2373); **Sicilia:** (1926-1950); 1976-2000; (1340); (3254).

1940. - ***Hadena caesia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata per la **Toscana:** Passo dei Mandrioli (AR) (2373); gli esemplari della collezione Fiori sono etichettati: Fiumalbo, località Mandriole (MO) (**Emilia**) e non Passo dei Mandrioli (AR) (3429). Le citazioni di *H. caesia* per la **Sicilia** sono da riferire a *H. vulcanica* (3288).

Nuovi dati - **Piemonte:** Sestriere (TO) 28.VI.1983 (PRN). **Veneto:** Dolomiti: Cortina d'Ampezzo (BL) 11.VII.1959, 12.IX.1957; Monte Baldo: Bocca di Navene (VR), 1600 m, 10.VI.1969, Noveza (VR) M.V.1966 (GLL, PRN). **Lazio:** Monti Reatini: il Brecciaro 1700 m 2.VII.1990 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 20.VI.1982; Belvedere 16.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 19.VI.1982; Lago Duglia 18.VI.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-2000; (2725); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2005; (146); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (244); (2969); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1950; (544); (2373); **Toscana:** 1951-2000; (2272); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2738); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168).

1941. - ***Hadena clara*** **(Staudinger, 1901)**

Nota - La citazione di *H. clara* per la **Sicilia:** (2980) va probabilmente riferita a *H. vulcanica*.

Nuovo dato - **Piemonte:** Valdieri 13.VI.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1623); (3145); **Piemonte:** 1926-1950; 1976-2000; (1623); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); **Trentino:** 1976-2000; (2373); **Alto Adige:** 1976-2000; (2373); **Veneto:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183).

1942. - ***Hadena perplexa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *lepida* Esper, 1790 nec Cramer, 1777; *carpophaga* Borkhausen, 1792; *nisus* Herrich-Schäffer, 1845)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 7.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 30.V-18.VI.1966 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 5.VI.1982, 28.V.1985 (GRL). **Abruzzo:** Pescara 27.VI.1951, 1.V.1952 (ex coll. Fiori, PRN). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 30.V, 12.VI.1985 (SNN). **Puglia:** Ruvo di Puglia 2.V.1982; Valenzano 1 e 8.IX.1984 (1m); Mola (BA) 30.VI.1980; Gravina in Puglia, Bosco di Pulicchie 28.V.1980, 1.V.1988; gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992; gravina di

Petruscio 23 e 30.IV.1983; gravina di Ginosa 5 e 20.V.1984; Taranto: Mar Piccolo 26.VI.1979. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 21-25.IV.1992, 19 e 25.V.1993; Metaponto: San Marco 7-28.IV.1985; Pollino: Lago Duglia 18.VI.1982; sorgente Acquafredda 3.VII.1981; Rotonda 25.VIII.1981. **Calabria:** foce Torrente Coserie 8.V.1981; Pollino: Vallone Colloreto 6.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-2005; (687); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1951-2005; (314); (3465bis); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1207); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2729); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (35*); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1943. - ***Hadena irregularis*** **(Hufnagel, 1766)**

Nota - Le citazioni per il **Lazio** e l'**Abruzzo** sono basate su materiale di dubbia provenienza (2931).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 11.VII.1979; St. Vincent 8 e 13.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Val di Susa: Rocciamelone 1000 m 15.VII.1978 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; (2362); (2719); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3288); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; (110); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2829); **Lazio:** 1901-1925; (2719); **Abruzzo:** 1901-1925; (2719).

1944. - ***Hadena syriaca*** **(Osthelder, 1933)**

Lazio: 1851-1900; (2719); (3288); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (2312); (3083).

1945. - ***Hadena silenes*** **(Hübner, 1822)** (= *calcescens* Dannehl, 1929)

Nota - È citata dubitativamente per la **Liguria:** (1388). La citazione per la **Campania:** (2350) va riferita a *H. perplexa*. Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite a *H. sancta* (= *protai*).

Nuovi dati - **Lazio:** Lido di Roma 24.IV.1963 (DBR, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 16-20.VI.1993; Metaponto: San Marco 6-8.IV.1985; Monte Vulture (PZ) 1000 m 30.IV.1983. **Calabria:** Crotone 11.IV.1988; Pollino: Civita 29.V.1975 (PRN).

Piemonte: 1951-1975; 2001-2005; (2968); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (260); **Toscana:** 1976-2000; (3171); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (2127); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2350); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2127); (2987); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (357); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1901-1925; (2312).

1946. - ***Hadena sancta* (Staudinger, 1859)**

Hadena protai è descritta su esemplari della **Sardegna**: Calasetta (olotipo), Santa Margherita Pula, Monte Limbara, Tempio, Costiadas (2127).

Nota - *H. sancta* è presente in **Sardegna** con la ssp. *protai* Berio, 1977, mentre la ssp. *trisagittata* (Rotschild, 1914) è presente a Malta e in Africa settentrionale. Le citazioni di *H. silenes* f. *sancta* e *H. silenes* ssp. *trisagittata* per la **Sicilia** sono da riferire a *H. silenes*.

Arcipelago toscano: 1976-2000; (3322); **Sardegna:** 1951-2000; (2127); (2587).

1947. - ***Hadena tephroleuca* (Boisduval, 1833)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Terme di Valdieri 28.VII.1966 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (188); (3378); **Lombardia:** 1901-1950; 1976-2000; (689); (2373); **Alto Adige:** 1926-1950; 1976-2000; (1184); (2373).

1948. - ***Lasionycta proxima* (Hübner, 1809)** (= *noguera* De Laever, 1976)

Nota - La **Sicilia** è coperta nella cartina in (3288), ma non è citata nel testo; la presenza nell'isola è da confermare.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Cogne 10.VII.1986; Pré St. Didier 7.VII.1976. **Piemonte:** Ceresole (TO) 1600 m 17.VII.1985 (GRL); Valdieri: Valle della Valletta 1750 m 4.VIII.1981 (CMC, PRN). **Lombardia:** Ponte di Legno VII.1964. **Veneto:** Cortina 4.IX.1956, 27.VIII.1959; Dolomiti: Falcade 17.VIII.1960 (GLL, PRN); Valtellina: Sant'Antonio di Valfurva 10.IX.1933 (BER, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (146); (3388); **Veneto:** 1926-2000; (1787); (2373); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114);

(3183); **Lazio:** 1976-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2429°); **Basilicata:** 1976-2000; (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2373).

1949. - ***Lasionycta calberlai*** **(Staudinger, 1883)**

Hadena calberlai è descritta su esemplari del Lazio: Campagna romana, Monterotondo (Entomologische Zeitung, Stettin, 44: 181) (297).

Nota - L'attribuzione delle popolazioni di **Puglia** e **Basilicata** alla ssp. *meridionalis* Dannehl sono dovute alla identificazione fatta da Hartig, che si era basato su alcuni esemplari recanti un cartellino con tale nome presenti presso lo ZSM; la sottospecie non è mai stata pubblicata.

Nuovi dati - **Toscana:** Arezzo: San Polo 4.VI.1988 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 27.VIII.1984, Torre Lama 10.VIII.1984; Roccadaspide (SA) 25.VII.1986; Serino (AV) 11.VIII.1984 (RTN, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella (Centro Visita) 1-5.V.1992; Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980, 9.V.1981; Piano Ruggio 22.VII.1979, 20.VI.1982; sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 19.VI.1982; Rotonda 19.V, 14.IX.1979, 7.VI, 16.VII, 16.VIII.1980, 18.V.1983; Rotonda: Valli 18.VII.1980; San Severino 16.IX.1979, 7.VII.1981; Terranova 11.VII, 13.VIII.1980, 3.VI.1981, 19.VI.1982, 22.IV, 15.V, 9-15.VI.1983; fiume Mercure 8.VI.1980, 16.V.1983 (PRN); Lago Sirino 13.VII.1984; Trecchina (PZ) 15.VII.1974 (GRL); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Santo Stefano di Rogliano 25.IX.1981; Pollino: Castrovillari 10.VI.1978; Civita 20.IV.1975; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (660); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (736); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (566); (3024); **Alto Adige:** 1851-1950; (344); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (893); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-2000; (297); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2005; (314); (3367); **Molise:** 1976-2005; (2968); (3453); **Campania:** 1901-1950; 1976-2005; (591); (3453); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2729); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (3254).

1950. - ***Lasionycta imbecilla*** **(Fabricius, 1794)**

Nota - La citazione per l'**Emilia** va confermata.

Nuovo dato - **Piemonte:** Alpi Marittime: Monte Moro 1700 m

23.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2373); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1900; (377).

1951. - ***Cerapteryx graminis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 15.VII.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (254*); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; 1976-2000; (157); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3411); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (262); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3321).

1952. - ***Tholera cespitis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *chloris* Millière, 1883)

Apamea chloris è descritta su esemplari del **Piemonte:** Acqui Terme (294).

Nuovo dato - **Veneto:** Dolomiti: Cortina 1170 m 23.III.1950 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3305); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1976-2000; (2373).

1953. - ***Tholera decimalis*** **(Poda, 1761)** (= *popularis* Fabricius, 1775)

Nuovi dati - **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968. **Alto Adige:** Val Gardena, 1400 m, 11.IX.1950 (GLL, PRN). **Veneto:** Cortina 31.VIII.1961 (GLL, PRN). **Toscana:** Arezzo 5.IX.1991. **Lazio:** Oriolo 29.IX.1984 (GRL). **Abruzzo:** San Potito, 1050 m, 17, 26 e 29.IX.1956 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** (1901-1925); 1926-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1901-1975; (812); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-1900;

1926-1975; (410); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-2000; (262); (3043); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (2883); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (529); (3083); **Sardegna:** (1976-2000); (2980); (3288).

1954. - **(-)** ***Tholera hilaris*** **(Staudinger, 1901)** (= *gracilis* Kostrowicki, 1963)

Nota - È citata come *T. popularis* f. *hilaris* Stgr. per il **Trentino** e l'**Alto Adige:** (1053); probabilmente si tratta di una aberrazione di *popularis*.

1955. - ***Mythimna turca*** **(Linnaeus, 1761)** (= *camuna* Turati, 1914)

Leucania camuna è descritta su esemplari della **Lombardia**: Valcamonica: Cogno (807).

Nota - È citata per la **Sardegna:** (114); molto dubbia; non coperta nella cartina in (3288).

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 18.V.1969. **Lombardia:** Cittiglio (VA) 1967 (GLL, PRN). **Veneto:** Nevegal (BL) 29.VI.1974 (GRL),

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (268); (2373); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (501); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1835); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3462).

1956. - ***Mythimna pudorina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *impudens* Hübner, 1803)

Nota – La citazione generica per la **Liguria:** (114) attende conferma. Citata per la **Sicilia:** (343), (1340); l'isola non è coperta nella cartina in (3288); probabile errata identificazione.

Nuovo dato - **Piemonte:** Oulx, Signola 3.VII.1991 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** (1901-1925); 1951-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (3068); **Liguria:** (1801-1850): (114); **Emilia:** 1976-2000; (2268); **Romagna:**

1976-2000; (2516); (2643); **Toscana:** 1976-2000; (2465); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (2268); **Puglia:** 1976-2000; (2465).

1957. - ***Mythimna conigera*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**; non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 30.VI, 7.VII.1976; St. Vincent 8.VII.1978. **Piemonte:** Terme di Valdieri, 1350 m, 25-28.VII.1966 (GLL); Ceresole (TO) 17.VII.1985 (GRL). **Veneto:** Cortina 20.VIII.1962, 6.VIII.1965 (GLL, PRN). **Basilicata:** Pollino: Piana San Francesco 14.VIII.1980; sorgente Aquafredda 10-16.VIII.1980, 3.VI.1981; Lago Duglia 18.VI.1981; Timpone Castellana 17.VII.1980. **Calabria:** Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (589); (2725); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2206); **Sicilia:** 1976-2000; (2209); (3254); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (3288).

1958. - ***Mythimna pallens*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Moncalieri 6 e 29.VIII.1968 (GLL, PRN).

Nota - È citata per l'**Arcipelago sardo:** Isola dell'Asinara (290); la **Sardegna:** non è coperta nella cartina in (3288); probabile errore di identificazione. Quasi tutti gli esemplari attribuiti a questa specie finora controllati sono risultati appartenere ad altri taxa (2931).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1951-2005; (372); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1951-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (2373); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Lazio:** 1851-1900; 1951-1975; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Basilicata:** 1976-2000; (2373); **Calabria:** 1851-1900; (277); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (148); (2373).

1959. - ***Mythimna impura*** **(Hübner, 1808)**

Nota - Gli esemplari di *Mythimna impura* citati da Berio per l'**Arcipelgo toscano**: Isola di Capraia (2768) sono in realtà *M. congrua* (2 es.) e *M. albipuncta* (1 es.) (3322).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 29.VI.1976; St. Vincent 22.VII.1978 (GRL). **Basilicata:** Pollino: San Severino 15.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2373); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1850; 1951-2000; (81); (2373); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; (114); (583); **Emilia:** 1976-2000; (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-1975; (1010); (2516); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (632); (2168); **Sicilia:** (1976-2000); (3288); **Sardegna:** 1926-1950; (1476).

1960. - ***Mythimna straminea*** **(Treitschke, 1825)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 15.VII.1978 (GRL). **Puglia:** Torre Guaceto 21.IX.1979; Porto Cesareo (LE): Serra degli Angeli 2 m 10.VIII.1996; Gallipoli (LE): Baia Verde 27.IV, 3 e 18.V, 24.VIII.1986, 9-28.V.1988 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (3241); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Emilia:** 1976-2000; (2643); (3099); **Romagna:** 1951-2000; (2058); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2268); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2268); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2593); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2373); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Sicilia:** 1976-2000; (2373); (3128); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2587).

1961. - ***Mythimna vitellina*** **(Hübner, 1808)**

Noctua vitellina è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noct.: tav. 81, fig. 379, 128, fig. 586) (23*); (42).

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 5.VI.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 15.VIII,1962, 5.VI, 15 e 28.VIII, 9 e 23.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 3.XI.1975, 11.V.1980, 23-27.V.1982, 7.VI.1988 (GRL); Montepulciano (SI) 10.IX.1975 (PRN).

Molise: Petacciato (CB) 2 m 10.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 27.IV., 28.X.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984; Roccadaspide (SA) 15.VII.1985, 15-22.VI, 25.VIII.1986; Serino (AV) 7.VII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 21.VIII.1985 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Molfetta 3.VI.1969; Palagiano 12.VIII.1991; gravina di Laterza (TA) 28.IV, 4.VI.1992; gravina di Riggio 1 e 10.IV, 18.V.1990; gravina di Petruscio 20.V.1985; Taranto: Mar Piccolo 26.V.1979; Fiume Lato 25.V.1991; Villa Castelli 15.V.1975; Monteroni 23.IX.1982 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 29.V.1986, 17-28.V.1988; agro Gallipoli (LE) 10-12.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 20.V.1993; Metaponto: San Marco 22.IV-19.V.1983; Rifreddo 20.V.1985 ; Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979, 6.VI.1980; Cropani 6.VI, 26.IX.1981; fiume Mercure 8.VI.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ): località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 2.V, 9.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980, 20.VII.1981; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Frascineto 25.VII.1979 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (23*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1926-2005; (1127); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2005; (2417); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1851-1900; 1951-2005; (277); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (109); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1962. - ***Mythimna unipuncta*** **(Haworth, 1809)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 31.XII.1965, 24.X.1965 (DBR, PRN); Massa: La Rocca 7.XI.1989 (GRL). **Lazio:** Dazio Salaria 1.I.1966; Roma 5 e 26.X.1969; Santa Marinella 25.VII.1961 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 1 e 29.XII.1983, 18.I, 1 e 29.III, 25.X, 1 e 8.XI, 6.XII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 24.VII.1987, 1.IX-20.X.1988; Eboli 4.V.1983; Portici 16.VII,

21.IX.1983; Roccadaspide (SA) 8.XI.1984, 22.VI.1986 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 12-16.VII.1985 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Bari: Campus 1-5.X.1980; Bari: Santa Fara (BA) 24.XI.1979, 6 e 18.IV, 5.V.1980; Valenzano 19.XII.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 24-31.X.1985, 21.XI-4.XII.1996; Taranto: Mar Piccolo 6.VII.1980; Fiume Lato 15 e 22.VI.1991; gravina di Petruscio 30.IV, 26.X.1983, 24.I.1992; gravina di Riggio 12.XI.1989, 29.IX.1991; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 27.IV-18.V, 24.VIII, 4.X.1986, 10.VII e 10.XI.1987, 9-26.IV, 9-28.V.1988, 1.IV.1989; agro Gallipoli (LE) 14.VIII.1986, 1.IV.1989 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 8.III.1992; Metaponto: San Marco 3.XI.1980; calanchi di Ferrandina 5.VII.1983 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000; Rionero in Vulture (PZ): località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; Pollino: Civita 29.V.1975, 20.V.1979; Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3043); **Trentino:** 1951-1975; (2014); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (566); (2145); **Veneto:** 1951-2005; (2051); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1976-2005; (2346); (3301); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3465 bis); **Toscana:** 1951-2005; (1896); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1951-2005; (1879); (2523); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2005; (506); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3231); **Sardegna:** 1951-2000; (1975); (2587).

1963. - ***Mythimna anderreggii*** **(Boisduval, 1840)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Sestriere 26.VI.1973 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1951-2005; (622); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (218); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1951-2000; (1943); (2373); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2272); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2144); **Abruzzo:** 1926-1975; (2141); (2143).

1964. - **(-)** ***Mythimna alopecuri*** **(Boisduval, 1840)**

Nota - È riportata con dubbio per l'**Italia**: (3054), (3288), non si hanno altre citazioni.

1965. - ***Mythimna sicula*** **(Treitschke, 1835)**

Leucania sicula è descritta su esemplari della **Sicilia**: Palermo ex larva (in Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa, X (2): 90) (75).

Nuovi dati - **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 6.VI.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Pulo Altamura 29.VII.1979, 28.VII.1983; Foresta Mercadante (BA) 28.IV.1989; gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992; gravina di Petruscio 23.IV.1983, 20.IV.1991; gravina di Riggio 29.III, 1-10.IV.1990, 20.VIII.1991; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 31.III, 28.IV.1985;Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Rotonda 10.VI.1978, 16.IX.1979, 8.VI, 9.VII.1980, 1-4.IX.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (tutti PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (2476); **Veneto:** 1976-2000; (2373); (3288); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (650); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1976; 2001-2005; (687); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (3171); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2005; (314); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2005; (2373); (2417); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3469); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (75); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1951-2000; (314); (2587).

1966. - ***Mythimna scirpi*** **(Duponchel, 1836)** (= *dactylidis* Boisduval, 1840; *montium* Boisduval, 1840; *cyperi* Boisduval, 1840)

Nota - *M. scirpi* non è più riconosciuta come specie in quanto sinonimo di *M. sicula* (Zilli in litt.). Essendo ancora elencata come buona specie in (2931), pur condividendo pienamente tale sinonimia, si mantengono separati i dati bibliografici in attesa di un parere definitivo.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Bardonecchia 1400 m 3.VII.1987. **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora 30.V.1987, 7.IX.1994 (CMC, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.VII.1986 (RTN, PRN); Scafati (SA) 28-31.VIII.1983 (SNN). **Puglia:** Bari: Santa Fara 1-15.VI.1980; Gravina in Puglia, Bosco di Pulicchie 28.V.1980; Palagianello 27.III.1976; gravina di Petruscio 23.IV.1983 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Ofanto 16.V.1969; Pollino: Timpone Balsamano

13.VIII.1980; Timpone Castellana 6.VI.1980, 9.V.1981; Cropani 6.VI.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII, 7.X.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (502); (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (2648); **Emilia:** 1901-1950; (688); (2725); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1801-1850); 1951-2000; (88); (2168); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3228); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (218); (2587); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

1967. - ***Mythimna prominens*** **(Walker, 1856)** (= *hispanica* Bellier, 1863)

Nuovo dato - **Campania:** Scafati (SA) (SNN).

Toscana: 1951-1975; (2168); **Lazio:** 1901-2000; (622); (2373); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Campania:** 1976-2000; (2373); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2729); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2005; (2201); (3347); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2005; (1384); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

1968. - ***Mythimna languida*** **(Walker, 1858)**

Nuovi dati - **Sicilia:** dintorni di Pedara (CT), 700 m, 11.XI.1999 (leg. Giandolfo, coll. Bertaccini). **Sardegna:** dintorni di Elmas (CA) VII.1997 (leg. Fancello, coll. Bertaccini).

Alto Adige: 1951-1975; (3215); **Arcipelago toscano:** 2000-2005; (3366); **Lazio:** 1976-2005; (3268); **Puglia:** 1976-2000; (3215); **Basilicata:** 1976-2000; (3215); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (3128); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1976-2000.

1969. - ***Mythimna albipuncta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 12.VII.1970, 8.VI.1978 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 3, 9-23.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 29.VII.1973, 7.X.1980, 21.IX.1982, 17.X.1988 (GRL). **Lazio:** Monte Sacro 11.IV.1938; Roma 28.IX, 18.X.1959 (DBR, PRN); Oriolo 29.IX.1984 (GRL). **Abruzzo:** San Potito 10.IX.1949 (DBR,

PRN), **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 1.XI.1984, Torre Lama 8.IX.1987, 8.IX.1988; Eboli 4.V.1983; Portici (NA): parco della Reggia 26.IV, 25.VI, 6.VII.1983 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 6-8.VII.1985 (SNN). **Puglia:** Terlizzi 25-31.V.1978; Bari: Santa Fara 1-15.VI.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 8-7.VII, 17-19.IX.1986; gravina di Riggio 1.IV.1990, 19.IX.1991; gravina di Petruscio 30.IV.1983 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 29.V.1986 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 12.VII.1983; Metaponto: San Marco 22.IV.1985; Pollino: Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979, 6.VI, 11.VII.1980, 9.V.1981; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Cropani 6.VI.1981; fiume Mercure 8.VI.1980, 29.III.1981; Rotonda 5.X.1980, 1-4.IX.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Rionero in Vulture (PZ): località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 2.V.2001, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Pollino: Civita 19.VII.1981; Monte Moschereto 800 m 15.VII, 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (2346); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1926-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1408); (2536); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1340); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1970. - ***Mythimna ferrago*** **(Fabricius, 1787)** (= *lithargyria* Esper, 1787)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 10.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 12.VIII.1960, 14.VII.1968 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 15.VII.1980 (GRL). **Veneto:** Cison di Valmarina 1.IX.1963. **Toscana:** Casentino 22.VII.1938; Ansedonia (GR), IX.1963, 30.VIII.1965, 30.V-19.VI.1970. **Lazio:** Anticoli Corrado 14.VIII.1938, 11.IX.1939; Cittaducale 8.IX.1949 (DBR, PRN). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 22-24.VII, 17-19.IX.1986; gravina di Laterza (TA) 28.IV, 28.IX.1992. **Basilicata:** Pollino:

sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979, 11.VII.1980; Piano Ruggio 22.VII.1979; Piana San Francesco 24.IX.1981; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; San Severino 15.IX.1979, 7.VII.1981; Rotonda 11.IX.1977, 23 e 26.VII, 16 e 28.IX.1979, 8.VIII-4.IX.1981; Rotonda: Valli 9.VIII.1980; Terranova 11.VIII.1980; 25.IX.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ): località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII, 7.IX.1985; Rossano lido 20-30.VII.1980; Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Santo Stefano di Rogliano 25.IX.1981; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980 (PRN); Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3411); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-2005; (1010); (3429); **Toscana:** (1851-1900); 1901-2005; (218); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2005; (385); (3409); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (817); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (1976); (2249).

1971. - ***Mythimna congrua*** **(Hübner, 1817)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 14-20.IX.1992 (PRN); Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000 (SCR). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Piemonte: 1976-2005; (2957); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2373); **Veneto:** 1901-2000; (1681); (3068); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (? 1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (314); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2987); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (75); (3254); **Sardegna:** 1801-1850; 1951-2000; (218); (2587).

1972. - ***Mythimna l-album*** **(Linnaeus, 1767)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 9.X.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) VI.1965, 23.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 28.VII.1973, 17.X.1988 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB), 2 m, 3.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 28.VII.1983, 27.IV, 25.X.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 22.VII.1987; Portici 30.VI.1983; Roccadaspide (SA) 11.IV, 8-22.VI, 15 e 28.VIII.1986; Serino (AV) 30.VI, 7.VII, 18.VIII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 6 e 29.VI, 6-8.VII, 21.VIII.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Bari: Santa Fara 22.VI.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 23.IV.1985, 17-19.IX.1986; gravina di Laterza (TA) 28.IV.1992 (NRD); gravina di Riggio 18.V.1990, 29.IX.1991; gravina di Petruscio 30.IV, 26.X.1983; Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Bari: Campus 1-5.X.1980 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 10.VII.1987 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 16-20.V.1993; calanchi di Ferrandina 27.VI.1979, 5.VII.1983; Metaponto: San Marco 4.IV.1985; Campomaggiore scalo 30.V.1976; Pollino: Piano Ruggio 20.VI, 23.VII.1976; Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979; Belvedere 16.VII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Cropani 6.VI, 26.IX.1981; Rotonda 5.X.1980, 25.VII.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Terranova 1.XI.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Trecchina (PZ), 320 m, 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ): località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; Sersale (CZ) 19.X.1986; Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Lorica 8-13.X.1978; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII, 7.X.1980; Frascineto 25.VII.1979 (PRN). **Sicilia:** Madonie: Mandria del Conte 2.VI.1995 (GRL); Etna N: Galvarina 1800 m 22.VII.1992 (coll. Giuliano); Altavilla Milicia (PA): Valle del Corvo 305 m 9.XI.1996; Caccamo (PA): Bosco Artale 650 m 15.V.1997 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (932); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (1044); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (99); (2355); **Puglia:** 1951-2005; (2168);

(3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2005; (148); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

1973. - ***Anapoma riparia*** **(Rambur, 1829)**

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA) 15.VIII.1986 (RTN, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Pulo di Altamura 29.V.1979; Valenzano 10.X.1983; Taranto: Mar Piccolo 26.V.1979; Torre Guaceto 20.IX, 15.X.1979 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 18.V.1986, 9-28.V.1988 (PRT, PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 11-15.VI, 16-20.IX.1992, Masseria Zagarella 11-15.VI.1992; fiume Camastra 15.VI.1976; Pollino: Timpone Castellana 9.VI.1981; Cropani 6.VI.1981; fiume Mercure 6.X.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 16.VI.1983 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V, 4.VI.1981 (PRN). **Sardegna:** Tempio Pausania 21.V.1994 (Luciano in litt.).

Piemonte: 1976-2005; (3461 bis); **Veneto:** 1976-2005; (3288); (3380); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Liguria:** (? 1851-1900); 1951-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1577); (2373); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2593); (3324); **Campania:** 1976-2005; (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (343); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2587).

1974. - ***Leucania comma*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - È citata per la **Toscana:** Passo dei Mandrioli (AR) (2373); gli esemplari della collezione Fiori sono etichettati: Fiumalbo, località Mandriole (MO) (**Emilia**) e non Passo dei Mandrioli (AR) (3429). È citata per la **Sardegna:** (2980); regione non coperta nella cartina in (3288). È citata genericamente per la **Sicilia**; non si hanno altri dati per l'isola.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 7.VII.1978. **Piemonte:** Frabosa (CN) 2.VII.1983; Val Bognanco (VB) 3.VI, 4.VII.1980 (GRL); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Lombardia:** Valtellina: Val Viola 9.VII.1979. **Veneto:** Belluno 27.VI.1974 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (2362); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293);

Alto Adige: 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1950; 1976-2000; (262); (2373); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2373); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2005; (2143); (3435); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1976-2000); (2980); (3288).

1975. - ***Leucania obsoleta*** **(Hübner, 1803)**

Nuovi dati - **Puglia:** Palazzo di Ascoli Satriano (FG) 4.X.1995 (PRN); Gallipoli (LE) 9-12.V.1988; Gallipoli (LE): Baia Verde 27.IV, 8 e 13.V, 11-24.VIII.1986, 11.V.1987, 17-28.V.1988 (PRT, PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Alto Adige:** 1901-1925; (812); (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Liguria:** (1926-1950); (1420); **Emilia:** 1976-2000; (2268); (3099); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (3335°); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2268); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2373); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2373); **Abruzzo:** 1976-2005; (2593); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1926-2000; (1776); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** 1976-2005; (2373); (3128); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2587).

1976. - ***Leucania zeae*** **(Duponchel, 1827)**

Nota - Dubbia la presenza di *Leucania zeae* in **Italia**; gli individui esaminati sono risultati essere *Hyphilare loreyi*, *Sesamia vuteria* e più frequentemente *S. cretica* (1243). La citazione di *L. zeae* per la **Lombardia:** (300) va riferita a *S. cretica*. Le citazioni per il **Veneto:** (990), la **Toscana:** (229*), (421), (344), (990) e l'**Abruzzo:** (344), (314), (421), vanno probabilmente riferite ad altra specie.

Nuovo dato - **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 10-27.VIII.1984, 20.X.1988 (RTN, PRN).

Veneto: 1951-2000; (2051); (2373); **Emilia:** 1976-2000; (2268); **Romagna:** 1951-2000; (2058); (2516); **Toscana:** 1976-2000; (2465); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2005; (2465); (3417); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2005; (2465); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1976-2000; (2465); (2587).

1977. - ***Leucania palestinae*** **Staudinger, 1897** (= *languida* Staudinger, 1898)

Sicilia: 1976-2000; (2986); (3128).

1978. - ***Leucania punctosa*** **(Treitschke, 1825)**

Nota - "Ad eccezione di un esemplare siciliano, tutti gli esemplari attribuiti a questa specie finora controllati sono risultati appartenere ad altri taxa" (2931). Le citazioni generiche per il **Piemonte** e la **Toscana** attendono conferma. Si riportano i dati bibliografici in attesa di ulteriori verifiche per quelli meno recenti.

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora 9.IX.1981, 19.IX.1987, 9.IX.1989, 4 e 7.IX.1994 (CMC, PRN). **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 21.IX.1979 (PRN).

Piemonte: (1851-1900); (218); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); **Toscana:** (1851-1900); (218); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2725); **Lazio:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** 1976-2000; (2373); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3288); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (349); (2907); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (2373).

1979. - ***Leucania putrescens*** **(Hübner, 1824)**

Nota - È riportata genericamente per l'**Alto Adige,** presenza da confermare.

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) 15.IX.1968 (GLL, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Valenzano 4.IX.1983; Putignano (BA): Bosco Petruzzi: 17-19.IX.1986; Parco delle Pianelle 6.IX.1980 (PRN); gravina di Laterza (TA) 28.IX.1992 (NRD). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 1-5.IX.1992; fiume Camastra 28.VII.1975 (PRN).

Piemonte: 1976-2005; (2373); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1797); (3272); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** (1951-1975); (1734); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1976-2000; (603); (2373); **Liguria:** 1951-2000; (1577); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1577); (2373); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3465 bis); **Toscana:** 1951-2005; (2168); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2536); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (75); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2907); (3226); **Sardegna:** 1951-2000; (1975); (2587).

1980. - ***Leucania joannisi*** **Boursin & Rungs, 1952** (= *arbia* Boursin & Rungs, 1952)

Nuovi dati - **Puglia:** Torre Guaceto 1.X.1977, 21.IX.1979 (PRN); Gallipoli (LE) 12-14.V.1988 (PRT, PRN).

Lazio: 1951-2000; (1947); (3268); **Puglia:** 1976-2000; (2109); **Basilicata:** 1976-2000; (2109); (2373); **Calabria:** (1976-2000); 2001-2005; (3103); (3347); **Sicilia:** 1976-2005; (2986); (3320); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1981. - ***Leucania loreyi*** **(Duponchel, 1827)** (= *caricis* Treitschke, 1835)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 1-15.VIII, 14 e 24.X.1965 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 5.X.1983, 3.VII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Valenzano 2.XI.1983. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fossa Bradano 26-30.VI.1993; Pollino: Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; San Severino 15.IX.1979, 6.VII.1981; fiume Mercure 8.VI.1980. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3043); **Trentino:** 1951-1975; (1787); (2060); **Alto Adige:** 1976-2000; (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** (1901-1925); 1951-2000; (544); (3043); **Romagna:** (1851-1900); 1951-2005; (314); (3465 bis); **Toscana:** 1926-2005; (1235); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2593); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2373); (2536); **Arcipelago campano:** 1901-1925; (1494); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2373); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (75); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); (3231); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (188); (2587).

1982. - ***Senta flammea*** **(Curtis, 1828)** (= *stenoptera* Staudinger, 1892)

Piemonte: 1976-2000; (2957); **Lombardia:** 1951-2000; (1915); (2373); **Veneto:** 1951-1975; (2268); (2658); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (688); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516).

1983. - ***Panolis flammea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *griseovariegata* Goeze, 1781; *piniperda* Panzer, 1786)

Nuovi dati - **Liguria:** Andora (SV) 18.IV.1993 (CMC, PRN). **Puglia:** Foresta Mercadante (BA) 28.IV.1989; Mottola (TA): gravina di Petruscio 23.IV.1983 (PRN); fiume Lato (TA) 21.III.1991 (NRD).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (2342); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-1975; (175); (1631); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Toscana:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2575); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); (3247); **Sardegna:** 1951-1975; (2041); (2803).

1984. - ***Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766)** (= *instabilis* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovo dato - **Piemonte:** Valdieri (CN) 22.V.1987 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1951-1975; (114); (2041).

1985. - ***Orthosia miniosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.III.1978, 20.IV.1984, 9.IV.1985, 10.IV.1988 (GRL). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 24-31.III.1986. **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia (MT) 10.III.1977; Vulture (PZ): Monticchio 9.IV.1983; Pollino: fiume Mercure 29.III.1981; Rotonda 28.III.1981; Terranova 22.IV.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1951-

2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); **Sicilia:** 1976-2000; (2597); (3083); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2373).

1986. - ***Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775)** (= *stabilis* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.IV.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 28.III.1978, 14.IV.1979, 9.IV.1985 (GRL). **Campania:** Portici 22.IV.1983 (RTN, PRN). **Basilicata:** Monte Caperino 15.IV.1975; Rifreddo 7.V.1983; Vulture (PZ): Monticchio 29.III.1970, 28.III.1977, 9.IV.1983; Grotticelle 9.IV.1983; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981; Rotonda 23.III, 28.III.1981; fiume Mercure 29.III.1981; Terranova 16.IV, 22.IV.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (108); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1951-2005; (2141); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1127); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

1987. - ***Orthosia cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pulverulenta* Esper, 1786)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.X.1980, 7.IV.1985 (GRL). **Puglia:** foce fiume Candelaro (FG) 7.IV.1981; Bari 8.IV.1983. **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 10.III.1977; Metaponto: San Marco 15.III.1986; Vulture (PZ): Monticchio 9.IV.1983; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981; Rotonda 23.III.1981; fiume Mercure 29.III.1981; Terranova 16.IV, 22.IV.1983; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 8.IV.1983, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Sila: San Cosma Albanese (CS) 9.IV.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3043); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1976-2000;

(2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1926-2000; (1551); (3043); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2141); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1976-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3254); **Sardegna:** 1801-1850; 1926-2000; (114); (2587).

1988. - ***Orthosia populeti*** **(Fabricius, 1781)** (= *populi* Ström, 1783)

Nota - È riportata genericamente per la **Sicilia,** citazione da confermare.

Nuovo dato - **Basilicata:** Irsina (PZ): Contrada Occhiambolo 220 m 13.III.1996 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (2211); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1958); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Emilia:** 2001-2005; (3301); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2209); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (2373); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (2350); **Sicilia:** (1976-2000); (2980).

1989. - ***Orthosia gracilis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (3024); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (629); (3043); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2373); (3462); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (2597); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (1976); (2373).

1990. - ***Orthosia opima*** **(Hübner, 1809)**

Nota - Le citazioni per la **Romagna** di Zangheri (1885) vanno riferite ad *Agrochola lota* (2516). La segnalazione per il **Lazio:** Circeo (2373) va riferita a *A. lota* (2931). La presenza sul Circeo è confermata da reperti molisani e abruzzesi (3222).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Trentino:** 1901-

2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (812); (2373); **Veneto:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (218); (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (983); (2373); **Toscana:** 1976-2000; (3310); **Lazio:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** 1976-2000; (3222); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222).

1991. - ***Orthosia gothica*** **(Linnaeus, 1766)**

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**; non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Toscana:** Argentario (GR) 14.IV.1963 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 14.IV.1979, 7.IV.1980, 9.IV.1985 (GRL). **Lazio:** Roma 13.IV.1974. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 15.III.1986; Vulture (PZ): Monticchio 9.IV.1983, 20.IV.1983; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981; fiume Mercure 29.III.1981; Rotonda 19.V, 9.XI.1979; 23.III.1981; Terranova 16 e 22.IV.1983 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 2.V.2001 (SCR). **Calabria:** Sila: San Cosmo Albanese (CS) 1.IV.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (5718,); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (2423); (3108); **Toscana:** 1951-2005; (2272); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (488); (3254); **Sardegna:** (1976-2000); (2931); (3253).

1992. - ***Anorthoa munda*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3183); **Emilia:** 1976-2005; (2268); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2350).

1993. - ***Perigrapha rorida*** **(Frivaldsky, 1835)**

Nota - La **Sicilia** è coperta nella cartina in (3253), ma non è citata nel

testo.

Nuovi dati - **Toscana:** Argentario (GR) 14.IV.1963 (DBR, PRN); **Puglia:** Bari 10.III.1982; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 20.III.1986. **Basilicata:** Metaponto, località San Marco 31.III, 13.IV.1985, 15.III.1986 (PRN).

Venezia Giulia: 1901-1950; (449); (1734); **Toscana:** 1951-2005; (2141); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Lazio:** 1901-2005; (813); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2373); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** (1976-2000); (2532); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2232); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (711); (2587).

1994. - ***Perigrapha i-cinctum*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: (1976-2000); 2001-2005; (2972); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183).

1995. - ***Egira conspicillaris*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 9 e 23.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano 3.V.1975, 21.IV.1976, 20.IV.1981 (GRL). **Lazio:** Lido di Roma 20.IV.1963 (DBR, PRN). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 21-23.IV.1985. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 16-20.IV.1993; Metaponto: San Marco 31.III-8.IV.1985 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** (1851-1900); 1951-2005; (218); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2373).

1996. - ***Egira anatolica*** **(Hering, 1933)**

Nota - La **Sicilia** è coperta nella cartina in (3253); non si hanno altri dati per l'isola.

Nuovo dato - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 21-23.III.1992 (PRN).

Molise: 1976-2000; (3115); **Puglia:** 1976-2000; (2275); **Basilicata:** 1976-2000; (2275); (2350).

1997. - ***Atethmia ambusta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *xerampelima* Esper, 1794)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (1551); **Romagna:** (1851-1900); 1951-1975; (314); (1885); **Toscana:** 2001-2005; (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2143); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (3298); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298).

1998. - ***Atethmia centrago*** **(Haworth, 1809)** (= *xerampelina* sensu Hübner, 1809 et auct. nec Esper, 1794)

Nuovo dato - **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1976-2000; (2373); (3099); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2829); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222).

1999. - ***Tiliacea citrago*** **(Linnaeus, 1758)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1926-1950; 1976-2000; (1060); (2373); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (262); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3428); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1231); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2350).

2000. - ***Tiliacea aurago*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *rutilago* Fabricius, 1775; *fucata* Esper, 1788)

Phalaena Noctua fucata è descritta su esemplari di **Italia** (9*); (3079).

Nota - È citata per la **Toscana:** Passo dei Mandrioli (AR) (2373); gli esemplari della collezione Fiori sono etichettati: Fiumalbo, località Mandriole (MO) (**Emilia**) e non Passo dei Mandrioli (AR) (3429).

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 12.IX.1979; Timpone Castellana 13.IX.1979, 5.X.1980; Piana San Francesco 24.IX.1981; Lago Duglia 1.XI.1981; Rotonda 28.IX, 20.X.1979; Terranova 25.IX.1981; San Severino 15.IX.1979. **Calabria:** Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).

Piemonte: 1851-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (16683); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (3068); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:**

1901-1925; 1976-2000; (893); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2373); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1926-2000; (1231); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2005; (3467); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (2597); (3254).

2001. - ***Tiliacea sulphurago*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *fulvago* Clerck, 1759)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.X.1980 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Terranova 18.X.1982 (PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1002); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2373); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2000; (553); (3254).

2002. - ***Tiliacea cypreago*** **(Hampson, 1906)** (= *innotata* Failla-Tedaldi, 1890)

Xanthia gilvago ab. *innotata* è descritta su esemplari della **Sicilia:** Piano della Noce (360).

Nota - In (3253) la **Puglia:** è coperta nella cartina; non si hanno altri dati per la regione.

Toscana: 1976-2005; (3276); **Basilicata:** 1976-2000; (2275); **Calabria:** 1976-2000; (2275); **Sicilia:** 1851-1925; 1951-2000; (360); (2907).

2003. - ***Xanthia togata*** **(Esper, 1788)** (= *lutea* Ström, 1783)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Liguria:** (1926-1950); 1976-2000; (1388); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2373); (3429); **Marche:** 1951-1975; (1980); (2085); **Lazio:** 1901-

1925; 1976-2000; (656); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2350).

2004. - ***Xanthia icteritia* (Hufnagel, 1766)** (= *fulvago* auct. nec Clerck, 1759; *flavescens* Esper, 1788)

Nuovo dato - **Calabria:** Sila: Il Cupone 19.IX.1985 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (161); (2659); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (9*); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** (1976-2000); (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (2819); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2373).

2005. - ***Xanthia gilvago* (Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 11.X.1966 (GLL, PRN). **Emilia:** Ozzano (BO) 2.XI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1184); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1861); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; 1976-2005; (24); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2587).

2006. - ***Xanthia ocellaris* (Borkhausen, 1792)** (= *palleago* Hübner, 1803)

Phalaena Noctua ocellaris è descritta su esemplari di **Italia** (Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge, IV: 647) (16*); (2576).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1184); (1787); **Alto Adige:** 1901-1975; (1053); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1734); (2051); **Emilia:** 1951-2000; (1577); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2373); **Toscana:** 1976-2005; (3310);

(3428); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Basilicata:** 1951-1975; (2168); **Sicilia:** 1851-1925; (218); (529).

2007. - ***Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *pistacina* Denis & Schiffermüller, 1775; *canaria* Esper, 1791; *serina* Esper, 1791; *rubetra* Esper, 1791; *schoenobaena* Esper, 1791)

Phalaena Noctua rubetra, *canaria*, *serina* e *schoenobaena* sono descritte su esemplari della **Toscana:** Firenze (9*); (2576).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 1-8.XI.1975, 21-23.X.1986 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 1 e 29.XII.1983, 18 e 26.I, 8.XI, 6.XII.1984; Eboli 28.II.1983; Pontecagnano (SA) 18.XII.1980 (RTN, PRN). **Puglia:** Foresta Mercadante XI.1987; Bari: Santa Fara 26.XI.1979, 5.IV, 5-15.XI.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 3.X-3.I.1986 (PRN); gravina di Petruscio 26.X.1983, 11.XI.1991; gravina di Laterza (TA) 12.I.1992 (NRD); Gallipoli (LE) 16.XI.1986; Gallipoli (LE): Baia Verde 5.XII.1986, 10 e 28.XI.1987 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 1.XI.1981; Terranova 1.XI.1981, 17.XI.1984; fiume Mercure 2.XI.1981, 13.XI.1983; Cropani 1.XI.1981. **Calabria:** Verzino (CZ) 21.VIII.1993 (PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (9*); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2939); (2536); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (310); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2008. - ***Agrochola orejoni* Agenjo, 1951** (misspelling: *orenjoni*)

Agrochola orenjoni (sic!) ssp. *terranovae* è descritta su esemplari della Basilicata: Pollino, Terranova (2275).

Basilicata: 1976-2000; (2275).

2009. - ***Agrochola pistacinoides* (d'Aubuisson, 1867)** (= *nitida* auct. nec Denis & Schiffermüller, 1775; *dujardini* Dufay, 1975)

Nota - In (3253) la **Sardegna** è coperta nella cartina ma non è citata nel testo.

Nuovi dati - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 16-20.IX.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (218); (2373); **Veneto:** 1926-2000; (1681); (2373); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (687); (2373); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2350); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2010. - ***Agrochola nitida*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per **Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Giulia, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo** e **Sicilia** sono dubbie, non rinvenuta nelle collezioni visitate, probabilmente sostituita da *A. pistacinoides* (2373). Tutte le popolazioni italiane appaiono riconducibili a *A. pistacinoides*, ma non si esclude la presenza di *A. nitida* nel settore nord-orientale (2931). Si ripottano le citazioni più recenti, che dovrebbero essere state identificate correttamente. **Valle d'Aosta:** Cerellaz, 1200 m, 10.IX.1988 (2560); Cerellaz, IX, 19 e 20.IX.1989 (2653); **Trentino:** Savignano (TN): Pomarolo, 650-700 m, 1993, 1995 (3024); **Alto Adige:** Sterzing 26.VIII.1908, Auer 250 m 21.IX.1974 (2064); Montiggl (BZ), 550 m, 1992 (3024); Montiggl (BZ) 550 m, 2000 (3293); **Toscana:** Val di Farma: Carpineto-nord (SI), 200 m, X (3428).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (2653); **Trentino:** 1976-2000; (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (2064); (3293); **Toscana:** 1976-2000; (3428).

2011. - ***Agrochola prolai*** **Berio, 1976**

Agrochola prolai è descritta su esemplari del **Lazio:** Vivara del Romano (olotipo) e **Abruzzo:** Carsoli (Bollettino della Società entomologica italiana, 108 (1-2): 22, fig. 1) (2056).

Nuovo dato - **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 18.X.1989 (SCL).

Lazio: 1951-2000; (2056); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2056); (3253); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3447); **Puglia:** 1976-2000; (2350); (3298); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2350).

2012. - ***Agrochola humilis*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980;

Terranova 18.X.1983. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN).

Alto Adige: 1901-1925; (1053); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1901-1925; (983); (1004); **Toscana:** 1976-2005; (2373); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1976-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2422°); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2232).

2013. - **(-)** ***Agrochola kindermanni*** **(Fischer von Röslerstamm, 1837)**

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** vanno riferite a *A. wolfschlaegeri* (2931).

2014. - ***Agrochola wolfschlaegeri*** **Boursin, 1953**

Nota - La **Calabria** è coperta nella cartina in (3253), non risultano segnalazioni per la regione. La presenza della specie in **Sicilia** è stata confermata recentemente in seguito ad alcune catture effettuate sulle Madonie e sull'Etna (leg. Grillo) (2931).

Sicilia: (1851-1900); 1976-2000; (388); (2931).

2015. - ***Agrochola litura*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 9.X.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (75); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2987); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (75); (3083); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

2016. - ***Agrochola meridionalis*** **(Staudinger, 1871)**

Orthosia litura meridionalis è descritta su esemplari di Andalusia, Gallia meridionale e **Italia meridionale** (188).

Nota - L'**Italia meridionale** fra i luoghi tipici è dubbia, non si hanno segnalazioni per l'**Italia centrale** e **meridionale**. Una citazione generica per il **Tirolo meridionale**: (1207) e una vecchia citazione per la **Sicilia:** (360) sono dubbie.

Liguria: 1976-2000; (2410); (3183).

2017. - ***Agrochola helvola*** **(Linnaeus, 1758)** (= *rufina* Linnaeus, 1758)

Nota - Una vecchia citazione per la **Sardegna:** (114) è poco attendibile, anche se la specie è presente in Corsica.

Nuovi dati - **Toscana:** Molinelli 28.X.1986; Pieve a Maiano (AR) 1.XI.1975 (GRL). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 14.X-23.XI.1985, 21.XI-4.XII.1986 (PRN); Mottola: San Antuono 30.XI.1991 (NRD). **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 1.XI.1981; fiume Mercure 2.XI.1982; Terranova 1.XI.1981; Cropani 1.XI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (262); (3043); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2018. - ***Agrochola lota*** **(Clerck, 1759)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 9.IX.1981, 12.XI.1983; Timpone Castellana 13.XI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (1551); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1976-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Puglia:** 1976-2000; (2230); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (3347); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2587); (3469).

2019. - ***Agrochola blidaensis*** **(Stertz, 1915)**

Nota - In (3253) **Liguria, Toscana, Campania, Puglia** e **Basilicata** sono coperte nella cartina; non risultano segnalazioni per queste regioni.

Lazio: 1951-2000; (2636); (3253); **Calabria:** 1976-2000; (3469); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (2066); (3253).

2020. - ***Agrochola macilenta*** **(Hübner, 1809)**

Nota - Le citazioni per l'**Italia peninsulare** vanno riferite alla specie gemella *A. blidaensis* secondo (2561). Nella cartina in (3253) sono coperte tutta l'**Italia** e la **Sicilia**. Zilli (in litt.) conferma che la specie più diffusa in Italia è *A. macilenta*, mentre *A, blidaensis* è rarissima.

Nuovi dati - **Campania:** Serino (AV) 5.X.1984 (RTN, PRN). **Basilicata:** Rotonda (PZ), 13.XI.1983; Piana San Francesco (PZ), 24.IX.1981; Lago Duglia (PZ), 1.XI.1981, 9.X.1983, 12.XI.1983; Timpone Castellana (PZ), 13.XI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2091); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (360); (3254).

2021. - ***Agrochola haematidea*** **(Duponchel, 1827)**

Noctua haematidea è descritta su esemplari di **Toscana**: Firenze (in Godart & Duponchel, Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France, VII: 365, pl. 122, fig. 5) (46*); (2576).

Nuovi dati - **Toscana:** Arezzo 15 e 31.X, 1.XI.1989, 10.XI.1990, 5.XI.1994; Molinelli 14.XI.1988; Pieve a Maiano (AR) 3.V.1985, 23.X.1986 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); **Piemonte:** 1801-1850; (114); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (46*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Lazio:** 1976-2000; (3268); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-1975; (782); (2067).

2022. - ***Agrochola circellaris*** **(Hufnagel, 1766)** (= *ferruginea* Denis & Schiffermüller, 1775; *rubecula* Esper, 1791)

Phalaena Noctua rubecula è descritta su esemplari della **Toscana:** dintorni di Firenze (9*); (2576).

Nota - In (3253) **Umbria, Campania** e **Puglia** sono coperte nella cartina; non risultano segnalazioni per queste regioni.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850;

1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2793 bis); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1951-2005; (1551); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (9*); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Molise:** 2001-2005; (3447); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

2023. - ***Agrochola laevis*** **(Hübner, 1803)**

Nota - Nella cartina sono coperte le regioni dell'**Italia centrale** e **meridionale** (3253); non risultano segnalazioni per questi settori. La citazione per la **Romagna:** (1885) va riferita a *Orthosia cruda* (2516). Le citazioni generiche per la **Valle d'Aosta** ed il **Piemonte** sono da confermare. Si hanno vecchie citazioni per la **Toscana:** (218) e la **Sicilia:** (506), poco attendibili.

Valle d'Aosta: (1901-1925); (736); **Piemonte:** (1926-1950); (1388); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (1734); **Veneto:** (1976-2000); (2725); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060).

2024. - **(-)** ***Agrochola mansueta*** **(Herrich-Schäffer, 1850)**

Nota - La vecchia citazione per la **Sicilia:** Piano della Noce (360) è probabilmente dovuta a errata identificazione.

2025. - ***Spudaea ruticilla*** **(Esper, 1791)**

Phalaena Noctua ruticilla è descritta su esemplari di Toscana: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2/1): 525, Taf. 157, Noct. 78, fig. 1) (9*); (3079).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.IV.1965; Argentario (GR) 14.IV.1963 (DBR, PRN). **Campania:** Portici (NA): parco della Reggia 26.III, 3 e 22.IV.1983 (RTN, PRN); Scafati (SA) 21-30.IV.1983 (SNN). **Puglia:** Palagianello 27.III.1976 (PRN); Fiume Lato 28.II.1992 (NRD). **Basilicata:** Metaponto (MT): San Marco 31.III.1985; Vulture (PZ): Monticchio 8.IV, 30.IV.1983; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1982; Rotonda (PZ) 8 e 23.III.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte**: (1901-1925); 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (424); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1551); (2346); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2373); **Toscana:** 1751-1800; 1951-

2005; (9*); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3275); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (3254); **Sardegna:** 1926-2000; (1260); (2652).

2026. - ***Omphaloscelis lunosa*** **(Haworth, 1809)**

Piemonte: 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183).

2027. - ***Conistra vaccinii*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - Le citazioni per la **Sardegna:** (841), (886), sono poco attendibili.

Nuovi dati - **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Basilicata:** Pollino, Lago Duglia 12.XI.1993; (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (262); (2346); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2141); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); (2536); **Puglia:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (360); (3254).

2027 bis ***Conistra iana*** **Zilli & Grassi, 2006**

Conistra iana è descritta su esemplari della Sicilia: Bosco della Ficuzza, 'Alpe Cucco', 1050 m, 16.XI.1990 (olotipo); Bosco della Ficuzza, 'Crocifisso', 1000 m, 22.XI.1990, 2.XII.1995; Bosco della Ficuzza, 'torrente', 730 m, 24.XI.1991; Etna: Linguaglossa, Contrada Salici, 13.III.1994; Etna: Pineta di Linguaglossa, 'Etna Nord', 1450 m, 5.IV.1989 (3473).

Nota - A questa nuova specie vanno riferite le citazioni di *Conistra ligula* per la **Sicilia**.

Sicilia: 1851-1900; 1976-2000; (360); (3473).

2028. - ***Conistra ligula*** **(Esper, 1791)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** (360), (3254); "gli esemplari siciliani esaminati di *C. vaccinii* presentano l'apice delle ali anteriori debolmente falcato, carattere normalmente considerato tipico di *C. ligula*; pertanto, nonostante numerose citazioni, al momento non si può

confermare la specie per l'isola" (2931). In **Sicilia** vola *Conistra iana.*

Nuovi dati - **Lazio:** Roma: Prima Porta 29.XI, 1.XII.1970; Monti Simbruini: Camposecco 14.XI.1971 (DBR, PRN). **Abruzzo:** Pescasseroli 2.XII.1970 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1734); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (687); (1551); **Romagna:** 1976-2000; (2373); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2800); **Basilicata:** 1951-2000; (2350); (3298).

2029. - ***Conistra rubiginosa* (Scopoli, 1763)** (= *silene* Fabricius, 1775; *vau-punctatum* Esper, 1786)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 14.III.1986 (GRL). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 9.IV.1983; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1797); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (424); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2185); (2373); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (218); (1060); **Liguria:** (1951-1975); (1943); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (1551); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (2066); (2373).

2030. - **(-)** ***Conistra daubei* (Duponchel, 1838)**

Nota - Le citazioni di *C. daubei* per l'**Abruzzo,** la **Basilicata** e la **Sicilia:** in (2373), (2800), (2844), vanno riferite a *C. torrida* (2931).

2031. - ***Conistra veronicae* (Hübner, 1813)** (= *camastra* De Laever, 1979)

Conistra camastra è descritta su esemplari di **Basilicata**: Camastra (olotipo) e **Puglia**: Monte Camplo (2159).

Nota - Le citazioni di *C. veronicae* per la **Sicilia** e la **Sardegna** sono da riferire a *C. intricata* (3253).

Nuovi dati - **Puglia:** Valenzano 30.I.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 17-30.XI.1985, 5-11.I.1986. **Basilicata:** Pollino: Timpone

Castellana 27.III.1981; Terranova 1.XI.1981, 19.XII.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1926-1950; (2286); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1901-2000; (1053); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (2286); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (302); (2286); **Romagna:** 1976-2000; (3108); **Toscana:** 1926-1950; 1976-2005; (2286); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2286); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2159); (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2800).

2032. - ***Conistra intricata*** **(Boisduval, 1829)**

Nota - Nella cartina in (3253) sono coperte **Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata** e **Calabria**; non si hanno altri dati per queste regioni.

Sicilia: 1851-1900; 1951-2000; (324); (3254); **Sardegna:** 1951-1975; (1976); (2286).

2033. - ***Conistra torrida*** **(Lederer, 1857)**

Orrhodia torrida è descritta su esemplari della **Sicilia**: dintorni di Palermo (Wiener entomologische Monatschrift, 1: 81) (130).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2636); (3378); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2890); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (448); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (3298); **Calabria:** 2001-2005; (3316); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (130); (2844).

2034. - ***Conistra ragusae*** **(Failla-Tedaldi, 1890)**

Heteromorpha ragusae è descritta su esemplari della **Sicilia**: Madonie e Piano della Noce (ll Naturalista Siciliano, 10 (2-3): 30, Tav. 1, Fig. 6, 7) (360).

Lazio: 1951-2000; (2143); (2890); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); (3253); **Molise:** 1976-2005; (3156); (3447); **Basilicata:** 1951-2000; (1931); (3298); **Calabria:** 1951-1975; (1931); (2141); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2035. - ***Conistra rubiginea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Molinelli 11.XI.1988 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 22 e 29.III.1984; Eboli 24.II.1983; Serino (AV) 27.X.1984 (RTN, PRN); Scafati (SA) 24.III.1983; Vesuvio: Osservatorio 16.X.1985 (col. Sannino). **Puglia:** Valenzano 20.I-20.II.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 15-22.XII.1985 (PRN); gravina di Laterza (TA) 12.I.1992 (NRD). **Basilicata:** Laghi di Monticchio

30.III.1982, 9.IV.1983; Pollino: Lago Duglia 9.X, 1.XI.1981; Rotonda 28.III.1981, 21.III.1982; fiume Mercure 29.III1981; Terranova 7.II.1984; Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (424); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (129); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2373); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; (109); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2373); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); (3254); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

2036. - ***Conistra staudingeri*** **(de Graslin, 1863)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1184); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3183).

2037. - ***Conistra erythrocephala*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1926-2000; (1279); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1951-1975; (110); (1577); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (360); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (792); (2373).

2038. - ***Jodia croceago*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 12.IV.1979, 6.IV.1980, 9.IV.1985 (GRL). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 28-31.X.1985, 15-25.XI.1987. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 9.XI.1979, 25.III.1981 (PRN). **Calabria:** San Cosma Albanese (CS) 2.IV.1983; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 27.X.1995, 4.IV.1996 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1901-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (218); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (298); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (218); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2373); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1926-1950; (1285); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2373); (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (711); (2587).

2039. - ***Brachylomia viminalis*** **(Fabricius, 1777)**

Nuovi dati - **Alto Adige:** Santa Cristina 27.VIII.1962 (GLL, PRN). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Piana San Francesco 14.VIII.1980; Lago Duglia 18.VII.1982; Terranova 24.IX.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1190); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (231); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2373); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Umbria:** 1976-2000; (2725); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1951-2000; (2168).

2040. - ***Lithophane semibrunnea*** **(Haworth, 1809)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3378); **Lombardia:** 1926-1950; 1976-2000; (1502); (2373); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (1053); (2373); **Veneto:** 1976-2000; (3068); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2272); (3389); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Basilicata:** 1951-1975; (2141); **Sicilia:** 1851-1925; (360); (488); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

2041. - ***Lithophane socia*** **(Hufnagel, 1766)** (= *petrificata* Denis & Schiffermüller, 1775; *hepatica* auct. nec Clerck, 1759)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2373); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (244); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3428); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2373).

2042. - ***Lithophane ornitopus*** **(Hufnagel, 1766)** (= *rizolitha* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Abruzzo:** Gran Sasso: San Pietro 1200 m 20.X.1988 (GRL), **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981, 13.XI.1982; Lago Duglia 1.XI.1981, 16.IV, 12.XI.1983; Terranova 12.XI.1983; Rotonda 23 e 28.III, 4.IV.1981, 21.III.1982, 13.XI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (1004); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2968); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2516); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (792); (2373).

2043. - ***Lithophane furcifera*** **(Hufnagel, 1766)**

Nota - Le citazioni di *L. lamda* v. *furcifera* per il **Piemonte** e la **Toscana** sono poco attendibili, da confermare.

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; (114); (736); **Lombardia**: (1851-1900); (2362); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (2373); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Toscana:** (1851-1900); (218).

2044. - ***Lithophane consocia*** **(Borkhausen, 1792)** (= *ingrica* Herrich-Schäffer, 1850)

Nota - È riportata per la **Sicilia:** (218); citazione poco attendibile.

Piemonte: 1976-2000; (2373); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2373); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2373); **Friuli:** 1926-1950; (1425).

2045. - **(-)** ***Lithophane lamda*** **(Fabricius, 1787)** (= *zinkenii* Treitschke, 1825)

Nota - Le citazioni di *L. lamda* var. *furcifera* per il **Piemonte,** la **Lombardia** e la **Toscana**, vanno riferite a *L. furcifera*.

2046. - ***Lithophane merckii*** **(Rambur, 1832)**

Nota - La **Sicilia** è coperta nella cartina (3253); non risultano segnalazioni per l'isola.

Trentino: 1851-1925; (566); (1038); **Veneto:** 1951-1975; (1734); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2648); **Lazio:** (1951-1975); (2041); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2373).

2047. - ***Lithophane leautieri*** **(Boisduval, 1829)** (= *lapidea* auct.)

Nota - Le citazioni di *L. leautieri* per la **Liguria,** la **Toscana** e l'**Umbria** vanno riferite a *L. lapidea* (2373).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (711); (2587).

2048. - ***Lithophane lapidea*** **(Hübner, 1808)**

Nota - Le citazioni di *L. lapidea* per la **Sardegna** vanno riferite a *L. leautieri.*

Nuovo dato - **Puglia:** Foresta Mercadante (BA), 400 m, 20.XI.1990 (PRN).

Liguria: (1851-1900); 1951-2000; (218); (2648); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (218); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Lazio:** 1951-2000; (2143); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3156); **Puglia:** 1976-2000; (2230); **Basilicata:** 1976-2000; (3467).

2049. - ***Lithomoia solidaginis*** **(Hübner, 1803)**

Trentino: 1926-1950; (1320); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2373).

2050. - ***Xylena exsoleta*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 21-25.III.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2373); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2373); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2373); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (410); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (262); (1577); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (19); (3462); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2643); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1161); (2536); **Puglia:** 1976-2000; (2230); (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; (421); **Sardegna:** 1901-2000; (818);

2051. - ***Xylena vetusta*** **(Hübner, 1813)**

Nota - La citazione per la **Liguria** probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo. La citazione per la **Sardegna:** (218) è molto dubbia. La **Sicilia** è coperta nella cartina (3253); non si hanno altri dati.

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; (188); (736); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2373); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1926-1950); (1388); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2373).

2052. - ***Orbona fragariae*** **(Vieweg, 1790)**

Nota - Sarebbe stata descritta *Noctua orbona* Rossi, 1794, sinonimo di *O. fragariae*, secondo (42), ma Rossi in (24) cita *Noctua orbona* Fabricius, che è sinonimo di *N. comes*; pertanto le citazioni di *Orbona fragariae* per la **Toscana:** in (42), (218), (344), (1388), (1943), si riferiscono a *Noctua comes*.

Nuovo dato - **Trentino:** Mattarello ex ovo 10.IX.1983 (GRL).

Piemonte: 1851-1925; 1976-2000; (114 bis); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528).

2053. - ***Eupsilia transversa*** **(Hufnagel, 1766)** (= *satellitia* Linnaeus, 1767)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1951-2005; (1551); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2346); **Toscana:** (1751-1800); 1976-2005; (24); (3462); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2373).

2054. - ***Evisa schawerdae*** **Reisser, 1930**

Sardegna: 1951-1975; (2067).

2055. - ***Rileyiana fovea*** **(Treitschke, 1825)**

Nota - Manca in **Piemonte,** la citazione per Sessana (AL) in (2373), va riferita a Sezana nel Carso yugoslavo (2636). Citata dubitativamente per la **Sicilia:** (1388), non presente nell'isola.

Alto Adige: 1926-1975; (1302); (1962); **Veneto:** 1951-1975; (2014); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Lazio:** 1976-2000; (2636).

2056. - ***Dryobota labecula*** **(Esper, 1788)** (= *furva* Esper, 1791; *occlusa* Hübner, 1824)

Phalaena Noctua furva è descritta su esemplari della **Toscana:** Firenze (9*), (2576).

Nota - Non è unico il luogo tipico di *D. labecula* riportato in letteratura: Libano in (2442); dintorni di Leipzig in (2576); Tirolo (Italia) in (2373); Erlangen (Baviera) in (3306); Erlangen è molto improbabile, secondo (3253).

Nuovo dato - **Puglia:** Valenzano (BA) 20.II, 29.XI, 9 e 19.XII.1984 (ADD).

Piemonte: (1851-1900); (2362); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (603); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (9*); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2143); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2819); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (2373); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3316); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (97); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (188); (2587).

2057. - ***Scotochrosta pulla*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata dubitativamente per la **Lombardia:** Valtellina (218). La **Sardegna** è coperta nella cartina (3253); non si hanno altri dati per l'isola.

Nuovo dato - **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 15.IX, 28.IX.1992 (PRN).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (262); (2373); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-1950; (1127); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2075); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2058. - ***Dichonia aeruginea*** **(Hübner, 1808)** (= *mioleuca* Treitschke, 1835)

Hadena mioleuca è descritta su esemplari della **Sicilia** (75).

Nuovi dati - **Puglia:** Foresta Mercadante (BA) XI.1987. **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 1.XI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; Cropani 1.XI.1981; Terranova 1.XI.1981 (PRN).

Alto Adige: 1851-1925; (170); (1053); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (932); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1577); **Romagna:** 1976-2000; (3108); **Toscana:** 1801-1900; 1976-2005; (75); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141);

(2373); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2000; (75); (3254).

2059. - ***Dichonia convergens*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3314); **Umbria:** 1976-2000; (2143); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; (343); (1340).

2060. - ***Dichonia aprilina*** **(Linnaeus, 1758)** (= *runica* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Toscana:** Molinelli 10.X.1981, 18.XI.1988; Pieve a Maiano (AR) 1 e 3.XI.1975, 13.X.1985, 13 e 24.X.1986, 20.XI e 7.XII.1989 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 1.XI.1981; Rotonda 9.XI.1979, 16.XI.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; Cropani 1.XI.1981 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 28.XII.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (2362); (2658); **Trentino:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (298); (1577); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3403); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (357); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1951-1975; (188); (2312).

2061. - **(-)** ***Griposia pinkeri*** **(Kobes, 1973)**

Nota - La citazione di questa specie per la **Sardegna:** (2373) va riferita a *G. aprilina* (2931).

2062. - ***Dryobotodes eremita*** **(Fabricius, 1775)** (= *protea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Toscana:** Arezzo 20.X.1989; Pieve a Maiano (AR) 6.X.1980, 20-21.X.1986 (GRL). **Puglia:** Foresta Mercadante (BA)

1990. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 8.X.1980; Terranova 1.XI.1981; Cropani 1.XI.1981; Rotonda 13.XI.1993. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 10.IX.1979 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 20.X.1994 (SCL).

Valle d'Aosta: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1976-2005; (218); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1797); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (262); (3043); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; (1285); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (357); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1951-2000; (188); (2587).

2063. - ***Dryobotodes monochroma*** **(Esper, 1790)** (= *suberis* Boisduval, 1829)

Phalaena Noctua monochroma è descritta su esemplari della **Toscana**: Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, t. IV, 2° parte: 521-522, Taf. 155, Noct. 76, figg. 3-6) (9*); (3079).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2373); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; (170); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (1787); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2346); (2373); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2829); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (9*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Puglia:** 1976-2000; (2276); **Basilicata:** 1951-2000; (2276); (2373); **Calabria:** 1976-2005; (2276); (3316); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (357); (2907); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-2000; (188); (2587).

2064. - ***Dryobotodes servadeii*** **Parenzan, 1982**

Dryobotodes servadeii è descritta su esemplari della **Puglia:** Monte Camplo (olotipo) e della **Basilicata:** Rotonda, fiume Camastra (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 60 (1981): 279, figg. 1a-h, 3, 5) (2276).

Nota - È riportata per la **Sardegna:** (2587); citazione da verificare (2931).

Puglia: 1951-2000; (2276); (3253); **Basilicata:** 1951-2000; (2276).

2065. - ***Dryobotodes roboris* (Boisduval, 1829)** (= *roboris* Geyer, 1835; *cerris* Boisduval, 1840)

Nota - Le citazioni per l'**Italia**, la **Sicilia** e la **Sardegna** di *D. roboris* sono da riferire a *D. carbonis*. *D. roboris* è presente solo nella **Liguria occidentale**.

Liguria: 1976-2005; (2893); (3314).

2066. - ***Dryobotodes carbonis* (Wagner, 1931)** (= *roboris* auct. nec Geyer, 1835; *cerris* auct. Boisduval, 1840)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.IV, 6.X.1980, 9.X.1985, 23.X.1986 (GRL). **Puglia:** Valenzano 21.XI.1983, 1-13.XI, 9.XII.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 8.X-16.XI.1985, 30.IX-23.X.1986; Cassano Murge 21.X.1980; gravina di Petruscio 26.X.1983: **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980; Rotonda 28.IX.1979, 2.IX, 5.X.1980; Terranova 24.IX, 1.XI.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 4.X, 1.XI.1995 (SCL).

Piemonte: 1976-2005; (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (2362); (2373); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); (603); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (377); (1577); **Romagna:** 1976-2000; (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2893); **Lazio:** 1926-2005; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (2597); (3083); **Sardegna:** (1851-1900); 1951-2000; (188); (2587).

2067. - ***Dryobotodes tenebrosa* (Esper, 1789)** (= *saportae* Duponchel, 1826; *accipitrina* auct. nec Esper, 1796)

Nuovi dati - **Toscana:** Argentario (GR) 20.X.1972; Ansedonia (GR) 23.X.1975, 24.X.1979 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 12.X.1985 (GRL). **Puglia:** Valenzano 12.X.1983, 20.X, 1-8.XI.1984. **Basilicata:** Laghi di Monticchio 30.IX.1991. **Sicilia:** Mandria del Conte 1.X.1994 (PRN). **Sicilia:** Madonie: Mandria del Conte 1.X,1994 (GRL).

Lombardia: 1951-1975; (1656); (1734); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (2373); **Alto Adige:** 1926-1950; 1976-2000; (2373); **Veneto:** 1926-2005; (1656); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Liguria:** (1851-1900); 1926-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2346); **Toscana:** (? 1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (218); (3462);

Arcipelago toscano: 2001-2005; (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (343); (3083); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2068. - ***Antitype chi*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Veneto:** Cortina d'Ampezzo 17.IX.1948; San Vito di Cadore 7.IX.1959 (GLL, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980; Piana San Francesco 24.IX.1981; San Severino 26.IX.1981; Rotonda 5.X.1980; Cropani 26.IX.1981. **Calabria:** Camigliatello: Il Cupone 19.IX.1985 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2373); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (2422°); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2069. - ***Antitype suda*** **(Geyer, 1832)** (= *astfälleri* Schawerda, 1925)

Antitype (Polia) astfälleri è descritta su esemplari dell' **Alto Adige:** Schnalstal 1200 m (1045).

Nuovo dato - **Alto Adige:** Schnalstal, 20.VIII.1925 (AST, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3378); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (2819); **Basilicata:** 1976-2000; (2350).

2070. - ***Antitype jonis*** **(Lederer, 1865)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Piana San Francesco 24.IX.1981; Timpone Castellana 5.X.1980 (PRN).

Liguria: 1976-2000; (2410); **Basilicata:** 1976-2000; (2168).

2071. - ***Ammoconia caecimacula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per la **Puglia:** Pianelle (2168), va riferita ad *A. senex*.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 7 e 10.X.1980, 23.X.1983, 16.X.1987, 17.X.1988 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Terranova

8.X.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2793 bis); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (377); (1551); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2987); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2072. - ***Ammoconia senex*** **(Geyer, 1828)**

Noctua senex è descritta su esemplari dell'**Alto Adige**: Bolzano (Sammlung europäischer Schmetterlinge, Noctuae, 2, Taf. 160, figg. 749, 750) (52*); (3253).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 11.X.1985, 18.X.1986, 14.X.1989 (GRL). **Puglia:** gravina di Petruscio 26.X, 7.XI.1983, 13.XI.1991. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980; Piano Ruggio 22.VII.1979; Terranova 1.XI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1801-1925; 1951-1975; (52*); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (341); (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (687); (2346); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1926-2005; (1127); (3268); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2000; (1127); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206); (2232); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (343); (3254).

2073. - ***Ammopolia witzenmanni*** **(Standfuss, 1890)**

Toscana: 1951-1975; 2001-2005; (2075); (3428); **Lazio:** 1976-2005; (3268); (3403); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2575); **Sicilia:** 1976-2000; (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (744); (2587).

2074. - ***Trigonophora flammea*** **(Esper, 1785)** (= *empyrea* Hübner, 1803)

(Phalaena) Bombyx flammea è descritta su esemplari dell'**Italia meridionale** (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, 3: 269, Taf. 53, fig. 3) (9*); (3079). *Noctua empyrea* è descritta su esemplari di **Italia** (23*); (41).

Nuovi dati - **Liguria:** Caprieto di Vobbia 24.IX.1977 (BER, PRN). **Toscana:** Argentario (GR) 20.X.1962; Ansedonia (GR), 19-20.X.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 3.XI.1975, 9.X.1980, 19 e 23.X.1986 (GRL). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 30.VII.1985 (SNN); Serino (AV) 27.X.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 24.X-4.XII.1985; gravina di Petruscio 26.X.1983. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 3.XI.1980; Monticchio Laghi 30.IX.1983; Pollino: Timpone Castellana 25.IX.1981; Piana San Francesco 24.IX.1981; Cropani 26.IX.1981 (PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 14.X.1985 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (424); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (? 1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1801-1850; 1951-2005; (75); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2729); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2005; (343); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2075. - ***Aporophyla australis*** **(Boisduval, 1829)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.X.1972 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 7.X.1980, 18.X.1986 (GRL). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 8.X-16.XI.1985; Locorotondo 5.VII.1994; San Paolo 8.X.1973; gravina di Riggio 12.XI.1989; gravina di Petruscio 26.X.1983 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 2.XI.1984, 10.XI.1987; Gallipoli (LE) 16.XI.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: Cropani 1.XI.1981. **Calabria:** Sersale (CZ) 14.X.1985 (PRN). **Sardegna:** Sangonis 11.X.1971; Musei (CA) 26.X.1972 (var. morosa Bell.); Belvì (NU) 11.X.1971 (PRN).

Lombardia: 1976-2000; (2373); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (2410); **Emilia:** 1976-2000; (2373); **Toscana:** 1951-2005; (2168); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2373); **Marche:**

1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-2000; (632); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2141); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3316); **Sicilia:** 1851-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

2076. - ***Aporophyla chioleuca*** **(Herrich-Schäffer, 1850)** (= *mioleuca* Treitschke, 1901)

Nota - *A. chioleuca* è citata per l'**Italia centrale** (448) e la **Toscana:** (1388), per la errata attribuzione a *chioleuca* H.-S. di *chioleuca* Treitschke, 1835, che è in realtà sinonimo di *Dichonia aeruginea*, come indicato in (2576).

Sicilia: (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (586); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2077. - ***Aporophyla lutulenta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - In **Italia** è presente solo *A. lueneburgensis*, cui vanno riferite anche le citazioni di *A. lutulenta* (3253). "Le segnalazioni di *A. lueneburgensis* in **Italia centrale, meridionale** ed in **Sicilia** (529), (2802), vanno riconsiderate criticamente, dal momento che la specie è un'entità vicariante ecologicamente di *A. lutulenta* nelle tipiche brughiere a *Calluna vulgaris* dell'Europa atlantica. *Calluna vulgaris* è anche la pianta alimentare di *lueneburgensis* e risulta assente in Italia a sud dell'Umbria" (3463). Peraltro, il fenotipo degli individui dell'**Italia meridionale** ed i genitali degli individui considerati "*lueneburgensis*" sono diversi da quelli illustrati in (3253), simili a quelli illustrati in (2373). In attesa di ulteriori verifiche si riportano separatamente le segnalazioni di *A. lueneburgensis* e *A. lutulenta* per l'Italia.

Nuovi dati - **Toscana:** Poti (AR) 5.X.1989 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980; Piana San Francesco 24.IX.1981; Lago Duglia 24.IX.1981; Rotonda 28.IX, 20.X.1979, 2.IX, 5.X.1980; Terranova 24.IX.1981. **Calabria:** Camigliatello: Il Cupone 19.IX.1985 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1089); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2005; (1053); (3380); **Veneto:** 1926-2000; (1681); (2373); **Friuli:** 1901-1925; 1951-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2373); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (893); (3043); **Romagna:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (990); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2005;

(344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (2041); (2373).

2078. - ***Aporophyla lueneburgensis*** **(Freyer, 1848)**

Nota - In **Italia** è presente solo *A. lueneburgensis* secondo (3253). La citazione di *A. lueneburgensis* per la **Romagna** (1885), ad un esame a vista degli esemplari, andrebbe riferita a *A. lutulenta* (2516).

Piemonte: 1976-2005; (3378); **Emilia:** 1901-1925; 2001-2005; (893); (3301); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1976-2005; (2373); (3428); **Basilicata:** 1976-2000; (3273); (3298); **Sicilia:** 1901-1950; (529); (1340).

2079. - ***Aporophyla nigra*** **(Haworth, 1809)** (= *aethiops* Treitschke, 1825)

Nota - È citata per il **Tirolo meridionale** (1053). Un esemplare etichettato Bozen è nella collezione Dannehl (1038); "l'esemplare citato da Kitschelt dalla ex-collezione Dannehl si basa sulla confusione di etichette di località" (1184).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 24.X.1963, 23.X.1965 (DBR, PRN). **Lazio:** Oriolo 29.IX.1984 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 1.XII.1983, 8.XI, 6.XII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Bari 22.XI.1993; Valenzano 3.XI.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 8.X-16.XI.1985, 21.XI-4.XII.1986 (PRN); Gallipoli (LE) 16.XI.1986; Gallipoli (LE): Baia Verde 10 e 28.XI.1987 (PRT, PRN). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 3.XI.1980; Pollino: Piana San Francesco 24.IX.1981; Piano Ruggio 14.IX.1979 (PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 19.X.1985 (RTN, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2373); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (2373); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (2373); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (631); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1551); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** (1751-1800); 1801-1850; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1285); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (144); (3254); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-2000; (114); (2587).

2080. - ***Aporophyla canescens*** **(Duponchel, 1826)** (= *pumicosa* Geyer, 1832)

Noctua pumicosa è descritta su esemplari della **Sicilia** (52*), (2576).

Nota - È citata per il **Tirolo meridionale** (157), (170); non è presente nella regione (1038).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 18.X.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 20.IX.1976, 6.X.1980, 19.IX.1982, 15.X.1987, 26.VII.1988; Poti (AR) 5.X.1989 (GRL). **Puglia:** Foresta Mercadante XI.1987; Valenzano 1-3.XI.1984; Putignano (BA): bosco Petruzzi 24.X.1986; gravina di Riggio 22.X.1990; gravina di Laterza (TA) 29.IX.1982 (PRN); Gallipoli (LE) 16.XI.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 21-25.X.1992; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979, 5.X.1980; San Severino 16.IX.1979; Terranova 24.IX.1981, 11.X.1983; Rotonda 14-29.IX.1979, 2 E 9.IX, 5.X.1980. **Calabria:** Sersale (CZ) 3 e 14.X.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; (621); **Veneto:** 1926-1950; (1681); (1734); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (603); (1060); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (622); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (1004); (3043); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2484); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (218); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3052); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3316); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (52*); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (88); (2587).

2081. - ***Dasypolia templi*** **(Thunberg, 1792)** (= *alpina* Rogenhofer, 1866; *banghaasi* Turati, 1909)

Dasypolia banghaasi è descritta su esemplari della **Sicilia:** Ficuzza (622).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); (3073); **Trentino:** 1976-2000; (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (424); (2373); **Veneto:** 1976-2000; (2373); **Lazio:** 1901-1925; 1976-2000; (622); (2465); **Abruzzo:** 1926-2000; (1207); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Basilicata:** 1951-2000; (1839); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (1839); (2373); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (3254).

2082. - ***Dasypolia ferdinandi*** **Rühl, 1892**

Dasypolia ferdinandi è descritta su esemplari della **Lombardia:** "monte Bormiense" (380 bis).

Nota - La descrizione in latino è riportata anche tradotta in tedesco ed il monte Bormiense diventa Stilfser Joch, cioè il passo dello Stelvio; la precisazione che si tratta del monte Bormiense, cioè di Bormio, indica che il luogo tipico è in **Lombardia**, e non in Svizzera, come riportato in (3253). La citazione per l'**Alto Adige**: Stilfserjoche di *D. ferdinandi* Rühl (in Soc. Ent., VI, p. 169), va riferita a *Spintherops hirsuta* (424). L'interpretazione di Rebel è errata sia per la identificazione che per la località.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Lombardia:**1851-1900; (380 bis)..

2083. - ***Polymixis polymita*** **(Linnaeus, 1761)** (= *viridiobscura* Goeze, 1781)

Nota - È citata per la **Toscana:** Passo dei Mandrioli (AR) (2373); gli esemplari della collezione Fiori sono etichettati: Fiumalbo, località Mandriole (MO) (**Emilia)** e non Passo dei Mandrioli (3429).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2373); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2373); **Alto Adige:** 1851-1925; 1976-2000; (170); (2373); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2373); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (893); (2373); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3305); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3254).

2084. - ***Polymixis lichenea*** **(Hübner, 1813)** (= *viridicincta* Freyer, 1831)

Nota - La cattura in **Alto Adige:** Bad Ratzes (157); è accidentale (1038).

Liguria: 1901-1925; (622); **Abruzzo:** 1901-2000; (622); (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (75); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (781); (2373).

2085. - ***Polymixis xanthomista*** **(Hübner, 1819)** (= *nigrocincta* Treitschke, 1825)

Nota - È citata con dubbio per la **Sardegna:** (2980).

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 5.X.1980; Piana San Francesco 24.IX.1981; Terranova 8.X.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (2362); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (2373); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2005; (218); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (314); (2373); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2373); **Calabria:**

1976-2000; (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3254).

2086. - ***Polymixis serpentina*** **(Treitschke, 1825)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria** va confermata.

Nuovo dato - **Toscana:** Ansedonia (GR) 23.X.1965 (DBR, PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII.1985 (RTN, PRN).

Piemonte: 1976-2000; (2373); **Liguria:** (1926-1950); (1328); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2484); **Toscana:** 1951-2000; (2272); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2373); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (2141); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1976-2000; (3083).

2087. - ***Polymixis argillaceago*** **(Hübner, 1822)** (= *venusta* Boisduval, 1840)

Piemonte: 1901-1925; 1976-2005; (910); (3461 bis); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (553); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1551); (1577); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (677); (3310); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1976-2000; (2141); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819).

2088. - ***Polymixis rufocincta*** **(Geyer, 1828)** (= *farinosa* Freyer, 1848)

Nota - È chiarito che in **Sicilia** è presente la ssp. *enceladaea* Turati, 1909 e che *Polia calvescens* Boisduval, 1840 (88), è sinonimo di *P. sublutea* (2889). L'attribuzione delle popolazioni della **Sicilia** alla ssp. *calvescens* Boisduval, 1840 (= *enceladea* Turati, 1909) (3253) è errata.

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 31.XII.1965 (DBR, PRN); Arezzo 27.XI.1988, 23.XI.1989; Molinelli 7.XI.1985, 8.II, 14.XI.1986, 4.XII.1988; Olmi 10.XI.1986 (GRL). **Puglia:** (ssp. mucida Gn.) Putignano (BA): Bosco Petruzzi 28.X-16.XI.1985, 21.XI-4.XII.1996, 15.XI-14.XII.1987; (ssp. mucida Gn.) Foresta Mercadante XI.1987; Valenzano 1-13.XI.1984; gravina di Petruscio 7 e 22.XI.1983, 2 e 24.I.1992 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 20.XII.1984 (PRT, PRN). **Basilicata:** fiume Camastra 30.X.1975; Pollino: Timpone Castellana 9.XI.1979, 13.XI.1985; Lago Duglia 18.XI.1983; Rotonda 9.XI, 20.X.1979, 16.XI.1980, 20.X.1981, 13.XI.1982; Terranova 1.XI.1981 (PRN). **Sardegna:** Sangonis 30.X.1976; Belvì (NU) 13.XI.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:**

1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3020); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1976-2000; (603); (2373); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (2373); **Toscana:** 1951-2005; (2272); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2373); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2373); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3316); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (144); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (1589); (2373).

2089. - ***Polymixis flavicincta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *dysodea* Esper, 1790; *aurantiomaculata* Goeze, 1781; *lajonquierei* Boursin, 1963)

Nota - Tutte le "*flavicincta*" esaminate sono risultate essere altra specie, o *P. rufocincta* o *P. sublutea* (2889). Le citazioni di *P. flavicincta* per **Emilia, Romagna, Marche, Lazio** e **Abruzzo** vanno riferite a *P. rufocincta* (2516). Le citazioni di *P. flavicincta* per **Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Basilicata** e **Calabria:** sono dubbie; la presenza di *P. flavicincta* è accertata solo per l'**Arcipelago toscano:** Isola di Montecristo e la **Sardegna:** (2889). La citazione per l'**Arcipelago sardo:** Isola di Capraia (2768) va riferita a *P. rufocincta*.

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2889); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-2000; (188); (2587).

2090. - ***Polymixis sublutea*** **(Turati, 1909)** (= *calvescens* Boisduval, 1840)

Polia calvescens è descritta su esemplari di **Sicilia** (88).

Nota - *Polia calvescens* è sinonimo di *P. sublutea* (2889).

Sicilia: (1801-1850); 1851-2000; (88); (3253).

2091. - ***Polymixis dubia*** **(Duponchel, 1836)** (= *caerulescens* Boisduval, 1840)

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (553) va confermata (3253).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Liguria:** 1901-1950; 1976-2000; (622); (3183); **Abruzzo:** 1951-1975; (2141).

2092. - **(-)** ***Polymixis bischoffi*** **(Herrich-Schäffer, 1850)**

Nota - La *Agrotis bischoffi* di Italia e **Sicilia:** illustrata da Culot (631) è in realtà *Yigoga forcipula lithargyrula* (2687).

2093. - ***Mniotype adusta*** **(Esper, 1790)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983. **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 22.VII.1979, 20.VI.1982; sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980, 3.VI.1981; Lago Duglia 6.V.1981; Timpone Castellana 17.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (689); (2373); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (239); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (2410); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; (110); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1788); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2373); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Sardegna:** 1951-1975; (1975).

2094. - ***Mniotype anilis*** **(Boisduval, 1840)**

Nota - Le citazioni per la **Valle d'Aosta** e l'**Emilia** sono dubbie, da confermare.

Nuovi dati - **Abruzzo:** Forme (AQ) 1150 m 20.VII.1988 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 17.VII.1980, 9.V.1981; sorgente Acquafredda 3.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; (581); **Emilia:** (1926-1950); (1388); **Toscana:** 1976-2000; (3190); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sardegna:** 1951-1975; (3253).

2095. - ***Mniotype spinosa*** **(Chrétien, 1911)**

Nuovo dato - **Sardegna:** Oristano, larve su Carciofo IX-X.1996 (Ortu in litt.).

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2373); **Sardegna:** 1801-1850; 1926-2000; (114); (2587).

2096. - **(?) Mniotype vallei Berio, 1993**

Mniotype vallei è descritta su esemplari dell'**Arcipelago toscano:** Isola di Capraia (LI) (olotipo) (Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi", Bergamo, 16: 158, figg. 3, 6H) (2768).

Nota - "Berio (in stampa) descrive una nuova specie dell'Isola di Capraia che, in base alle figure del manoscritto, appare rientrare nel campo di variabilità di *Mniotype solieri* (Boisduval, 1840)" (2931).

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2768).

2097. - ***Mniotype solieri*** **(Boisduval, 1840)** (= *melanomorpha* Turati, 1921)

Hadena solieri è descritta su esemplari di Francia meridionale e **Sicilia** (Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 120) (88).

Nota - Le citazioni di *M. solieri* per la **Sardegna** vanno riferite a *M. spinosa*.

Nuovi dati - **Veneto:** Padova 4.XI.1973; Dolomiti: Cortina 12.VII.1979 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.X.1962, 5.X.1965; Argentario (GR) 20.X.1962 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 21.IX.1976, 7.X.1980, 19-21.IX.1982, 21.IX.1984 (GRL); Montepulciano (SI) 10.IX.1975 (PRN). **Lazio:** Roma 1.XI.1956 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 30.X.1983, 25.X, 8.XI.1984; Roccadaspide (SA) 8.XI.1984; Serino (AV) 16 e 22.IX, 27.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 12-16.VII, 16.X.1985 (SNN). **Puglia:** Foggia 10.VII.1980; Bari: Campus 1-5.X.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 22.IX-31.X.1985; gravina di Petruscio 26.X.1983, 13.XI.1991; Caprarica (LE) 4.IX.1990 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 12.X, 16.XI.1986, 19.X.1987; Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 19.X.1986; Pollino: Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979; Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN); Oriolo 29.IX.1984 (GRL); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 6.X.1994; Copanello (RC) 100 m 15.IV.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; (2040); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (765); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (544); (1551); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (514); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1851-1900; 1951-2000; (207); (2940); **Arcipelago campano:** 1901-1925; 1976-2000; (502 (2511); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2729); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (88); (3254).

2098. - ***Mniotype satura*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *porphyrea* Esper, 1789; *amicissima* Bryk, 1948)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 5.X.1968 (GLL, PRN). **Marche:** Valcaldara 1000 m 22.IX.1979 (leg. Trolese, PRN).

Piemonte: (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:**

1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2373); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (687); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2373); **Lazio:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Sardegna:** 1976-2000; (2373).

2099. - ***Episema grueneri* Boisduval, 1837**

Nota - È citata per il **Piemonte**: Ozzano (Monferrato, AL) (660), dato dubbio. Per l'Italia nella cartina in (3253) sono coperte solo le regioni centro-meridionali tirreniche, dal **Lazio** alla **Calabria.**

Emilia: 1901-1925; (687); **Lazio:** 1976-2000; (2373); **Puglia:** 1976-2000; (2373); (2800); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; (88); (1340); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (1975).

2100. - ***Episema glaucina* (Esper, 1789)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 23.IX.1968 (GLL, PRN), **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.X.1962 (DBR, PRN); Arezzo 22.IX, 2 e 10.X.1989; Pieve a Maiano (AR) 10.X.1980, 29.IX.1985, 10.X.1988, 29.IX.1989 (GRL). **Puglia:** Palazzo d'Ascoli Satriano 4.X.1985; Valenzano 13.X.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 3-28.X.1985, 11-17.X.1987; gravina di Riggio 22.X, 12.XI.1989; gravina di Petruscio 26.X.1983. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Rotonda 16 e 28.IX.1979; San Severino 15.IX.1979; Terranova 24.IX, 1.XI.1981. **Sardegna:** Belvì (NU) 6.X.1975 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1801-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1184); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (760); (1060); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (631); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (377); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (554); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1926-2000; (1127); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2101. - ***Episema tersa* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *trimacula* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - "La identificazione delle specie appartenenti a questo genere è resa difficoltosa dall'estrema variabilità fenotipica degli esemplari e

dalle modeste differenze presenti a livello degli apparati copulatori. In seguito ad un lavoro di Boursin (1951), venne esclusa la presenza di *E. tersa* in **Italia**; tuttavia, Hacker & Weigert (1986), Poole (1989) e Parenzan & Porcelli (1993) hanno successivamente confermato la specie per la fauna italiana. Per quanto riguarda le segnalazioni di *E. grueneri*, la situazione appare complessa sul piano tassonomico, dal momento che i presunti esemplari italiani del taxon si discostano alquanto da quelli iberici, ritenuti caratteristici della specie da tutti gli autori nonostante Boisduval (1840. Genera et Index methodicus europaeorum Lepidopterorum) avesse indicato nella **Sicilia** la località tipica di *grueneri"* (2931). *E. tersa* manca in **Italia** e **Sicilia** nella cartina, ma *Derthisa culoti* Ragusa, descritta su esemplari di **Sicilia,** è sinonimo di *E. tersa* (3253). Le citazioni per la **Sardegna:** (1024), (894) vanno riferite a *E. glaucina*. Le citazioni per l'**Emilia** come *E. glaucina tersina* Stgr. (893), (1004) e come *E. trimacula* (894), probabilmente vanno riferite a *E. glaucina*.

Lombardia: 1901-1925; (894); **Alto Adige:** 1926-1950; (1184); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Toscana:** 1951-1975; (2800); **Umbria:** 1901-1925; (894); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); (3298); **Calabria:** 2001-2005; (3401); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (506); (3254).

2102. - ***Cleoceris scoriacea* (Esper, 1789)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 2.X.1965 (DBR, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 16-30.IX, 21-25.X.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Trentino:** 1926-1950; (1320); **Liguria:** 1976-2000; (2373); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (544); (3043); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1951-2005; (2272); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2195); (2350).

2103. - ***Leucochlaena oditis* (Hübner, 1822)** (= *hispida* auct. nec Geyer, 1832)

Nota - In **Sardegna** sono presenti sia *L. turatii* che *L. oditis* ed è presente anche in **Italia** nel testo, ma non nella cartina (3253). La citazione per la **Venezia Giulia:** (1060) è dubbia. Le identificazioni riportate in letteratura vanno verificate.

Liguria: 1801-1850; 1951-2000; (114); (3183); **Toscana:** 1951-2000; (2968); **Lazio:** 1926-1950; 1976-2000; (1085); (2373); **Calabria:** 1976-2000; (2373); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3083); **Sardegna:** 1901-1925; 1976-2000; (781); (2373).

2104. - ***Leucochlaena turatii*** **(Schawerda, 1931)**

Nota - Le citazioni di *L. turatii* per il **Lazio,** la **Calabria** e la **Sicilia:** sono da riferire a *L. oditis* (2931), (3253).

Sardegna: 1901-1975; (1303); (3253).

2105. - ***Leucochlaena seposita*** **Turati, 1919**

Leucochlaena seposita è descritta su esemplari della **Sicilia**: Nicolosi (Etna), 1000 m (Il Naturalista Siciliano, 23: 291, Tav. IV, fig. 18-19) (894).

Nota - La citazione di *E. seposita* per la **Toscana:** (2968) probabilmente va riferita a *L. oditis.*

Puglia: 1976-2000; (2800); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2000; (894); (2373); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (894); (3253).

2106. - ***Ulochlaena hirta*** **(Hübner, 1813)**

Nuovo dato - **Puglia:** Foresta Mercadante XI.1987 (PRN).

Abruzzo: 1951-2000; (1821); (3253); **Puglia:** 1951-2000; (2075); (2800); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (343); (3254).

2107. - ***Valeria oleagina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 22 e 29.III.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Fiume Lato 10.II.1992 (NRD). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981; Rotonda 27.III.198, 19.IV.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1926-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1976-2000; (603); (2373); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1926-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1951-2005; (2168); (3428); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2373); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2195); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); **Sardegna:** 1951-1975; (2041); (2312).

2108. - ***Valeria jaspidea*** **(Villers, 1789)**

Alto Adige: 1901-1925; (1038); **Liguria:** 1976-2000; (2373); (3314).

2109. - ***Meganephria bimaculosa*** **(Linnaeus, 1767)** (= *italica* Esper, 1791)

Phalaena Noctua bimaculosa var. *italica* è descritta su esemplari della

Toscana: dintorni di Firenze) (9*), (2576). *Phalaena Noctua binubeculosa* è descritta su esemplari della **Toscana:** Firenze, illustrata come *italica* nel 1791 (9*) (3079).

Nuovi dati - **Lazio:** Olgiata (RM) 8.X.1964, 9.X.1975 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1951-1975; (1787); (2014); **Alto Adige:** 1901-1975; (624); (1734); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (2014); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2643); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (9*); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1976-2000; (2987).

2110. - ***Allophyes oxyacanthae*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per **Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia** e **Sardegna** vanno riferite a *A. corsica* ssp. *parenzani* De Laever (3253).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (566); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (2184); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429).

2111. - ***Allophyes corsica*** **(Spuler, 1905)** (= *parenzani* De Laever, 1976; *oxyacanthae* auct.)

Allophyes protai è descritta su esemplari della **Sardegna:** Tempio Pausania (1793). *Allophyes protai* ssp. *parenzani* è descritta su esemplari della **Basilicata:** Camastra (2062).

Nuovi dati - **Puglia:** Gargano: San Giovanni Rotondo 22.X.1985; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 28.X-30.XI.1985, 21.XI-4.XII.1996, 15.XI-22.XII.1987. **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 1.XI.1981; Piana San Francesco 24.IX.1981; Rotonda 16.XI.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; fiume Mercure 2.XI.1981; Terranova 1.XI.1981 (PRN).

Toscana: 1976-2005; (2447); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2366); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; (1285); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1951-2000; (1976); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (1976); (3253); **Sicilia:** 1851-1900;

1926-1950; 1976-2000; (360); (3254); **Sardegna:** 1926-2000; (781); (2373).

2112. - ***Stilbia anomala*** **(Haworth, 1812)**

Nota - "Si ritiene che la *S. anomala* citata per la **Toscana** da Stefanelli (184) sia in realtà *S. faillae*" (687). In **Sicilia** sono presenti sia *S. faillae* che *S. calberlae* ma non *S. anomala* (712). *S. insularis,* considerata sinonimo di *S. anomala* in (2576), è sinonimo di *S. faillae*.

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Venosa 20.IX.1983 (PRN).

Liguria: 1951-2000; (2410); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Campania:** 1926-1950; (1183); **Basilicata:** 1951-1975; (2168).

2113. - ***Stilbia calberlae*** **(Failla-Tedaldi, 1890)**

Caradrina calberlae è descritta su un esemplare della **Sicilia**: Castelbuono (Il Naturalista Siciliano, 10 (2-3): 29, Tav. 1, Fig. 4) (360).

Sicilia: 1851-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2114. - ***Stilbia faillae*** **Püngeler, 1891** (= *sicula* Staudinger, 1892; *insularis* Fuchs, 1903)

Stilbia faillae è descritta su esemplari della **Sicilia**: Madonie (Il Naturalista Siciliano, 11 (2-3): 18) (369). *Stilbia insularis* è descritta su esemplari di **Sicilia:** (463). *Praestilbia armeniaca* v. *sicula* è descritta su esemplari della **Sicilia:** Palermo (384).

Nuovi dati - **Campania:** Serino (AV) 22.IX.1984 (1m) (RTN, PRN). **Basilicata:** Pollino: Terranova 8.X.1983 (PRN). **Calabria:** Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Piemonte: 1901-1925; (712); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (688); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (184); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (712); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (712); **Arcipelago campano:** 1926-1950; 1976-2000; (1207); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (384); (3254).

2115. - **(-)** ***Praestilbia armeniaca*** **Staudinger, 1892)**

Nota - Le citazioni per la **Liguria:** (1388) e la **Sicilia:** (343) vanno riferite a altre specie. Non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2116. - ***Xylocampa areola*** **(Esper, 1789)** (= *lithoriza* Borkhausen, 1792)

Phalaena Noctua areola è descritta su esemplari della **Toscana**:

Firenze (Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, IV (2), 448, Taf. 141, fig. 4) (9*); (3079).

Nota - Le citazioni di *X. areola* per **Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria** e **Sicilia** vanno riferite a *X. mustapha italica* Parenzan (2275).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2654); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Alto Adige:** (1901-1925); (1053); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (687); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (9*); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Sardegna:** 1951-2000; (2066); (2587).

2117. - ***Xylocampa mustapha*** **(Oberthür, 1910)**

Xylocampa mustapha ssp. *italica* è descritta su esemplari di **Basilicata**: Camastra (olotipo), **Puglia**, **Lazio** e **Umbria** (2275).

Nuovi dati - **Toscana:** Argentario (GR) 16.IV.1963; Ansedonia (GR) 1.I.1966 (DBR, PRN); Bagni di Lucca (LU) 1979 (PRN),

Toscana: 1951-2000; (2143); (2373); **Umbria:** 1951-1975; (2143); (2275); **Lazio:** 1951-2000; (2275); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2275); **Basilicata:** 1976-2000; (2275); (3253); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (310); (3253).

2118. - ***Euxoa temera*** **(Hübner, 1808)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Valle di Susa: Argentera 1700 m 11.VIII.1982 (CMC, PRN). **Puglia:** Foggia 1994; Pulo di Altamura 26.IX.1982; Bari: Campus 1-5.X.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 18.IX, 8-13.X.1985, 17-19.IX.1996; gravina di Petruscio 26.VIII.1991; gravina di Laterza (TA) 18-28.IX.1992 (+ f. ruris Hb.); gravina di Riggio 19.IX, 29.IX.1991; Parabita (LE) 16.IX.1986. **Basilicata:** Vulture (PZ): Laghi di Monticchio 30.IX.1983; Pollino: San Severino 15.IX.1979; Piana San Francesco 24.IX.1981; Terranova 24.IX.1981; Rotonda 26.VII.1979, 29.VI.1981; Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 1-5.IX.1992 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; (765); (1734); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (377); (3043); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1926-1950); 1976-2005; (1380); (3429); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** (1926-1950); 1951-2000; (1380); (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3044); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; (890); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2940); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:**

1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (2597); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-2000; (218); (2587).

2119. - ***Euxoa conspicua*** **(Hübner, 1827)** (= *agricola* Boisduval, 1829)

Nota - La citazione per **Liguria:** Colle di Tenda (114) va riferita al **Piemonte.** La citazione per l'**Alto Adige:** Passeier (273) è dubbia. La citazione generica per la **Calabria** va confermata..

Nuovo dato - **Basilicata**: Cristo di Maratea (PZ), 650 m, 10.IX.1991 (leg. Hausmann, coll. Z.S.M.) (Zilli in litt.).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Basilicata:** 1976-2000; (3182); **Calabria:** (1976-2000); (3182).

2120. - **(-)** ***Euxoa cursoria*** **(Hufnagel, 1766)** (= *mixta* Fabricius, 1794)

Noctua mixta è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (2756).

Nota - Probabilmente il luogo tipico non appartiene più al nostro territorio. Le citazioni di *E. cursoria* per il **Lazio** e l'**Abruzzo** vanno riferite a *E. cos* (2931). Allo ZSM sono conservati esemplari di **Abruzzo**: Avezzano, della coll. Dannehl, ma ecologicamente tale dato non può essere valido (Zilli in litt.).

2121. - ***Euxoa birivia*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La citazione per le **Marche** è poco attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (807); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (366); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (2717); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1975; (114); (1693); **Romagna:** 1976-2000; (2717); **Toscana:** 1976-2000; (3190); **Marche:** 1851-1900; (385).

2122. - ***Euxoa distinguenda*** **(Lederer, 1857)**

Nota - Non sono note segnalazioni certe per la penisola (2931). Si riportano i dati bibliografici e un Nuovo dato, precisando che i dati per la penisola e la **Sicilia** vanno verificati (Zilli in litt.).

Nuovi dati - **Alto Adige:** Val Venosta (Vinschgau), 700 m, 15.IX.1929 (AST, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano: Ponte Cagnolino, 100 m, 15-20.IX.1992 (Fibiger det.) (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1976-2000; (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1033); (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; (1038); (1734); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 2001-2005; (3471); **Liguria:** 1926-1950; (1445); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-1950; (1085); **Abruzzo:** 2001-2005;

(3460); **Basilicata:** 1976-2000; (3467): **Calabria:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1384); (3254).

2123. - ***Euxoa vitta*** **(Esper, 1789)**

Nota - Le citazioni per la **Liguria:** (114) e l'**Emilia:** (110) non sono attendibili. La **Puglia settentrionale** (Gargano) è inclusa nell'areale illustrato in (2605), che copre tutta l'**Italia settentrionale** e **centrale**. Nella cartina in (2753) sono indicate per la **Puglia** una località costiera presso Manfredonia e per la **Sardegna** una località nell'area del Gennargentu. Segnalazioni da confermare. "Tutti gli individui che ho visto così determinati al di fuori delle Alpi erano altre specie, inclusi alcuni esemplari dell'**Emilia** determinati da Fiori" (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 2001-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1926-1950; (1320); **Alto Adige:** 1901-2005; (812); (3388).

2124. - ***Euxoa obelisca*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - Le citazioni per la **Venezia Giulia** sono da confermare. In (3460) non è indicata per la regione. Le citazioni per la **Sardegna** sono da riferire a *E. corsicola.*

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1975; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (893); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1901-1925; (990); **Basilicata:** 1901-1925; 1976-2000; (990); (2350); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (343); (3254).

2125. - ***Euxoa corsicola*** **Corti, 1928**

Nota - *E. corsicola* è sinonimo di *obelisca* (2576); ssp. di *obelisca* (2066), (3018); buona specie (2452), (2605), (2931), (2980); è specie valida in (3459). Ci atteniamo all'ultima opinione.

Sardegna: 1926-1975; (1260); (2587).

2126. - ***Euxoa eruta*** **(Hübner, 1827)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979. **Calabria:** Aspromonte: Gambarie (RC) 9.VIII.1971; foce torrente Coserie 4.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:**

(1901-1925); 1951-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** (1901-1925); 1951-1975; (1038); (1958); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1976-2000; (2141); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 2001-2005; (3460).

2127. - ***Euxoa nigrofusca*** **(Esper, 1788)** (= *tritici* Linnaeus, 1761)

Nota - "Secondo alcuni autori si tratterebbe di più specie gemelle frammiste, fra le quali *Euxoa crypta* (Dadd, 1927)" (2931). *E. nigrofusca* (Esper) è il nome valido e *tritici* suo sinonimo (Zilli in litt.).

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980; Fiume Sarmento 7.VI.1981. **Calabria:** foce torrente Coserie 4.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1950; (1038); (1053); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1081); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1850; (367); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (262); (2346); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; (678); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2141); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3460); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2141); **Molise:** 1851-1900; (421); **Puglia:** 1851-1900; 1951-2000; (421); (2938); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2005; (2597); (3460); **Sardegna:** 1851-1900; 1926-2000; (1169); (2587).

2128. - ***Euxoa segnilis*** **(Duponchel, 1836)**

Nota - La citazione generica per il **Piemonte:** (797) non è attendibile. Esemplari di *Euxoa segnilis* della **Sicilia** sono presenti in coll. Grillo e/o Mariani (Zilli in litt.).

Emilia: 1976-2000; (2516); (2605); **Romagna:** 1976-2000; (2829); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3462); **Marche:** 1951-1975; (1575); (2085); **Lazio:** 1976-2005; (3268); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (3268); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** (1976-2000); (2931); (2980); **Sardegna:** 1976-2000; (2587).

2129. - ***Euxoa nigricans*** **(Linnaeus, 1761)** (= *fumosa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata per l'**Arcipelago toscano**: Isola di Capraia (2768); gli esemplari di *E. nigricans* dell'Isola di Capraia conservati a Bergamo sono in realtà *Agrotis trux* (3322).

Nuovi dati - **Veneto:** Dolomiti: Cortina 1200 m 23.VIII.1952, 26.VIII.1956. **Abruzzo:** San Potito 6-16.IX.1958, 31.VIII.1959 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (171); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (446); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (377); (1004); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1951-1975; (2168); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2907); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (781); (2587).

2130. - ***Euxoa cos*** **(Hübner, 1824)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Terranova 10-15.VIII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-1975; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787): (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (840); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (566); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (603); (935); **Liguria:** 1926-1950; 1976-2000; (1445); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (688); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2950); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3044); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2143); **Abruzzo:** 1901-2000; (890); (2422°); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2907).

2131. - ***Euxoa aquilina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - La specie è presente in **Sardegna** con popolazioni ben differenziate che sono state distinte come ssp. *falleri* Schawerda, 1927 (2931). Le citazioni per la **Sicilia**, sono da confermare.

Nuovi dati - **Alto Adige:** Val Venosta (Vinschgau), 700 m, 15.IX.1929 (AST, PRN). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 30.IX.1995. **Sardegna:** Gennargentu: Desulo 25.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** 1951-1975; (1659); **Emilia:** 1901-1950; (687); (1235); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (678); (3310); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (421); (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1900;

(1340); (2597); **Sardegna:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (218); (1303).

2132. - ***Euxoa hastifera*** **(Donzel, 1847)** (= *ambrosiana* Boursin, 1927)

Nota - È citata per la **Sardegna:** (2587), ma gli esemplari sono risultati appartenere ad altri taxa (2931); gli esemplari citati da Siegel sono risultati appartenere a *E. temera* (ex verbis Zilli).

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Lazio:** 1951-1975; (2057); **Abruzzo:** 1926-1975; (1139); (2143).

2133. - ***Euxoa decora*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Valle Susa: Argentera 1700 m 11.VIII.1982 (CMC, PRN). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 1230 m 23.VIII.1960; Sappada 1250 m 10.VIII.1935 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-2005; (231); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (410); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (525); (1004); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (990); (3310); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1901-2005; (747); (3357).

2134. - ***Euxoa culminicola*** **(Staudinger, 1870)**

Nota - La citazione per l'**Abruzzo:** Appennini (Dannehl) in (1207) è errata; la ab. *robiginosa* è stata descritta da Dannehl su individui dell'**Alto Adige**; non sembra vi siano altri dati per gli Appennini (2141). Allo ZSM è conservato un esemplare dell'**Abruzzo**: Montagna Grande, ex coll. Dannehl, ma la quota è troppo bassa per la specie e la veridicità del reperto è dubbia (Zilli in litt.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1951-1975; 2001-2005; (2605); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (215); (231); **Trentino:** 1951-1975; (1734); **Alto Adige:** 1851-1975; (231); (2325); catturata dopo il 1970 (2973).

2135. - ***Euxoa recussa*** **(Hübner, 1817)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1926-1950; (1445); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2143).

2136. - (-) ***Euxoa tristis*** **(Staudinger, 1897)**

Nota - È citata per il **Tirolo meridionale**: (1053); dato non attendibile.

2137. - ***Agrotis fatidica*** **(Hübner, 1824)**

Lombardia: 1851-1900; (231); (218); **Trentino:** 1926-1950; (1053); (1089); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (157); (2325); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143).

2138. - (-) ***Agrotis trifurca*** **Eversmann, 1837**

Nota - È citata per il **Tirolo meridionale** (172); dato non attendibile.

2139. - ***Agrotis cinerea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 18.VI.1977 (GRL); Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Abruzzo:** Gran Sasso 6.VI.1981, 25.V.1982; Ovindoli 10.VII.1984 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 6.VI.1981, 18.VI.1982; Timpone Castellana 6.VI.1980, 9.V.1981; Piano Ruggio 20.VI.1982; Rotonda 2.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1976-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (244); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (1004); (2362); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3321); **Umbria:** 1951-2000; (2968); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2968); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2206), **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (3254).

2140. - (?) ***Agrotis turatii*** **Standfuss, 1888**

Nota - È citata per l'**Italia settentrionale** (2931), settore occidentale (2605); non si hanno altri dati.

2141. - ***Agrotis simplonia*** **(Geyer, 1832)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 13.VI.1985 (GRL); Sestriere 2000 m 28.VI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (244); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 2001-2005; (3460); **Marche:** 1976-2000; (2538); **Lazio:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (2605).

2142. - ***Agrotis segetum*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *sicula* Boisduval, 1829; *dimidia* Zeller, 1847; *sicania* Guenée, 1852)

Noctua sicula è descritta su esemplari della **Sicilia** e della **Campania:** Napoli (59); *Agrotis dimidia* è descritta su un maschio della **Sicilia:** Catania (109); *Agrotis sicania* è descritta su esemplari di **Sicilia** (115*), (2576).

Nuovi dati - **Veneto:** Cison di Valmarino 400 m 1.IX.1963; Colli Euganei 20.VII.1973 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 1-30.VIII.1965, 31.IV.1967 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 24.VII.1989 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 27.IV, 1 e 27.VIII.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 8.IX.1987, 8.IX.1988; Eboli 4.V.1983; Portici 22.IV-28.V, 20-30.VI, 16.VII, 21.IX.1983; Roccadaspide (SA) 15 e 25.VIII.1986; Serino (AV) 4, 7 e 19.VII, 11 e 18.VIII, 5.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 8.VI, 12-16.VII, 29.IX.1983, 21.VIII.1985 (SNN). **Puglia:** Bari: Campus 1-5.X.1980; Bari: Santa Fara 24.II.1979; Valenzano 12.IX.1983; gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999; gravina di Petruscio 30.IV.1983, 4.VIII.1991, 29.II.1992; gravina di Riggio 12.XI.1989, 10.IV.1990, 8, 19 e 29.IX.1991; Gargano: Foresta Umbra 5.VIII.2005 (PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano: Ponte Cagnolino 1-5 e 16-20.IX.1992; calanchi di Ferrandina 12.VII.1983; Metaponto: San Marco 6.IV.1985; Bernalda 7.VII.1983; Vulture (PZ): Monticchio 6.VI.1983; Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII, 9.XI.1979, 6.VI.1980, 13.XI.1983; fiume Mercure 28.III.1981, 8.VI.1980; Cropani 6.VI.1981; Rotondella 5.V.1978; Lago Duglia 12.XI.1983; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Terranova 11.VIII.1980 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980; Pollino: Vallone Colloreto 8.VI.1981; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII, 14.IX.1979; Monte Moschereto 7.X.1980, 15.VII.1982 (PRN); Oriolo 29.IX.1984 (GRL). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (253); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3241); **Veneto:** 1851-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (410); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (650); (1430); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1926-2000; (1403); (2141); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000;

(2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1901-2000; (59); (2355); **Puglia:** 1926-2005; (1776); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (59); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (349); (3226); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

2143. - ***Agrotis clavis*** **(Hufnagel, 1766)** (= *corticea* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - È citata con dubbio per la **Sicilia:** (1388), (1340); non è presente nell'isola.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Brusson 16.VII.1988 (GRL). **Piemonte:** Ceresole (TO) 17.VII.1985 (GRL). **Lombardia:** Valtellina: Santa Caterina Valfurva 1700-2200 m 15.VII.1950 (BER, PRN). **Veneto:** Dolomiti: Falcade 17.VIII.1960 (GLL, PRN). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 17.VII.1980. **Calabria:** Sila: Fossiata 24.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1901-1975; (2051); (2795); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (174); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (525); (1004); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1900; (24); (206); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2738); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1951-1975; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168).

2144. - ***Agrotis endogaea*** **Boisduval, 1837**

Agrotis endogaea è descritta su esemplari della **Sardegna** (Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus de l'Europe: pl. 75, fig. 5,) (71*).

Nota - Presso il presso il British Museum è conservato un esemplare di **Sicilia** (Fibiger in litt.). Tutte le segnalazioni si riferiscono ad una sola località della **Sardegna**: San Giovanni in Sinis.

Sardegna: (1801-1850); 1926-2000; (71*); (2587).

2145. - **(-)** ***Agrotis haifae*** **Staudinger, 1897**

Nota - È riportata come presente in **Sardegna:** (2561), in realtà è *A. endogaea* (2931).

2146. - ***Agrotis herzogi*** **Rebel, 1911**

Nota - È indicato un sito nella **Sardegna:** (3460).

Nuovo dato - **Sardegna S**: Musei (CA), 20.XI.1974 (leg. Hartig, coll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino) (Zilli in litt.).

Sardegna: 1951-1975.

2147. - ***Agrotis puta*** **(Hübner, 1803)** (= *lignosa* Godart, 1825; *erythroxylea* Treitschke, 1826)

Xylina erythroxylea è descritta su esemplari di **Italia** e Francia meridionale (45).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 16.IV.1961, 18.IV, 3, 18.X.1965. **Lazio:** Roma 2.X.1955, 21.IX.1963, 17.X.1962; Lido di Roma 21.IX.1963; Frascati 5.IX.1965; Ostia 25.IX.1955 (DBR, PRN). **Puglia:** foce Candelaro (FG) 7.IV.1981; Foresta Mercadante (BA) 28.IV.1989; Bari: Campus 1-5.X.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 21-23.IV.1985; Monte Camplo 17.V.1974, 13.IV.1975, 13.V.1976, 8.IX.1975; San Paolo 18.IX.1971; gravina di Laterza (TA) 1.III.1976, 28.IV.1992; gravina di Petruscio 30.IV.1983, 25.III.1991, 27.IV.1992; Lecce IX.1983; Parabita (LE) 16.IX.1986 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 4.X.1984, 26.III, 4.IV.1987, 1.IV.1989, 4.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella 1-5.IV.1992; Metaponto: San Marco 4-28.IV.1985; Ofanto 16.V.1969; Monte Vulture (PZ) 1000 m 30.IV.1983; fiume Camastra 11.VIII, 29.IX.1975, 28.VIII.1978, 1.V.1979; Pollino: Terranova 25.IX.1981; San Severino 15.IX.1979; Timpone Castellana 13.IX.1979; Rotonda 25.VIII.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN); Sersale (CZ) 19.X.1986 (RTN, PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1950; (114); (1681); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (1053); (1734); **Veneto:** 1926-1975; (1286); (1787); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (603); **Liguria:** 1926-2000; (1286); (3183); **Emilia:** 1851-2000; (269); (2346); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (1801-1850); 1951-2005; (40*); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-2005; (890); (3367); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1286); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1926-2005; (1286); (3347); **Sicilia:** 1851-2005; (144); (3254); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-2000; (114); (2587).

2148. - ***Agrotis predotai*** **Bytinski-Salz, 1937**

Agrotis puta ssp. *predotai* è descritta su esemplari della **Sardegna**: Santa Teresa di Gallura (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 (1936) (2): 199) (1303).

Nota - Non è indicata per la **Toscana** e l'**Arcipelago toscano** in (3460).

Toscana: 1976-2000; (3276); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (1303); (2587).

2149. - ***Agrotis syricola*** **Corti & Draudt, 1933**

Marche: 2001-2005; (3460); **Lazio:** 1976-2005; (3268); **Abruzzo:** 2001-2005; (3460); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1976-2000; (3467); **Basilicata:** 1976-2000; (3467); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1976-2000; (3254).

2150. - ***Agrotis vestigialis*** **(Hufnagel, 1766)** (= *valligera* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - La citazione per l'**Italia centrale**: (448) e le **Marche:** (385), sono poco attendibili. Le citazioni per il **Piemonte** e la **Liguria** sono da confermare.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); (114); **Trentino:** (1901-1925); 1951-2000; (1022); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (2880); **Friuli:** 1976-2000; (2880); (2974); **Liguria:** (1801-1850); (114).

2151. - ***Agrotis trux*** **(Hübner, 1824)** (= *terranea* Freyer, 1831)
Agrotis terranea è descritta su esemplari della **Sicilia** (66*), (2576).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.X.1962, 7.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 11.X.1989 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (797); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (603); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (2950); **Toscana:** (1901-1925); 1951-2005; (2362); (3310); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2725); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1161); (2987); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (66*); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2907); (3226); **Sardegna:** 1901-1925; 1951-2000; (781); (2587).

2152. - ***Agrotis schawerdai*** **Bytinski-Salz, 1937** (= *santoruana* Hartig, 1939)

Agrotis schawerdai è descritta su esemplari della **Sardegna**: Teulada (Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 (1936) (2): 198) (1303). *Agrotis santoruana* è descritta su esemplari della **Sardegna occidentale**: Porto Santoru (1338).

Sardegna: 1926-2000; (1303); (2587).

2153. - ***Agrotis exclamationis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): Lago d'Orta 14.VII.1978 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 7.VII.1983; Val Bognanco (VB) 5.VII.1980 (GRL). **Veneto:** San Vito di Cadore 19.VI.1959; Dolomiti: Cortina 6.VII.1959 (GLL, PRN). **Emilia:** Casinalbo (MO) 8.VIII.1954 (RBR, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 5.VI.1965. **Lazio:** Roma: Monte Sacri 3.IX.1938 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 10.VIII.1984, Roccadaspide (SA) 11.IV.1986, Serino (AV) 11.VI.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 20.VI.1982. **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 6.VI, 27.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1980; Lago Duglia 18.VI.1982; fiume Mercure 8.VI.1980, 20.VI.1982; Terranova 6.VI.1981. **Calabria:** foce Torrente Coserie 4.VI.1981, 8.V.1984; Santo Stefano di Rogliano 5-10.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2005; (164); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1950; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1901-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1901-1925; 1976-2000; (990); (2940); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** 1901-1925; 1976-2000; (990); (2587).

2154. - ***Agrotis ipsilon*** **(Hufnagel, 1766)** (= *suffusa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Ferriere di Busezio 18.VIII.1964; Valdieri 28.VII.1966; Moncalieri (TO) 13.IV.1968; Torino 6.IV.1970 (GLL, PRN). **Veneto:** Nevegal (BL) 27.VI.1984 (GRL); Cison di Valmarino 400 m 1.IX.1963 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 9-30.VIII.1961, 6-31.XII.1965 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 1 e 29.XII.1983, 5 e 26/1, 1-29.III, 21-28.IV, 25.X.1984, Torre Lama 3-10.VIII.1984, 1.IX, 20.X.1988; Portici 2.VI-6.VII.1983; Roccadaspide (SA) 25.VIII.1986; Serino (AV) 19.VII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 21.VIII.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR), **Puglia:** Palazzo d'Ascoli 4.X.1985; Pulo di Altamura 30.VI.1979, 28.VII.1983; Bari: Santa Fara 21.XI.1979, 6.IV.1980; fiume Lato 22.VI.1991; gravina di

Petruscio 30.V.1990; Lido Silvana 24.VIII.1968. **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 1-5.IX.1992; Metaponto: San Marco 31.III-8.IV.1985; Vulture (PZ): Monticchio 8.IV1983; Pollino: Timpone Castellana 13.IX, 9.XI.1979, 6.VI.1980, 27.III.1981, 13.XI.1983; Terranova 1.XI.1981; Rotonda 11.IX.1977, 16.IX.1979, 8.VI, 16.VII.1980; Cropani 6.VI, 26.IX.1981; fiume Mercure 8.VI.1980; San Severino 15.IX.1979. **Calabria:** Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979; Pollino: Colle del Dragone 27.IV.1975; Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-2000; (650); (3076); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1851-1925; 1951-2005; (212); (3465 bis); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (433 bis); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (1944); (2364); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3386); **Abruzzo:** (1901-1925); 1951-2005; (890); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-2005; (1161); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (1944); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (310); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (337); (3231); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-2000; (114); (2587).

2155. - ***Agrotis bigramma*** **(Esper, 1790)** (= *crassa* Hübner, 1803)

Nota - È citata erroneamente come *A. basigramma*, come in (3460), ma tale nome è dovuto a un refuso (ex verbis Zilli).

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 7.IX.1968. **Veneto:** Cison di Valmarino 400 m 1.IX.1963 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 30.VIII.1961. **Lazio:** Monte Sacro 28.VIII.1969; Anticolli Corrado 5.IX.1939 (DBR, PRN). **Puglia:** Valenzano 18.VIII.1982, 14.IX.1983, 1, 8 e 15.IX.1984; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 22.VIII.1985; Martina Franca: Contrada Santoro 15.VIII.1971, 9.VIII.1972; gravina di Riggio 19.IX.1991. **Basilicata:** fiume Camastra 28.V, 2.IX.1975; Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Piana San Francesco 14.VIII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 13.IX.1979; San Severino 15.IX.1979; Terranova 10-15.VIII.1980, 24.IX.1981; Campotenese 14.IX.1991; Rotonda 9 e 16.VIII.1980, 4.IX.1981. **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII, 7.IX.1985 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998; Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1926-1975; (1089); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3024); **Veneto:** 1951-1975; (1681); (1787); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (935); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1950; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-2005; (109); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2924); **Basilicata:** 1901-1925; 1951-2000; (990); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

2156. - ***Agrotis lata*** **Treitschke, 1835** (= *dirempta* Staudinger, 1859)

Agrotis lata è descritta su esemplari della **Sicilia** (in Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa, X, Zweite Abtheilung der Supplement: 24, Tav. 124, fig. 3, 4) (75).

Nota - Le citazioni di *A. crassa* v. *lata* per l'**Alto Adige:** (566), la **Venezia Giulia:** (530), (935) e il **Lazio:** (1085) sono da verificare. La citazione per le **Marche:** Sassoferrato (314) è errata; "la citazione di Turati su segnalazione di Struve è errata, in quanto Struve non ha mai cacciato in tale località; probabilmente Turati si è confuso con il materiale mio raccolto a Sassoferrato, che però non comprende la var. *lata*" (344).

Campania: 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (3298); **Basilicata:** 1976-2000; (3298); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2000; (75); (3254); **Sardegna:** (1851-1900); 1976-2000; (448); (2587).

2157. - ***Agrotis obesa*** **Boisduval, 1829**

Nota - La citazione per la **Liguria occidentale** (218) è dovuta alla presenza nel Nizzardo. La citazione per il **Lazio:** Marino (2636) sembra valida, per quanto non può essere esclusa la possibilità di un errore nel cartellino (2636); citazione confermata (2931).

Lazio: 1925-1950; (2636).

2158. - ***Agrotis biconica*** **Kollar, 1844** (= *spinifera* Hübner, 1808, nec de Villers, 1789)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 9.X.1965 (DBR, PRN). **Puglia:** gravina di Riggio 21.IV, 18.V.1990; Gallipoli (LE): Baia Verde 10.VII.1987, 13.VIII, 14.X.1988; Gallipoli (LE) 14.X.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Masseria Zagarella

16-20.XI.1992 (PRN).

Trentino: 1851-1925; (1038); (1787); **Liguria:** 1851-1900; 1926-1950; (314); (1445); **Toscana:** 1926-1975; (1235); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); (3322); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Campania:** 1976-2000; (2536); **Puglia:** 1976-2000; (2168); (2924); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (3347); (3469); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (75); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1951-2000; (1975); (2587).

2159. - ***Cladocerotis optabilis*** **(Boisduval, 1837)**

Nota - Le citazioni per la **Liguria:** dintorni di La Spezia (114) e Ceriana (IM) (3272) non sono ritenute valide in (3460).

Sicilia: 1801-1950; 1976-2000; (97); (3254).

2160. - ***Dichagyris vallesiaca*** **(Boisduval, 1837)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3378); **Piemonte:** 1976-2005; (3145); (3378).

2161. - ***Dichagyris candelisequa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *rana* Lederer, 1853)

Valle d'Aosta: 1801-1850; 1976-2000; (114); (3145); **Piemonte:** 1851-1925; 1951-2005; (114 bis); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2000; (2185); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1958); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1943); **Liguria:** 1976-2000; (2553); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (589); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3310); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1207); (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; (388); (2597).

2162. - ***Dichagyris renigera*** **(Hübner, 1808)**

Nota - È riportata per l'**Italia centro-meridionale** tirrenica (2605), (3041); non presente nel settore. Le citazioni per il **Lazio** e la **Sicilia** vanno riferite a *D. forcipula* (2946).

Piemonte: (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (188); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183).

2163. - ***Dichagyris constanti*** **(Millière, 1860)**

Nota - È citata erroneamente per il **Piemonte:** Alpi Cozie, Valle del Gesso, Colle di Tenda (588), (2410), (3183); tali dati sono ripresi da (506), in cui Turati riferisce che l'esplorazione della Valle del Gesso, del Colle di Tenda e di Pigna ha portato fra l'altro al rinvenimento di *Agrotis constanti* sui monti al di sopra di Pigna.

Liguria: 1901-1925; 1976-2000; (622); (3314).

2164. - ***Yigoga nigrescens*** **(Höfner, 1888)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3378); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (1943); (2475); **Alto Adige:** 1901-1975; (1066); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2350); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (894); (3254).

2165. - ***Yigoga forcipula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata dubitativamente per la **Sardegna:** (2605), (2931); da confermare (2783).

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; Terranova 18.VI.1980; fiume Mercure 20.VI.1982; Rotonda 16.VII.1980 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (1445); (2410); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-2000; (2141); (3272); **Abruzzo:** 1901-2005; (1231); (3435); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (3467); **Sicilia:** 1801-2000; (97); (3254).

2166. - ***Yigoga celsicola*** **(Bellier, 1859)**

Nota - È citata per il **Lazio:** (1085), (2605); probabile errata identificazione (2141). Le citazioni per la **Sardegna** vanno riferite ad *A. anceps* (3461).

Piemonte: 1976-2005; (3378).

2167. - ***Yigoga signifera*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Terme Valdieri 1350 m 28.VII.1966. **Alto Adige:** Schnalstal 800 m 23.VI.1930 (AST, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; 2001-2005; (273); (3388); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Calabria:** 1976-2000; (2168).

2168. - ***Actebia praecox*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota – La citazione generica per il **Piemonte:** (1388), attende conferma.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); (1388); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); **Trentino:** 1851-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (765); (3241); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (935); (1060).

2169. - ***Basistriga flammatra*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Veneto:** Valtellina: Sant'Antonio di Valfurva 10.IX.1933 (BER, PRN). **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 15.VI.1983 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2653); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1926-1950); (1943); **Trentino:** (1901-1925); 1926-1975; (1053); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (157); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2738); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2170. - ***Albocosta musiva*** **(Hübner, 1803)**

Nuovo dato - **Veneto:** Dolomiti: Cortina, 1230 m, 27.VIII.1962, 23.VIII.1965 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-2000; (622); (3073); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; 2001-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); (935); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Lazio:** 1976-2000; (2143); **Abruzzo:** 1976-2000; (2143); **Basilicata:** 1951-2000; (2168).

2171. - ***Axylia putris*** **(Linnaeus, 1761)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 13.VIII.1968 (GLL, PRN). **Liguria:** Conna (SV) 1.IX.1978 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1975, 27.V.1982. **Lazio:** Frascati 16.V.1966; Oriolo 29.IX.1984 (GRL). **Campania:** Portici (NA): parco della Reggia 6.VI, 24.VI.1983; Serino (AV) 30.VI, 7.VII, 10 e 18.VIII, 8.IX.1984 (RTN, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935);

Liguria: 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1926-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3390); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (817); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (99); (2536); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (343); (3254).

2172. - ***Ochropleura plecta*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - La citazione per la **Sicilia** è poco attendibile. È citata genericamente per la **Sardegna,** ma non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 7.VII.1983 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Veneto:** Nevegal 28.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 1.VII.1973, 26 e 29.V.1982, 3.VI.1988. **Basilicata:** Nemoli 4.VI.1981 (GRL); Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979; fiume Mercure 6.X.1980, 8.V.1981, 16.V.1983; Rotonda: Valli 18.VII.1980. **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (2725); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3386); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** (1976-2000); (2597); **Sardegna:** (1976-2000); (2605); (2931).

2173. - ***Ochropleura leucogaster*** **(Freyer, 1831)**

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 13-17.V.1963. **Lazio:** Roma 29.IX.1963, 25.V, 15.XI.1964 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 28.IV, 5.V, 7.VII.1983, 1-29.III, 27.IV, 28.X, 1.XI, 6.XII.1984, Torre Lama 3-10.VIII.1984, 20.X.1988; Eboli 4.V.1983; Roccadaspide (SA) 8.XI.1984, 25.VII.1986 (RTN, PRN). **Puglia:** Castellaneta Marina 12.VII.1980; gravina di Petruscio 30.IV.1983 (PRN); Gallipoli (LE) 5.IV.1986; Gallipoli (LE): Baia Verde

20.VII.1985, 18.V, 25.VI, 13.VII.1986, 10.VII.1987, 17-28.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: Belvedere 16.VII.1980; sorgente Acquafredda 8.VI.1981; Cropani 6.VI.1981; Rotonda 19.V.1979, 21.VI, 9.VII.1980; fiume Mercure 8.VI.1980 (PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 7.IX.1985 (RTN, PRN).

Piemonte: 1901-1925; 1976-2005; (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (2014); (3043); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1038); (2060); **Alto Adige:** 1901-1925; (566); (1038); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (893); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-2005; (517); (3462); **Arcipelago toscano:** 1851-1925; 1976-2000; (1044); (2768); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (1733); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (75); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2174. - **(?)** ***Parexarnis fugax*** **(Treitschke, 1825)**

Nota - È citata dubitativamente per l'**Italia settentrionale** (2931), (2980). In (2605) l'**Italia settentrionale** è coperta nella cartina ma non citata nel testo.

2175. - ***Ledereragrotis multifida*** **(Lederer, 1870)**

Nuovo dato - **Lombardia:** Valtellina, San Antonio di Valfurva 8.IX.1933 (BER, PRN).

Lombardia: 1926-1950; **Alto Adige:** 1851-2000; (448); (2783).

2176. - ***Standfussiana dalmata*** **(Staudinger, 1901)** (= *nycthemera* Hübner-Geyer, 1835, nec Boisduval, 1834, nec Herrich-Schäffer, 1845)

Nota - Le citazioni per il **Piemonte** l'**Alto Adige**, l' **Emilia** e la **Toscana** vanno confermate.

Piemonte: 1901-1925; (747); (797); **Trentino:** (1926-1950); 1951-1975; (1388); (1943); **Alto Adige:** (1926-1950); (1388); (1543); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Emilia:** 1901-1925; (688); (1004); **Toscana:** 1851-1900; (344); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2141); **Abruzzo:** 1851-1950; (1976-2000); (344); (1836).

2177. - ***Standfussiana wiskotti*** **(Standfuss, 1888)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Trentino:** 1926-1950; (1320); **Alto Adige:** 1851-1925; (424); (1038); catturata dopo il 1970 (2973).

2178. - ***Standfussiana lucernea*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le segnalazioni di *S. lucernea* per la **Sardegna:** (781) vanno riferite a *S. insulicola* (894).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1951-1975; (1943); (2605); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (3190); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2005; (1207); (3356).

2179. - ***Standfussiana insulicola*** **(Turati, 1919)**

Rhyacia lucernea insulicola è descritta su tre esemplari della **Sardegna**: Gennargentu, 1700 m e uno di Corsica: dintorni di Ajaccio (Il Naturalista siciliano, 23: 271, Tav. III, fig. 33) (894).

Nota - In (2576) come luogo tipico di *S. lucernea* è indicata erroneamente la **Sicilia**.

Sardegna: 1901-1950; (781); (894).

2180. - ***Standfussiana nictymera*** **(Boisduval, 1834)** (= *simulatrix* auct. p.p., nec Hübner)

Nota - Le segnalazioni per il **Tirolo meridionale** e per gli **Appennini** riportate da Staudinger sono basate su vecchie segnalazioni dubbie di Wocke, mai verificate (2783). Le citazioni per il **Piemonte:** (1388) e la **Lombardia:** (218) non sono attendibili. Le citazioni di *S. nyctymera* per l'**Emilia,** la **Toscana** e l'**Abruzzo** vanno riferite a *S. dalmata*; probabilmente anche le citazioni per l'**Alto Adige** vanno riferite a questa specie.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (2653).

2181. - ***Epipsilia latens*** **(Hübner, 1809)**

Nota - In **Sicilia** è presente *R. cervantes*, simile a *Rhyacia latens* (2636). La presenza di *R. latens* in **Sicilia** è accertata sull'Etna: Piano Vetore 5.IX.1995 (1f) (Fibiger det.) (3254).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 2001-2005; (188); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (218); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (3024); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2783); **Emilia:** 1901-1925; (589); (1004); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1139); (2141); **Sicilia:** 1976-2000; (3254).

2182. - ***Epipsilia cervantes*** **(Reisser, 1935)**

Sicilia: 1926-1950; 1976-2000; (1384); (3254).

2183. - ***Epipsilia grisescens*** **(Fabricius, 1794)**

Nota - La citazione per la **Campania** va confermata.

Nuovo dato - **Alto Adige:** Val Gardena 1500 m 5.IX.1956 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; (689);

(748 bis); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (231); (2783); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1493); (1528); **Liguria:** 1976-2000; (2410); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2141); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2141); **Abruzzo:** 1851-2005; (344); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Campania:** 1926-1950; (1388).

2184. - ***Rhyacia helvetina*** **(Boisduval, 1833)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (2658); (3073); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (2475); **Alto Adige:** 1851-2005; (216); (3388); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1926-1975; (1214); (1528); **Lazio:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141).

2185. - ***Rhyacia simulans*** **(Hufnagel, 1766)**

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Cogne 11.VII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2779); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-1975; (260); (1797); **Trentino:** 1901-2000; (1320); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; (325); (1038); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (410); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (377); (2346); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (406); (2272); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2141); (3052); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3470); **Sicilia:** 1976-2000; (3254); **Sardegna:** 1901-1950; 1976-2000; (781); (2587).

2186. - ***Rhyacia lucipeta*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Lombardia:** Ponte di Legno (BS) VII.1964 (leg. Giannini, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Belvedere 16.VII.1980; Cropani 6.VI.1981 (PRN).

Piemonte: 1801-1925; 2001-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Liguria:** 1951-1975; (1659); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (501); (1551); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (406); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2195); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1384); (3254).

2187. - ***Chersotis rectangula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1388); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1926-2000; (1681);

(2475); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1925; 1951-2005; (1681); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1951-1975; (114); (1659); **Emilia:** 1901-1925; (589); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1388); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (488); (3254).

2188. - ***Chersotis andereggii* (Boisduval, 1837)**

Nota - Le citazioni di *C. andereggii* var. *rectangula* per il **Lazio** e l'**Abruzzo:** (890), probabilmente sono da riferire a *C. rectangula*, da verificare (2141).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; (218); **Alto Adige:** 1851-1925; (273); (1053).

2189. - ***Chersotis ocellina* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *phytheumae* Esper, 1803)

Phalaena Noctua phytheumae è descritta su esemplari della **Liguria**: Genova (9*); (2576).

Nota - È riportata genericamente per l'**Abruzzo:** (1943); citazione molto dubbia.

Nuovi dati . **Trentino:** Passo Valparola 2200 m 24.VII.1990; Passo Vizza 2300 m 21.VII.1990 (GRL). **Veneto:** Valtellina: Val Cedeo 2500 m VII.1950 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1926-1950; 1976-2000; (1120); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (244); (2909); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (9*); (3183).

2190. - ***Chersotis alpestris* (Boisduval, 1837)**

Nota - Le citazioni di *C. alpestris* per le **Marche,** il **Lazio** e l'**Abruzzo** sono da riferire a *C. oreina*, sola specie presente in **Italia centrale** (3222).

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Cesana 1500 m 19.VIII.1980, 1350 m 25.VII.1985 (GRL); Valdieri: Valle della Valletta 1750 m 4.VIII.1981; Valle di Susa: Valfredda (Bardonecchia) 2200 m 6.VI.1981 (CMC, PRN). **Lombardia:** Valtellina, San Antonio di Valfurva 10.IX.1933 (BER, PRN). **Alto Adige:** Val Gardena 1400 m 5.IX.1950 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900);

1926-1950; (2372); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-1950; 2001-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1951-1975; (1943); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183).

2191. - ***Chersotis oreina*** **Dufay, 1984**

Nuovo dato - **Marche:** Forca Canapine (AP) 1500 m 27.VII.1979 (leg. Trollese, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2968); (3378); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (1978); (1992); **Molise:** 1976-2000; (3222).

2192. - ***Chersotis multangula*** **(Hübner, 1803)**

Nota - La citazione per la **Sicilia:** Castelbuono (488) è molto dubbia.

Nuovi dati - **Piemonte:** Finero (NO) 900 m 20.VIII.1975 (CMC, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Lago Duglia 22.VII.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1089); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (273); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Liguria:** 1926-1950; (1445); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1901-1925; 1951-1975; (847); (2144); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (2429°); **Molise:** 1976-2000; (3115); (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168).

2193. - ***Chersotis margaritacea*** **(de Villers, 1789)** (= *glareosa* Treitschke, 1825)

Nota - È citata con dubbio per la **Sardegna:** (2980); non risulta segnalata per l'isola.

Nuovi dati - **Abruzzo:** Monte Velino: Peschio Rovicino 1150 m 1.IX.1989 (GRL). **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980 (PRN). **Calabria:** Camigliatello: Il Cupone 19.IX.1985; Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980, 800 m 7.X.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (1060); (935); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2141); **Abruzzo:** 1901-2000; (890); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1801-1850; (70); **Basilicata:** 1976-2000; (2168);

Calabria: 1976-2000; (2168); (2232); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (106); (2907).

2194. - (-) ***Chersotis cyrnea*** **(Spuler, 1908)**

Nota - È citata con dubbio per la **Sardegna:** (2931), (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2195. - ***Chersotis larixia*** **(Guenée, 1852)**

Nota - Le citazioni per il **Lazio:** (2141), (2143), vanno riferite a *C. anatolica* (2931).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (448); (3378).

2196. - (-) ***Chersotis elegans*** **(Eversmann, 1837)** (= *grammiptera* Rambur, 1839)

Nota - Le citazioni per l'**Italia** (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Marche, Lazio e Abruzzo) vanno riferite a *C. anatolica* (2931). È indicata per il **Piemonte** SW, al confine francese: (3460); tale sito probabilmente si riferisce alle località Valle di Mollières e Cinque Laghi (747), oggi in territorio francese. Non risultano altre citazioni per il territorio italiano.

2197. - ***Chersotis anatolica*** **(Draudt, 1936)** (= *elegans* auct. nec Eversmann, 1837)

Nota - "È stato dimostrato che *elegans* Eversmann, 1837 è il nome valido per la specie successivamente descritta come *grammiptera* Rambur, [1839], non nota per la fauna italiana. Le citazioni della specie per l'**Italia** si riferiscono a *Chersotis anatolica* (Draudt, 1936), primo nome disponibile per *C. elegans* Auct. nec Eversmann, 1837. Nonostante il chiarimento, Fibiger (2783) confonde i nomi ed inverte, almeno relativamente all'Italia, le geonemie delle specie" (2931).

Nuovo dato - **Abruzzo:** Maiella: Blochaus versante E (CH) 6.VIII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (622); (3378); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2143); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (2422°).

2198. - ***Chersotis cuprea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Veneto:** Dolomiti: Cortina 17.VII.1959, 23.VIII.1960, 17.VIII.1963 (leg. Beer, PRN); Monte Baldo: Bocca di Navene 1300-1500 m M.VIII.1968 (leg. Wolfsberger, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (215); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (2909); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114);

(2410); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Toscana:** 1976-2000; (2272); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2144); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (632); (2422°).

2199. - ***Chersotis fimbriola*** **(Esper, 1803)** (= *maravignae* Duponchel, 1826)

Nota - È citata genericamente per la **Lombardia**; non si hanno altri dati per la regione.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (1901-1925); (114); (2608); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (46*); (3254).

2200. - ***Noctua pronuba*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È citata per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Piemonte:** Torino 22.VI.1968, 19.VIII.1971, 6.VI.1972; Superga 24.VI.1973; Moncalieri (TO) 8.VI.1968 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 5.VII.1980; Frabosa (CN) 3.VII.1983; Grottarossa 12.V.1988. **Veneto:** Nevegal (BL) 28.VI.1974 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) VI.1965, 10.VIII.1966 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 2.VI.1973, 29.V.1989 (GRL). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 15.VI.1974, 15.VI.1976 (GRL). **Molise:** Petacciato (CB) 2 m 3 e 17.VI.1997 (SCR). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7 e 28.VII, 30.X, 1.XII.1983, 25.X.1984, Torre Lama 1.VII.1987, 22.IX, 6 e 20.X.1988, Portici 22.IV-15.VI.1983, Roccadaspide (SA) 8.XI.1984, Serino (AV) 7.VII, 16-29.IX.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 18 e 29.IX.1983, 29.VI.1985 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001; Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Bari: Campus 28.VI.1966, 13.III.1978 ex l. su Iris, 1-5.X.1980; Noci 19.V.1971; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 30.IX-23.XI.1985, 17-19.IX.1986;.VI.1976, 4.VI, 18-24.IX.1992, 16.VI.1999; gravina di Riggio 12.XI.1989, 22.X.1990, 19.IX.1991; Gargano: Foresta Umbra 5.VIII.2005 (PRN); Gallipoli (LE) 12.X, 16.XI.1986; Gallipoli (LE): Baia Verde 18.V, 4-19.X1986, 10.VII, 10.XI.1987, 14.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 3.XI.1980; Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; Pollino: Piana San Francesco 24.IX.1981; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 13.IX.1979, 6.VI, 17.VII.1980; San Severino 15.IX.1979; Terranova 25.IX.1981; Cropani 6.VI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 20.VII.1981; Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Pollino: Colle del Dragone 27.IV.1975, Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 7.X.1980 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-

2000; (157); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-2005; (385); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1161); (2683); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (97); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1951-2000; (223); (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2587); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; (781).

2201. - ***Noctua fimbriata*** **(Schreber, 1759)** (= *fimbria* Linnaeus, 1767; *solani* Fabricius, 1787)

Nota - Gli esemplari dell' **Emilia**: Campigna: La Lama segnalati in (1885) sono risultati essere *Noctua tirrenica* (3429). In **Sicilia** è presente ovunque *N. tirrenica*, ma *N. fimbriata* è indicata per una località montana dell'Agrigentino (3460). Le citazioni di *N. fimbriata* per la **Sardegna** vanno riferite a *N. tirrenica*. In **Italia meridionale** *N. fimbriata* è presente solo in alta collina e montagna.

Nuovi dati - **Piemonte:** Noasca (TO) 10.VII.1973. **Trentino:** Levico 26.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 1 e 12.VII.1973 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 28.VI.1986 (RTN, PRN). **Basilicata:** Pollino: Rotonda 1-4.IX.1978 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Aspromonte: Gambarie 16.VII.1984 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2005; (273); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); (1060); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1835); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3357); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); (3256); **Puglia:** 1951-1975; 2001-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (2232); **Sicilia:** 2001-2005; (3470).

2202. - ***Noctua tirrenica*** **Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983**

Noctua tirrenica è descritta su esemplari della **Sardegna**: Siniscola (Nuoro) (olotipo); Aritzo: Su Pranu, Monte Ferru, Arcu Neridu e di Francia meridionale (Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a. M., 93 (7): 81, figg. 1-4) (2287).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 2-30.VII.1993, 20.IX.1976, 7.X.1980 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 1.VII.1987; Portici 21.IX.1983; Roccadaspide (SA) 15 e 28.VIII.1986; Serino (AV) 21-28.VII, 16 e 22.IX, 8.X.1984 (RTN, PRN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 30.IX-3.X.1985 (PRN); gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII.1985 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 22.X.1981; Tessano (CS) 750 m 16.X.1994 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3145); (3461 bis); **Trentino:** 1976-2000; (2312); (3293); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Liguria:** 1976-2000; (2648); (3183); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2677); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (2350); (3268); **Abruzzo:** (1926-1950); 1976-2000; (2312); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2350); (3112); **Puglia:** 1951-2000; (2288); (2350); **Basilicata:** 1951-1975; 1951-2000; (2350); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2350); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (109); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1926-2000; (781); (2587).

2203. - ***Noctua orbona*** **(Hufnagel, 1766)** (= *subsequa* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nota - Come *subsequa* Hb. è citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 4.VI.1992 (1m) (NRD). **Basilicata:** Pollino: Lago Duglia 22.VII.1982; Cersosimo 9.VI.1978. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (990); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3043); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3310); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1742); (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2168);

Basilicata: 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (147); (3254); **Sardegna:** 1851-1900; 1926-1975; (290); (2066).

2204. - ***Noctua interposita*** **(Hübner, 1790)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979, 17.VII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Casa del Conte 1100 m 16.VI.1982; San Severino 900 m 15.IX.1979; Rotonda 14.IX.1979, 9.VII.1980. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3461 bis); **Friuli:** 1976-2000; (3197); **Liguria:** 1976-2000; (2553); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2456); **Marche:** 1951-1975; (2048); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2143); **Abruzzo:** 1951-2005; (1710); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1976-2000; (2168); **Basilicata:** 1951-2000; (2075); (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1384); (3254).

2205. - ***Noctua comes*** **(Hübner, 1813)** (= *orbona* Fabricius 1787 et auct.)

Nuovi dati - **Liguria:** Andora (SV) 29.VI.1987. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 2.VII.1973, 3.VI.1982 (GRL). **Campania:** Roccadaspide (SA) 15 e 28.VIII.1986; Serino (AV) 22-29.IX, 5 e 27.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 12-16.VII.1985 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001; Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Bari: Campus 1-5.X.1980; Mola (BA) 25.VI.1978; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 14-18.X.1985 /PRN); Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: Piana San Francesco 24.IX.1981; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Casa del Conte 1100 m 20.VI.1982; Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979, 17.VII.1980; Terranova 25.IX, 1.XI.1981; San Severino 6.VII.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998 Rionero in Vulture (PZ): 600 m, 7.VI.2000, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Frascineto 25.VII.1979; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Monte Moschereto 800 m 15.VII, 7.X.1980 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR). **Sardegna:** Belvì 11.V.1975; Gennargentu: S'Arcu de Tascuni, Desulo 28.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (390); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (129); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925;

1976-2005; (168); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1951-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (99); (3166); **Puglia:** 1951-2005; (2168); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); (3226); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2206. - ***Noctua interjecta*** **Hübner, 1803** (= *fimbria-minor* de Villers, 1789)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa 21.VII.1985 (GRL). **Emilia:** Roncobilaccio 15.VII.1985 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 27.VII.1973 (GRL). **Campania:** Portici 16.VII.1983, Roccadaspide (SA) 8.VII.1986, Serino (AV) 18.VIII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983, 12-16.VII.1985 (SNN). **Puglia:** Castellaneta Marina (TA) 7-14.VII.1980. **Basilicata:** calanchi di Ferrandina 27.VI.1979; Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Piano Ruggio 18.VII.1975, 17.VI, 23.VII.1976, 18.VII.1977, 22.VII.1979, 30.VI.1982; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; San Severino 6.VII.1981; Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979, 17.VII.1980; Rotonda 9.VII, 9.VIII.1980, 23 e 26.VII, 16.IX.1979, 1-4.IX.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9 e 25.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Vallone Colloreto 6.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1901-1925); 1926-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (314); (2658); **Trentino:** 1951-2000; (2783); (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2209); **Liguria:** (? 1850-1900); 1951-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (168); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (554); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (218); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2230); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-

2000; (343); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1951-2000; (2067); (2587).

2207. - ***Noctua janthe*** **(Borkhausen, 1792)**

Nota - È citata genericamente per la **Sardegna**; non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 16.VII.1974, 16.VII.1979 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (2667); (3461 bis); **Trentino:** 1976-2000; (3293); **Alto Adige:** 1976-2000; (3024); (3241); **Veneto:** 1976-2005; (3380); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Romagna:** 1951-1975; (1885); (3062); **Toscana:** 1951-2000; (2667); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Marche:** 1976-2000; (2667); **Lazio:** 1976-2000; (3052); **Abruzzo:** 1976-2000; (3305); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2800); **Basilicata:** 1951-2005; (2800); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2800); **Sicilia:** 1976-2000; (2800); (3254); **Sardegna:** (1976-2000); (2783), (2931).

2208. - ***Noctua janthina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora 16.VII.1987, 26.VI.1990, 10 e 14.VIII.1992 (CMC, PRN). **Lazio:** Roma 2.X.1962 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 24.VII.1987; Roccadaspide (SA) 15.VII, 15.VIII.1986; Serino (AV) 30.VI, 19.VII, 18 e 25.VIII, 16-29.IX.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Castellaneta Marina 7-14.VII.1980; Gargano: Foresta Umbra 20.VIII.2005 (PRN). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano (MT): Fosso Bradano A.VI.1993; calanchi di Ferrandina 27.VI.1979; Pollino: Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Cropani 26.IX1981; Terranova 11.VIII.1980; fiume Mercure 6.X.1980; Rotonda 11.IX.1977, 9 e 17.VII.1980, 23.VII, 14.IX, 16.IX.1979, 8.VIII-4.IX.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9 e 25.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 13-20.VII.1985; Rossano Lido 20-30.VII.1980; Pollino: Monte Moschereto 800 m 15.VII, 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Frascineto 25.VII.1979; Vallone Colloreto 6.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (161); (3068); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (410); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060);

Liguria: 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-1925; 1951-2005; (109); (3386); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1951-2005; (99); (2417); **Puglia:** 1951-2005; (2800); (2168); **Basilicata:** 1951-2005; (2168); (2800); **Calabria:** (1851-1900); 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (97); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** 1851-2000; (301); (2587).

2209. - ***Noctua tertia*** **(Mentzer, Moberg & Fibiger, 1991)**

Nota - "In aggiunta ai dubbi già sollevati da Porcelli & Parenzan (1993) su questa entità, la validità della specie andrebbe riesaminata alla luce del reperimento di esemplari di transizione con *Euschesis janthina* nell'Appennino centro-meridionale" (2931).

Toscana: 1951-1975; (2800); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Puglia:** 1976-2000; (2800); **Basilicata:** 1976-2000; (2800); **Calabria:** 1976-2000; (2800); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); (3254).

2210. - ***Epilecta linogrisea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Campania:** Serino (AV) 16.IX.1984 (RTN, PRN). **Basilicata:** Pollino: sorgente Acquafredda 10.VIII.1980, 3.VII.1981; Piano Ruggio 18.VII.1975, 18.VII.1977; Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979, 17 e 27.VII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; San Severino 15.IX.1979; Terranova 25.IX.1981; Rotonda 14.IX.1979 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 24.VIII.1985; Sila: Il Cupone 19.IX.1985; Pollino: Monte Moschereto 800 m 7.X.1980; Vallone Colloreto 4.VI.1981 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-1975; (260); (1797); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Veneto:** 1901-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-1975; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1950; (168); (1235); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (890); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (99); (1047); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2000; (2168); (2206); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (310); (3254);

Sardegna: (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

2211. - ***Spaelotis ravida*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *obscura* Brahm, 1791)

Nota - "Non sembra che la segnalazione della specie per l'**Italia centrale** in (448) sia stata successivamente convalidata da catture certe; Mariani (1941: 36) indica nuovamente la specie per l'Italia centrale, ma si confonde chiaramente con *Spaelotis senna* (Freyer, [1829])" (2931). La citazione per il **Lazio:** (581), sola citazione per una regione dell'**Italia centrale**, probabilmente va riferita a *S. senna*.

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (260); (2014); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1053); (2325); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1900; 1976-2000; (377); (3043).

2212. - ***Spaelotis senna*** **(Freyer, 1829)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); (201); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3024); **Veneto:** 1926-2005; (1262); (3380); **Liguria:** 1951-1975; (1659); (2410); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2185); **Toscana:** 1976-2000; (2272); **Umbria:** 1976-2000; (2968); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1356); (2738).

2213. - ***Spaelotis suecica*** **(Aurivillius, 1890)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Alto Adige:** 1951-1975; (1710); (1734).

2214. - ***Opigena polygona*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Piemonte: (1801-1850); 1926-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (3043); **Trentino:** 1901-1975; (1184); (1943); **Alto Adige:** 1901-1975; (1055); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (161); (1943); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (262); (3043); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (344); (3310); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1976-2000; (2141); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (1139); (2141); **Basilicata:** 1976-2000; (2350); **Calabria:** 1976-2000; (2168).

2215. - ***Graphiphora augur*** **(Fabricius, 1775)**

Nota - La citazione generica per la **Liguria** e quelle l'**Emilia**, vanno confermate. Le citazioni per l'**Abruzzo:** (314) e la **Basilicata:** (1943) sono poco attendibili.

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900);

1901-1925; 1976-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (446); (1943); **Friuli:** 1851-1900; (410); **Liguria:** (1801-1850); (114): **Emilia:** 1851-1900; (262).

2216. - ***Eugraphe sigma*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *signum* Fabricius, 1787)

Nota - La citazione per la **Sicilia:** (1340) è molto dubbia.

Nuovo dato - **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (1943); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197).

2217. - **(-)** ***Coenophila subrosea*** **(Stephens, 1829)**

Nota - È riportata per l'**Italia** (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2218. - ***Protolampra sobrina*** **(Duponchel, 1843)**

Nota - La citazione per il **Lazio:** (890) è errata (2931). Nella collezione del Museo di Timisoara sono presenti esemplari del **Lazio:** Olgiata, Roma 27.II-6.IV (2032).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (797); (3378); **Trentino:** 1926-2000; (1106); (2211); **Alto Adige:** 1901-1975; (1024); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1943).

2219. - ***Paradiarsia punicea*** **(Hübner, 1803)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); **Trentino:** 1976-2000; (2475); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053).

2220. - **(-)** ***Lycophotia molothina*** **(Esper, 1789)**

Nota - È citata come probabilmente presente in **Sardegna:** (2980); non si hanno altri dati per l'isola.

2221. - ***Lycophotia porphyrea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *strigula* Thunberg, 1792)

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 20.VII.1985 (GRL). **Veneto:** Dolomiti, Cortina 13.VII.1959 (leg. Beer, PRN). **Liguria:** Torriglia 17.VII.1960 (BER, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 25 e 28.VI.1975, 3.VII.1979, 19.VI.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1851-1950; 1976-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** (1851-1900); 1926-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (390); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (410); (3197); **Liguria:** 1926-1975; (1445); (1659); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Toscana:**

1901-1925; 1951-2005; (518); (3310).

2222. - ***Lycophotia erythrina*** **(Herrich-Schäffer, 1852)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 28-29.VI.1975, 25.VII.1976, 3.VII.1979, 29.VI.1983, 19.VI.1985 (GRL).

Piemonte: 2001-2005; (3461 bis); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1950; (622); (1085); **Abruzzo:** (1851-1900); (448); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

2223. - ***Peridroma saucia*** **(Hübner, 1808)** (= *margaritosa* Haworth, 1809)

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 3.VIII.1961, 5.VI, 21.VIII.1965, 5-20.VIII.1966 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 30.VII.1983 (GRL). **Abruzzo:** San Potito 7.VII.1950 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 21 e 28.IV, 7.VII.1983, 29.III, 28.X, 8.XI.1984, Torre Lama 2-28.VIII.1984, 1, 22 e 24.VII.1987; Eboli 4.V.1983; Portici 13.IV, 10.V, 6.VI-16.VII.1983; Roccadaspide (SA) 8.XI.1984, 21.VII, 15 e 25.VIII.1986; Serino (AV) 7.VII, 21-28.VII, 11 e 18.VIII, 27.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Bari 3.II.1982 ex l. su carciofo; Bari: Santa Fara 14.V.1980; Francavilla Fontana VIII.1969; Case Arse 12.V.1971 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 18.V.1986, 10.VII.1987, 14 e 28.V.1988; Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN); Fiume Lato 22.VI.1991, 20.II.1992 (NRD). **Basilicata:** Metaponto: San Marco 6 e 22.IV.1985; Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Piana San Francesco 14.VIII.1980; Timpone Castellana 9.XI.1979, 6.VI.1980, 27.III, 9.V.1981, 13.XI.1983; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Lago Duglia 18.V.1982, 16.XI.1983; San Severino 15.IX.1979; fiume Mercure 8.VI.1980, 29.III.1981; Cropani 6.VI.1981; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983. **Calabria:** Rossano Lido 20-30.VII.1980; Sersale (CZ) 24.VIII.1985, 19.X.1986; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN). **Sicilia:** Palermo città, in migrazione 26.V.2003 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2035); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (840); (2211); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3380); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (50); (3462); **Arcipelago toscano:**

1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3417); **Abruzzo:** 1926-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1851-2005; (138*); (2536); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (343); (3254); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2587).

2224. - ***Diarsia dahlii*** **(Hübner, 1813)**

Valle d'Aosta: 1926-1950; (1207); **Lombardia:** 1951-2000; (3073); **Alto Adige:** 1901-1950; (170); (1038); catturata dopo il 1970 (2973).

2225. - ***Diarsia brunnea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 30.VI.1980, 6.VII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (218); (2272); **Basilicata:** 1976-2000; (2168).

2226. - ***Diarsia mendica*** **(Fabricius, 1775)** (= *festiva* Denis & Schiffermüller, 1775; *primulae* Esper, 1788; *dannehli* Corti & Draudt, 1933)

Rhyacia dannehli è descritta su individui dell'**Abruzzo:** Gran Sasso (1207).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 11.VII.1976 (GRL). **Piemonte:** Valdieri 1350 m 25-28.VII.1966 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 14.VI.1985; Val Bognanco (VB) 17.VI.1977, 30.VI.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (1332); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (689); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (170); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1214); (3197); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2141); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (776); (2422°); **Basilicata:** 1976-2000; (2987); **Calabria:** 1951-2000; (2168).

2227. - ***Diarsia rubi*** **(Vieweg, 1790)**

Nota - È citata per la **Sicilia:** "nella collezione Failla-Tedaldi sono presenti due femmine di Madonie: Castelbuono" (2597); identificazione da verificare.

Piemonte: 2001-2005; (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310).

2228. - ***Diarsia florida*** **(Schmidt, 1859)**

Trentino: 1976-2000; (2475).

2229. - ***Eugnorisma glareosa*** **(Esper, 1788)**

Nota - Le citazioni per la **Valle d'Aosta** e il **Piemonte** vanno confermate; siccome la specie è piuttosto affine alla *Chersotis margaritacea* de Villers, non è improbabile che la determinazione sia errata (3378). La citazione di *glareosa* per l'**Alto Adige:** Taufers (170) e quelle per le **Marche:** (385) e la **Sicilia:** (218) vanno riferite a *C. margaritacea* Vill.

Valle d'Aosta: (1901-1925); (736); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (114); (736); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; (275); **Trentino:** 1851-1900; 1976-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183).

2230. - ***Eugnorisma depuncta*** **(Linnaeus, 1761)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Bardonecchia 1300 m 26.VIII.1989, 1400 m 15.VIII.1987 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (2014); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (273); (3388); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1851-1900; (410); (1425); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (893); (3043); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2000; (3190); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** (1951-1975); (1943); **Abruzzo:** (1926-1950); 1951-2000; (1207); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); **Campania:** 1976-2000; (2350); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2350); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (357); (3254).

2231. - **(-)** ***Xestia sincera*** **(Herrich-Schäffer, 1851)**

Nota - È citata come *Anomogyna sincera* genericamente per l'**Italia settentrionale** (2931), (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2232. - ***Xestia rhaetica*** **(Staudinger, 1871)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Lombardia**: 1851-1900; (218); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (1038); (3024).

2233. - ***Xestia speciosa*** **(Hübner,1813)**

Nota - Citata con dubbio per il **Piemonte:** (736). La citazione per la **Lombardia** probabilmente è da riferire a *X. viridescens*.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Lombardia:** 1851-1900; (164); **Trentino:** 1901-1950; (1053); (1257); **Alto Adige:** 1851-1950; (273); (1083); catturata dopo il 1970 (2973); **Friuli:** 1926-1950; (1425); **Liguria:** 1976-2000; (3183).

2234. - ***Xestia viridescens*** **(Turati, 1919)**

Aplectoides speciosa f. *viridescens* è descritta su esemplari del **Piemonte**: Valdieri (Alpi Marittime) e Macugnaga (Monte Rosa) e del Vallese (Il Naturalista Siciliano, 23 (7-12): 166, Tav. III, fig. 29) (849).

Nota - "Si ritiene che gli esemplari della **Valle d'Aosta:** (2769) siano di *X. speciosa* ssp. *modesta* e non di *X. viridescens*" (3145).

Piemonte: 1901-1925; 2001-2005; (747); (3378); **Lombardia:** 1951-2000; (1734); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1951-2000; (1572); (3293); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943).

2235. - ***Xestia alpicola*** **(Zetterstedt, 1839)** (= *hyperborea* Zetterstedt, 1839)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Lombardia:** 1851-1900; (218); **Trentino:** 1901-1925; 1976-2000; (2211); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3024); **Friuli:** (1851-1900); (218).

2236. - **(-)** ***Xestia lorezi*** **(Staudinger, 1891)**

Nota - È citata come probabilmente presente in **Italia settentrionale** (2931), (2980); non risultano altre segnalazioni per il territorio italiano.

2237. - ***Xestia c-nigrum*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pondel 7.VII.1973 (GRL). **Piemonte:** Moncalieri (TO) 8.X.1968 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 14.VI.1985 (GRL). **Veneto:** Padova 12.IX.1963 (DBR, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 30.VIII.1961, 6-10.VII.1962, 25.X.1965, 5-15.VIII.1966 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 18.VII.1976, 9.X.1980 (GRL). **Basilicata:** Oasi WWF San Giuliano: Ponte Cagnolino 1-5.IX.1992; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979, 9.V.1981; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Cropani 6.VII.1981; Rotonda 23.VII.1979, 2.IX.1980, 4.IX, 20.X.1981; fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980, 16.V.1983. **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980; Sila: Lorica 8-13.X.1978; Pollino: Vallone Colloreto 6.VI.1981; Monte Moschereto 800 m 15.VII, 7.X.1980; 1000 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2560); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2005; (164); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto**

Adige: 1851-2005; (170); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1951-2005; (1684); (3419); **Abruzzo:** 1951-2005; (2141); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (2417); (2940); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (144); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (2249).

2238. - ***Xestia ditrapezium*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *tristigma* Treitschke, 1825)

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 12.VIII.1966 (GLL, PRN). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Basilicata:** Vulture: Monticchio 16.V.1969; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (3197); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Abruzzo:**\2001-2005; (3460); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); **Calabria:** 1976-2000; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254).

2239. - ***Xestia triangulum*** **(Hufnagel, 1766)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 11.VII.1976; St. Vincent 7.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Valdieri 28.VII.1956 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 5.VII.1980 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (2014); **Trentino:** 1901-2000; (840); (3024); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1024); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1951-2000; (1528); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (935); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (629); (893); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1976-2005; (2987); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2987); **Calabria:** 1951-

2000; (2168); (2987); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (3254).

2240. - ***Xestia ashworthii*** **(Doubleday, 1855)**

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Valle Valeille 2000 m 9.VII.1976 (TBL, PRN). **Marche:** Forca Canapine 22.VII.1949. **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 16.VII.1977; Timpone Castellana 23.VII.1979; sorgente Acquafredda 3.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 2001-2005; (736); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (689); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1901-1975; 2001-2005; (1053); (3388); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** 1901-2000; (935); (3197); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Toscana:** 1976-2000; (3190); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1901-2000; (847); (2141); **Lazio:** 1926-2000; (1127); (2141); **Abruzzo:** 1926-2000; (1139); (2429°); **Basilicata:** 1976-2000; (2168).

2241. - ***Xestia baja*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 12.VIII.1963 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 21.IX.1976 (GRL). **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 6.X.1981; Pollino: Piano Ruggio 18.VII.1977; Timpone Castellana 13.IX.1979 C; Piana San Francesco 14.VIII.1980; Rotonda 28.IX.1979, 15.IX.1980; sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; fiume Mercure 6.X.1980 (PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (358); (3388); **Veneto:** 1926-1975; (2051); (2795); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (629); (1577); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3321); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2141); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Puglia:** 1926-1950; (1538); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2168); (3401).

2242. - ***Xestia stigmatica*** **(Hübner, 1813)** (= *rhomboidea* sensu auct. nec Esper)

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; San Severino 15.IX.1979; Piana San Francesco 14.VIII.1980, 24.IX.1981; sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Rotonda 16.IX.1979. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN); Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1900; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1851-1900; (410); (1425); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 2001-2005; (629); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3429); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3386); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1926-1950; (1538); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-1975; (2168); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254).

2243. - **(?) *Xestia trifida* (Fischer de Waldheim, 1820)**

Nota - È citata per la **Sardegna:** (f. *atra* A. Bang-Haas) Dorgali 15-22.VII.1979 (2478); da confermare.

2244. - ***Xestia castanea* (Esper, 1798)** (= *neglecta* Hübner, 1803)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 8.X.1985. **Lazio:** Oriolo 29.IX.1984 (GRL).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (765); (3241); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (935); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (377); (1781); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (70); (2987); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-2000; (343); (3254).

2245. - ***Xestia jordani* (Turati, 1912)**

Agrotis (Euxoa) jordani è descritta su esemplari della **Sardegna**: Monte Cugnada (The Entomologist's Record and Journal of Variation, 24 (12): 306) (745).

Nota - *Eugraphe cornucata* Berio, descritta su esemplari di **Sardegna**: Monte Limbara, Belvì (NU), Ortuabis e Musei (CA) (2428), probabilmente è sinonimo di questa specie.

Arcipelago toscano: 1976-2000; (2768); **Sardegna:** 1901-2000; (745); (2587).

2246. - ***Xestia agathina*** **(Duponchel, 1827)**

Nota - La citazione generica per il **Piemonte:** (2209), attende conferma).

Nuovo dato - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 9.X.1980 (GRL).

Piemonte: (1976-2000); (2209); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2166); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2141).

2247. - ***Xestia ochreago*** **(Hübner, 1809)** (= *rubecula* Treitschke, 1825)

Nota - Una citazione per la **Toscana:** (42) non è attendibile.

Nuovo dato - **Piemonte:** Valdieri 1350 m 25-28.VII.1966 (GLL. PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Trentino:** 1901-1925; (1038); (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (1038); (1184); catturata dopo il 1970 (2973); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3020).

2248. - ***Xestia collina*** **(Boisduval, 1840)**

Trentino: 1901-1925; (1038); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1024); (2325); **Veneto:** 1951-1975; (1943).

2249. - ***Xestia kermesina*** **(Mabille, 1869)**

Nota - La citazione per le **Marche:** (385) è certamente errata. La citazione per la **Sicilia:** (609) probabilmente è una identificazione errata.

Sardegna: 1901-2000; (745); (2803).

2250. - ***Xestia xanthographa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *lepida* Costantini, 1922)

Agrotis lepida è descritta su esemplari dell'**Emilia**: Regium Lepidii e Sestola (962) & (983).

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 13.IX, 5.X.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 2.VII.1961, 5.X.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 19.IX.1982, 8.X.1985 (GRL); Montepulciano (SI) 10.IX.1975 (PRN). **Marche:** Fano: Torrette IX.1955 (ex coll. Fiori, PRN). **Lazio:** Oriolo 29.IX.1984 (GRL). **Puglia:** Bari: Campus 1-14.X.1980; Valenzano 6.X.1984; Toritto (BA): località Quasano 4.X.1980; Mola (BA) 14 e 23.IX.1979; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 21.IX-31.X.1985, 17-19.IX.1986; gravina di Petruscio 26.X.1983 (PRN); gravina di Laterza (TA) 24.IX.1992 (coll. Lardelli); Gallipoli (LE): Baia Verde 12.X.1986, 19.X.1987, 16.X.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Matera 29.IX.1994; Bosco di Policoro (MT) 6.X.1980; Vulture (PZ): Laghi Monticchio 30.IX.1983; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; fiume Mercure 6.X.1980; Mormanno

11.IX.1977. **Calabria:** Camigliatello: Il Cupone 19.IX.1985; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN). **Sardegna:** Belvì (NU) 7.XII.1974 (HRT, PRN).

Valle d'Aosta: (1901-1925); 1976-2000; (736); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3043); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-2000; (812); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (98); (3380); **Friuli:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2426); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (554); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3275); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2168); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (1943); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (314); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2251. - ***Xestia cohaesa*** **(Herrich-Schäffer, 1849)** (= *pulverea* Hampson, 1903)

Alto Adige: 1901-1925; (812); (1053); **Veneto:** 1951-2005; (3067); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Emilia:** 1901-1925; (629); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (3190); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (554); (3429); **Marche:** 1851-1900; (344); **Lazio:** 1851-1925; (344); (890); **Abruzzo:** 1901-1925; (890); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2987); (3469); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** 1901-1950; (781); (1303).

2252. - ***Xestia sexstrigata*** **(Haworth, 1809)** (= *umbrosa* Hübner, 1790)

Nota - È citata per la **Sicilia:** (343), (1340); citazioni molto dubbie.

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; (114); (736); **Trentino:** 1901-1925; (1038); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Emilia:** 1801-1900; 1976-2000; (110); (3043); **Toscana:** 2001-2005; (3462).

2253. - ***Eurois occulta*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni per la **Liguria:** (114), (218), e la **Toscana:** (24), (42) sono molto dubbie.

Nuovo dato - **Valle d'Aosta:** Pré St. Didier 30.VI.1976 (GRL). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 17.IX.1946, 20.VIII.1962 (GLL, PRN). **Friuli:** Monte Matajur (UD), 1200-1400 m, 4.VII.1988 (MRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 2001-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1951-2000;

(2968); (3073); **Trentino:** 1926-2000; (1320); (3024); **Alto Adige:** 1851-2005; (170); (3388); **Veneto:** 1926-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1976-2000; **Liguria:** 1801-1850; (114); (218).

2254. - ***Anaplectoides prasina*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *herbida* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Alpi Marittime: Frabosa (CN) 21.VII.1985; Val Bognanco (VB) 30.VI, 5.VII.1980 (GRL). **Veneto:** Dolomiti: Cortina 11.VII.1959 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (164); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-2005; (812); (3388); **Veneto:** 1926-2000; (2051); (3068); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1976-2000; (2209); **Romagna:** 1951-2000; (2185); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3062); (3429); **Sicilia:** 1976-2000; (2907); (3254).

2255. - ***Cerastis rubricosa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 13 e 15.IV.1979, 5.IV.1980 (GRL). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 9 e 30.IV.1983; Pollino: Timpone Castellana 27.III.1981; fiume Mercure 29.III.1981; Rotonda 23.III, 28.III.1981, 21.III.1982 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (622); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (273); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1976-2005; (2272); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (890); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Puglia:** 1951-2000; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2232); (2987); **Sicilia:** 1901-1925; 1976-2000; (488); (3254); **Sardegna:** 1951-1975; (2041).

2256. - ***Cerastis faceta*** **(Treitschke, 1835)**

Noctua faceta è descritta su esemplari della **Campania**: Napoli e **Sicilia** (in Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa, X (2): 35) (75).

Nuovi dati - **Toscana:** Ansedonia (GR) 31.XII.1965 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 14.III.1986 (GRL). **Lazio:** Frascati 12.III.1967; Roma 9.III.1962; Roma: Acquacetosa 3.III.1950; Dazio Salaria 5.III.1966 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 1, 8 e 29.III.1984 (RTN, PRN). **Basilicata:** Vulture (PZ): Monticchio 9.IV.1983; Pollino:

fiume Mercure 29.III.1981; Rotonda 28.III.1981. **Sardegna:** Musei 25.XI.1973 (PRN).

Liguria: 1901-1925; 1976-2000; (515); (3183); **Emilia:** 1951-1975; (1551); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1951-2005; (2272); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (890); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2141); (3324); **Molise:** 1976-2000; (2141); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1976-2000; (75); **Arcipelago campano:** 1851-1900; (853); **Puglia:** 1951-2000; (2230); (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (188); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (75); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (818); (2587).

2257. - ***Cerastis leucographa*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1901-1925; (736); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (218); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); **Veneto:** 1951-1975; (1787); **Liguria:** 1901-1925 (1004); **Toscana:** 1851-1900; (206); **Umbria:** 1901-1925; (1004).

2258. - ***Naenia typica*** **(Linnaeus, 1758)**

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1975; (164); (1787); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1787); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1081); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1926-1975; (10); (1787); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1951-1975; (1659); **Emilia:** 1851-1900; (262); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3429); **Marche:** 1951-1975; (2085); (2209); **Lazio:** 1976-2000; (2465); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Basilicata:** 1976-2000; (2800).

2259. - ***Panthea coenobita*** **(Esper, 1785)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; (114); (2410); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (812); (3293); **Veneto:** (1926-1950); 1951-2005; (1388); (2795); **Friuli:** 1926-1975; (1425); (1528).

2260. - ***Trichosea ludifica*** **(Linnaeus, 1758)**

Alto Adige: 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Emilia:** 1851-1900; (262).

2261. - ***Colocasia coryli*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 12.V, 14.VII.1968, 18.V.1969 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 19.VII.1985 (GRL). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia 25.VII.1973 (GLL, PRN). **Toscana:** Ansedonia (GR) 20.VIII.1963, 30.V-18.VI.1970 (DBR, PRN); Pieve a Maiano (AR) 21.IV e 15.VII.1976, 16.VII.1979, 29.V.1982, 22.IV.1984, 20.VII.1985, 9.VII.1987 (GRL). **Umbria:**

Sigillo (PG): Val di Ranco 24.VI.1983 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 26.VII, 11 e 18.VIII.1984 (RTN, PRN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Rifreddo (PZ) 20.V.1985; Pollino: Timpone Castellana 6.VI, 17.VII.1980, 27.III.1981; Belvedere 16.VII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Rotonda: Valli 18.VII.1980; fiume Mercure 8.VI.1980; San Severino 7.VII.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VIII.1979 (PRN); Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (935); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (518); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3386); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (890); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3164); (3403); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1350); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2005; (894); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1976-2000; (357); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2249).

Fam. Lymantriidae

2262. - ***Lymantria monacha*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Veneto:** Dolomiti: Cortina 20.VIII.1963 (GLL, PRN). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra (FG), 750 m, 6.VIII.1977, 5.VII.1989 (PRN). **Calabria:** Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (2708); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (300); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3388); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (2732); (3007); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1976-2000; (3007); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3007); **Toscana:** (? 1850-1900); 1901-1925; 1976-2005; (218); (3428); **Marche:** 1951-2005; (1939); (3409); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3007); **Abruzzo:** (1951-1975); 1976-2000; (1939); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3447); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (3466); **Basilicata:** 1976-2000; (3466);

Calabria: 1951-2000; (2108); (2206); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (2949); **Sardegna:** 1901-1925; (841); (886).

2263. - ***Lymantria dispar*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 6.VI.1970 (GLL, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7 e 28.VII.1983, Torre Lama 2-27.VIII.1984; Portici 30.VI-16.VII.1983; Roccadaspide (SA) 15.VII, 15 e 28.VIII.1986; Serino (AV) 11-25.VIII, 8-22.IX.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 6-8.VII.1985 (SNN); Castel San Lorenzo (SA): Genzano 330 m 4.VII.1998 (DMR, PRN). **Calabria:** Sersale (CZ) 20.X.1985 (RTN, PRN); Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003 (DMR, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3300); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1925; 1951-2000; (392); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; 1951-1975; (125); (1556); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2005; (2898); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2456); (3275); **Umbria:** 1926-2000; (1457); (2679); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (3324); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1801-2000; (99); (2091); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (156); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2005; (97); (3384); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (3363).

2264. - ***Lymantria atlantica*** **(Rambur, 1837)**

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia:** (2931), (2980), probabilmente riferendosi all'**Arcipelago siciliano**.

Nuovo dato - **Sardegna:** Musei (CA) 120 m 7.X.1974 (HRT, PRN).

Arcipelago toscano: 1976-2005; (3129); (3322); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2935); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-2000; (88); (3007); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (3007).

2265. - ***Lymantria lapidicola*** **(Herrich-Schäffer, 1851)** (= *kruegeri* Turati, 1912)

Ocneria kruegeri è descritta su esemplari della **Sardegna**: Gennargentu, 200-1400 m (745). *Lymantria kruegeri* è descritta su esemplari della **Sardegna**: Cresta Talese, Monte Chiesa, Fontana Cugnada (781).

Sardegna: 1901-2000; (764); (3007).

2266. - ***Ocneria rubea*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele 20.IX.1968 (GLL, PRN). **Puglia:** Valenzano 8.X.1983; Mola (BA) 29.V.1979; gravina di Laterza (TA) 21 e 29.IX.1982 (ADD); Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Policoro (PZ): Bosco Pantano 21.IX.1979, 14.VI.2000; Sellata: La Maddalena 28.VII.1974; Pollino: sorgente Acquafredda 10-16.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Terranova 10-15.VIII.1980; Rotonda 9 e 16.VIII.1980, 1-4.IX.1981. **Calabria:** Santo Stefano di Rogliano 5-10.VII.1981; Sersale (CZ) 27.VII.1985; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 1.VI.1996; Amantea (CS) 100 m 15.VII.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1951-2005; (114 bis); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1851-1925; 1951-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1851-1975; (377); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1950; 1976-2005; (518); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3007); **Lazio:** 1901-2000; (772); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Puglia:** 1951-2000; (1549); (3065); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2206); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (354); (3083).

2267. - ***Ocneria ledereri* (Millière, 1869)** (= *prolai* Hartig, 1963)

Orgyia ledereri è descritta su esemplari della **Sicilia**: Messina (Iconographie et Description de Chènilles et Lépidoptères inédits, Lyon, Tome II: 451) (150*); (1716). *Ocneria prolai* è descritta su esemplari dell' **Umbria:** San Faustino di Orvieto, 500 m (1716).

Umbria: 1951-1975; (1716); (3007); **Marche:** 1951-1975; (1878); (2469); **Lazio:** 1951-1975; (1997); **Campania:** 1951-1975; (1997); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1976-2000; (2206); (2274); **Sicilia:** 1851-1900; (150*).

2268. - ***Parocneria detrita* (Esper, 1785)**

Nota - È citata genericamente per il **Piemonte:** (2732); non si hanno altri dati per la regione.

Trentino: 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (3007); catturata dal 1950 al 1969 (2973).

2269. - ***Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Liguria:** Murialdo (SV): Rio Freddo ex o. 25.IV.1996 (CMC, PRN). **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 8.VI.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Basilicata:** Bosco

di Policoro (MT) 18.V.1979; Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; Monticchio 750 m 6.VI.1983; Pollino: Lago Duglia 15.VI.1983; Rotonda 10.VI.1978, 19-20.V.1979, 7.VI.1980, 8 e 26.V.1981, 13-17.V.1982, 16.V.1983; Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983; Timpone Castellana 6.VI.1980, 9.V.1981; fiume Mercure 8.VI.1980; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; Pollino: Lago Fondo 1700 m 15.V.1983. **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 1000 m 15.VII.1980 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 28.V.1995 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1801-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1926-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3007); (3173); **Campania:** 1851-1900; 1976-2005; (421); **Puglia:** 1926-1950; (1538); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2108); **Calabria:** 1951-1975; 2001-2005; (1733); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2949); **Sardegna:** 1901-1975; (711); (1976).

2270. - ***Dicallomera fascelina*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovo dato - **Alto Adige:** Val Gardena: Santa Cristina 1450 m 27.VII.1955 (GLL, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; (231); (820); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3007); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (273); (3007); **Veneto:** 1801-1900; 1926-1975; 2001-2005; (98); (3470); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (935); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2516); (3310); **Marche:** 1976-2000; (2643); (3007).

2271. - ***Gynaephora selenitica*** **(Esper, 1783)**

Piemonte: 1976-2000; (3007); (3183).

2272. - ***Orgyia antiqua*** **(Linnaeus, 1758)** (= *gonostigma* Scopoli, 1763; *recens* Hübner 1819, sensu Forster & Wohlfahrt, 1960)

Nuovi dati - **Liguria:** Murialdo (SV): Rio Freddo 25.VI.1988 ex. l. (CMC, PRN). **Umbria:** San Faustino 20.VII.1960. **Lazio:** Ardea (RM) 12.X.1935 (DBR, PRN). **Puglia:** Policoro (MT): Bosco Pantano 14.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 22.VII.2002 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1951-1975; (98); (1943); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3007); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1926-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1552); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1901-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1951-1975; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1926-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); **Puglia:** 1976-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); **Calabria:** 1801-1850; 1951-1975; 2001-2005; (70); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; (97); (354); **Sardegna:** (1951-1975); 1976-2000; (1589); (3007).

2273. - **(-)** ***Orgyia antiquoides*** **(Hübner, 1819)** (= *ericae* Germar, 1824)

Nota - Le citazioni per **Abruzzo, Puglia, Basilicata** e **Sicilia** vanno riferite a *T. trigotephras* (3007).

2274. - ***Teia recens*** **(Hübner, 1819)** (= *gonostigma* Fabricius et suct. nec Scopoli, 1793; *antiqua* Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni di *T. recens* Hb. per **Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo** e **Sicilia** vanno riferite a *T. antiqua*.

Nuovo dato - **Piemonte:** Caselette (TO) ex l. 16-25.V.1989 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3007); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (164); (2591); **Trentino:** 1901-2000; (1064); (3007); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3007); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (98); (2591); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Emilia:** 1801-1925; (110); (525); **Toscana:** 1976-2000; (3007); (3335°).

2275. - ***Teia trigotephras*** **(Boisduval, 1829)** (= *etrusca* Verity, 1905)

Orgya (sic!) etrusca è descritta su esemplari della **Toscana**: dintorni di Firenze e Rumena (Casentino Toscano) (519).

Nota - La citazione per la **Liguria:** (1388) probabilmente deriva dalla presenza nel Nizzardo. È citata per la **Sardegna:** (2732); manca nell'isola (3007).

Nuovi dati - **Lazio:** Monti Aurunci 500 m 15.VI.1947 (coll. INE). **Calabria:** Paola (CS) 200 m 30.X.2001 (SCL). **Sicilia:** Buseto Palizzolo (TP): Bosco Sorace 10-15.VI.1997 ex l. su Quercus (PRN).

Romagna: 1951-2000; (1885); (3007); **Toscana:** 1901-1925; (519); (715); **Umbria:** 1976-2000; (3007); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000;

(385); (3007); **Lazio:** 1901-2000; (807); (2142); **Abruzzo:** 1851-1900; (344); **Puglia:** 1976-2000; (2274); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (2274); **Calabria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (712); (3007); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-2000; (49); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3093); (3231).

2276. - ***Teia corsica*** **(Boisduval, 1834)** (= *nupera* Turati, 1919)

Orgyia nupera è descritta su individui dell'**Abruzzo:** Gran Sasso; Teramo ex l. (894).

Nota - In Italia è presente la ssp. *nupera* Turati (2303). Le citazioni per la **Sicilia** vanno riferite a *T. trigotephras*; quelle per la **Sardegna** a *T. rupestris*.

Toscana: 1976-2000; (3007); **Lazio:** 1926-1950; 1976-2000; (1085); (3007); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2000; (894); (3206).

2277. - ***Teia rupestris*** **(Rambur, 1832)** (= *ramburii* Mabille, 1866)

Nota - La citazione di *T. rupestris* per il **Lazio:** (1085) va riportata a *T. corsica*. *T. rupestris* è erroneamente citata per **Sicilia,** è stato appurato trattarsi di *T. trigotephras* (3007).

Toscana: (1851-1900); 1901-1925; (476); (2362); **Arcipelago toscano:** 1951-2000; (1852); (3322); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1925; 1976-2000; (505); (3007); **Arcipelago sardo:** 1951-1975; (2469).

2278. - ***Teia dubia*** **(Tauscher, 1806)**

Orgyia dubia r. *arcerii* è descritta su esemplari di **Sicilia**: Trapani: (992).

Sicilia: 1851-1950; 1976-2000; (388); (3206).

2279. - ***Euproctis chrysorrhoea*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 5.VI.1970 (GLL, PRN). **Lazio:** Colli Albani: Pratone 15.VII.1950 (DBR, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 7.VII.1983; Roccadaspide (SA) 15.VII.1986; Serino (AV) 11.VIII.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Pulo di Altamura 29.V.1979; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 5-7.VII.1996; Oria 13.VII.1984 (PRN). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 10.VII.1983; calanchi di Ferrandina 5.VI, 5.VII.1983; Sellata: La Maddalena 28.VII.1974; Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 17.VII.1980; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980, 3.VI.1981; Lago Duglia 18.VII.1982; Terranova 11.VIII.1980, 3.VI.1981, 9-18.VII.1982, 20.VI.1983; Rotonda 23-26.VII.1979, 16.VII, 9-16.VIII.1980, 29.VI, 5-7.VII, 4.IX.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; Cropani 6.VI.1981; San Severino 7.VII.1981 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9.VII.2001 (SCR). **Calabria:** Sersale (CZ) 5-27.VII, 24.VIII.1985; Umbriatico 10-14.VII.1982; Santo Stefano di Rogliano 5-10.VII.1981; Gambarie (RC) 8.VIII.1971; Pollino: Monte Moschereto 1000 m

15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979; Vallone Colloreto 6.VI.1981; Civita 19.VII.1981 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 18.VI.1995; Sila: Cupone 1250 m 22.VII.2002 (SCL). **Sicilia:** Bosco della Ficuzza (PA) 18.VII.1967 ex l. su *Rubus* (coll. I.E.P.).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-1975; (79*); (2784); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (146); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (935); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-2000; (110); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2817); (3322); **Umbria:** 1926-2000; (1457); (2589); **Marche:** 1851-1900; 1926-2000; (385); (3007); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2005; (421); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (421); **Puglia:** 1926-2005; (1776); (3426); **Basilicata:** 1926-2005; (1776); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (2919); **Sicilia:** 1851-2000; (354); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (223); (3055); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2387).

2280. - ***Sphrageidus similis*** **(Fuessly, 1775)** (= *auriflua* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Torino 27.VI.1982 ex l. (CMC, PRN). **Basilicata:** Policoro (MT): Bosco Pantano 18.V, 21.IX.1979, 14.VI.2000 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (146); (1831); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2000; (81); (3068); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1900; (110); (377); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (2185); (2516); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 2001-2005; (24); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (1044); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1976-2000; (344); (2142); **Molise:** (1801-1850); 2001-2005; (70); (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2108); **Calabria:** (1801-1850); 1976-2000; (70); (3007); **Sicilia:** (1801-1850); 1926-1950; (97); (1340); **Sardegna:** 1851-1900; 1976-2000; (301); (2249).

2281. - ***Pentophera morio*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - È citata come probabilmente presente in **Liguria:** (218) e **Lombardia:** (319); non si hanno segnalazioni per queste regioni. La citazione generica per l'**Umbria:** (2732) è da confermare. Le citazioni generiche per il **Lazio:** (2142), (2732) probabilmente sono dovute alla citazione in (772) dove è detto che è tratta da Calberla che la riporta da Curò; ma Curò segnala la presenza della specie nella "zona centrale d'Italia", che comprende anche la Liguria. Le citazioni per l'**Abruzzo:** (2732), (3007) si rifanno a (448), ma anche in questo caso è citata solo genericamente l'**Italia centrale**. Le citazioni per la **Campania:** (70) e la **Basilicata:** (218) sono molto dubbie.

Piemonte: 1901-1925; ex (736); **Alto Adige:** 1851-1950; (170); (1038); **Venezia Giulia:** 1901-1950; (3007); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; (19); (206).

2282. - ***Laelia coenosa*** **(Hübner, 1808)**

Piemonte: 1976-2000; (2957); **Veneto:** 1976-2000; (3007); (3250); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Emilia:** 1976-2000; (2270); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3007); **Toscana:** 1951-2000; (1782); (3365); **Lazio:** 1976-2000; (3403); (3007); **Puglia:** 1976-2000; (2109); (2963).

2283. - ***Leucoma salicis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È riportata come presente in **Venezia Giulia, Umbria** e **Calabria:** (2732); non risultano altre segnalazioni per queste regioni.

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 20-24.VIII.1968 (GLL, PRN); Bardonecchia: Valle del Frejus 1700 m 7.VII.1987 (CMC, PRN). **Abruzzo:** San Potito 1050 m 12 e 27.VIII.1955 (DBR, PRN). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 19.VI.1982; Lago Duglia 18.VI.1982, 15.VI.1983; Casa del Conte 18.VI.1982; Terranova 6.VI.1981; Rotonda 10.VI.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1717); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1801-2005; (44); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (157); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (181); (3197); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1901-2005; (19); (3310); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1951-2000; (2142); (3403); **Abruzzo:** 1951-2000; (1629); (2142); **Molise:** 2001-2005; (3447); **Basilicata:** 1951-2000; (1943); (2108); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (298); (3247); **Sardegna:** 1901-1950; 1976-2000; (841); (3007).

2284. - ***Actornis l-nigrum*** **(Müller, 1764)** (= *v-nigrum* Fabricius,

1775; misspelling: *vau-nigrum*)

Nuovi dati - **Lombardia:** Gonzaga 20.VIII.1965 (GLL, PRN); **Basilicata:** Policoro (MT): Bosco Pantano 21.IX.1979; Vulture: Monticchio (PZ) 6.VI.1983; Pollino: Piana San Francesco 14.VIII.1980; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Timpone Castellana 13.IX.1979, 17.VII.1980; Rotonda 14.IX.1979; San Severino 15.IX.1979, 7.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1851-1900; 1976-2000; (314); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (2516); **Toscana:** (? 1851-1900); 1976-2005; (218); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2005; (656); (3268); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Puglia:** 2001-2005; (3426); (3466); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2108); **Calabria:** 1976-2000; (2206); **Sicilia:** 1926-1950; (1384); **Sardegna:** 1976-2000; (3129).

2285. - ***Meganola togatulalis*** **(Hübner, 1796)**

Nuovi dati - **Alto Adige:** Merano 300 m 6.VIII.1937 (AST, PRN). **Toscana:** Ansedonia 20-30.VII.1962 (DBR, PRN). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 16.VI.1999 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1851-1925; 1976-2005; (298); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (3007); **Trentino:** 1951-2000; (1787); (3293); **Alto Adige:** 1901-1950; (1038); (1053); catturata dal 1950 al 1969 (2973); **Veneto:** 1926-1975; (1681); (1787); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1951-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (687); (1577); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1851-1925; 1951-2005; (218); (3429); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3007); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1976-2000; (2987); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (3007); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); **Sicilia:** 1901-1950; 1976-2000; (488); (3254); **Sardegna:** 1901-1975; (781); (1976).

2286. - ***Meganola strigula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)**

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70). La citazione per la **Sardegna:** (114) non è attendibile.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 5.VI.1981 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000. **Calabria:** Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 2001-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** (1926-1950); (1943); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); (1060); **Liguria:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (687); (1004); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3007); **Toscana:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (1943); (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3007); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3419); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (3007); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (197); (3254).

2287. - ***Meganola albula*** **(Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *albulana* Hübner, 1825)

Nuovi dati - **Puglia:** Gallipoli (LE): Baia Verde 18.V.1986 (PRT, PRN). **Basilicata:** Pollino: fiume Mercure 24.VII.1982 (PRN); Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 25.IX.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2713); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); (2974); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1951-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1951-2000; (1781); (2346); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (517); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 2001-2005; (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Puglia:** 1976-2000; (3007); (3065); **Basilicata:** 1976-2005; (2108); (2274); **Calabria:** 1976-2005; (2274); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-2000; (114); (3129).

2288. - ***Nola cucullatella*** **(Linnaeus, 1758)** (= *pygmaria* Fabricius, 1794; *palliolana* Duponchel, 1845)

Phalaena pygmaria è descritta su esemplari di **Italia** (22*); (2576).

Nuovi dati - **Piemonte:** Torino città e Caselette (TO) (Bertaccini in litt.). **Calabria:** Lago Arvo 12 VII. 1998 (1 es.) (SCL).

Piemonte: (1801-1850); 1976-2000; (114); (3273); **Lombardia:** 1976-

2000; (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (268); (2795); **Friuli:** 1976-2000; (3007); (3197); **Liguria:** (1851-1900); (218); **Emilia:** 1901-1925; (893); (1004); **Romagna:** 1976-2000; (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (3007); **Lazio:** 1951-2000; (2142); **Abruzzo:** 1976-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (2274); **Calabria:** 1976-2000; (2274); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (360); (3254).

2289. - ***Nola confusalis*** **(Herrich-Schäffer, 1847)**

Nota - È riportata come presente in **Umbria, Molise** e **Sicilia:** (2732); non risultano segnalazioni per queste regioni.

Nuovi dati - **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 27.III.1989 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2476); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1570); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Veneto:** 1926-1975; (1943); (2051); **Friuli:** (1951-1975); (1943); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (687); (3007); **Romagna:** 1976-2000; (3007); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1976-2000; (3007); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3007); **Campania:** 2001-2005; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (2274); **Basilicata:** 1951-2000; (2274); (3007); **Calabria:** 1951-2000; (2274); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1925; (298); (781).

2290. - ***Nola cicatricalis*** **(Treitschke, 1835)** (= *ancipitalis* Herrich-Schäffer, 1845)

Nuovo dato - **Calabria:** Pollino: Civita 20.IV.1975 (1f) (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3007); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1851-1900; 1951-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** 1976-2000; (2410); **Emilia:** 1901-1925; (629); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3429); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1976-2000; (3007); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2142); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3007); (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (3007); **Calabria:** 1951-1975; (2274); **Sardegna:** 1926-1950; (1260).

2291. - ***Nola aerugula*** **(Hübner, 1793)** (= *centonalis* Hübner, 1796)

Nota - Per la **Sicilia** si ha solo una citazione generica (1340), poco

attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3007); **Piemonte:** 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3007); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-2000; (675); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (268); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (650); (3007); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2000; (377); (2346); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3007); **Toscana:** 1901-1950; 1976-2005; (517); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1926-1950; 1976-2000; (2469); (3403); **Abruzzo:** 1926-2005; (2142); (3367); **Puglia:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3007); **Basilicata:** 1951-1975; (1658); **Calabria:** 1976-2000; (3065).

2292. - ***Nola squalida*** **Staudinger, 1870** (= *turanica* Staudinger, 1887)

Nota - La citazione generica per la **Calabria:** (2732) è errata, va riferita alla **Basilicata.**

Toscana: 1976-2000; (3007); (3044); **Lazio:** 1976-2000; (3007); **Puglia:** 1976-2000; (3007); (3065); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); (2528); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1340); (3128); **Sardegna:** 1926-1950; 1976-2000; (1303); (2249).

2293. - ***Nola cristatula*** **(Hübner, 1793)**

Nota - È citata genericamente per la **Lombardia:** (1388); l'**Emilia** e la **Romagna:** (2732); e la **Toscana:** (218); non risultano altre segnalazioni per queste regioni.

Trentino: 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (3241); **Veneto:** 1951-1975; (1820); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Sardegna:** 1901-1925; (781); (818).

2294. - ***Nola subchlamydula*** **Staudinger, 1871** (= *kruegeri* Turati, 1911)

Nola kruegeri è descritta su individui della **Sardegna:** Cagliari, Bosco 7 Fratelli, 800 m (711).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Aosta, 583 m, 2.VI.1981 (GRL). **Puglia:** Pulo di Altamura 29.V.1979. **Basilicata:** Pollino: Rotonda 10.VI.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3007); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3024); **Alto Adige:** 1926-2000; (1572); (3007); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1951-2000; (1693); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (687); (3007); **Romagna:** 1976-2000; (2516); (3007); **Toscana:** (1926-

1950); 1976-2000; (1388); (3044); **Lazio:** 1926-1950; (2142); **Abruzzo:** 1976-2000; (3007); **Puglia:** 1976-2000; (2108); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 1976-2005; (3007); (3347); **Sicilia:** 1901-1925; (1065); **Sardegna:** 1901-2000; (711); (2249).

2295. - ***Nola chlamitulalis*** **(Hübner, 1813)** (= *chlamydulana* Duponchel, 1845)

Nuovo dato - **Calabria:** Brancaleone (RC): foce Fiumara Bruzzano 3 m 26.VIII.2001 (1 es.) (SCL).

Piemonte: 1801-1850; (114); **Lombardia:** 1901-1925; 1951-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (171); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1801-1850; 1976-2000; (114); (3183); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3007); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3462); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (3044); **Lazio:** 1851-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-2000; (1565); (2987); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2987); (3347); **Sicilia:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2005; (104*); (3228); **Sardegna:** 1801-1850; 1901-1950; (114); (1260).

2296. - ***Nola thymula*** **Millière, 1868**

Liguria: 1976-2000; (3007).

2297. - ***Nycteola revayana*** **(Scopoli, 1772)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 24 e 27.III.1981 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 8.VI.1992 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 2001-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1801-1850; 1976-2005; (112); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2005; (2768); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2000; (2141); (2642); **Abruzzo:** 1951-1975; (1603); **Campania:** 1926-1975; (1350); (1603); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (2168); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (388); (3254); **Sardegna:** 1901-2000; (781); (2587).

2298. - ***Nycteola columbana*** **(Turner, 1925)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Rotonda 26.V.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 24-25.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 7.X.1980 (PRN).

Lombardia: 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1901-1925; 1951-1975; (1509); (1787); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Liguria:** 1976-2000; (2642); (3183); **Toscana:** 1976-2005; (2642); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (1509); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2422°); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); (2642); **Calabria:** 1976-2000; (2168); (2642); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (1509); (3254); **Sardegna:** 1951-2000; (1603); (2249).

2299. - ***Nycteola degenerana*** **(Hübner, 1799)** (= *achatana* de Villers, 1789)

Nota - È citata dubitativamente per **Sicilia** e **Sardegna:** (2980); non si hanno altri dati per le isole.

Piemonte: (1851-1900); (218); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (1787); **Trentino:** 1926-1975; (1603); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-2000; (1024); (3241); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Toscana:** 1801-1850; (112); **Puglia:** 1951-1975; (2168).

2300. - ***Nycteola asiatica*** **(Krulikowsky, 1904)**

Nuovo dato - **Lombardia:** Mantova ex l. su *Populus* 23.IX.1985 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1951-2005; (1603); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1781); (2658); **Trentino:** 1951-1975; (1603); (2902); **Alto Adige:** 1901-2000; (1603); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2902); (2974); **Liguria:** 1951-1975; (1603); **Emilia:** 1951-1975; 2001-2005; (1551); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (3310); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (1603); (2085); **Lazio:** 1951-2000; (1509); (2141); **Abruzzo:** 1951-1975; (1509); (1603); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Puglia:** 1951-1975; (2168); **Basilicata:** 1976-2000; (2168); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Sicilia:** (1976-2000); (2902); **Sardegna:** 1951-2000; (2249); (2587).

2301. - ***Nycteola siculana*** **(Fuchs, 1899)**

Sarrothripus undulana var. *siculana* è descritta su esemplari della **Sicilia** (Jahrbuch Nassauisch. Ver. Naturkunde, 52: 128) (422).

Nota - Il luogo tipico di *N. siculana* è Castelbuono (343).

Nuovo dato - **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 23.V.1977 (PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (260); (1603); **Trentino:** 1851-1900; 1926-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1509); **Veneto:** 1926-2000; (1681); (2642); **Friuli:** 1851-1900; (181); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650); (1658); **Liguria:** 1976-2000; (2642); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (377); (906); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1801-1900; (112); (206); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1926-1950; (1509); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (2168); **Calabria:**

1951-1975; 2001-2005; (2168); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (422); (3254).

2302. - ***Characoma nilotica*** **(Rogenhofer, 1882)**

Lazio: 1976-2005; (3124); (3268).

2303. - ***Bena bicolorana*** **(Fuessly, 1775)** (= *prasinana* Linnaeus, 1758; *quercana* Denis & Schiffermüller, 1775; *prasinana* auct. nec Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Quart 11.VII.1979; St. Vincent 14.VII.1978. **Piemonte:** Noasca (TO) 10.VII.1973. **Veneto:** Sappada (BL) 8.VII.1989. **Liguria:** Andora (SV) 17.VI.1987 (GRL). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 1.V, 1.VII.1975, 19.VI.1985 (GRL). **Puglia:** gravina di Laterza (TA) 4.VI.1992 (NRD). **Basilicata:** Lago Sirino 13.VII.1974; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Cropani 6.VI.1981; Rotonda 3 e 20.VI.1981. **Calabria:** Rossano lido 20-30.VII.1980 (PRN); Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2903); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1951-2000; (410); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2000; (687); (2642); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2141); **Marche:** 1951-2000; (1885); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (772); (2642); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3222); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; (99); (1285); **Arcipelago campano:** 1801-1850; (72); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2005; (72); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2642); **Calabria:** 1951-2005; (2168); (2642); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2005; (247); (3254); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1950; (114); (1476).

2304. - ***Pseudoips prasinana*** **(Linnaeus, 1758)** (= *fagana* Fabricius, 1781; *sylvana* Fabricius, 1783; *fiorii* Costantini, 1911)

Hylophila fiorii è descritta su esemplari dell'**Emilia:** Modenese: San Faustino, Saliceta San Giuliano, San Pancrazio e della **Lombardia**: Alzate (Brianza) (686).

Nota - Per la **Sardegna** si ha solo una citazione generica (1388), poco attendibile.

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO): lago d'Orta 17.V.1969 (GLL, PRN); Alpi Marittime: Frabosa (CN) 7.VII.1983 (GRL). **Lombardia:** Cittiglio (VA) 5.VI.1968 (GLL, PRN). **Veneto:** Nevegal (BL) 27.VI.1974 (GRL). **Toscana:** Ansedonia (GR) 16-24.VII.1963 (DBR, PRN). **Umbria:** Sigillo (PG): Val di Ranco 8.VI.1981, 25.VI.1983.

Abruzzo: Ovindoli 9.VII.1984 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 11.VIII.1984 (RTN, PRN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001 (SCR). **Puglia:** Gargano: Foresta Umbra 9.VIII.1977, 20.VIII.2005 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1951-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1089); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (1053); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (392); (3197); **Liguria:** 1951-2000; (1659); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2000; (377); (2642); **Romagna:** 1951-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1951-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2141); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1951-2005; (2141); (3443); **Abruzzo:** 1976-2000; (2141); **Campania:** 1926-1950; 1976-2005; (1350); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (2575); **Basilicata:** 1951-2000; (2168); (2987); **Calabria:** 1976-2000; (2987); (3468); **Sicilia:** 1976-2000; (3254).

2305. - ***Earias clorana*** **(Linnaeus, 1761)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Miasino (NO) 11.V.1968 (GLL, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 13.VII.1974, 20.VII.1975, 17.VII.1978, 13.VII.1979, 9.VI.1981 (GRL). **Campania:** Lago del Matese (CE) 1000 m 10.VII.1995 (DMR, PRN). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 9 e 25.VII.2001 (SCR).

Piemonte: (1801-1850); 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2211); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1850; 1951-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2141); (2488); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3443); **Abruzzo:** 1976-2005; (3053); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1350); (2350); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2350); (3347); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (360); (3228); **Sardegna:** 1976-2000; (2249); (2587).

2306. - ***Earias albovenosana*** **Oberthür, 1917**

Sicilia: 1926-1950; (1384).

2307. - ***Earias vernana*** **(Fabricius, 1787)**

Nuovi dati - **Basilicata:** Bosco di Policoro (MT) 14.VI.2000; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001 (SCR).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1951-1975; (2029);

Trentino: 1901-1925; 1951-1975; (1038); (1653); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1958); **Veneto:** 1951-2000; (1787); (2642); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (906); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1976-2005; (518); (3428); **Umbria:** 1951-1975; (2141); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2642); **Lazio:** 1976-2005; (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); **Molise:** 1976-2000; (3222); **Basilicata:** 1976-2005; (2168); (2642); **Calabria:** 1976-2000; (2987); (3469); **Sicilia:** 1976-2000; (2168); (3254).

2308. - ***Earias insulana*** **(Boisduval, 1833)** (= *siliquana* Herrich-Schäffer, 1851)

Earias siliquana è descritta su esemplari della **Sicilia** (100*), (2576).

Lazio: 1976-2000; (3044); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1202); **Basilicata:** 1976-2000; (2642); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1975; (100*); (3327); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231).

Fam. Arctiidae

2309. - ***Nudaria mundana*** **(Linnaeus, 1761)**

Nota - È citata per la **Sardegna:** (841), (886); probabile errore di identificazione.

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII1979; Rotonda 26.VII.1979, 18.VII.1980; Terranova 3.VI.1981 (PRN). **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (164); (3273); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1901-1975; (1081); (1943); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2000; (262); (2894); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1851-1925; 1976-2000; (206); (2894); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2643); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2142); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2000; (712); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3469); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2894).

2310. - ***Thumatha senex*** **(Hübner, 1808)**

Piemonte: (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1951-1975; (3273); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1976-2000; (2469); (3250); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (983); (2270); **Romagna:** 1951-2000; (2516); (2643).

2311. - ***Paidia rica*** **(Freyer, 1858)** (= *murina* Hübner, 1790)

Nota - Le citazioni di *P. murina* per la **Sicilia** vanno riferite a *P. griseola* Rothschild.

Nuovi dati - **Liguria:** Capo Mele (SV) : Andora Barè 20.VII.1988, Molini di Triora (IM) 650 m 30.VII.1993 (CMC, PRN).

Piemonte: 1751-1800; (1801-1850); 1951-1975; 2001-2005; (20); (3378); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Liguria:** 1976-2000; (2894); (3183); **Emilia:** 1901-1925; (525).

2312. - ***Paidia griseola*** **Rothschild, 1933**

Nuovo dato - **Sicilia:** Mandria del Conte (PA), 1300 m, 30.VII.1978 (GRL).

Sicilia: 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (343); (2949).

2313. - ***Apaidia mesogona*** **(Godart, 1824)**

Sardegna: 1901-1925; 1976-2000; (894); (2421).

2314. - ***Apaidia rufeola*** **(Rambur, 1832)**

Nota - Viene data come probabile la sua presenza in **Liguria:** (218). Una citazione per il **Veneto:** (268) va confermata.

Nuovo dato - **Sardegna:** Musei (CA) 1 e 15.X.1972 (HRT, PRN).

Lombardia: 1851-1900; (2362); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2000; (344); (3044); **Lazio:** 1901-2005; (1329); (3268); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** 1976-2000; (2274); (3066); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (2274); **Sicilia:** 1976-2005; (2949); (3228); **Sardegna:** (1901-1925); 1926-1975; (505); (2067).

2315. - ***Apaidia barbarica*** **Legrand, 1938**

Apaidia barbarica ssp. *messapia* è descritta su individui della **Puglia:** San Cataldo (LE) (olotipo) e dell'**Abruzzo:** San Valentino (PS) (3066).

Abruzzo: 1976-2000; (3066); **Puglia:** 1976-2000; (3066).

2316. - ***Miltochrista miniata*** **(Forster, 1771)** (= *rosea* Fabricius, 1775)

Nuovi dati - **Piemonte:** Frabosa (CN) 2.VII.1983, 21.VII.1985; Monte Moro 8.VII.1983. **Trentino:** Levico 25.VI.1974 (GRL). **Marche:** Val di Tazza (MC) 20.IX.1976 (TBL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (129); (3068); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1976-2005; (2185); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3462); **Umbria:** 1976-2000;

(2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2005; (2142); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Basilicata:** 1976-2000; (2274); (2894); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

2317. - ***Cybosia mesomella*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Bognanco (VB) 22.VI.1977. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.VI.1972, 25.VI.1976, 12.VI.1981, 3.VII.1987. **Lazio:** Rieti 24.VI.1980. **Abruzzo:** Ovindoli 9.VII.1984 (GRL). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 15.VI.1995; Lago Arvo (CS): Righitano 1300 m 26.VI.1999 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-1975; (161); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1951-2000; (114); (3384 bis); **Emilia:** 1851-1925; (377); (1004); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2894); **Toscana:** (1751-1800); 1951-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2142); **Abruzzo:** 1901-1925; 1976-2005; (817); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Puglia:** 1976-2005; (2923); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (2923); **Calabria:** 1901-1925; 1951-2000; (1013); (2923).

2318. - ***Pelosia muscerda*** **(Hufnagel, 1766)** (= *perlella* Fabricius, 1787)

Nota - È citata genericamente per la **Puglia:** (2732), non si hanno altri dati. La citazione per la **Sardegna:** (114) è poco attendibile.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); **Piemonte:** (1801-1850); 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2005; (260); (3300); **Trentino:** 1901-1975; (1053); (1787); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (812); (1572); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (446); (2591); **Friuli:** 1901-1925; (1007); **Venezia Giulia:** 1851-1900; 1976-2000; (1060); (2894); **Emilia:** 1851-1900; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1835); (2894); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (19); (3462); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1976-2000; (2142); (2894); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3453); **Campania:** 2001-2005; (3453); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 2001-2005; (3347).

2319. - ***Pelosia obtusa*** **(Herrich-Schäffer, 1847)**

Paidina obtusa è descritta su esemplari della **Toscana**: Pratovecchio (Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 2: 156, 161, idem 6: 53) (100*); (2469).

Venezia Giulia: 1976-2000; (2894); **Emilia:** 1976-2000; (2270);

Romagna: 1976-2000; (2346); (2894); **Toscana:** 1801-1850; (100*); **Lazio:** 1926-1950; 1976-2000; (2179); (2894); **Puglia:** 1976-2000; (2692); (2894); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 2001-2005; (3467).

2320. - ***Pelosia plumosa*** **(Mabille, 1900)** (= *hispanica* Witt, 1979)

Puglia: 1976-2000; (2274); **Sardegna:** 1976-2000; (2249).

2321. - ***Atolmis rubricollis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota – La citazione generica per la **Liguria:** (1338) deriva dalla presenza nel Nizzardo. Le citazioni per la **Sicilia:** (144), (1340), sono molto dubbie.

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (807); (3273); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (2362); (3068); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2894); **Liguria:** (? 1926-1950); 1976-2000; (1388); (3183); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (3129); (3429); **Marche:** 1976-2000; (2643); (2882).

2322. - ***Lithosia quadra*** **(Linnaeus, 1758)** (= *deplana* Linnaeus, 1771)

Nota - È citata genericamente per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 30.VII.1973, 24.IX.1976, 12.VI.1977, 18.VII.1979, 9.VI.1981, 22.IX.1982; Poti (AR) 5.X.1989. **Marche:** Monti Sibillini: Monte Prata 1300 m 1.VII.1987 (GRL); Sarnano 14.VIII.1969 (PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 27.VIII.1984, Torre Lama 3-10.VIII.1984 (RTN, PRN); Scafati (SA) 21-25.VII.1983 (SNN). **Puglia:** Gargano: Vieste 4.VII.1991, 4.VIII.1998; Canosa 18.IX.1995; Bitonto 16.V.1998; Gargano: Foresta Umbra 20.VIII.2005 (PRN). **Basilicata:** Nemoli 18.VII.1979; Monticchio 6.VI, 30.IX.1983; Pollino: Belvedere 16.VII.1980; Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Lago Duglia 18.VII.1982; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980, 3.VI.1981; Rotonda 23.VII.1979, 16.VIII.1980, 4.IX.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; San Severino 7.VII.1981; Cropani VII.1980; fiume Mercure 6.X.1980, 20.VI.1982 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Rossano lido 20.VII.1981; Lago Arvo 26.VI.1999 (1 es.); Sersale (CZ) 13-20.VII.1985; Pollino: Civita 19.VII.1981; Monte Moschereto 800 m 15.VII.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VII.1979 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 26.VII.1996; Oriolo 5.VIII.1991 (SCL). **Sicilia:** Etna N: Galvarina 1800 m 22.VII.1992 (GRL). **Sardegna:** Gennargentu: S'Arcu de Tassuni 1200 m 20.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:**

1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (773); (3443); **Abruzzo:** 1951-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1976-2000; (2894); **Puglia:** 1926-1950; 1976-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2005; (156); (3347); **Sicilia:** 1976-2000; (2844); (2949); **Sardegna:** 1926-2000; (1303); (2478).

2323. - ***Eilema depressa*** **(Esper, 1787)** (= *deplana* Esper, 1787; *luteola* Hübner, 1788)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1926-1950; 1976-2000; (1425); (3197); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** 1976-2000; (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2000; (629); (2270); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3462); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2732); **Marche:** 1851-1900; 1976-2000; (385); (2894); **Lazio:** 1976-2005; (2894); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (3053); (3436); **Molise:** 1976-2000; (3156); (3436); **Puglia:** 1976-2000; (2963); (3436); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (2274); **Calabria:** 2001-2005; (3347); **Arcipelago sardo:** 1976-2000; (3436).

2324. - ***Eilema griseola*** **(Hübner, 1803)**

Nota - Le citazioni per la **Toscana:** (2732) e le **Marche:** (385) sono da confermare (3436).

Piemonte: (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (260); (2894); **Trentino:** 1901-1925; 1951-2000; (1038); (2894); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1038); (2894); **Veneto:** 1801-1900; 1926-1950; (108); (2051); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (2974); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2894); **Emilia:** 1851-1925; 2001-2005; (298); (3301); **Umbria:** 1951-1975; (3436); **Calabria:** 1951-1975; (2274).

2325. - ***Eilema lurideola*** **(Zincken, 1817)** (= *complanula* Boisduval, 1834)

Nota - I 4 esemplari di Zangheri citati per la **Romagna** e la **Toscana** in (1885) sono erroneamente identificati, nessuno di essi appartiene a questa specie (2516).

Nuovi dati - **Piemonte:** Valdieri 28.VII.1956 (GLL, PRN). **Liguria:** Caprieto di Vobbia 16.VII.1977 (CMC, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII.1979, 17.VII.1980; Lago Duglia

19.VI.1982; sorgente Acquafredda 3.VI.1981; Cropani 6.VII.1981; Rotonda 23 e 26.VII.1979, 17.VII.1980, 5.VII.1981; Rotonda: Valli 16.VII.1980; Terranova 3.VI.1981; San Severino 7.VII.1981 (PRN). **Calabria:** Umbriatico 12.VII.1982 (RTN, PRN); Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979 (PRN); Lago Arvo 12 VII. 1998, 26.VI.1999; Cava di Melis 1300 m 20.VII.1995; Potame (CS) 1000 m 13.VII.1997 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-2000; (1787); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (146); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (446); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1976-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1900; 1951-1975; (262); (1781); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3429); **Toscana:** 1851-1950; 1976-2005; (344); (3428); **Arcipelago toscano:** 1976-2000; (2599); **Umbria:** (1976-2000); (2894); **Marche:** 1951-2005; (2085); (3409); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2142); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Puglia:** 2001-2005; (3426); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1951-2005; (2108); (3401).

2326. - ***Eilema complana*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Albarasca 10-28.VIII.1980 (BER, PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 8.VII.1986 (RTN, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979; Belvedere 16.VII.1980; Lago Duglia 19.VI.1982; sorgente Acquafredda 3.VI.1981, 10-16.VIII.1980; Rotonda 26.VII, 23.VIII,16.IX.1979, 16.VII, 9 e 16.VIII, 5.X.1980, 8. e 25.VIII, 4 e14.IX.1981; Rotonda: Valli 16.VII.1980; Terranova 3.VI.1981, 18.VII.1982; San Severino 7.VII.1981; Cropani 6.VII.1981 (PRN). **Calabria:** Umbriatico 10.VII.1982 (RTN, PRN); Sila: La Fossiata 24.VII.1977; Pietralata Soprana (CS) 3.VII.1972; Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 25.VII.1971 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 18.VI.1995; Lago Arvo (CS): Righitano 1300 m 10.IX.1998 (SCL); Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR).

Valle d'Aosta: 1951-2000; (1986); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (47*); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2005; (157); (3388); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2894); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1925; 1976-2005; (24); (3428); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1943); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2005; (385); (3409); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344);

(3419); **Abruzzo:** 1801-1925; 1951-2005; (70); (3435); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1851-1900; 1976-2000; (135); (298); **Puglia:** 1951-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2000; (1538); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (156); (3401); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (354); (2949); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (223); (2935); **Sardegna:** 1851-1925; (290); (781).

2327. - ***Eilema pseudocomplana*** **(Daniel, 1939)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2625); (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3273); (3378); **Alto Adige:** (1976-2000); (2973); **Lazio:** 1976-2005; (3436); **Abruzzo:** 1976-2005; (2469); (3436).

2328. - ***Eilema caniola*** **(Hübner, 1808)** (= *lacteola* Boisduval, 1834; *vitellina* Boisduval, 1834)

Nuovi dati - **Liguria:** Caprieto di Vobbia 1.IX.1977; Capo Mele (SV) 25.IX.1978 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.IX.1976 (GRL). **Lazio:** Roma: Castel Giubileo 18.V.1938 (PRN). **Campania:** Roccadaspide (SA) 15.VI, 8.VII, 15 e 25.VIII.1986; Serino (AV) 21-28.VII, 5.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983 (SNN); Agerola (NA): località Imbarrata, 1000 m, 30.V.2001; Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Pulo di Altamura 25.VIII.1978, 29.V, 30.VI.1979; Bari: Campus 15.VI.1980, 20.IX.1984; Bari: Santa Fara 1-15.V.1980; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 11-17.X.1987; Parco delle Pianelle 29.VI, 31.VII, 4.VIII, 4 e 25.IX.1970, 30.VII.1973; San Paolo 14.V, 7.VI, 23.VI, 2.VII.1969; Mottola: Sant'Antuono 13.VIII.1977; gravina di Laterza (TA) 8 e 27.V, 28.VI, 27.VII, 25.IX.1976, 24.IX.1992, 16.VI.1999; gravina di Riggio 18.V.1990, 19 e 29.IX.1991; Castellaneta Marina 26.VI, 1.VII, 7-14.VII.1980; Torre Guaceto 24.IX.1976, 1.X.1977, 26.IX.1978, 20.IX.1979 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 18.V, 24.VIII.1986; agro Gallipoli (LE) 12.X.1986 (PRT, PRN); Veglie: Torre Lupomonaco 9.VI, 15.VII.1961 (Hartig in litt.); Ginosa Marina (TA) 17.VI.1999; Laghi Alimini 15.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 1.VI, 3.VII, 29.VIII, 18.IX.1976, 23.V.1977; calanchi di Ferrandina 23.VII.1979; Monte Caperino 24.VIII.1976; Bosco di Policoro (MT) 13.V.1977, 21.IX.1979, 6.X.1981, 14.VI.2000; Monte Vulture (PZ) 27.V.1979; Monticchio 30.IX.1983; fiume Camastra 1-17.VI, 28.VIII, 28.IX, 30.X.1975; Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Campomaggiore scalo 30.V.1976; Pollino: Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; sorgente Acquafredda 15.VIII.1980; Fiume Mercure 6.X.1980, 8.VI, 2.XI.1981; Cropani 6.VI, 6.VII, 26.IX.1981; Rotonda 11.IX.1977, 17.VII, 8.VIII, 2 E 15.IX, 16.XI.1980; Rotonda: Fosso Paraturo 2.XI.1981; Rotonda: Valli 16.VII.1980; San Severino 15.IX.1979, 7.VII.1981; Terranova 3.VI, 24.IX, 1.XI.1981, 8.X.1983 (PRN):

Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** foce torrente Coserie 8.V, 4.VI.1981; Castiglione Cosentino 16.VI.1978; Umbriatico 10.VII.1982; Pollino: Mormanno 11.IX.1977; Monte Moschereto 1000 m 15.VII, 7.X.1980, 19.VII.1981; Civita 20.V.1979; Monte Cerviero: Acquaformosa 25.VIII, 14.IX.1979; Castrovillari 10.VI.1978; Frascineto 25.VII.1979; Oriolo 9.VI.1978 (PRN); Sila Grande: Savelli (KR) 1000 m, 12.VIII.1998 (SCR); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 10.X.1994, 31.V, 3.VI.1995; Lago Arvo 26.VI.1999, Verzino: Fiume Lese 150 m 14.VI.2003; Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003; Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 21-25.VIII.2001; Lago Arvo (CS): Righitano 1300 m 10.IX.1998 (SCL). **Sicilia:** Giacalone 13.VII.1975; Mandria del Conte 31.VIII.1973 (GRL); Contrada Traversa 30.VII.1978; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 5.VIII.1978; Ficuzza 28.VII.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (380); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (380); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1801-1925; 1976-2005; (125); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3275); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3443); **Arcipelago laziale:** 1976-2000; (2732); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (2536); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2511); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2005; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2232); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2005; (109); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2732); (3055); **Sardegna:** (1801-1850); 1851-2000; (114); (2478).

2329. - ***Eilema palliatella*** **(Scopoli, 1763)** (= *unita* Denis & Schiffermüller, 1775; *gilveola* Ochsenheimer, 1810; *flaveola* Rambur, 1848)

Nota - La citazione generica per la **Sardegna:** (114) è molto dubbia.

Nuovi dati - **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001 (SCR). **Sicilia:** Casteldaccia: Solanto, 5 m, 5.VIII.1978; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 3.VIII.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (807); (2658); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3024); **Alto Adige:** 1901-1975; (566); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:**

1851-1900; 1926-2005; (244); (3380); **Friuli:** 1901-1975; (1007); (1528); **Venezia Giulia:** 1926-1950; (1060); **Liguria:** 1801-1850; (114); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (501); (1781); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2516); **Toscana:** 1901-1925; 1951-2005; (554); (3429); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3436); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1926-1950; (1408); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2923); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (147).

2330. - ***Eilema pygmaeola*** **(Doubleday, 1847)**

Nota - In Italia è presente con la ssp. *pallifrons* Zeller, 1847. È riportata genericamente per la **Sardegna** ma non si hanno segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati- **Piemonte:** Val di Susa, Bardonecchia, 1450 m, 22.VIII.1967, 3.VIII.1990 (CMC, PRN). **Marche:** Val di Tazza (MC) 29.VII.1975; Monte Comunitore 1.VIII.1976. **Lazio:** Manziana 1979; Palo 14.VIII.1972 (GRL). **Basilicata:** Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 25.VII.2001. **Calabria:** Sila Grande: Serra Toppale (CS), 1700 m, 13.VIII.1998 (SCR); Cava di Melis (CS) 1300 m 15.VIII.1996; Silvana Mansio 13.VIII.1998 (SCL). **Sicilia:** Madonie: Piano Zucchi 22.VIII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (457); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (2362); (2658); **Trentino:** 1926-2000; (1190); (2211); **Alto Adige:** 1901-1925; 1951-1975; (1024); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1926-2005; (1681); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1951-1975; 2001-2005; (1835); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2894); **Toscana:** 1951-2005; (1885); (3462); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1926-1950; 1976-2005; (1333); (3402); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1976-2000; (3467); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2894); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (2274); **Calabria:** 1976-2000; (2274); **Sicilia:** 1926-1950; 1976-2000; (2469); (2949); **Sardegna:** (1976-2000); (2732); (2931).

2331. - ***Eilema marcida*** **(Mann, 1859)**

Lithosia marcida è descritta su esemplari della **Sicilia**: Valle Pallagutta (*recte* Vallecorta) (Wiener Entomologische Monatschrift, 3 (3): 94) (144).

Nota - *L. marcida* è stata ritenuta sinonimo (3031), generazione estiva (1738) o sottospecie di *L. pygmaeola pallifrons* (1333), ed anche buona specie (2067). Illustrandone i genitali e comparandoli con quelli di *E. pygmaeola* è stato dimostrato inconfutabilmente che si tratta di buona specie (2274), ma si è continuato a considerarla ssp. di *pygmaeola*

(2469), (2931), (2980). Un nuovo lavoro (3436) ribadisce la validità della specie, si auspica definitivamente.

Lazio: 1951-2000; (2142); (3436); **Puglia:** 1976-2000; (2274); (3436); **Calabria:** 2001-2005; (3467); **Sicilia:** 1851-1950; 1976-2000; (144); (3083); **Sardegna:** 1926-1975; (1303); (3436).

2332. - ***Eilema lutarella*** **(Linnaeus, 1758)** (= *luteola* Denis & Schiffermüller, 1775; *lutea* Fabricius, 1798)

Nota - La citazione per la **Romagna:** (1885) attende conferma (2516). Le citazioni generiche per la **Lombardia:** (2362) ed il **Friuli:** (2732) e le citazioni per l'**Emilia:** (262), (377) e la **Toscana:** (19) vanno confermate.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1901-1925; 1976-2005; (747); (3378); **Lombardia:** (1851-1900); (2732); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (1038); (2894); **Veneto:** 1926-1975; (1681); **Emilia:** 1851-1900; (262); (377); **Romagna:** 1951-1975; (1885); **Toscana:** 1751-1800; (19); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2142); **Abruzzo:** 1976-2000; (2894); **Calabria:** 1976-2000; (2894); **Sicilia:** 1851-1900; (357).

2333. - ***Eilema sororcula*** **(Hufnagel, 1766)** (= *aureola* Hübner, 1803)

Nota - È citata genericamente per la **Sicilia:** (1943); non risultano segnalazioni per l'isola.

Nuovi dati - **Basilicata:** Pollino: Rotonda: Fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR).

Piemonte: (1801-1850); 1851-1900; 1976-2005; (114); (3414); **Lombardia:** 1851-1900; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2000; (446); (3068); **Friuli:** (1976-2000); (2732); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** 1976-2000; (2410); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1976-2005; (377); (3301); **Romagna:** 1976-2005; (2516); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3462); **Umbria:** 1951-1975; (2488); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (3268); **Abruzzo:** 1976-2005; (2142); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1801-1850; (70); **Puglia:** 1976-2000; (2274); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (2274); **Calabria:** 1976-2005; (2274); (3347); **Sardegna:** 1901-1975; (841); (2469).

2334. - ***Eilema uniola*** **(Rambur, 1866)**

Liguria: 1976-2000; (3183).

2335. - ***Eilema rungsi*** **de Toulgoët, 1960** (= *hellenica* Derra & Hacker, 1983)

Nota - In (2732) è indicata erroneamente come presente in **Basilicata**

invece che in **Puglia.**

Puglia: 1976-2000; (2108); (2963); **Sicilia:** 1976-2005; (2949); (3128).

2336. - **(-)** ***Zobida bipuncta*** **(Hübner, 1824)**

Nota - È citata per **Piemonte:** (1388), **Trentino:** (1388), **Alto Adige:** (172), (1388) e **Italia meridionale** (188), (1327); non è presente in Italia.

2337. - ***Setema cereola*** **(Hübner, 1803)**

Nota - È riportata genericamente per l'**Umbria:** (2732); non si hanno dati per questa regione.

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (218); (2894); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (272); (3024); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2894); **Veneto:** 1851-1900; 1926-1975; (244); (1943).

2338. - ***Setina irrorella*** **(Linnaeus, 1758)** (= *andereggi* Herrich-Schäffer, 1847)

Nuovo dato - **Marche:** Casali di Ussita 1000 m 30.VIII.1973 (TBL, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** (1751-1850); 1901-1925; 1951-1975; 2001-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (231); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (273); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; 2001-2005; (146); (3388); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (161); (3411); **Friuli:** 1851-1975; (175); (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; (262); (1004); **Toscana:** 1851-1900; (344); **Marche:** 1851-1900; 1951-2005; (385); (3409); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2142); **Abruzzo:** 1851-2005; (344); (3402); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Basilicata:** 1976-2000; (3211).

2339. - ***Setina aurita*** **(Esper, 1787)** (= *ramosa* Fabricius, 1793; *arterica* Turati, 1914)

Endrosa arterica è descritta su esemplari della **Lombardia**: Valcamonica: Cogno, 350-700 m (807).

Nota - Le citazioni generiche per la **Liguria** ed il **Veneto** sono da confermare.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Brusson 17.VII.1988; Gran San Bernardo 2100 m 13.VII.1988; (ssp. ramosa) Valmontey 8.VII.1973; Dondenaz 2000 m 16.VII.1988; Champoluc - Monte Crest 2400 m 17.VII.1988 (GRL); Monte Bianco 2200 m 9.VII.1976; La Thuile 11.VII.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Val Formazza (VB) 20.VI.1977 (GRL); Val di Susa: Rocciamelone 1000 m 13.IX.1980, 10.V.1992; Piano dei Frati 2400-2600 m 17.IX.1978; Bardonecchia: Valfredda 2200 m 10.VIII.1987; Sestriere: Col Basset 2470 m 12.VIII.1989, (ad ramosa) 11.VII.1991;

Oulx 1100 m 10.VIII.1988 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (114); (3378); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-1975; (215); (1609); **Trentino:** 1851-1950; 1976-2000; (273); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (358); **Veneto:** (1976-2000); (2732); **Liguria:** (1801-1850); (114).

2340. - ***Setina alpestris* Zeller, 1865** (= *wolfsbergeri* Burmann, 1975; *pseudokuhlweini* Vorbrodt, 1914)

Setina alpestris è descritta su esemplari dell'**Alto Adige**: dintorni di Bolzano (Entomologische Zeitung, Stettin, 26: 34) (165).

Nota - La Valle di Mollières visitata da Turati e Verity (747), ripresa in (797), (2410), è in territorio francese; non risulta ancora segnalata in **Piemonte.**

Lombardia: 1926-2000; (1502); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2441); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (165); (2469); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2000; (244); (2469); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650).

2341. - ***Setina roscida* (Denis & Schiffermüller, 1775)** (= *kuhlweini* Hübner, 1824)

Piemonte: (1801-1850); (114); **Lombardia:** 1851-1925; (218); (2990); **Trentino:** 1851-1900; (171); (273); **Alto Adige:** 1851-2000; (157); (2894); **Veneto:** 1926-1975; (1081); (1681); **Friuli:** 1926-1975; (1528); (2469); **Marche:** 1951-1975; (2085); **Lazio:** 1976-2000; (2894); **Abruzzo:** 1976-2000; (3211).

2342. - **(-)** ***Setina flavicans* (Geyer, 1836)**

Nota - Le citazioni per **Trentino, Alto Adige, Veneto** e **Venezia Giulia,** sono da riferire a *Setina alpestris wolfsbergeri* Burmannn (2469), (2894).

Fam. Syntomidae

2343. - ***Syntomis phegea* (Linnaeus, 1758)**

Sphinx ligata è descritta su esemplari del **Piemonte**: Torino: colle dei Cappuccini e fiume 'Duriam' (Dora Riparia) (6).

Nota - *S. ligata* è ssp. di *S. phegea* (1804). Le citazioni di *S. phegea* per la **Sicilia** vanno riferite a *S. kruegeri*. Una citazione per la **Sardegna:** (1589) è molto dubbia.

Nuovo dato - **Basilicata:** Serra di Calvello: Fosso Bifurno 26.VI.1979; Senise 3.VI.1981. **Calabria:** Pollino: Colle del Dragone 16.VII.1980; Civita 22.VII.1979; Timpa di San Lorenzo 29.VI.1996 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658);

Trentino: 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3007); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (568); (778); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1975; (114); (1950); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1901-1925); 1926-1950; 1976-2005; (1804); (3429); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; (966); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3462); **Molise:** 1951-2000; (2142); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (70); (3457); **Arcipelago campano:** 1951-1975; (1589); **Puglia:** 1901-2000; (468); (3007); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1804); (2108); **Calabria:** (1751-1800); (1801-1850); 1901-1925; (18); (833).

2344. - ***Syntomis ragazzii*** **Turati, 1917**

Syntomis ragazzii è descritta su esemplari della **Campania**: Sorrento, Quisisana, Torre Annunziata (Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, 56: 193, Tav. 3, figg. 11, 13, Tav. 5, figg. 4, 11, Tav. 6, fig. 2, Tav. 8, fig. 8) (869).

Nota -È noto un esemplare di **Liguria:** Genua, Riviera 6-8.VI.1925 (1m), probabile errata etichettatura (1804).

Nuovi dati - **Basilicata:** Policoro (MT): Bosco Pantano 14.VI.2000 (SCR); Pollino: Timpone Castellana 13.VII.1980; Belvedere 16.VII.1980 (PRN). **Calabria:** Longobucco (CS): Macrocioli 1150 m 9.VIII.1997, Vallone dei Ronzi 450 m 16.VI.1997; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 27.VI.1992; Carolei (CS): Valle del Busento 300 m 12.VII.1997 (SCL).

Arcipelago toscano: 1976-2000; (3384 bis); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (3007); **Abruzzo:** 1976-2000; (2758); (2819); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-2005; (70); (3457); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (3007); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3007); **Calabria:** 1901-1950; 1976-2000; (948); (3007).

2345. - ***Syntomis marjana*** **Stauder, 1913**

Nota - Le citazioni di *S. marjana* per **Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia** e **Sardegna** vanno riferite a *S. kruegeri*.

Veneto: 1926-2005; (2051); (3380); **Friuli:** 1951-1975; (1787); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (869); (3007).

2346. - ***Syntomis kruegeri*** **Ragusa, 1904**

Syntomis phegea ab. *krügeri* è descritta su esemplari della **Sicilia**: monti presso Ficuzza (Il Naturalista Siciliano, 17: 20) (488).

Syntomis (*mestralii* Bugnion?) *quercii* è descritta su esemplari delle **Marche**: Massacci di Bolognola 1200 m E.VI-A.VIII.1913 e di Sicilia (828).

Nota - *Amata (Syntomis) kruegeri kruegeri* (Ragusa, 1904) natio *quercii* (Verity, 1914), comb. & status nov. (1084). Per la **Sardegna** è noto un solo reperto (2469). Le citazioni di *S. kruegeri* per **Veneto, Friuli, Venezia Giulia**, vanno riferite a *S. marjana*

Nuovi dati - **Puglia:** Mellitto 18 e 28.V.1982; Rutigliano 16.VI.1988. **Basilicata:** Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola 4.VI.1981; Cersosimo 6.VI.1981 (PRN); Maratea (PZ): statua del Cristo, 650 m, 23.VI.1998 (SCR). **Calabria:** Calopezzati (CS): Garrubella 40 m 27.V.1997; Pollino: La Petrosa 750 m 10.VI.1997; Monte Moschereto 29.VI.1996; Colle Calderaio 1140 m 9.VI.1999; Fiumara Trionto (CS) 50 m 18.V.1999 (SCL). **Sicilia:** Palma di Montechiaro 20.V.1993 (GRL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (1804); (2713); **Piemonte:** 1901-1950; 1976-2005; (3007); (3461 bis); **Lombardia:** 1951-1975; (1787); (3007); **Trentino:** 1926-1975; (1064); (1653); **Alto Adige:** 1901-1925; (1053); **Emilia:** 1976-2000; (3007); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Marche:** 1901-1975; (828); (2085); **Lazio:** 1901-2000; (869); (2142); **Abruzzo:** 1901-2000; (869); (3007); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1926-1950; 2001-2005; (1804); (3457); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (3007); **Basilicata:** 1951-2000; (1565); (2108); **Calabria:** 1901-2000; (948); (2469); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3083); **Sardegna**; 1976-2000; (2469).

2347. - ***Dysauxes ancilla*** **(Linnaeus, 1767)**

Nota - È citata genericamente per **Liguria** e **Puglia:** (2732), non si hanno altri dati per queste regioni. La citazione per la **Sicilia:** (343) è molto dubbia.

Nuovi dati - **Campania:** Roccadaspide (SA) 28.VI.1986 (RTN, PRN). **Basilicata:** Sellata: La Maddalena 13.VII.1977; Pollino: Piano Ruggio 22.VII.1979; Terranova 3.VI.1981, 18.VII.1982, 3.VI.1985; San Severino 7.VII.1981; Rotonda 17-18.VII.1980, 29.VI.1982; Rotonda: Valli 16.VII.1980; Cropani 6.VI.1981; fiume Mercure 6.VI.1981. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 27.VII.1979 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2471); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1851-1900); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1751-1800; 1851-1900; 1926-2005; (10); (3411); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (410); (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2346); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** (1751-1800); 1851-

1925; 1976-2005; (24); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2005; (1085); (3462); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (70); (811); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (2232).

2348. - ***Dysauxes famula*** **(Freyer, 1836)**

Nuovi dati - **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 8.VI, 12-16.VII.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Monte Camplo 1.IX.1973; Parco delle Pianelle 1.VIII, 29.IX.1970, 21.V, 18.VI, 29.VI.71, 4 e 11.IX.1971, 22 e 30.VIII.1973; San Paolo 13.VI, 30.VII.1969; gravina di Petruscio 5.X.1984; Lido Silvana 10.IX.1967; Case Arse 12.V.1971 (PRN); gravina di Riggio 20.VIII.1991 (NRD); gravina di Laterza (TA) 18.IX.1992; Laghi Alimini (LE) 15.VI.1999; Presicce Marina (LE) 6.VI.2000 (SCR). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 18.IX.1976, 23.V.1977; fiume Camastra 28.VIII.1975; Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Terranova 11.VIII.1980 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Pollino: Civita 29.VI.1975 (PRN); Sersale (CZ) 24.VIII, 7.IX.1985 (RTN, PRN); Verzino: Fiume Lese 150 m 14.VI.2003; Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003; Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 21-29.VIII.2001; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 12.VI.1995; Amendolea (RC) 100 m 9.IX.2000; Monte Moschereto 2.IX.2001 (SCL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1976-2005; (3007); (3378); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007); **Liguria:** 1976-2000; (3007); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1976-2005; (1004); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (3007); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3462); **Umbria:** 1951-1975; (2032); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2005; (344); (3419); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (699); (3324); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (109); (2337); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (3007); **Basilicata:** 1951-2005; (2108); (3007); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (1013); (3347); **Sicilia:** 1801-1950; 1976-2000; (109); (3083); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231).

2349. - ***Dysauxes punctata*** **(Fabricius, 1781)**

Bombyx punctata è descritta su esemplari di **Italia** (Species Insectorum, 2: 207) (11*); (2469).

Nota - È riportata come presente in **Umbria:** (2732); non si hanno altri dati per la regione.

Nuovi dati - **Campania:** Vesuvio: Osservatorio 16.X.1985 (SNN).

Puglia: Putignano (BA): Bosco Petruzzi 20.IX.1995 (TRG, PRN). **Basilicata:** Pollino: Terranova 18.VII.1982. **Calabria:** Gambarie (RC) 8.VII, 9.VIII.1971 (PRN); Santo Stefano di Rogliano 12.IV.1982 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2211); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (2469); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1925; 1951-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (949); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-1975; (377); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-1975; (1010); (1885); **Toscana:** (1751-1800); 1851-1950; (24); (554); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2145); **Lazio:** 1851-1950; (344); (1085); **Abruzzo:** 1801-1900; 1926-1950; 1976-2000; (70); (2422°); **Campania:** 1926-1950; 1976-2000; (1141); (1350); **Puglia:** 1926-2000; (1538); (2938); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1901-1925; (1013); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (97); (3007); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3007).

2350. - ***Coscinia striata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *grammica* Linnaeus, 1758)

Nota - Una citazione per la **Sardegna:** (278); manca in **Sardegna:** (2894).

Nuovi dati - **Piemonte:** Casalborgone (TO) VII.1994 (CMC, PRN). **Liguria:** (+ f. melanoptera Brahm) Caprieto di Vobbia 29.VI.1976 (GRL). **Emilia:** Roncobilaccio (BO) 11.VII.1974, 18.VII.1975 (GRL). **Abruzzo:** Passo Godi 25.VII.1979 (GRL). **Puglia:** Mellitto 28.VI.1982; Pulo di Altamura 4.VI.1978 (PRN). **Basilicata:** Monte Sirino 1200 m 18.VII.1979, 13.VII.1980, 28.VI.1986; Lagonegro 4.VII.1987; Pollino: Serra Cappellina (San Severino) 6.VII.1981 (PRN). **Calabria:** Sila: Pietralata Soprana (CS) 9.VII.1972 (PRN); Lago Arvo (CS): Righitano 1300 m 26.VI.1999; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 23.VI.1992 (SCL). **Sicilia:** Monte Gallo (PA) 18.V.1976, 24.III.1977, 7.IX.1977, 23.X.1979; Piano Zucchi 22.VI.1975 (GRL).

Piemonte: 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; (260); (621); **Trentino:** 1851-1950; (171); (1184); **Alto Adige:** 1851-1950; (171); (1081); **Veneto:** 1751-1925; 1951-1975; (10); (1787); **Friuli:** 1851-1950; (392); (1334); **Venezia Giulia:** 1901-2000; (603); (2894); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3007); **Emilia:** 1801-1900; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3428); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1741); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1801-

2000; (109); (3417); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1950; 1976-2000; (314); (3053); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1901-1925; (1013); **Puglia:** 1801-1850; 1901-2000; (70); (2894); **Basilicata:** 1951-2000; (1658); (3298); **Calabria:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2000; (70); (1013); **Sicilia:** (1851-1900); 1976-2000; (147).

2351. - ***Coscinia cribraria*** **(Linnaeus, 1758)** (= *cribrum* Linnaeus, 1761)

Bombyx candida è descritta su esemplari della **Campania** (15).

Nota - *Bombyx candida* è ssp. di *C, cribraria.* Le citazioni generiche per la **Venezia Giulia**, la **Puglia** e la **Sardegna** sono da confermare.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Ayas 18.VII.1988; Cogne 12.VII.1988 (GRL). **Piemonte:** Val Susa: (St. Com. Marie), 1500 m, 25.VI.1991. **Liguria:** Rocchetta Nervina (IM), 600 m ,23.VII.1986 (CMC, PRN). **Toscana:** Le Gobbie (LU), 1200 m, 20.VIII.1989; Massa, 7.X.1990 ex l. (GRL). **Calabria:** Sila: Camigliatello, 15-25.VI.1978. **Sicilia:** Altavilla Milicia: Valle del Corvo, 6.VIII.1979; Sciacca, 300 m, 13.IX.1995 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (453); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (170); (3293); **Veneto:** 1851-1900; 1951-2005; (161); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2974); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (760); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (2894); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-2000; (1741); (3322); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2142); **Abruzzo:** 1901-2005; (1127); (3402); **Molise:** (1801-1850); 1976-2000; (70); (3403); **Campania:** 1751-1800; 1901-1950; (15); (1285); **Puglia:** (1976-2000); (2732); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); **Calabria:** 1976-2000; (2732); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1976-2000; (97); (343); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (2894); (3055); **Sardegna:** (1801-1850); (114).

2352. - ***Coscinia bifasciata*** **(Rambur, 1832)**

Sardegna: (1801-1850); 1851-2000; (114); (2894).

2353. - ***Coscinia libyssa*** **(Püngeler, 1907)**

Coscinia caligans è descritta su esemplari della **Sicilia**: Monti Rossi (Etna) (553).

Nota - In **Sicilia** è presente con la ssp. *caligans* Turati, 1907.

Sicilia: (1851-1900); 1901-1950; 2001-2005; (147); (3320).

2354. - ***Utetheisa pulchella*** **(Linnaeus, 1758)** (= *pulchra* Denis & Schiffermüller, 1775)

Nuovi dati - **Campania:** Torre del Greco 9.V.1955 (PRN). **Puglia:** Mottola (TA): gravina di Petruscio 12.X.1991 (NRD). **Calabria:** Rossano (CS): Lampa Patire 250 m 20.X.1997; Amendolea (RC) 100 m 9.IX.2000 (SCL). **Sicilia:** Nebrodi: Mistretta 2.X.1961 (coll. IEAP); Ficuzza 11.IX.1969; Selinunte: Foce Belice 14.X.1990 (GRL).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1900; 1926-1975; (260); (1787); **Trentino:** 1901-2000; (1053); (2894); **Alto Adige:** 1851-1925; (566); (1053); **Veneto:** 1801-1925; 1951-1975; (98); (1787); **Venezia Giulia:** 1801-1900; (109); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2000; (114); (3384 bis); **Emilia:** 1801-1900; (110); (262); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (3114); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2000; (19); (3190); **Arcipelago toscano:** 1951-1975; (1741); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-1975; (385); (2085); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; 1951-1975; (99); (1013); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (1139); **Puglia:** 1951-2000; (2108); **Basilicata:** 1951-1975; (1658); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (3200); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (257); (3320); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (330); (3055); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1975; (114); (2110).

2355. - ***Ocnogyna corsica*** **(Rambur, 1832)**

Sardegna: (1801-1800); 1901-2000; (114); (2469); **Arcipelago sardo:** 1901-1925; 1976-2000; (781); (2894).

2356. - ***Ocnogyna boeticum*** **(Rambur, 1837)**

Nota - È riportata come presente in **Trentino**, **Romagna:** (2619); e **Campania:** (1388); non si hanno altri dati per queste regioni.

Marche: 1851-1900; (521); **Lazio:** 1901-1925; (513); **Abruzzo:** 1851-1950; (513); (2142); **Campania:** (1926-1950); (1388); **Puglia:** 1901-1975; (513); (1776); **Basilicata:** 1951-1975; (1508); **Calabria:** 1901-1925; (521); (547); **Sicilia:** 1901-1925; 1951-2000; (1019); (2894).

2357. - ***Ocnogyna parasita*** **(Hübner, 1790)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1851-1900; 1976-2005; (293); (3378); **Lombardia:** 1976-2000; (2524); (3073); **Trentino:** 1926-1950; 1976-2000; (1320); (2894); **Alto Adige:** (1951-1975); (1647); **Liguria:** 1976-2000; (2278).

2358. - ***Chelis maculosa*** **(Gerning, 1780)**

Nota - È riportata come presente in **Venezia Giulia** e **Romagna:** (2732); non si hanno altri dati per queste regioni.

Nuovo dato - **Umbria:** Sigillo (PG), Val di Ranco 29.VI.1973 (GRL). **Marche:** Monte Monaco, 18.VII.1972 (TBL, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1901-1950; (164);

(1279); **Trentino:** 1901-2000; (812); (3024); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-1950; (1053); (1681); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1951-1975; (2469); (3183); **Toscana:** 1976-2000; (2516); **Umbria:** 1951-1975; **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (622); (2142); **Abruzzo:** 1926-2005; (1127); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Basilicata:** 1976-2000; (2108); (2274).

2359. - ***Chelis simplonica*** **(Boisduval, 1840)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (3273); **Lombardia:** 1851-1900; (164); (218); **Alto Adige:** 1851-1900; (2362); **Veneto:** 1901-1925; (769).

2360. - ***Watsonarctia deserta*** **(Bartel, 1902)** (= *casta* Esper, 1785, nec Pallas, 1767)

Nuovi dati - **Piemonte:** Sestriere 28.VI.1983 (PRN). **Basilicata:** Rifreddo (PZ) 12.VI.1984 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Lombardia:** 1901-1925; 1976-2000; (797); (2894); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (3293); **Alto Adige:** 1901-1925; 1976-2000; (1053); (2469); **Veneto:** 1951-2005; (1787); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (3007); **Liguria:** 1901-1925; 1976-2000; (687); (3183); **Emilia:** 1901-1925; 1951-1975; (688); (1551); **Romagna:** 1951-2005; (1885); (3429); **Toscana:** 1976-2005; (2196); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** (1926-1950); 1951-2000; (1388); (2890); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1976-2000; (3466); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206).

2361. - ***Phragmatobia fuliginosa*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Lombardia:** Brescia 16.V.1962 (GLL, PRN). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 13.IV-19.V, 7 e 28.VII, 30.X.1983, 25.X.1984, Torre Lama 2-27.VIII.1984, 1-22.IX, 20.X.1988; Eboli 4.V.1983; Portici 22.IV-10.V, 30.VI-16.VII.1983; Roccadaspide (SA) 8-15.VII, 15 e 28.VIII.1986; Serino (AV) 21-28.VII, 18.VIII-16.IX.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Trinitapoli 6.X.1983; Pulo di Altamura 25.VIII.1978, 4 e 29.V, 30.VI.1979; Ceglie 4.IV.1977; Bari: Santa Fara 20-30.IV, 1-15.V, 1-15.VI.1980; Bari 10-15.X.1980, 7.VIII.1985; Mola 26.IX.1979; Locorotondo 20.VI.1992; Monte Camplo 1.IX, 30.IX.1973; Parco delle Pianelle 29.VI, 26.VII.1970; San Paolo 6, 17 e 24.VII.1969; gravina di Massafra 24.IX, 26.IX, 28.IX.1971; gravina di Laterza (TA) 25.IX.1976, 16.VI.1999; Castellanta Marina 7-14.VII.1980; fiume Lato 15.VI.1991; Taranto: Mar Piccolo 26.V.1979; Taranto 4.VII.1980; Villa Castelli 6.V.1975; Torre Guaceto 24.IX.1976, 1.X.1977, 4.VIII, 26.IX.1978, 15.X.1979 (PRN); Veglie: Torre Lupomonaco 11.VI-15.VII.1961 (Hartig in litt.); Gallipoli (LE): Baia

Verde 25.IV e 19.X.1986, 10.VII.1987, 9.V.1988 (PRT, PRN). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 1.VII, 3.VII, 18.IX.1976, 10.III, 23.V.1977; calanchi di Ferrandina 27.VI.1979; Metaponto: San Marco 22-28.IV.1985; Bosco di Policoro (MT) 24.IV, 13.V, 19.VI.1977, 24.IV, 19.VI.1978, 21.IX.1979; Rotondella 5.V.1978; Pietrapertosa 18.VII.1971; Monte Vulture (PZ) 20.V, 20.VI.1969; Monticchio 6.VI.1983; Monte Caperino 28.VIII.1973; fiume Camastra 31.V1971, 22 e 29.VIII.1975, 29.V, 26.VI.1976; Sellata: La Maddalena 15 e 22.VII.1977; Pollino: Piano Ruggio 18.VII.1977, 20.VI.1982; Lago Duglia 18.VII.1982; Timpone Castellana 9.V.1981, 23.VII.1979; Timpone Balsamano 13.VIII.1980; fiume Mercure 8.VI, 6.X.1980, 6.VI.1981, 20.VII.1982, 18.V.1983; Cropani 6.VI.1981; Rotonda 11.IX.1977, 13 e 17.V.1982; Terranova 11.VIII.1980, 15-18.V.1983; fosso Paraturo 16.V.1983 (PRN); Fiume Noce (PZ) 23.VI.1998; Rionero in Vulture (PZ), località Grotticelle, 600 m, 7.VI.2000, 9.VII.2001, 25.IX.2001 (SCR). **Calabria:** Sila: La Fossiata 24.VII.1979; Sersale (CZ) 6.VII-28.VIII, 19-20.X.1985; foce torrente Coserie 8.V, 4.VI, 20.VII.1981; Pollino: Civita 20.V.1979; Vallone Colloreto 6.VI.1981; Campotenese 14.IX.1991; Frascineto 25.VII.1979 (PRN); Domanico (CS) 800 m 28.VI.1997, 30.III.2000; Foce Fiume Crati (CS) 5 m 9.V.2003; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 30.IV.1995, 30.V.1995, 15.VII.1995; Laghi La Vota (CZ) 5 m 7.VI.1997; Nicastro (CZ) 100 m 2.VII.1997; Verzino: Fiume Lese 150 m 14.VI.2003; Verzino: Grave Grubbo 180 m 20.VI.2003; Brancaleone: foce Fiumara Bruzzano 3 m 25.VIII.2001 (SCL). **Sicilia:** Madonie: Mandria del Conte 2.VI.1995; Monte San Salvatore 1600 m 28.VIII.1976; Altavilla Milicia: Valle del Corvo 3.VIII.1978; Casteldaccia 25.VII-3.VIII.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2005; (164); (3308); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3024); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-2000; (181); (3197); **Venezia Giulia:** 1801-1850; 1901-1925; (109); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1926-1950; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1951-2005; (1683); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1951-2000; (1741); (3322); **Umbria:** (1976-2000); (2732); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3443); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-2005; (314); (3462); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3403); **Campania:** 1801-1850; 1926-1950; 1976-2000; (72); (2536); **Arcipelago campano:** 1926-1950; (2469); **Puglia:** 1951-2005; (1538); (3426); **Basilicata:** 1951-2005; (1658); (3298); **Calabria:** 1751-1800; 1901-1925; 1976-2005; (13); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (94); (3228); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3231); **Sardegna:** (1801-1850);

1901-2000; (114); (2249).

2362. - (-) ***Phragmatobia placida*** **(Frivaldsky, 1835)**

Nota - È citata per la **Campania:** (1350); è una errata identificazione, da riferire a *P. fuliginosa*.

2363. - ***Phragmatobia caesarea*** **(Goeze, 1781)** (= *luctifera* Esper, 1784)

Nota - La citazione per la **Liguria occidentale** (218) deriva dalla presenza nel Nizzardo.

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 20.V.1959, 5.V.1975, 25.V.1987, 24.V.1990; Molinelli (AR) 28.V.1988; Montagnano (AR) 27.V.1982 (GRL). **Marche:** Sarnano, Montioli, 1100 m, 5.VI.1970 (PRN).

Piemonte: 1801-1850; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1901-2000; (734); (2658); **Trentino:** 1901-1975; (1038); (1943); **Alto Adige:** 1901-1925; (1038); (1053); **Veneto:** 1851-1900; 1926-2005; (367); (3380); **Friuli:** 1926-1975; (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Emilia:** 1951-1975; (1781); **Romagna:** (1851-1900); 1976-2000; (314); (2185); **Toscana:** 1951-2005; (2051); (3429); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2145); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2894); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (2894).

2364. - ***Cymbalophora rivularis*** **(Ménétriés, 1832)**

Nuovi dati - **Lazio:** Villa Camponeschi: Colle Petruccio 1000 m 22.VIII.1997 (Zilli in litt.). **Abruzzo:** Pescocostanzo 22.VIII.1938 (DBR, PRN).

Umbria: 1976-2000; (2894); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2894); **Lazio:** 1976-2000; (2142); (2894); **Abruzzo:** 1901-2000; (553); (2894).

2365. - ***Cymbalophora pudica*** **(Esper, 1785)**

Nuovi dati - **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 30.X.1983; Serino (AV) 8.IX-5.X.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 29.IX.1983 (SNN). **Puglia:** Palazzo d'Ascoli Satriano (FG) 4.X.1985; Trinitapoli 6.X.1983; Pulo di Altamura 24.VIII.1978; Locorotondo 20.VIII.1992; Putignano (BA): Bosco Petruzzi 17-19.IX.1986; Monte Camplo 30.IX, 1.X.1973, 2.IX.1975; San Paolo 16.IX.1969, 18.IX.1971; gravina di Petruscio 5.X.1984, 12.X.1991; gravina di Riggio 8, 19 e 29.IX.1991; gravina di Laterza (TA) 25.IX.1973, 28.VI.1976, 18-24.IX.1992; gravina di Massafra 24 e 28.IX, 12.X.1971; Statte 17.IX.1971; Lido Silvana 10.IX.1967; Torre Guaceto 24.IX.1976, 1.X.1977, 26.IX.1978 (PRN). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 3.VII, 29.VIII, 18.IX.1976; Bosco di Policoro (MT) 21.IX.1979, 6.X.1981; Camastra 17.VI.1975, 16.VII.1976; Pollino: Timpone Castellana 13.IX.1979; Rotonda 11.IX.1977, 14-18.IX.1979, 15.IX.1980, 4 e 23.IX.1981; Terranova 25.IX.1981; Cropani 26.IX.1981; fiume Mercure 6.X.1980 (PRN).

Calabria: Sersale (CZ) 24.VIII, 5.X.1985, 19.X.1986, 14.IX.1989; Cosenza 8.IX.1983; Pollino: Civita 19.VII.1981; Monte Moschereto 7.X.1980; Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN); Amantea (CS) 150 m 1.X.1995; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 1.IX.1992 (SCL). **Sicilia:** Mandria del Conte 1.X.1994; Sciacca 300 m 30.IX.1995; Sambuca di Sicilia: 16.IX.1959; Ponte (Marsala) 29.IX.1960; Cefalù 23.X.1988 (GRL). **Sardegna:** Musei (CA) 8.X.1972; Domus de Maria 14.X.1990 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 2001-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Trentino:** 1901-1925; (1053); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Liguria:** 1901-1925; 1951-2000; (894); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1976-2000; (2185); (3108); **Toscana:** (1801-1850); 1851-2005; (73); (3429); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2005; (1044); (3322); **Umbria:** 1951-2000; (2142); (2488); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1901-2000; (807); (3268); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Campania:** 1976-2000; (2732); (3431); **Puglia:** 1801-1850; 1951-2000; (70); (2924); **Arcipelago pugliese:** 1976-2000; (2894); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (2108); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (2206); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1950; 1976-2005; (97); (3128); **Arcipelago siciliano:** 1851-1900; 1976-2000; (349); (3055); **Sardegna:** (1801-1850); 1926-2000; (114); (1975).

2366. - ***Parasemia plantaginis*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - È riportata come presente in **Venezia Giulia:** (2732); da confermare.

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** Champoluc 2400 m 20.VII.1987; Val d'Ayas 2400 m 14.VII.1988. **Trentino:** Val di Genova 26.VI.1967 (GLL, PRN). **Marche:** Monti Laga: Torrente Castellano 1600 m 11.VII.1972 (GRL); Monte Vettore 20.IV.1975; Sarnano 27.VI.1965, 26.VI.1966 (DBR, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1951-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1976-2005; (6); (3378); **Lombardia:** 1851-1950; 1976-2000; (215); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (272); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (146); (1831); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1926-1975; (98); (1943); **Friuli:** 1851-1900; 1926-1975; (181); (1528); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (3129); **Toscana:** (1851-1900); 1976-2000; (344); (3136); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2894); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2142); **Abruzzo:** (1851-1900); 1951-2000; (344); (2429°); **Molise:** 1851-1900; 1976-2000; (712); (3173).

2367. - ***Grammia quenselii*** **(Paykull, 1791)**

Nuovo dato - **Piemonte:** Sestriere 2200 m ex l. 7.VII.1990 (CMC, PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** (1926-1950); 1976-2005; (1388); (3378); **Lombardia:** 1851-1900; 1976-2000; (231); (2894); **Trentino:** 1851-1925; (273); (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (170); (2894).

2368. - ***Holoarctia cervini*** **(Fallou, 1864)**

Nota - È citata anche per il **Trentino:** (2732), ma è presente solo in **Alto Adige.**

Alto Adige: 1976-2000; (2469).

2369. - ***Spilosoma lutea*** **(Hufnagel, 1766)** (= *lubricipeda* auct. nec Linnaeus; *rhodosoma* Turati, 1907; *menthastri* Esper, 1786)

Spilosoma rhodosoma è descritta su esemplari della **Sicilia:** Ficuzza: Macchia dello Zingaro (553).

Nota - *Spilosoma rhodosoma* è una forma tipica della Sicilia dal caratteristico addome rossastro.

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 20.VI, 11.VIII.1968, 12.VIII.1970; Stupinigi 10.VIII.1971 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 6.VII.1983, 15.VI.1985 (GRL). **Lombardia:** Recco 7.VI.1967 (GLL, PRN). **Trentino:** Brentonico 1970 m 16.VI.1986 (GRL). **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 4.VIII.1969, 20.VII.1973; Nevegal (BL) 28.VI.1974. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 11.VI.1977, 28.V.1982, 1.VI.1982, 6.IX.1987; Montagnano (AR) 3.VI.1988 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Cioffi 17.VIII.1980, 19.V.1983, Torre Lama 3.VIII.1984, 1.IX.1988; Serino (AV) 8.IX.1984 (RTN, PRN) ; Scafati (SA) 16-20.VII, 14.VIII.1983 (SNN). **Sicilia:** (ssp. rhodosoma Turati) Ficuzza 25.V.1979, 1.VI.1982, 30.VI.1984, 8.VI.1989, 30.V.1991, 11.VI.1991, 1.VI.1992; Piana degli Albanesi 2.VI.1978, 29.IV.81; Mandria del Conte 6.VI.1989 (GRL). **Sardegna:** Belvì (NU) 700 m 8.VI.1975; Monte Ferru 22.VI.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (164); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2005; (98); (3380); **Friuli:** 1901-1925; 1976-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1851-1925; 1951-2005; (262); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2000; (344); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1926-1950; 1976-

2000; (1285); (2536); **Puglia:** 1951-2000; (1538); (2108); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1976-2005; (2923); (3347); **Sicilia:** 1851-1925; 1976-2000; (333); (2949); **Sardegna:** 1901-1975; (1260); (1975).

2370. - ***Spilosoma lubricipeda*** **(Linnaeus, 1758)** (= *menthastri* Denis & Schiffermüller; *lutea* auct. nec Hufnagel, 1766)

Nota - Le citazioni per la **Sicilia** di *S. lubricipeda* vanno riferite a *S. lutea*. È riportata come presente in **Basilicata** e **Calabria:** (2732), ma l'unica citazione generica per queste regioni risale al 1863 (156), probabilmente ripresa dalla citazione generica per il **Regno di Napoli** (70).

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** St. Vincent 13.VII.1978 (GRL). **Piemonte:** Moncalieri (TO) 21.VIII.1968, 6.IV.1970, 27.IV.1978 (GLL, PRN); Frabosa (CN) 6.VII.1982, 21.VII.1985; Val Bognanco (VB) 17.VI.1977. **Veneto:** Colli Euganei: Torreglia (PD) 4.VIII.1969. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 6.V.1985; Molinelli (AR) 15.V.1987 (GRL). **Campania:** Battipaglia (SA): Torre Lama 3-10.VIII.1984 (RTN, PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (2591); **Trentino:** 1901-2000; (1038); (2475); **Alto Adige:** (1851-1900); 1901-2000; (170); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1951-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1901-2000; (1007); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1900; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1851-1900; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (772); (3268); **Abruzzo:** 1976-2000; (2593); (3324); **Campania:** 1976-2000; (2536); (2940); **Puglia:** 1976-2000; (2894); **Arcipelago pugliese:** 1901-1925; (556); **Sardegna:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (2249).

2371. - ***Spilosoma urticae*** **(Esper, 1789)**

Nota - La citazione per la **Liguria:** (1388) probabilmente è dovuta alla presenza nel Nizzardo. La citazione per la **Sicilia:** (2732) è dubbia, probabilmente da riferire alla **Calabria,** che non è citata.

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 10.VIII.1968 (GLL, PRN). **Lombardia:** Bardello (VA) 21.VIII.1988 (GRL).

Valle d'Aosta: (1901-1925); (797); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1976-2005; (260); (3308); **Trentino:** 1901-1950; 1976-2000; (1053); (2475); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-1975; (368); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1851-1900; 1951-1975; (446);

(3279); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2894); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (2270); **Romagna:** 1901-1925; 1976-2000; (1010); (2894); **Toscana:** 1976-2000; (2894); (3171); **Puglia:** 1976-2000; (2274); (2963); **Calabria:** 1976-2000; (2274).

2372. - ***Hyphantria cunea* (Drury, 1773)**

Nota - È citata come probabilmente presente in **Umbria** e **Sardegna:** (2865); non si hanno altri dati per queste regioni.

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2514); **Piemonte:** 1976-2005; (2668); (3461 bis); **Lombardia:** 1976-2005; (2381); (3308); **Veneto:** 1976-2005; (2402); (3380); **Friuli:** 1976-2000; (2668); (2865); **Venezia Giulia:** 1976-2000; (2831); **Liguria:** (1976-2000); (2911); **Emilia:** 1951-2005; (2301); (3301); **Romagna:** 1976-2005; (2540); (3465 bis); **Toscana:** 1976-2005; (2971); (3310); **Marche:** 1976-2000; (2865); (2894); **Puglia:** 1976-2000; (2230).

2373. - ***Diaphora mendica* (Clerck, 1759)**

Nota - È citata genericamente per **Friuli** e **Umbria:** (2732), (2894); non si hanno altri dati per queste regioni.

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 2.V.1971 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 23.VI.1977 (GRL); Caselette (TO) 1.VI.1987 (CMC, PRN). **Liguria:** Andora (SV): Barè 31.III.1991 (CMC, PRN). **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 25.V.1987 (GRL). **Campania:** Aquilonia Scalo (AV) 15.V.1980 (Bertaccini in litt.). **Puglia:** Putignano (BA): Bosco Petruzzi 24-30.III.1986; Locorotondo 26.IV.1981; gravina di Petruscio 20.V.1985. **Basilicata:** Metaponto: San Marco 3-30.IV.1985; Rotondella 5.V.1978; Vulture (PZ): Monticchio 30.IV.1983; Trivigno scalo 18.IV.1977; Pollino: Timpone Castellana 6.VI.1981; Rotonda 20.V.1979, 13.V.1982, 16.V.1983; Terranova 12-22.IV.1983; fiume Mercure 16.V.1983 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 28.IV.1991; Paola (CS) 150 m 15.V.2002 (SCL). **Sicilia:** Nebrodi: San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2769); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-2005; (108); (3380); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1850; 1951-1975; (110); (1551); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1851-1900; 1976-2005; (206); (3462); **Arcipelago toscano:** 2001-2005; (3322); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-1925; 1951-2005; (344); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1976-2000; (344); (3324); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1976-2000; (2894); **Puglia:** 1951-2000; (2108); (2729); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-

2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1901-1925; 1976-2005; (811); (3347); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (73).

2374. - ***Diaphora sordida*** **(Hübner, 1803)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2174); (3145); **Piemonte:** 1801-1850; 1901-1925; 1976-2005; (114); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1951-2000; (260); (3461 bis); **Trentino:** 1851-2000; (273); (2894); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1958); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1951-1975; (1787); (1943); **Friuli:** 1951-1975; (1528); **Liguria:** 1901-1925; (683); **Toscana:** 1976-2000; (3129); **Marche:** 1976-2000; (2894); **Abruzzo:** (1851-1900); 1926-1950; 1976-2000; (314); (2894).

2375. - ***Diaphora luctuosa*** **(Hübner, 1833)**

Nota - La citazione per l'**Alto Adige:** (1024) è probabilmente errata (1038). Molto dubbie le citazioni per l'**Emilia:** (110) e la **Sicilia:** (73). È citata genericamente per il **Piemonte:** (2362) e per il **Friuli:** (2732), da confermare.

Venezia Giulia: 1901-1925; 1976-2000; (1060); (3007).

2376. - ***Rhyparia purpurata*** **(Linnaeus, 1758)** (= *purpurea* Linnaeus, 1767)

Nuovi dati - **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 19.VI.1974, 4.IV.1988 ex l.; San Severo (AR) 16.VII.1983 (GRL). **Sicilia:** Giacalone 20.VI.1986 (GRL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2780); (3145); **Piemonte:** 1751-1850; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1951-1975; (164); (2014); **Trentino:** 1851-1975; (171); (1787); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; (81); (367); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (1060); **Liguria:** 1951-2000; (2553); (3183); **Emilia:** 1951-2005; (2118); (3301); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1851-1900; 1951-2005; (206); (3428); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2894); **Lazio:** 1851-1900; 1951-2000; (344); (2142); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (2945); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Puglia:** 1976-2000; (2274); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1951-1975; (2274); **Sicilia:** 1851-1900; 1951-2000; (144); (3083).

2377. - ***Diacrisia sannio*** **(Linnaeus, 1758)** (= *russula* Linnaeus, 1758)

Nuovi dati - **Valle d'Aosta:** La Thuile 30.VI.1976 (TBL, PRN). **Piemonte:** Valdieri 7.VII.1983 (GRL); Albarasca (AL) 10-28.VIII.1980 (BER, PRN); Caselette (TO) ex o. 8.VIII.1993 (CMC, PRN). **Lombardia:** Valtellina: Val Viola 7.VII.1979. **Veneto:** Livines (BL) 1500 m 12.VI.1989. **Friuli:** Taipana 30.VI.1987. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 29.V.1982, 7.VI.1982; Pratomagno (AR)

1.VI.1982. **Umbria:** Sulmona 26.VII.1979; Orvieto 12.VI.1972 (GRL). **Basilicata:** Monte Sirino 1200 m 11.VI.1988; Sellata: La Maddalena 25.VI.1979. Sila: Sila: Camigliatello 15-25.VI.1978 (PRN). **Calabria:** Sila: Camigliatello 15-25.VI.1978 (PRN).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (797); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** (1851-1900); 1901-2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (146); (3293); **Veneto:** 1801-1900; 1926-2005; (81); (3380); **Friuli:** 1851-1900; 1926-2000; (174); (3197); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1950; 1976-2005; (19); (3428); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2488); **Marche:** 1901-1925; 1951-2000; (847); (2883); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2005; (772); (3268); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2005; (344); (3435); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania**: (1975-2000); (2894); **Puglia:** 1926-1950; (1538); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1976-2000; (2206); **Sicilia:** 1851-1900; (144); (1340).

2378. - ***Hyphoraia aulica*** **(Linnaeus, 1758)** (= *testudinaria* auct. nec Fourcr.)

Nota - Le citazioni di *H. aulica* per **Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria** e **Sicilia** sono da riferire a *H. testudinaria* (2894).

Friuli: 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (410); (2894).

2379. - ***Hyphoraia testudinaria*** **(Geoffroy, 1785)** (= *maculania* Lang, 1789; *curialis* Esper, 1790; *civica* Hübner, 1790)

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-1925; 1976-2000; (260); (2894); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1975; (170); (1572); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1850; 1951-2005; (108); (3380); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (2894); **Emilia:** 1801-1925; 1976-2000; (110); (2894); **Romagna:** 1951-2000; (1885); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1976-2000; (2142); **Marche:** 1951-2000; (2108); (2894); **Lazio:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2469); **Abruzzo:** 1976-2000; (2142); (2894); **Molise:** 1976-2000; (2894); (3164); **Campania:** 1976-2000; (2923); **Puglia:** 1951-1975; (2108); **Basilicata:** 1976-2000; (2923); **Calabria:** 1976-2000; (2923); (3158); **Sicilia:** 1951-1975; (2718).

2380. - ***Pericallia matronula*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Valle d'Aosta** (114), il **Piemonte:** (448), la **Lombardia:** (164), attendono conferma. È riportata come

presente in **Venezia Giulia** e **Liguria:** (2732); non risultano segnalazioni per queste regioni.

Valle d'Aosta: (1801-1850); (114); **Piemonte:** (1851-1900); (188); **Lombardia:** (1851-1900); (164); **Alto Adige:** 1901-1925; (170); (2894); **Veneto:** 1751-1900; 1976-2005; (10); (3455); **Friuli:** 1951-2000; (1528); (3197).

2381. - ***Arctia fasciata*** **(Esper, 1785)** (= *tigrina* de Villers, 1789)

Piemonte: 1751-1850; 1901-1925; 1976-2005; (20); (3378); **Liguria:** (1851-1900); 1976-2000; (218); (2278).

2382. - ***Arctia caja*** **(Linnaeus, 1758)**

Nota - Le citazioni generiche per la **Sicilia:** (304) e la **Sardegna:** (114) sono poco attendibili.

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 29.VIII.1968 (GLL, PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Castellana 17.VII.1980; Piana San Francesco 14.VIII.1980; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; Lago Duglia 18.VII.1982; Belvedere 16.VII.1980; Rotonda 7.VII, 1-4.IX.1981; Rotonda: Valli 18.VII.1980; San Severino 7.VII.1981. **Calabria:** Sila: Camigliatello 5-15.VII.1979; Fossiata 24.VII.1979; Silvana Mansio 11.VIII.1998; Santo Stefano di Rogliano 10.VI, 5-10.VII.1981 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** 1751-1925; 1951-2005; (6); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3241); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3411); **Friuli:** 1851-1925; 1976-2000; (392); (2894); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2000; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1900; 1976-2005; (19); (3429); **Umbria:** (1976-2000); (2894); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2883); **Lazio:** 1951-2000; (1684); (2142); **Abruzzo:** (1851-1900); 1901-1925; 1951-2000; (344); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3173); (3164); **Campania:** 1851-1900; (135); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (1943); (3298); **Calabria:** 1951-2000; (2108); (2206).

2383. - ***Arctia flavia*** **(Fuessly, 1779)**

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2894); (3145); **Piemonte:** 1976-2000; (2894); **Lombardia:** 1901-1925; (1053); **Trentino:** 1851-1925; 1976-2000; (218); (2894); **Alto Adige:** 1851-2000; (231); (2894).

2384. - ***Arctia villica*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Moncalieri (TO) 29.VI.1971 (GLL, PRN); Val Bognanco (VB) 30.VI.1977, 20.VI.1979, 6.VI. 1980, 2.VII.1983. **Liguria:** Andora 11.VII.1985. **Toscana:** Pieve a Maiano (AR) 7.VI.1988, 29.V.1989. **Abruzzo:** Ovindoli 9.VII.1974 **Molise:** Pesche 23.V.1982 (GRL); Petacciato (CB) 2 m 3 e 10.VI.1997 (SCR).

Campania: Battipaglia (SA): Cioffi 12-26.V.1983; Portici 10-23.V.1983; Roccadaspide (SA) 22-28.VIII.1986; Serino (AV) 30.VI, 7-19.VII.1984 (RTN, PRN); Vesuvio: Osservatorio 30.V.1985 (SNN); Amalfi (SA): Valle delle Ferriere, 300 m, 29.V.2001 (SCR). **Puglia:** Zapponeta 18.V.1979; Pulo di Altamura 4.V, 29.V.1979; Mellitto 16.V.1979; Modugno (BA) 30.IV.1982; Bari: Santa Fara 1-15.V.1980; Mottola 9.V.1995; Parco delle Pianelle 30.V, 5.VI.1968, 19.V.1969, 11.V, 18.VI, 21-28.V.1971; San Paolo 16.V.1969, 25.V.1970, 18.V.1971, 14.V.1972; Faggiano 23.IV.1970; gravina di Laterza (TA) 27.V.1976, 28.IV, 8.V.1992; gravina di Riggio 18.V.1990; gravina di Petruscio 20.V.1985; gravina di Ginosa 28.V.1980; Castellaneta Marina 18.V.1980; Villa Castelli 5-15.V.1975; Case Arse 12.V.1971 (PRN); Gallipoli (LE): Baia Verde 9-21.V.1988 (PRT, PRN); Otranto 11.VI.1999 (SCR). **Basilicata:** Bradano: Santa Lucia 1.VI.1976, 23.V.1977; Bosco di Policoro (MT) 24.IV, 13.V.1977, 5.V.1978, 18.V.1979; Metaponto: San Marco 28.IV, 11.V.1983; Rifreddo 12.VI.1984; Monte Vulture (PZ) 27.V.1969; Monticchio 6.VI.1983; fiume Camastra 1.V, 1-17.VI.1975, 27.VI.1976, 15.VI.1977, 19.V.1985; Campomaggiore scalo 30.V.1976; Sellata: La Maddalena 26.VI.1979; Pollino: Timpone Castellana 9.V.1981; Lago Duglia 18.VI.1982; sorgente Acquafredda 19.VI.1982; fiume Mercure 8.VI.1980, 20.VI.1982; Rotonda 10.VI.1978, 7-8.VI, 21.VI.1980, 8 e 26.V, 8.VI.1981, 17.V, 17.VII.1982, 15-31.V.1983; fosso Paraturo 16.V.1983; Terranova 6.VI.1981, 19.VI.1982, 15.V-20.VI.1983; Cropani 6.VI.1981 (PRN); Vulture (PZ), località Grotticelle 7.VI.2000 (SCR). **Calabria:** Campotenese 17.VI.1981; Sila: Piano Caruso 9.V.1981; Pollino: Torrente Raganello 16.V.1983 (PRN); Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 10.V.1992, 26.V.1995, 30.V.1995, 15.VI.1995 (SCL). **Sicilia:** (ssp. angelica B.) Piana degli Albanesi 2.VI.1978, 12.IV.1981, 12.V.1986; Caronie 1300 m 29.VI.1971; Mandria del Conte 30.III.1986, 6.VI.1989; Polizzi 1.III.1985 ex l.; Giacalone 1.VI.1973, 24.V.1977; Campobello di Mazzara 17.IV.1980; Ficuzza 9.VI.1989, 12.III.1990 ex l.; Etna N - Linguaglossa 18.VI.1989 (GRL); San Gregorio (ME) 10 m 5-10.V.1997 (VTL).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (2431); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1801-2000; (44); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-1925; 1951-2000; (171); (3293); **Veneto:** 1751-2005; (10); (3380); **Friuli:** 1851-1975; (392); (1528); **Venezia Giulia:** 1901-1925; (650); (1060); **Liguria:** (1801-1850); 1901-1925; 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3301); **Romagna:** (1901-1925); 1951-2005; (1010); (3465 bis); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Arcipelago toscano:** 1901-1925; 1976-2000; (1044); (3322); **Umbria:** 1951-1975; (1996); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:**

1801-2005; (73); (3268); **Abruzzo:** 1951-2000; (2142); (3305); **Molise:** 1976-2000; (3164); (3173); **Campania:** 1801-1850; 1901-1950; 1976-2005; (99); (2536); **Arcipelago campano:** 1976-2000; (2894); **Puglia:** 1901-2000; (921); (2924); **Basilicata:** (1951-1975); 1976-2000; (2108); (3298); **Calabria:** (1751-1800); 1901-1925; 1976-2005; (13); (3347); **Sicilia:** 1801-2005; (97); (3228); **Sardegna:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3101).

2385. - ***Arctia festiva*** **(Hufnagel, 1766)** (= *hebe* Linnaeus, 1767)

Nota - È citata con dubbio per la **Lombardia:** (164) e riportata come presente in **Emilia** e **Romagna:** (2732), non risultano altri dati per queste regioni.

Nuovi dati - **Calabria:** Pollino: Monte Moschereto 23.IV.1999; Colle Calderaio 5.IV.1997 (SCR).

Piemonte: 1801-1850; 1901-1925; (114); (797); **Trentino:** 1851-1925; (171); (1053); **Alto Adige:** 1851-1925; (171); (1053); **Veneto:** 1801-1900; (98); (268); **Venezia Giulia:** 1851-1900; (218); **Liguria:** 1976-2000; (3007); **Toscana:** (1851-1900); 1951-1975; (218); (2020); **Umbria:** 1951-1975; (2085); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2894); **Lazio:** 1926-2000; (1085); (2894); **Abruzzo:** (1801-1850); 1926-2000; (70); (2894); **Molise:** 1976-2000; (3173); **Puglia:** (1751-1800); 1801-1850; 1951-2000; (15); (3298); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** (1851-1900); 1976-2000; (156); (3467); **Sicilia:** 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (197); (3083).

2386. - ***Callimorpha dominula*** **(Linnaeus, 1758)**

Nuovi dati - **Piemonte:** Val Gesso: Terme di Valdieri (CN) 1300 m 25-26.IV.1990 (forma rossa) (CMC, PRN). **Lombardia:** Cittiglio (VA) VI.1968 (GLL, PRN). **Basilicata:** Pollino: Piano Ruggio 22.VII.1979; Timpone Castellana 17.VII.1980; Rotonda 20.VI.1982; Rotonda: Valli 16.VII.1980 (PRN). **Calabria:** Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 29.VI.1992; Acri (CS) 1000 m 10.VII.1999; Longobucco (CS): Vallone dei Ronzi 500 m 16.VI.1997 (SCL).

Valle d'Aosta: 1901-1925; 1976-2000; (659); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; 1851-1925; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (260); (3073); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2984); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (2469); catturata dopo il 1970 (2973); **Veneto:** 1801-1900; 1951-2000; (98); (3068); **Friuli:** 1851-2000; (392); (3197); **Venezia Giulia:** (1976-2000); (2732); **Liguria:** (1801-1850); 1976-2000; (114); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2005; (1010); (3429); **Toscana:** 1801-1925; 1951-2005; (110); (3429); **Umbria:** 1901-1925; (847); **Marche:** 1951-2000; (2085); (2894); **Lazio:** 1951-2000; (2142); **Abruzzo:** (1801-1850); 1901-2000; (70); (3305); **Molise:** 1976-2000; (2142); (3164); **Campania:** 1801-1925; (73); (1013); **Puglia:** (1976-2000); (2732); **Basilicata:** 1951-1975; (2108); **Calabria:** (1801-

1850); 1901-1925; 1951-2000; (70); (2108); **Sicilia:** (1801-1850); 1926-2000; (73); (2949).

2387. - ***Euplagia quadripunctaria*** **(Poda, 1761)** (= *hera* Linnaeus, 1767)

Phalaena (Noctua) hera è descritta su esemplari della **Liguria:** Genova (7*) (2794).

Nota - La citazione generica per la **Sardegna** va confermata.

Nuovi dati - **Piemonte:** Val di Susa: Amodera 31.VII.1976 (CMC, PRN). **Liguria:** Andora: Barò 13.VIII.1973 (GRL). **Campania:** Serino (AV) 25.VIII, 8.IX.1984 (RTN, PRN). **Puglia:** Castelluccio dei Sauri (FG) 27.VI.1982; Pulo di Altamura 28.VII.1983; Noci 28.VI.1991; Gargano: Foresta Umbra 25.VIII.2005 (PRN). **Basilicata:** Pollino: Timpone Balsamano 13.VIII.1980; Timpone Castellana 23.VII, 13.IX.1979; Piano Ruggio 5.VIII.1998; Rotonda 14 e 16.IX.1979, 9.VIII.1980; San Severino 15.IX.1979; Terranova 10-15.VIII.1980. **Calabria:** Pollino: Monte Cerviero, Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN); Longobucco (CS): Macrocioli 1100 m 29.VII.1997; Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 13.VIII.1989 (SCL).

Valle d'Aosta: 1851-1900; 1976-2000; (417); (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1851-1925; 1951-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-2000; (253); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (3293); **Alto Adige:** 1851-2000; (171); (3024); **Veneto:** 1751-1900; 1926-2005; (10); (3411); **Friuli:** 1926-2000; (1528); (2974); **Venezia Giulia:** 1851-1925; (650); (1014); **Liguria:** 1751-1900; 1951-2000; (7*); (3183); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; 2001-2005; (110); (3301); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (3108); **Toscana:** 1751-1800; 1901-1925; 1951-2005; (19); (3462); **Umbria:** 1801-1850; 1951-2000; (109); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2894); **Lazio:** 1901-2005; (656); (3386); **Abruzzo:** 1901-2000; (817); (3305); **Molise:** 1976-2005; (3173); (3469); **Campania:** 1801-1850; 1901-1975; (99); (1591); **Puglia:** 1926-2005; (1538); (2108); **Basilicata:** 1951-2000; (2108); (3298); **Calabria:** 1851-1900; 1951-2000; (277); (2206); **Sicilia:** (1801-1850); 1851-1900; 1926-1950; 1976-2000; (97); (3083); **Sardegna:** (1801-1850); (114).

2388. - ***Tyria jacobaeae*** **(Linnaeus, 1758)** (= *senecionis* Godart, 1832)

Nota - È riportata come presente in **Molise** e **Basilicata:** (2732); manca nel **Molise:** (2894).

Nuovi dati - **Lazio:** Sasso Furbara 28.VI.1980 (GRL). **Calabria:** Bagnara Calabra (RC), 30 m, 10.VII.2001 (larve) (SCL); **Sardegna:** Sassari 27.III.1961 (PRN).

Valle d'Aosta: 1976-2000; (3145); **Piemonte:** 1751-1800; (1801-1850); 1901-1950; 1976-2005; (20); (3461 bis); **Lombardia:** 1851-

2000; (260); (2658); **Trentino:** 1851-2000; (171); (2475); **Alto Adige:** 1851-1975; (171); (1572); **Veneto:** 1801-1900; 1926-1975; (98); (3279); **Friuli:** 1851-1900; (392); **Venezia Giulia:** 1901-1925; 1951-1975; (650); (1478); **Liguria:** (1801-1850); (114); **Emilia:** 1801-1925; 1951-1975; (110); (1781); **Romagna:** 1901-1925; 1951-2000; (1010); (2516); **Toscana:** 1751-1800; 1851-1925; 1951-2005; (19); (3429); **Umbria:** 1951-2000; (1996); (2142); **Marche:** 1851-1925; 1951-2000; (385); (2883); **Lazio:** 1851-2000; (344); (2142); **Abruzzo:** 1901-1925; 1951-2000; (772); (2142); **Campania:** 1801-1850; 1901-1925; (70); (811); **Arcipelago pugliese:** 1976-2000; (2732); **Calabria:** 1851-1900; 2001-2005; (156); (3466); **Sicilia:** 1801-1900; 1926-2000; (109); (2949); **Arcipelago siciliano:** 1976-2000; (3032); **Sardegna:** (1851-1900); 1901-1975; (290); (781).

Ringraziamenti

Questa monografia vuole anche essere un doveroso riconoscimento a tutti i lepidotterologi "dilettanti" senza la cui passione ed il cui impegno ben poco sarebbe noto sulla lepidotterofauna italiana.

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla raccolta del materiale bibliografico, dagli appassionati ai colleghi e amici delle varie Università italiane, ai Bibliotecari dei Musei nazionali ed esteri. Ugualmente si ringraziano quanti hanno messo a disposizione i dati inediti in loro possesso, identificati con un "°", consentendo di integrare notevolmente le notizie riunite.

Un particolare ringraziamento rivolgiamo alla Signora Franca Todisco che ha destinato parte del proprio tempo libero alla fotocomposizione del testo e del documento .pdf.

Infine, riconosciamo con gratitudine di avere un grande debito nei confronti delle nostre Mogli e Figli che ci hanno permesso di dedicare tempo ed attenzioni a questo studio, ben oltre il consueto orario di lavoro.

Data l'enorme quantità di lavori schedati nell'arco di oltre trenta anni qualche svista è possibile, anzi probabile. Saranno molto gradite le considerazioni ed i rilievi, in vista di un "addenda et corrigenda".

Acknowledgement:

We wish to thank the enthusiastic support from many friends and colleagues from the Universities, and amateur collectors whose commitment and interest are the basement for this paper.

A special thanks must be devoted to all Museums, Libraries and University employers; to people that sent me unpublished data that are recalled by a "°" and thanks to Franca Todisco for the use of patience and free time during the text and .pdf typesetting of this paper.

We deeply acknowledge our Wives and Sons that make us able to attend this study far beyond the usual working time.

The present publication should not exist without of.

Bibliografia Consultata

1 CUPANI F. 1713 - Panphyton siculum sive historia naturalis de animalibus stirpibus, fossilibus, quae in Sicilia, vel in circuito ejus invenientur - Panormi, Ex Typographia Regia Antonini Epiro, 3 voll., 658 Tavv.

2* GARBELLI F. 1741 - Lettera a Francesco Roncalli: nell'Historiae morborum observationibus acute et clariss. virorum consultat. atque epistolis illustratae, auctore Francesco Roncalli etc. - Brixiae (in Bettoni, 1884).

3* LINNÉ C. 1761 - Fauna Suecica. Editio altera - Holmiae.

4* LINNÉ C. 1763 - Museum Ludovicae Ulricae Reginae - Holmiae.

5 SCOPOLI J.A. 1763 - Entomologia carniolica, exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeana - Vindobonae, Typis Ioannis Thomae Trattnerm, XXXVI + 420 pp., 43 Tavv.

6 MÜLLER O.F. 1766 - in: Manipulus Insectorum Taurinensium a Carolo Allionio editus - *Miscellanea di Filosophia e Matematica della Società Reale di Torino per gli anni 1762-1765*, 3 (7): 185-198.

7* LINNÉ C. 1767 - Systema Naturae. Tom. I. Pars. I. edit. XII - Holmiae.

8* SULZER 1776 - Abgekürzte Geschichte der Insekten nach dem Linnaeischen System - Winterthur.

9* ESPER E.J.C. 1777-1805 - Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Erster Theil, nebst den Supplementen - Erlangen, im Verlage Wolfgang Walthers, voll. I (1777) - V (1794), Suppl. III (3) (1800), (fino 1805).

10 TURRA A. 1780 - Insecta Vicetina, in Florae italicae Prodromus - ex Officina Turreana, Vicenza: 1-16.

11* FABRICIUS J.C. 1781 - Species Insectorum Exhibentes Eorum Differentias Specificas, Synonyma Auctorum, Loca Natalia, Metamorphosin Adiectis, Observationibus, Descriptionibus. Tom. II - Hamburgi et Kilonii. Crol. Ernest Bohnii, 517 pp.

12* LAICHARTING 1782 - in Fuessly: Archiv der Insecten-geschichte - Zürich u. Winthertur.

12bis* HERBST 1783 - Natursystem der Schmetterlinge - Berlin, 11 vol.

13 PETAGNA V. 1786 - Specimen Insectorum ulterioris Calabriae - Neapoli, Typis Petri Perger, V + 46 pp., 1 Tav.

14* HÜBNER J. 1786-1791 - Beiträge zur Geschichte Schmetterlinge. 2 vol. - Augsburg. I Vol. 1786-1789, II vol. & Suppl. 1791.

15 CYRILLUS D. 1787 - Entomologiae Neapolitanae specimen primum - G. V. Scheel, Neapoli, 13 pp., 13 tavv.

16* BORKHAUSEN 1788-1794 - Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge - Frankfurt. I (1788), II (1789), III (1790), IV (1792), V (1794).

17 DE VILLERS C. 1789 - Caroli Linnaei Entomologica, Faunae Sueciae descriptionibus aucta. Tomus secundus – Lugduni, Sumptibus Piestre et Delamollière.

18 LINNÉ C.A. 1789 - Systema Naturae. Editio decima tertia. Tom. I. Pars V. Insecta. III. Lepidoptera - Lugduni, Apud J. B. Delamolliere: 2225-2618.

19 ROSSI P. 1790 - Fauna Etrusca sistens Insecta quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit Petrus Rossius - Liburnii: Typis Thomae Masi & Sociorum: 348 pp.

20 GIORNA M.E. 1791-1793 - Calendario Entomologico, ossia Osservazioni sulle stagioni degl'Insetti nel' Clima Pimontese e Particularmente n' Contorni di Torino - Nella Stamperia Reale, Com permissione, Torino, 146 pp.

21* PETAGNA V. 1792 - Institutiones Entomomologicae. Tom. II - Neapoli.

21bis* BORKHAUSEN 1793 - in Scriba, Beiträge zur Insekten Geschichte - Frankfurt, vol. 3.

22* FABRICIUS J.C. 1793-1794 - Entomologica Systematica emendata et aucta. Tom. III. Pars. I et II - Hafniae.

23* HÜBNER J. 1793-1827 - Sammlung europäischer Schmetterlinge (Pap., Sph., Bomb., Noct., Geom., Pyr., Tort., Tin., Al.) - Augsburg.

24 ROSSI P. 1794 - Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas. Tom. II - Pisis. Ex Typographia Prosperi.

25* HÜBNER J. 1796-1833 - Sammlung europäischer Schmetterlinge. Vol. 7. Tortrices - Augsburg. 53 tavv., pp. I-III-IV + 1.16.

26 DE PRUNNER L. 1798 - Lepidoptera Pedemontana - Augusta Taurinorum Excudebat Mathaeus Guaita, LII + 121 pp.

27 DE LOCHE 1801 - Papillons du Piémont nouvellement connus - *Mém. Acad. Torino,* 11: 139-150.

27bis* LASPEYRES J.H. 1801 - Sesiae Europaeae Iconibus et Descriptionibus illustratae - Berolini, 32 pp., 1 Tav.

28 HOFFMANSEGG J.C. 1804 - Alphabetisches Verzeichniss zu J. Hübner's Abbildungen der Papilionen mit beigefügten vorzüglichsten Synonymen - *Magazin für Insektenkunde*, von Karl Illiger (edit.), III: 181-206.

29 HOFFMANSEGG J.C. 1806 - Erster Nachtrag zu des Gr. v. Hoffmansegg (sic!) alphabetischem Verzeichnisse von Hübner's

Papilionen - *Magazin für Insektenkunde*, von Karl Illiger (edit.), V: 176-183.

30 OCHSENHEIMER F. 1807 - Die Schmetterlinge von Europa. Erster Band. Falter, oder Tagschmetterlinge. Erste Abtheilung - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 323 pp.

31 OCHSENHEIMER F. 1808 - Die Schmetterlinge von Europa. Erster Band. Falter, oder Tagschmetterlinge. Zweite Abtheilung - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 240 + XXX pp.

32 OCHSENHEIMER F. 1808 - Die Schmetterlinge von Europa. Zweiter Band. Schwärmer, oder Abendschmetterlinge (Sphinges Linn. Zigaene, Sesiae et Sphinges Fabr.) - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 256 pp.

33 OCHSENHEIMER F. 1810 - Die Schmetterlinge von Europa. Dritter Band - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 360 pp.

34 GAGLIARDI G.M. 1811 - Del Papiglione dell'Asclepiade. Adunanza del 5 Novembre 1807 - *Atti del Reale Istituto per l'Incoraggiamento delle Scienze Naturali,* Napoli, 1: 155-161, 1 tav.

35* GERMAR 1817-1844 - Fauna Insectorum Europae - Halan.

36 OCHSENHEIMER F. 1816 - Die Schmetterlinge von Europa. Vierter Band. Nachtrag zu den drei ersten Bänden - Gerhard Fleischer dem Jüngern, Leipzig, 223 pp.

37* SCINÀ D. 1818 - Topografia di Palermo, nota 188 - Palermo.

38 NACCARI F.L. 1821 - Lettera sopra un bruco - *Giornale delle Scienze e Lettere delle Provincie Venete*, V: 3-7.

39* GODART 1822 - Histoire Naturelle des Lepidopteres ou Papillons de France. Vol. 2 - Meguignon-Marvis and Sons, Paris.

40* GODART J.B. 1825 - Histoire Naturelle des Lépidoptéres ou Papillons de France. Vol. V - Meguignon-Marvis and Sons, Paris, 300 pp., Tavv. 41-71.

41 TREITSCHKE F. 1825 - Die Schmetterlinge von Europa. Fünfter Band. Erste Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 414 pp.

42 TREITSCHKE F. 1825 - Die Schmetterlinge von Europa. Fünfter Band. Zweite Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 417 pp.

43 BONELLI F.A. 1826 - Descrizione di sei nuove specie di insetti Lepidotteri diurni raccolte in Sardegna dal cav. Alberto della Marmora negli anni 1822 e 1823 - *Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino*, 30 (1838) (1): 171-188, di cui copie sono state messe a disposizione nel febbraio 1826.

44 LANFOSSI P. 1826 - Lepidoptera. In: Saggio di Storia Naturale dei contorni di Mantova - *Giornale di Fisica, Chimica, Storia Naturale, Medicina, er Arti*, Dec. II, Tom. VIII (1825): 15-26, Tom. IX (1826): 197-205.

45 TREITSCHKE F. 1826 - Die Schmetterlinge von Europa. Fünfter Band. Dritte Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 420 pp.

46* DUPONCHEL 1826-1842 - Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. (Continuation de l'ouvrage de Godart) - Paris. Tom. VI (1826) - XI (1838). Suppl. Tom. I (1832) - IV (1842).

47* GORNO P. 1827 - Bruco delle muraglie - *Commentari dell'Ateneo*: 63-65, Brescia (in Bettoni, 1884).

48 LEFEBVRE A. 1827 - Description de divers insectes inédits recueilles en Sicile - *Mémoires de la Société Linneénne de Paris*, VI (2): 94-108, Tav. V.

49 LEFEBVRE A. 1827 - Description de trois Papillons nouvellement observés - *Memoires de la Société Linneénne de Paris*, V: 486-492, Tav. XI.

50 TREITSCHKE F. 1827 - Die Schmetterlinge von Europa. Sechster Band. Erste Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 444 pp.

51* MEIGEN J.W. 1827-1832 - Systematisce Beschreibung der europäischen Schmetterlinge, mit Abbildungen auf Steintafe – J.A. Mayer, Aachen & Leipzig, vi+170 pp.

52* HÜBNER J., GEYER 1827-1841 - Sammlung europäischer Schmetterlinge. Fortsetzung von Geyer (Pap. t. 182-207, Sph. t. 36-38, Bomb. t. 70-83, Noct. t. 158-185, Geom. t. 106-113, Pyr. t. 31-32, Tort. t. 49-52, Tin. t. 70-71) - Augsburg.

53* BOISDUVAL J.A. 1828 - Essay sur une Monographie des Zygénides - Paris.

54 COSTA O.G. 1828 - Fauna di Aspromonte e sue adiacenze. Lepidotteri - *Atti della Regia Accademia delle Scienze*, tornata del 12 Febbraio 1828, IV:168-169.

55 COSTA O.G. 1828 - Rapporto sull'escursioni fatte al Vesuvio in agosto, ottobre, novembre e dicembre 1827 - *Atti della Regia Accademia delle Scienze*, tornata del 9 gennaio 1828, IV: 55-60.

56* FREYER C.F., 1828 - Beyträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge, T. 1 - Augsburg.

57 TREITSCHKE F. 1828 - Die Schmetterlinge von Europa. Sechster Band. Zweite Abtheilung - Gerhard Fleischer, Leipzig, 319 pp.

58 BERTOLONI J. 1829 - Memoria sopra due rare farfalle trovate nel promontorio Lunese - *Annali del Museo Cuvico di Storia Naturale,* Bologna, II: 237-240.

59 BOISDUVAL J.A. 1829 - Europaeorum Lepidopterorum Index Methodicus. Pars prima (Sistens genera *Papilio*, *Sphinx*, *Bombyx* et *Noctua* Lin.) - Apud Méquignon-Marvis, Librarium-Editorem, Parisiis, 103 pp.

60* BOISDUVAL J.A. 1829 - Europaeorum Lepidopterorum Index Methodicus. Errata et Addenda - Apud Méquignon-Marvis, Librarium-Editorem, Parisiis, 8 pp.

61* BOISDUVAL J.A. 1829 - Monographie des Zygénides - Errata et Addenda - Paris: 1-8.

62 TREITSCHKE F. 1829 - Die Schmetterlinge von Europa. Siebenter Band - Gerhard Fleischer, Leipzig, 252 pp.

63 PASSERINI C. 1830 - Sopra due specie d'insetti nocivi, uno alla vite, il brucio (sic) della *Procris ampelophaga*, e l'altro al Cavolo Arboreo, la larva, o baco del *Lixus octolineatus*. Comunicazione tenuta il 6 dicembre 1829 - *Atti dell'I. e R. Accademia dei Georgofili di Firenze*, VIII (1): 11-23, tav. I.

64 BONAPARTE C.L. 1831 - Cenni sopra le variazioni a cui vanno soggette le farfalle del gruppo *Melitaea* - *Antologia, giornale di Scienze, Lettere e Arti*, Vol. XLII della Collezione, Volume Secondo del secondo decennio, Aprile, Maggio e Giugno 1831: 157-160.

65 LEFEBVRE A. 1831 - F. de Duponchel. *Fidonia duponcheliaria* - *Magasin de Zoologie*, Paris, I (II): 32 (2 pagg., 1 tav.).

66* FREYER C.F., 1831-1833 - Neuere Beyträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Erster Band - Augsburg. Carl Kollmann, 182 pp., IV, 95 pl.

67 DE FEISTHAMEL I. 1832 - Notice sur le *Bombyx Repanda* (Hübner), appartenant au genre Megasoma (Boisduval) - *Annales de la Société entomologique de France*, I: 340-347.

68 LEFEBVRE A. 1832 - Caractère distinctif entre quelques Satyres Européens de la section des Leucomelaniens - *Annales de la Société entomologique de France*, I: 80-90.

69 LEFEBVRE A. 1832 - F. gris-cendré. *Fidonia spodiaria*- *Magasin de Zoologie*, Paris, II: Classe IX, (2 pagg., Pl. 8).

70 COSTA O.G. 1832-1836 - Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte prima. Lepidotteri Diurni, Crepuscolari ed alcune famiglie de' Notturni - Napoli, dai torchi del Tramater, pp. XI + 204, tavv. I-XIV.

71* BOISDUVAL J.A. 1832-1837 - Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus de l'Europe - Paris I (1832), II (1834); tavv. 70-84 (post 1836?).

72 COSTA O.G. 1834 - Cenni zoologici ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali discoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834 - Tip. di Azzolino e Comp., Napoli, 80 pp.

73 TREITSCHKE F. 1834 - Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Erste Abtheilung der Supplement - Ernst Fleischer, Leipzig, 286 pp.

74 DE FEISTHAMEL I. 1835 - Description de trois Lépidoptères nouveaux de la tribu des Phalénites - *Annales de la Société entomologique de France*, IV: 151-154.

75 TREITSCHKE F. 1835 - Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Zweite Abtheilung der Supplement - Ernst Fleischer, Leipzig, 340 pp.

76 TREITSCHKE F. 1835 - Die Schmetterlinge von Europa. Zehnter Band. Dritte Abtheilung der Supplement - Ernst Fleischer, Leipzig, 302 pp.

77* BOISDUVAL J.A. 1836 - Species Général des Lépidoptères. Tom. I. Papillons diurnes - Paris.

78 DE FEISTHAMEL I. 1837 - Notice sur trois Lépidoptères nouveaux, dont un de Sicile et deux d'Espagne - *Annales de la Société entomologique de France*, VI: 299-302.

79* MENIS W. 1837 - Saggio di Topografia statistico-medica della provincia di Brescia - Vol. 2, Brescia.

80 HEEGER E. 1838 - Beitraege zur Schmetterlingskunde oder Abbildungen und Beschreibungen neuer Sicilianischer Schmetterlinge - Wien, Ed. J. P. Sollinger, 7 pp, 1 tav.

81 MARTENS G. 1838 - Lepidotteri. In: Reise nach Venedig. Teil 2 - Stettin'schen Buchandlung, Ulm: 664 pp.

82* RAMBUR P. 1838-1839 - Faune Entomologique de l'Andalousie - Livr. I-V (p. 1-301) Paris, 1838-1839 (p. 305-336 non ed.).

83* HERRICH-SCHÄFFER G.A.W. 1838-1844 - Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer, Faunae Insectorum Germaniae Initia oder Deutschlands Insecten-Fauna) - Regensburg, Heft 111-190.

84 COSTA A. 1839 - Di due novelle specie di Lepidotteri discoperte sul Gran Sasso d'Italia - *Corrispondenze zoologiche.* 1: 149-150, pl. IX.

85 GENÉ J. 1839 - De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cogniti - *Memorie della Regia Accademia delle scienze di Torino*, Ser. 2, vol. 1, Fasc. II: 43-84.

86* POWER G. 1839 - Itinerario per la Sicilia - Cataloghi vari di insetti siciliani, pag. 125.

87 TOMMASI S. 1839 - Sunto d'una Memoria riguardante la Faune Entomologica delle Adiacenze di Reggio - *Corrispondenze zoologiche.* 1: 146-148.

88 BOISDUVAL J.A. 1840 - Genera et Index Methodicus Europaeorum Lepidopterorum - Apud Roret, Bibliopolam, Parisiis, 238 pp.

89 COSTA O.G. 1840 - Su un nuovo Lepidottero - *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali di Catania*, XV (1839): 289-294.

90* COSTA O.G. 1840 - Fauna siciliana ossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse regioni dell'isola e sue dipendenze e le acque che le bagnano contenente la descrizione dei nuovi o poco

esattamente conosciute con figure ricavate da originali viventi e dipinti al naturale. Vol. I. Animali vertebrati - Napoli.

91 COSTA O.G. 1840 - Statistica Fisica ed economica della isola di Capri. 9. Insetti - *Esercitazioni Accademiche degli Aspiranti Naturalisti in Napoli*, II (1): 80-86.

91bis COSTA O.G. 1841 - Atlante della Statistica Fisica ed economica della isola di Capri - *Esercitazioni Accademiche degli Aspiranti Naturalisti in Napoli,* Tav. 6, fig. 4a, b.

92 ISNARDI F. 1840 - Storia del Papilione Jasius e della seta che si può ricavare dal suo baco - Genova, Stamperia Casamara, 14 pp., 1 Tav.

93* COSTA O.G. 1841 - Catalogo dei Lepidotteri del Regno di Napoli - 16 pp., 1 tav.

94 CALCARA P. 1842 - Cenno topografico dei dintorni di Termini - Palermo, Tip. e Legat. Roberti: 32 pp.

95 CALCARA P. 1842 - Descrizione dell'Isola di Ustica - *Giornale Letterario*, Palermo, n. 229: 64 pp., 1 carta.

96 COSTA A. 1842 - Note sur les *Callimorpha dominula* et *donna* - *Annales de la Société entomologique de France*, XI: 239-241.

97 GHILIANI F. 1842 - Insetti di Sicilia determinati dal Sig. F. Ghiliani nel suo viaggio in questa isola. Anno 1839. Lepidoptera - *Atti dell'Accademia Gioenia di scienze naturali di Catania*, XIX: 43-48.

97bis* FREYER C.F. 1842-1845 - Neuere Beyträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Fünfter Band - Augsburg. M. Krieger, 166 pp., pl. 385-480.

98 CONTARINI N. 1843 - Catalogo degli uccelli ed insetti delle provincie di Padova e Venezia. Ordo sextus. Lepidoptera - Baseggio Ed., Bassano: 35-39.

99 COSTA A. 1843 - Esposizione sommaria delle osservazioni raccolte durante l'anno 1842 intorno allo sviluppo ed apparizione successiva degli insetti nei contorni di Napoli - *Annali della Accademia degli Aspiranti Naturalisti*, Napoli, 1: 37-68.

100* HERRICH-SCHÄFFER G.A.W. 1843-1856 - Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa als Text, Revision und Supplement zu Hübner - Regensburg. Voll. I-VI.

101 BLANCHARD E. 1844 - Recherches entomologiques faites en Sicile et en Calabre en 1844 - *Annales de la Société entomologique de France*, 2, Bulletin Entomologique: LXXVIII-LXXXVI.

102 DE SÈLYS-LONGCHAMPS 1844 - Lettre sur quelques Lépidoptères recuillis en Italie - *Annales de la Société entomologique de France*, 2, Bulletin Entomologique: XII-XIII.

103 DE SÈLYS-LONGCHAMPS E. 1844 - Énumération des Insectes Lépidoptères de la Belgique. Description des espèces prèsumèes

nouvelles et de quelques variétés remarquables - *Mémoires de la Société royale des Sciences de Liége*: 35 pp.

104* DUPONCHEL 1845 - Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe - Paris.

105* LANFOSSI P. 1845 - Sulla concordanza botanico-entomologica nella distribuzione geografica, per ciò che riguarda la Lombardia, considerata come un mezzo per conoscere approssimativamente la diversità dei climi della Lombardia stessa - Estratto dallo *Spettatore*, III (16), Milano.

106 ZUCCARELLO PATTI M. 1845 - Illustrazioni Entomologiche della Sicilia - *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania*, (II) 2: 23-64.

106bis* FREYER C.F., 1846-1852 - Neuere Beyträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Volume 6 Band - Augsburg. Math. Rieger, 195 pp., pl. 481-600.

107* CALCARA P. 1847 - Descrizione di Lampedusa - *Giornale letterario*, n. 229.

108 CONTARINI N. 1847 - Notizie sulla fauna terrestre e particolarmente sulla ornitologia del Veneto Estuario con cenni sul passaggio degli uccelli e sulla caccia. Ordine Lepidotteri. In: Venezia e le sue lagune - I. R. Privil. Stabilimento Antonelli, Venezia, Vol. 2: 180-183.

109 ZELLER P.C. 1847 - Bemerkungen über die auf einer Reise, nach Italien, und Sicilien beobachteten Schmetterlinge - *Isis*, 40: (2): 121-159, (3): 213-233, (4): 284-308, (6): 401-457, (7): 481-521, (8): 561-594, (9): 641-673, (10): 721-771, (11): 801-859, (12): 881-914.

110 BERTOLONI J. 1847-1849 - Historia Lepidopterorum agri bononiensis - *Novi Commentari Academiae scientiarum Instituti Bononiensis*, VII (1847): 205-261; VIII (1848): 105-164, IX (1849): 97-183.

111 COSTA O.G. 1848-1850 - Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte seconda. Geometre - (1848): 1-52; (1849): 53-88; (1850): 89-104.

112 ZELLER P.C., 1849-1850 - Verzeichniss der von Herrn Jos. Mann beobachteten Toscanischen Microlepidoptera - *Stettiner entomologische Zeitung*, X (1849) (5): 200-223, (7) 231-256; (9): 275-287; (11): 312-317; XI (1850) (1): 59-64, (3): 134-136, (5): 139-162, (7): 195-212.

113 BERTOLONI G. 1850 - Illustrazione dei prodotti naturali del Mozambico. Dissertazione IV. Insetti Lepidotteri diurni - Memorie della Accademia delle Scienze dell'Istitituto di Bologna, II: 169-171.

113bis COSTA A. 1851 - Storia della Bombice neustria, sui costumi, danni che arreca, e mezzi per distruggerla - *Reale Istituto d'Incoraggiamento*, adunanza del 7 agosto 1851: 5-24, 1 Tav,

114 GHILIANI V. 1852 - Materiali per servire alla compilazione della Fauna Entomologica italiana, ossia elenco delle specie di Lepidotteri riconosciute esistenti negli Stati Sardi - *Memorie Regia Accademia delle scienze di Torino*, Serie 2, XIV: 131-247.

114bis° GHILIANI V. post 1852 - Aggiunte autografe allo stesso (Catalogo dei lepidotteri degli Stati Sardi).

115* GUENÉE A. 1852 - in Boisduval J.A. & Guenée A., Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptéres. Tome cinquiéme. Noctuélites. Tome I - Paris, Roret, 407 pp., XCVI.

116 LEDERER J. 1852 - Versuch, die europäischen Lepidopteren. II. Abtheilung: Die Heteroceren - *Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien*, Abhandlungen, II: 65-126.

117 LEDERER J. 1852 - *Celonoptera mirificaria*, ein neuer europäischer Spanner - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, VI: 59-60, Tav. I.

118 ZELLER P.C. 1852 - Lepidopterologische Mitteilungen - *Stettiner entomologische Zeitung*, 13 (6): 177-187.

119 ZELLER P.C. 1852 - Sieben Tineaceen-Gattungen. - *Linnaea Entomologica*, 7: 325-367.

120* GUENÉE A. 1852-1858 - Species Géneral des Lépidoptères. Tom. V-VII. Noctuelites I-III - Paris.

121 BRUAND TH. 1853 - Essai monographique sur la Tribu des Psychides - *Comptes rendus de la Société libre d'Emulation du Doubs,* 127 pp. (1852 pp. 1-16, 1853 pp. 17-127).

122 LEDERER J. 1853 - Versuch, die europäischen Lepidopteren. Die Spanner - *Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien*, III: 165-270.

123* MINÀ-PALUMBO F. 1853 - Lettere su insetti di interesse agricolo - *Empedocle*, II: 279, 332.

124 KOLLAR 1854 - *Bombyx Cynthia* - *Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien*, IV: 114.

125 MANN J. 1854 - Aufzählung der Schmetterlinge, gesammelt auf einer Reise im Auftrage des k. k. zoologischen Museums nach Oberkrain und dem Küstenlande, in den Monaten Mai und Juni 1854, als Beitrag zur Fauna des Österreichischen Kaiserstaates - *Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien*, IV: 545-596.

125bis* MINÀ-PALUMBO F. 1854 - Acherontia atropos - Empedocle, IX: 294.

125ter NIZZOLI A. 1854 - Lepidotteri diurni del Mantovano - Dissertazione inaugurale onde ottenere la Laurea dottorale in Medicina nell'I. R. Università di Pavia, 70 pp.

126 ZELLER P.C. 1854 - Lokalitäten an der Ostküste Siciliens in lepidopterologischer Hinsicht dargestellt - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 27: 3-52.

126bis STANDFUSS G. 1855-1857 - Bemerkungen über einige en den küsten von Spanien und Sicilien fliegende Falter - *Stettiner entomologische Zeitung*, 16 (1855): 151-163; 17 (1856): 48-52; 18 (1857): 21-35.

127 STAUDINGER O. 1856 - Beitrag zur Festellung der bisher bekannten Sesien-Arten Europas und angrenzenden Asiens - *Stettiner entomologische Zeitung*, 17 (7/8): 193-224, (9/10): 257-288, (11/12): 323-338.

128 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1857 - Description d'une Noctuelle nouvelle du genre *Cleophana* - *Annales de la Société entomologique de France*, 3 ser., V: 13-14, pl. I, fig. 1.

129 DISCONZI F. 1857 - Collezione entomologica, in: Programma del Ginnasio Liceale Vescovile di Vicenza alla fine dell'anno scolastico 1857 - Tipografia Picutti: 1-35.

130 LEDERER J. 1857 - Vier neue Europäische Schmetterlinge - *Wiener Entomologische Monatschrift*, 1: 80-83.

131 LEDERER J. 1857 - Die Noctuinen Europa's, mit Zuziehung einiger bisher meist dazu gezählter Arten des asiatischen Russland's, Kleinasien's, Syrien's, und Labrador's - Buchdruckerei von Friedrich Manz, Wien.

132 ROGENHOFER A. 1857 - Einige an neuen Standorten augefundene Insecten - *Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien*, VII: 130-131.

133 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1858 - Description de variétés de Lépidoptères - *Annales de la Société entomologique de France*, 3 ser., VI: 703-707, tav. 14.

134 BRUAND D'UZELLE, 1858 - Remarques sur plusieurs Psychidae - *Annales de la Société entomologique de France*, 3 ser., VI: 459-469.

135 COSTA A. 1858 - Ricerche Entomologiche sopra i Monti Partenii nel Principato Ulteriore - Napoli, 30 pp.

136* GUENÉE A. 1858 - in Boisduval J.A. & Guenée A., Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptéres. Tome cinquiéme. Noctuélites. Tom. IX-X. Phalaenae I-II - Paris (1857).

137* GUENÉE A. 1858 - in Boisduval J.A. & Guenée A., Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptéres. 9 - Paris.

138* MINÀ-PALUMBO F. 1858 - Osservazioni entomologiche sulle Madonie - *Palingenese*, I: 109.

139* RAMBUR P. 1858-1866 - Catalogue Systématique des Lépidoptéres de l'Andalousie - Paris, 1° partie p. 1-92, Pl. I-X (1858); 2° partie, p. 93-412, Pl. XI-XXII (Aug. 1866).

140 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1859 - Remarques sur le résultat de chasses entomologiques, principalement de Lépidoptères, faites en Sicile - *Annales de la Société entomologique de France*, 3° Serie, T. VII, Bulletin entomologique: LXXXV-LXXXVIII.

140bis BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1859 - Curieux détails sur le séjour en Sicile - *Annales de la Société entomologique de France*, Ser. III, VII, Bulletin entomologique: CXXVI-CXXVII.

141 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1859 - *Saturnia carpini* Bork. - *Annales de la Société entomologique de France*, Ser. III, VII, Bulletin entomologique: CLXIX.

142 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1859 - Sur Lépidoptères recuilli en Sicile - *Annales de la Société entomologique de France*, Ser. III, VII, Bulletin entomologique: CLXI, CLXXVIII, CCXLII-CCXLIII.

143 ERRA L. 1859 - Insetti della Provincia bresciana - Commentari dell'Ateneo di Brescia dall'anno 1852 a tutto il 1857: 388-389.

144 MANN J. 1859 - Verzeichnis der im Jahre 1858 in Sicilien gesammelten Schmetterlinge - *Wiener Entomologische Monatschrift*, 3 (3): 78-96, (4): 97-106, (6): 161-178.

145 MINÀ-PALUMBO F. 1859 - Catalogo dei Lepidotteri diurni delle Madonie - Atti dell'Accademia di Scienze e Lettere di Palermo, III: 1-26.

146 SPEYER A. 1859 - Lepidopterologische Beobachtungen auf einer Wanderung über das Stilfser Joch - *Stettiner entomologische Zeitung*, 20: 12-34.

147 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1860 - Observations sur la faune entomologique de la Sicile. Lépidoptères de Sicile - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 3° serie, VIII: 667-713.

148 DELAHARPE J. 1860 - Contributions à la Faune de la Sicile. Lépidoptères - *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles*, 47: estratto 35 pp.

149 HOFMANN O. 1860 - Ueber die Naturgeschichte der Psychiden - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, IV: 1-53, Tavv. I-II.

150* MILLIÈRE P. 1860 - Iconographie et Description de Chénilles et Lépidoptères inédits. Tome 1 - Lyon. Tome I (1859).

151 GUENÉE A. 1861 - Études sur le genre *Lithosia* - *Annales de la Société entomologique de France*, 4° ser., I: 39-44.

152 SNELLEN P.C.T. 1862 - Notice sur la faune Lépidopterologique de l'Ile de Sicile - *Tijdschrift voor Entomologie*, V: 100-105.

153 STAUDINGER O. 1862 - Die Arten der Lepidopteren-Gattung *Ino* Leach - *Stettiner entomologische Zeitung*, 23: 341-359.

154 STAUDINGER O. 1862 - Ueber einige neue griechische Lepidopteren - *Stettiner entomologische Zeitung*, 23 (4-6): 257-271

155 CORNALIA D. 1863 - Tentativo d'allevamento della *S. hesperus* e della *S. yama-may* - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, 5: 275-285.

156 COSTA A. 1863 - Nuovi studi sulle entomologia della Calabria Ulteriore - *Atti Regia Accademia Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, I (2): 1-80, 4 Tavv.

157 GREDLER V.M. 1863 - Vierzhen Tage in Bad Ratzes. Eine naturgeschichtliche Lokalskizze mit näherer Berücksichtigung der Fauna - 13. Programm des k. k. Obergymnasium in Bozen: 41 pp.

158 LEDERER J. 1863 - Snellen P.C.T., 1862 - Notice sur la faune Lépidopterologique de l'Ile de Sicile - *Wiener Entomologische Monatschrift*, 7: 228-229.

159 CORNALIA E. 1865 - Del bruco del Lentisco (*Lasiocampa otus*, Drury) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, VIII: 186-192, Tav. 2.

160 COSTA A. 1865 - Sugl'Insetti che danneggiano le piante di Cotone e ne alterano la qualità del prodotto e mezzi per guarentirle dagli stessi - *Atti del Regio Istituto d'incoraggiamento alle Scienze Naturali Economiche e Tecnologiche di Napoli*, 2° Ser., 2: 127-144.

160bis COSTA A. 1865 - Primo allevamento in Napoli della bombice della quercia del Giappone (*Bombyx*, *Antheraea*, *Yama-mai*) - *Atti del Regio Istituto d'incoraggiamento alle Scienze Naturali Economiche e Tecnologiche di Napoli*, 2° Ser., II: 281-294, 1 Tav.

160ter CURÒ A. 1865 - Intorno alla Fauna Lepidotterologica della Lombardia - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, VIII, estr. 7 pp.

161 DISCONZI F. 1865 - De' Lepidotteri. In: Entomologia Vicentina ossia catalogo sistematico degl'insetti della Provincia di Vicenza - Tipografia G. B. Randi, Padova, 316 pp.

162 FRANCESCHINI F. 1865 - Tentativo d'allevamento della Saturnia yama-may - Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano: 1-16.

163 SPEYER A. 1865 - Lepidopterologische Mitteilungen - *Stettiner entomologische Zeitung*, 26: 241-252.

164 VILLA A., VILLA G.B. 1865 - Catalogo dei Lepidotteri della Lombardia - Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, VIII (1): 41-64.

165 ZELLER P.C. 1865 - Nachricht über einige Falter der Meseritzer Gegend - *Stettiner entomologische Zeitung*, 26: 29-48.

166* GORNO P. 1866 - Di alcuni insetti nocivi all'agricoltura - Commentari dell'Ateneo per gli anni 1862, 63, 64: pag. 189 e seg., Brescia (in Bettoni, 1884).

167 GREDLER V. 1866 - Bericht über Zuchtversuche der *Saturnia cynthia* in Bozen - *Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg*, 20 (4): 50-56.

168 RONDANI C. 1866 - Note entomologiche. II. Specie Italiane del genere *Triphaena* Ochs. - *Archivio per la Zoologia l'Anatomia e la Fisiologia*, 4: 193-196.

169 TARGIONI TOZZETTI A. 1866 - Sopra alcune qualità della seta di diverse specie di Lepidotteri - *Nuovo Cimento*, XXIII-XXIV: 3-17.

170 HINTERWALDNER J.M. 1867 - Beitrag zur Lepidopterenfauna Tirols - *Zeitschrift des "Ferdinandeums" für Tirol und Vorarlberg Ill.* Insbruck, 13: 211-254.

171 MANN J. 1867 - Schmetterlinge, gesammelt im Jahre 1867 in der Umgebung von Bozen und Trient in Tyrol im Jahre 1867 - *Verhandlungen des k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XVII: 829-844.

171bis DEI A. 1868 - Catalogo degli Insetti della Provincia Senese - *Atti della R. Accademia dei Fisiocritici,* Siena, ser. II, 4: 155-171.

172 HINTERWALDNER J.M. 1868 - Systematisches Verzeichnis der bis jetz bekannten Tiroler Lepidopteren - Neunzenthes Programm des kaiserl. königl. Staats-Gymnasium zu Innsbruck, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1868, Druck der Wagner'schen Universitäts: 1-20.

173 MILLIÈRE P. 1868 - Iconographie et description de Chenilles et Lépidoptères inédits. Tome Second - *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, N.S.: 16: 1-36, pl. 85-86.

174 ZELLER P.C. 1868 - Beitrag zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna der Umgegend von Raibl in Oberkärnthen und Preth im angrenzenden Küstengebiet - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XVIII (3/4): 563-628.

175 ZELLER P.C. 1868 - Lepidopterologische Ergebnisse einer Reise in Oberkärnthen - Stettiner entomologische Zeitung, 29 (4-6): 121-149.

176 GHILIANI V. 1869 - Acclimatazione spontanea - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, I: 268-269.

177 STEFANELLI P. 1869 - Catalogo illustrativo dei Lepidotteri toscani. Parte prima. (Ropaloceri) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, I: 138-160, 236-245, 295-305.

178 BERTOLONI A. 1870 - Descrizione e storia della vita e dei danni che arrecano alla canepa due larve di Carabici ed una di Lepidottero

appellato *Xylina hepatica* Treit. - *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, Ser. II, t. X: 189-208.

179 BERTOLONI A. 1870 - La Ruga ragna dei bolognesi - *Gazzetta dell'Emilia*, anno XI, n. 142, 23 maggio.

180 CURÒ A. 1870 - Nuove varietà accidentali di due specie di Lepidotteri Ropaloceri appartenenti alla fauna italiana - *Bullettino Entomologico*, Firenze, II (1): 1-3.

180bis DEI A. 1870 - Due insetti che danneggiano le viti - La vite e il vino, Milano, estratto 3 pp.

181 MANN J. 1870 - Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Raibl in Ober-Kärnten. - *Wiener Entomologische Monatschrift*, 20: 39-44.

182 ROGENHOFER A. 1870 - Ueber die Synonymie und die früheren Stände von *Earias insulana* B. (*siliquana* H. Sch.) und Beschreibung einer neuen Art - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft* in Wien, XX: 870-874.

183 STAUDINGER O. 1870 - Beschreibung neuer Lepidopteren des europäischen Faunengebietes - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, XIV: 97-132, 193-208, 273-330.

184 STEFANELLI P. 1870 - Di alcuni Lepidotteri appartenenti alla fauna della Toscana - Comunicazione fatta nella prima adunanza pubblica della Società entomologica Italiana, Firenze: 3-12.

185 STEFANELLI P. 1870 - Frammenti di una comunicazione intorno a vari lepidotteri toscani fatta nella prima adunanza pubblica della Società Entomologica Italiana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, II: 190-192.

186 CURÒ A. 1871 - Di una nuova forma di Erebia prossima alla nerine Freyer proveniente dalle Alpi dello Stelvio e della Gastropacha arbusculae Freyer - Bullettino Entomologico, III, estr. 5 pp., Firenze.

187 RAGUSA E. 1871 - Breve escursione entomologica fatta sulle Madonie e ne' boschi di Caronia - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, III: 366-380.

188 STAUDINGER O. 1871 - Macrolepidoptera. In: Staudinger O. & Woche M. (Eds.): Catalog der Lepidopteren des Europaeischen Faunengebiets - Staudinger & Burdach, Dresden, XXXVIII+426 pp.

188bis STAUDINGER O. 1871 - Lepidotteri nuovi della fauna Europea - Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze, III: 205-210.

189 STAUDINGER O. 1871 - Beitrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands - Horae societatis entomologicae Rossicae, VII (1870): 3-304, 3 Tavv.

190 STEFANELLI P. 1871 - Catalogo illustrativo dei Lepidotteri toscani. Parte seconda. Sfingidi - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, II (1870): 339-357.

191 BARGAGLI P. 1872 - Alcune escursioni entomologiche fatte in Italia nel 1872. I. Notizie sulla Fauna entomologica del Modenese. Lepidotteri. Lettera di A. Carruccio - *Bullettino della Società entomologica italiana, Firenze,* IV 361-364.

192 BARGAGLI P. 1872 - Alcune escursioni entomologiche fatte in Italia nel 1872. II. Lettera del Cav. Vittore Ghiliani - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, IV 365-366.

193 DIETZE C. 1872 - Beiträge zur Kenntnis der Arten des Genus *Eupithecia* Curt. - *Stettiner Entomologische Zeitung*, 33 (1872): 184-204, 329-331; 35 (1874): 209-221, 270-277; 36 (1875): 69-76, 236-258; 38 (1877): 98-100.

194 DISCONZI. 1872 - Insetti dannosi - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, IV: 24.

195 KALCHBERG A. 1872 - Rettificazione - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, IV: 119.

196 KALCHBERG, VON, A. 1872 - Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Siciliens. I. - *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXIII: 312-320.

197 KALCHBERG, VON, A. 1872 - Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Siciliens. II. - *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXIII: 403-412.

198 PANCERI P. 1872 - La luce degli occhi delle farfalle - Rendiconto dell'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli, XI: 213-218.

199 PINCITORE MAROTT G. 1872 - Specie nuove per la Lepidottero-fauna della Sicilia - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, IV: 105-106.

200 PINCITORE MAROTT G. 1872 - Lepidotteri nuovi e rari di Sicilia - *Comizio Agrario di Palermo*: 7 pp.

201 PINCITORE MAROTT G. 1872 - Specie nuove per la Lepidottero-fauna della Sicilia - *Atti della Società entomologica italiana, Firenze*: 30-31.

202 RONDANI C. 1872 - Degli Insetti nocivi e dei loro parassiti - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, IV: 137-165.

203 STEFANELLI P. 1872 - Nuovo esame comparativo su varie specie di lepidotteri d'Italia e più particolarmente della Toscana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, IV: 79-82.

204 TACCHETTI C. 1872-1873 - Materiali per una fauna entomologica del padovano. Parte I. Lepidotteri - *Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali*, Padova, I (1872) (2): 97-126, (3): 145-157; II (1873) (1): 19-23.

205 KALCHBERG A. 1873 - Lepidotteri nuovi per la Sicilia o per l'Europa - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, V: 51.

205bis LESSONA M. 1873 - Calendario Zoologico in Piemonte. Calendario degl'Insetti, di Giorna il figlio - *Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino*, XVI: 87-161.

206 MANN J. 1873 - Verzeichniss der im Jahre 1872 in der Umgebung von Livorno und Pratovecchio gesammelten Schmetterlinge - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXIII: 117-129.

207 MILLIÈRE P. 1873 - Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-Maritimes. Première partie - Imprimerie H. Vidal, Cannes:1-135, 2 pl.

208 PINCITORE MAROTT J., DE KALCHBERG A. 1873 - Sur la *Lasiocampa otus* et son habitat - *Petites Nouvelles Entomologiques*, Paris, 5 (81): 323-324, 341.

209 PINCITORE-MAROTT G. 1873 - Escursioni entomologiche al Bosco della Ficuzza e nei prossimi ex-feudi Marraccia, Catagnano e Rao - (Sicilia) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, V: 180-197.

210 RAGUSA E. 1873 - Notizie sulla fauna lepidotterologica della Sicilia tratte da un articolo del Sig. A. Kalchberg - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, V: 31-33.

211 BERTOLINI A. 1874 - Elenco d'insetti italiani trovati nel Trentino - *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, XVII: 456-457, Milano.

212 BERTOLONI A. 1874 - Intorno al danno arrecato alla canepa, alla zea, ai faggioli, ecc. dalla larva dell'*Agrotis suffusa* Ochsm., var. *Pepoli* Bertol. Nep. nelle terre inondate del Comune di Bondeno nella primavera 1873 - *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, Ser. III, t. IV: 605-614, 1 tav.

213* BOISDUVAL J.A. 1874 - Species Général des Lépidoptères. Crepusculaires (Heterocera. Tom. I. Sphingides, Sesiides, Castnides) - Paris.

214 CARRUCCIO A. 1874 - Contributo allo studio degli insetti del modenese - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VI (1): 69-82.

215 CURÒ A. 1874 - Elenco dei Lepidotteri raccolti nei dintorni della IV Cantoniera dello Stelvio - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, V (1873): 267-270.

216 EPPELSHEIM F. 1874 - Bericht über eine entomologische Reise nach dem Stilfserjoch 1872 - *Jahresbericht der Pollichia*, XXX-XXXII: 59-86.

217 STEFANELLI P. 1874 - Di una forma poco nota del *Polyommatus alciphron* Rott. - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VI: 83-85.

218 CURÒ A. 1874-1880 - Saggio di un catalogo dei Lepidotteri d'Italia - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VI (1874) (1): 3-26; (2): 106-123; (3): 201-217; (4): 315-316; VII (1875) (2): 107-121; (3): 192-201; VIII: (1876) (1): 25-40; (2): 139-162; (3): 269-270; IX (1877) (1): 3-24; (2): 143-165; (3): 252-286; (4): 321-332; X (1878) (1): 113-125; (2): 189-203; (3): 229-243; XI (1879) (1): 49-67; (3): 142-152; XII (1880) (1): 51-92; (2): 111-115; (3): 153-191.

219 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1875 - *Heliodes arbutoides* (*jocosa* Zeller), *Lycaena Alexis* hermaphrodite - *Annales de la Société entomologique de France*, 5 ser., Bulletin entomologique: XIII-XIV.

220 MILLIÈRE P. 1875 - Lépidoptérologie. Premier fascicule - *Annales de la Société des Sciences naturelles, Arts et Belles-Artes de Cannes*, 4 (1), 16 pp.

221 MILLIÈRE P. 1875 - Description de Chenilles et de Lépidoptères inédits d'Europe - *Annales de la Société entomologique de France*, 5 ser., 11-14, Bulletin entomologique: CLXVII-CLXVIII, Tav. 1.

222 MILLIÈRE P. 1875 - Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-Maritimes. Seconde partie - Imprimerie H. Vidal, Cannes:141-383 pp., 2 pl.

223 RAGUSA E. 1875 - Gita entomologica all'Isola di Pantelleria - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VII (4): 239-256.

224* BETTONI E. 1876 - Considerazioni sopra un caso di atrofia parassitica, verificatosi su una bombicidea indigena - *Bollettino di Bachicoltura*: 121-122, Padova.

225 KALCHBERG, VON, A. 1876 - Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Sicilien's. III - *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVII: 138-150.

226 MILLIÈRE P. 1876 - Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-Maritimes. Supplément - Imprimerie H. Vidal, Cannes: 384-455, 2 pl.

227 ROGENHOFER A.F. 1876 - Die ersten Stände einiger Lepidopteren - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXV: 797-801, (1875).

228 STEFANELLI P. 1876 - Correzioni ed aggiunte al catalogo degli Sfingidi (Lepidotteri Eteroceri) della Toscana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, VIII (2): 163-167.

229* TARGIONE TOZZETTI A. 1876 - Relazione intorno ai lavori della R. Stazione di Entom. Agr. di Firenze per l'anno 1875 - *Annuario del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, LXXXIV: 5, 43.

230 WEISSMANN A. 1876 - Studien zur Descendenz-Theorie. I. Die Entstehung der Zeichnung bei den Schmetterlings-Raupen - Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann: 1-140.

231 WOCKE M. 1876 - Die Lepidopterenfauna des Stilfser Jochs in Tirol - *Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur*, 53 (1875): 157-170.

232 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. 1877 - Note sur le *Bombyx canensis* Millière - *Annales de la Société entomologique de France*, 5° ser., VII: 367-368.

233 COSTA A. 1877 - Degl'Insetti che attaccano l'albero ed il frutto dell'Olivo del Ciliegio del Pero del Melo del Castagno e della Vite e le semenze del Pisello della Lenticchia della Fava e del Grano - *Atti del R. Istituto d'incoraggiamento alle Scienze Naturali Economiche e Tecnologiche di Napoli*, 2° Serie, XIV (II): 340 pp., 10 Tavv.

234 FAILLA-TEDALDI L. 1877 - Capture de *Charaxes Jasius* - *Petites Nouvelles Entomologiques*: 182.

235 FAILLA-TEDALDI L. 1877 - Note sur la *Lasiocampa otus* Drury - *Petites Nouvelles Entomologiques*: 183-184.

236 MILLIÈRE P. 1877 - Lépidoptérologie. Deuxième fascicule. Six espèces de chenilles inédits des environs de Cannes (Alpes-Maritimes) - *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, 14 pp.

237 PINCITORE MAROTT G. 1877 - Dell'*Arge pherusa* e della sua varietà *plesaura* - Off. Tip. G. De-Luca, Palermo, estratti dal *Comizio Agrario*, Palermo: 7-16.

238 STAUDINGER O. 1877 - Neue Lepidopteren des europäischen Faunengebietes aus meiner Sammlung - *Stettiner entomologische Zeitung*, 38: 175-208.

239 WOCKE M. 1877 - Die Lepidopterenfauna des Stilfser Jochs in Tirol. Fortsetzung - *Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterlländische Cultur*, 54 (1876): 199-208.

240 WOCKE M. 1877 - Ueber einige wenig bekannte oder neue Falter der deutschen Fauna - *Zeitschrift für Entomologie*, herausgegeben vom Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau, N. F., VI: 42-52.

241* CONSOLI G. 1878 - Bruco della vite - *Bollettino del Comizio Agrario di Brescia*, VII (3-6): 19-21.

242 FAILLA-TEDALDI L. 1878 - Fauna entomologica sicula. Lepidotteri delle Madonie - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, X (3): 217-227, (4): 248-259.

243 LESSONA M. 1878 - Dello *Arocatus melanocephalus* Fabr. in Torino - *Annali Regia Accademiaa d'Agricoltura di Torino*, XX (1877): 53-58.

244 MANN J., ROGENHOFER A. 1878 - Zur Lepidopteren-Fauna des Dolomiten-Gebietes - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXVII (1877): 491-500.

245 MILLIÈRE P. 1878 - Lépidoptérologie - *Annales de la Société des Sciences naturelles, Arts et Belles-Artes de Cannes*, VII (3), 24 pp.

246 TOGNOLI L. 1878 - Notizie sopra i Lepidotteri del Modenese e del Reggiano - *Annuario della Società dei Naturalisti,* Modena, XII (III), serie II: 81-146.

247 FAILLA-TEDALDI L. 1879 - Sopra alcuni Lepidotteri Siciliani - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XI: 225-228.

248 FAILLA-TEDALDI L. 1879 - Note sur une invasion de la *Vanessa cardui* observé en Sicile - *Feuille des jeunes naturalistes*, X: 64.

249 FAILLA-TEDALDI L. 1879 - Aberration de *Melanargia galathea* - *Feuille des jeunes naturalistes*: 152.

250 HEYLAERTS F.-J.-M. 1879 - Descriptions de nouvelles espèces de Psychides - *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXII. Comptes-Rendus des Séances: CXXXVII-CXL.

251 HEYLAERTS J.-M. 1879 - Diagnoses de trois nouvelles espèces de Lépidoptères du genre *Epichnopteryx* Hb. - *Le Naturaliste*, Paris, 1 (2): 3.

252 NINNI A. 1879 - Intorno alla recente invasione della farfalla del cardo - Tip. Zoppelli, Treviso: 5-14, 1 tav.

253 PAGLIA E. 1879 - Saggio di studi naturali sul territorio Mantovano - V. Guastalla Ed., Mantova, 507 pp.

254* PAVESI P. 1879 - Lettera entomologica - *Bullettino di Agricoltura*, n. 29, Milano.

254bis PELLEGRINI G. 1879 - Insetti che specialmente riuscirono dannosi alle produzioni campestri nella Provincia Veronese dall'anno 1877 fino al termine dell'estate 1879. Di un microlepidottero spettante alla famiglia delle Noctuide, al genere *Laphygma*, che allo stato di bruco devastava le coltivazioni erbacee di alcune località del Veronese; detta dagli entomologi *Laphygma exigua* Guenée, *Caradrina exigua* Hubner. Di una insolita apparizione della Vanessa del Cardo nella Provincia Veronese (*Vanessa cardui* - *Pyrameis cardui* L.) - *Bollettino N. 7 della Stazione Agraria di Verona*: 24-50.

255 PINCITORE MAROTT G. 1879 - Lepidotteri nuovi e rari di Sicilia - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XIV: 50-54.

256* PINCITORE MAROTT G. 1879 - La *Vanessa cardui* nel territorio di Palermo - *Giornale del Comizio Agrario di Palermo*, V-X: 164.

257 PINCITORE-MAROTT G. 1879 - Emigrations et apparitions de certaines Lepidopteres - *Feuille des jeunes naturalistes*, X (117): 115-117.

258 STAUDINGER O. 1879 - Lepidopteren-Fauna Kleinasien's - *Horae societatis entomologicae Rossicae*, 14: 176-516.

259 SWINTON A.H. 1879 - Notes on Italian butterflies - *The Entomologist's Monthly Magazine*, 16: 40-41.

260 TURATI E. 1879 - Contribuzione alla fauna Lepidotterologica Lombarda - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XI (3): 153-208.

261 CHRIST 1880 - Zur Zygaenen unserer Südalpen - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 6 (2): 35-46, 1 Tav.

262 FIORI A. 1880 - Contribuzione allo studio dei lepidotteri del Modenese e del Reggiano - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XII: 192-230.

263 FORBES W.A. 1880 - Three weeks' Butterfly-collecting in the Alps - *The Entomologist's Monthly Magazine*, XVI (191): 256-259.

264 GIANELLI G. 1880 - Notizie di entomologia applicata. Lepidotteri dannosi alla vite - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XII (4): 289-290.

265 MILLIÈRE P. 1880 - Lépidoptérologie. Sixième fascicule - *Annales de la Société des Sciences naturelles, Arts et Belles-Artes de Cannes*, IX (6), 20 pp.

266 MILLIÈRE P. 1880 - Lépidoptérologie. Septième fascicule - *Annales de la Société des Sciences naturelles, Arts et Belles-Artes de Cannes*, IX (9), 22 pp.

267 PICCIOLI, CAVANNA 1880 - Notizie di entomologia applicata. Coleotteri, Lepidotteri ed altri insetti dannosi alla vite - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XII: 152-153.

268 SORMANI MORETTI L. 1880-1881 - Lepidoptera, pp. 120-122. In: La Provincia di Venezia. Fauna - Stab. Tipografico G. Antonelli, Venezia, 438 pp.

269 FIORI A. 1881 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Modenese e del Reggiano. Supplemento alla parte I - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XIII: 132-144.

270 GARBINI A. 1881 - Nuove varietà della *Vanessa io* - *Bullettino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali*, Padova, Tomo II, N. 1: 19-20.

271 GIANELLI G. 1881 - Venti giorni in Sicilia. Note di un lepidotterofilo - *Il Naturalista Siciliano*, I (2): 31-36.

272 HELLER C. 1881 - Über die Verbreitung der Thierwelt im Tiroler Hochgebirge - *Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie des Wissenschaften*. Mathematisch-naturwissenschaftlische Klasse, 83: 103-175.

273 HELLER C. 1881 - Die alpinen Lepidopteren Tirols - *Bericht des naturwissenschaftlichen-medizinischen Vereines in Innsbruck*, XI (1880/81): 60-162.

274 RAGUSA E. 1881 - Note su alcuni Lepidotteri siciliani - *Il Naturalista Siciliano*, I (2): 36-38.

275 WOCKE M. 1881 - Die Lepidopterenfauna des Stilfser Jochs. Fortsetzung II - *Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterlländische Cultur*, 58 (1880): 198-205.

276 BOHATSCH O. 1882 - Die Eupithecien Oesterreich-Ungarns - *Wiener Entomologische Zeitung*, I: 105-110, 129-134, 161-166, 183-189.

277 COSTA A. 1882 - Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto nella state del 1876 - *Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, IX (4): 1-63, 1 Tav.

278 COSTA A. 1882 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Prima. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nel settembre 1881 - *Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, IX (11): 1-41.

279 CURÒ A., MANCINI O. 1882 - Ordo Lepidoptera. In: Cavanna G. - Al Vulture e al Pollino. Parte I - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XIV (1): 62-63.

280 FAILLA-TEDALDI L. 1882 - Psychidae nuove - *Il Naturalista Siciliano*, I (12): 38.

281 FAILLA-TEDALDI L. 1882 - Sopra una singolare aberrazione dell'*Arge pherusa* B. - *Il Naturalista Siciliano*, I (9): 208.

282 GERHARD B. 1882 - Lepidopterologisches - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, XXVI (1): 125-128.

283 HEYLAERTS F.-J.-M. 1882 - Descriptions de deux nouvelles espèces de Psychides - *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXVI. *Comptes-Rendus des Séances*, Sér. III, N. 19: CXXXIX-CXLI.

284 RAGUSA E. 1882 - Sulla *Sesia cruentata* Mann - *Il Naturalista Siciliano*, I (10): 223-224.

285 RAGUSA E. 1882 - Strana aberrazione di *Syntomis phegea* B. - *Il Naturalista Siciliano*, I (12): 278-279, Tav. XI.

286 STANDFUSS G. 1882 - *Psyche wockei* m. - *Entomologische Nachrichten,* VIII (23): 322.

287 STAUDINGER O. 1882 - *Plusia beckeri* Stgr., eine südrussische Eule in der höheren Theilen der Abruzzen entdeckt - *Entomologische Nachrichten*, VIII (21): 292-294.

288 STEFANELLI F. 1882 - Nuova forma di *Biston graecarius* Stgr. - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XIV (2): 221-222.

289 BOHATSCH O. 1883 - Die Eupithecien Oesterreich-Ungarns. I. Nachtrag - *Wiener Entomologische Zeitung*, II: 183-188, 227-230.

290 COSTA A. 1883 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Seconda. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella primavera del 1882 - *Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, Serie 2°, vol. I (2): 1-109.

291 FAILLA-TEDALDI L. 1883 - Caccia di Lepidotteri rari - *Il Naturalista Siciliano*, II (11): 249-250.

292 FAILLA-TEDALDI L. 1883 - Psychide nuova - *Il Naturalista Siciliano*, II (5): 99-100.

293 MILLIÈRE P. 1883 - Notes Lépidoptérologiques - *Il Naturalista Siciliano*, III (2): 33-37.

294 MILLIÈRE P. 1883 - Lépidoptérologie - *Annales de la Société Linnéenne de* Lyon, XXIX: 152-179, Tavv. I-IV.

295 PENZIG O. 1883 - Un nuovo flagello degli Agrumi - *L'Italia Agricola*, XX: 3-11.

296 RAGUSA E. 1883 - Nota sulla *Apocheima flabellaria* Heeger, Her. Sch. - *Il Naturalista Siciliano*, II (6): 136-137.

297 STAUDINGER O. 1883 - Einige neue Lepidopteren Europa's - *Stettiner entomologische Zeitung*, 44 (4-6): 177-186.

298 MINÀ-PALUMBO A. 1883-1884 - Lepidotteri Druofagi - *Il Naturalista Siciliano*, (1883) II (12): 298-302; III (1): 31-32, (2): 54-56, (3): 92-96; (1884) III (4): 120-124, (6): 184-186, (8): 247-248, (10): 298-300, (11): 323-324, (12): 347-348; IV (1-2): 16-20.

299 BELLIER DE LA CHAVIGNERIE 1884 - Sur la *Nychiodes ragusaria* Mill. - *Il Naturalista Siciliano*, III (10): 297.

300 BETTONI E. 1884 - Prodromi della faunistica bresciana. Lepidotteri - Typ. Apollonio, Brescia: 1-316.

301 COSTA A. 1884 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Terza. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella estate del 1883 - *Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, Serie 2°, vol. I (9): 1-64.

302 CURÒ A. 1884 - Notizie lepidotterologiche - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XV (4) (1883): 296-298.

303 DEI A. 1884 - Insetti raccolti in una escursione al Monte Argentario ed all'Isola del Giglio, nel maggio 1883 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XVI: 65-67.

304 LEECH J.H. 1884 - A fortnight's collecting in Sicily - *The Entomologist*, XVII (N. 253): 133-136.

305 MILLIÈRE P. 1884 - *Nychiodes lividaria* Hb. var. *ragusaria* Mill. - *Il Naturalista Siciliano*, III (7): 196.

306 MILLIÈRE P. 1884 - Chenilles européennes inédites ou imparfaitement connues et notes lépidoptérologiques - *Il Naturalista Siciliano*, IV (1-2): 7-16.

307 MÖSCHLER H.B. 1884 - Die Nordamerika und Europa gemeinsam angehörenden Lepidopteren. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXXIV: 273-319.

308 RAGUSA E. 1884 - *Nychiodes bellieraria* nov. sp. - *Il Naturalista Siciliano*, III (12): 352.

309 RAGUSA E. 1884 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, IV (1-2): 30-32.

310 RIGGIO G. 1884 - Contribuzione alla fauna lepidotterologica della Sicilia - *Il Naturalista Siciliano*, IV (3): 49-54.

311 STANDFUSS M. 1884 - *Callimorpha* v. *Persona* Hb. - *Correspondenzblatt des Entomologischen Vereins "Iris" zu Dresden*, 1: 23-29.

312 STANDFUSS M. 1884 - Lepidopterologisches - *Stettiner entomologische Zeitung*, 45: 193-209.

313 TARGIONI TOZZETTI A. 1884 - Relazione intorno ai lavori della R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze per gli anni 1879-80-81-82. Lepidotteri - *Annali di Agricoltura*, Firenze-Roma: 415-511.

314 TURATI G. 1884 - Note Lepidotterologiche sulla Fauna Italiana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XVI (1-2): 68-87.

315 MILLIÈRE P. 1884-1913 - Lépidoptères inédits et notes entomologiques - *Revue d'Entomologie*, 3 (1): 1-7, Tav. I (1984).

316 CAMERANO L. 1885 - Di una apparizione della *Vanessa cardui* nel 1883 nei pressi di Torino - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XVII (1-2): 95.

317 COSTA A. 1885 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Quarta - *Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli, Serie 2°, vol. I (13): 1-31.

318 COSTA A. 1885 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Quinta. Risultamento delle ricerche fatte in maggio 1885 - *Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze naturali economiche e tecnologiche di Napoli*, Serie 2°, vol. II (7): 1-24.

319 CURÒ A. 1885 - Saggio di un Catalogo dei Lepidotteri d'Italia. Parte Prima. Rhopalocera. Heterocera (Sphinges, Bombyces) - Tipografia Cenniniana. Firenze, pp. 168 (Ristampa aggiornata).

320 DE CARLINI A. 1885 - Artropodi dell'Isola di S. Pietro - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XVII (3-4): 192-196.

321* GALLI VALERIO B. 1885 - Elenco dei principali Lepidotteri dei dintorni di Sondrio - *Il Naturalista Valtellinese*, 1 (3): 33-35.

322 MILLIÈRE P. 1885 - Acidalie nouvelle. Lépidoptères nouveaux et Chenilles inédites pour la faune française - *Annales de la Société entomologique de France*, V: 113-120, Tav. 2°.

323 MINÀ-PALUMBO F. 1885 - Ampelopatie. *Zygaena* mangia vite - *La Sicilia Agricola*, III (14): 268-275.

324 RAGUSA E. 1885 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, IV (11): 271-274, (12): 299-300.

325 ROGENHOFER A.F. 1885 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXXV: 31.

326 STAUDINGER O. 1885 - Einige neue Lepidopteren des europäischen Faunengebietes - *Stettiner Entomologische Zeitung*, 46 (7-9): 349-352.

327 STAUDINGER O. 1885 - *Deilephila Euphorbiae* L. var. *Grentzenbergi* Stgr., und eine neue *Anthocharis* - *Entomologische Nachrichten*, 11: 10-11.

328 STRUVE O. 1885 - Notizie Lepidotterologiche Siciliane - *Il Naturalista Siciliano*, V (3): 49-52.

329 MILLIÈRE P. 1885-1886 - Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes - Maritimes. (2° Supplément et Addenda) - *Il Naturalista Siciliano*, (1885) IV (6): 147-150, (7): 170-176, (8): 195-199, (9): 218-223, (10): 233-237, (11): 275-280, (12): 301-304; V (1): 16-21, (2): 44-48, (3): 67-73; (1886) V (4): 102-104, (5): 127-132, (6): 152-156, (7): 176-180, (8): 195-204, (9): 220-224, (10): 225-231.

330 RIGGIO G. 1885-1886 - Materiali per una fauna entomologica dell'Isola d'Ustica. Prima contribuzione - *Il Naturalista Siciliano*, V (2): 25-31, (3): 53-56, (4) (1986): 85-91.

331 COSTA A. 1886 - Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda - Memoria Sesta. Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella state del 1885 - *Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze naturali economiche e tecnologiche di Napoli*, Serie 2°, vol. II (8): 1-40.

332 MILLIÈRE P. 1886 - Chenilles inédites et Lepidoptères nouveaux pour la faune européenne - *Il Naturalista Siciliano*, VI (1): 1-9.

333 PAJNO F. 1886 - Notizie lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, V (12): 249.

334 SPEYER A. 1886 - Ein Beiträg zur Kenntniss der Psychiden mit spiralig gewundenen Raupengehäusen - *Stettiner entomologische Zeitung*, 47: 325-350.

335 STAUDINGER O. 1886 - Centralasiatische Lepidopteren - *Stettiner entomologische Zeitung*, 47: 193-215, 225-256.

336 CALBERLA H. 1887 ? - *Eubolia sparsaria* Hb. in Ober-Italien aufgefunden - Estratto 6 pp.

337 FAILLA-TEDALDI L. 1887 - Escursione entomologica all'Isola di Lampedusa - *Il Naturalista Siciliano*, VI (4-5): 53-56, (6): 69-73; (7): 102-104; (9): 157-162.

338 HEYLAERTS F.J.M. 1887 - *Psyche helicinella* H.-S. et les Psychides à fourreau héliciforme. - *Tijdschrift voor Entomologie*, 30: 3-8.

339 MILLIÈRE P. 1887 - Lépidoptères nouveaux ou peu connus. Chenilles nouvelles - *Annales de la Société entomologique de France*, VII: 215-221.

340 RAGUSA E. 1887 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, VI (12): 236-238.

341 ROGENHOFER A.F. 1887 - Ueber *Polia senex* Geyer - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXXVII: 201-204.

342 ROGENHOFER A.F. 1887 - Ueber *Heliothis armiger* Hb. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XXXVII: 63-64.

343 MINÀ-PALUMBO F., FAILLA-TEDALDI L. 1887-1889 - Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia - *Il Naturalista Siciliano*, (1887) VI (12): 229-236; (1887) VII (11): 10-21, (2): 46-53, (3): 65-72; (1888) VII (4): 81-87, (6): 133-139, (7): 153-156, (9): 201-205, (10-11): 225-233, (12): 269-272; (1888) VIII (1): 1-10, (2): 29-36, (3): 57-62; (1889) VIII (4): 81-89, (5): 105-115, (6): 129-140, (7): 153-164, (8): 181-194, (9): 200-202.

344 CALBERLA H. 1887-1890 - Die Macrolepidopterenfauna der Römischen Campagna und der angrenzenden Provinzen Mittelitaliens - *Correspondenzblatt des Entomologischen Vereins "Iris" zu Dresden*, 4 (1887): 119-158; 5 (1888): 220-272; 6 (1890): 47-94.

345 FAILLA-TEDALDI L. 1888 - Due parole in aggiunta alla lettera del dott. O. Struve - *Il Naturalista Siciliano*, VII (9): 206.

346 KALCHBERG A. 1888 - Lepidotterologia siciliana - *Il Naturalista Siciliano*, VII (12): 267-268.

347 PALUMBO A. 1888 - Di un bruco che danneggia i mandorli (*Diloba coeruleocephala* Lin.) - *Rivista delle Scienze Botanica e Zoologia*, estr. 10 pp.

348 PÜNGELER R. 1888 - Einige neuer europäische Spanner - *Stettiner entomologische Zeitung*, 49 (10-12): 348-351.

349 RIGGIO G. 1888 - Materiali per una fauna entomologica dell'Isola d'Ustica. Seconda contribuzione - *Il Naturalista Siciliano*, VII (12): 292-298; VIII (1): 20-22, (5): 115-121. VIII (1): 20-22, (5): 115-121.

350 STANDFUSS M. 1888 - Alte und neue Agrotiden der europäischen Fauna - *Correspondenzblatt des Entomologischen Vereins "Iris" zu Dresden*, 1 (5): 211-219, Tav. X-XI.

351 STRUVE O. 1888 - Lepidotterologia siciliana. Lettera del dott. O. Struve al sig. E. Ragusa - *Il Naturalista Siciliano*, VII (8): 183.

352 TACCONI G. 1888 - Contribuzione allo studio dei Ropaloceri del Canale del Ferro - *Cronaca della Società Alpina Friulana*, VII-VIII (1887-1888): 277-188 (recte 288).

352bis VON GUMPPENBERG C. 1888 - Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Erebia* - *Entomologische Zeitung, Herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin*, 49 (10-12): 365-393.

353 BLACHIER C. 1889 - Une Boarmie nouvelle variété inédites de Lépidoptères et Chenille d'une Hémérophile - *Annales de la Société entomologique de France*, IX: 254-260, tav. 4.

354 CALBERLA E. 1889 - Elenco dei Lepidotteri raccolti in Sicilia dal sig. Enrico Calberla nel giugno e luglio 1889 - *Il Naturalista Siciliano*, IX (2): 42-49.

355 CURÒ A. 1889 - Aggiunte alla prima parte del Saggio di un catalogo dei Lepidotteri d'Italia - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXI (1): 77-85.

356 DÜRCK H. 1889 - Macrolepidopteren-Ausbeute auf dem Stilfserjoch im Sommer 1888 - *Societas entomologica*, IV (2): 18-19, (4): 31, (5): 41-42, (6): 48-49, (7): 58-59.

357 RAGUSA E. 1889 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, VIII (10-11): 221-229; (12): 257-258.

358 STEINERT H. 1889 - Schmetterlingsfang in Südtirol während des Hochsommers - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, II: 270-274.

359 CASAGRANDE D., MANZONE F. 1890 - Contributo alla Fauna entomologica italiana. Lepidotteri della provincia di Roma - *Lo Spallanzani*, 28: 274-306.

360 FAILLA-TEDALDI L. 1890 - Contribuzioni alla fauna lepidotterologica della Sicilia. Descrizione di alcune nuove specie - *Il Naturalista Siciliano*, X (2-3): 25-31.

361 GIANELLI G. 1890 - Osservazioni ed aggiunte al Catalogo dei Lepidotteri del Piemonte di Vittore Ghiliani coll'indicazione dei principali bruchi che danneggiano i prodotti agricoli - *Annali della R. Accademia di agricoltura di Torino*, XXXIII: 183-207.

362 HEYLAERTS F.-J.-M. 1890 - Notes psychidologiques. 1. Une psychide inédite de l'Afrique méridionale. *Eumeta Junodi* m. 2. Une psychide nouvelle de la faune Européenne. *Psyche Calberlae* m. -

Annales de la Société Entomologique de Belgique, XXXIV, Comptes-Rendus: CXXX-CXXXIII.

363 RÄTZER P. 1890 - Lepidopterologische Nachlese - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, VIII (6): 220-229.

364 SENNA A. 1890 - Escursione zoologica a due laghi friulani - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXII (3-4): 93-107.

365 ASSENZA V. 1891 - Materiali per una fauna entomologica dei dintorni di Noto (Siracusa) - *Il Naturalista Siciliano*, XI (2-3): 23-45.

366 LOCKE H. 1891 - Entomologische Excursionen im Ortler-gebiete - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereins* (1890): 15-19.

367 MASSALONGO O. 1891 - Prospetto ragionato degli Insetti della Provincia di Verona - Stab. Tipo-Lit. G. Franchini, Verona, 386 pp.

368 MITGLEID 698 1891 - Eine Sammelreise nach Tirol - *Entomologische Zeitschrift*, Guben, V (14): 112-113, (15): 117-119.

369 PÜNGELER R. 1891 - Besprechung der neuen Schmetterlingsarten aus Sicilien in N. 2-3 des Nat. Sic. (Jahrg. 1890) - *Il Naturalista Siciliano*, XI (2-3): 17-23.

370 RIGGIO G. 1891 - Corrispondenze scientifiche moderne degli Animali figurati nel Pamphyton (sic) siculum del Cupani - *Il Naturalista Siciliano*, XI (2-3): 45-50.

371* SCHIAVAZZI G. 1891 - I lepidotteri diurni (Rhopalocera) del livornese - Livorno, 1891.

372 DE CARLINI A. 1892 - Artropodi di Val Vigezzo (Lepidotteri, Rincoti, Ortotteri, Aracnidi) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXIV (1): 83-91.

373 GARBOWSKI T. 1892 - Kleine Mitteilung. *Apterona helix* - *Entomologische Zeitschrift*, Guben, VI (16): 124.

374 MABILLE M.P. 1892 - *Zygaena sardoa* n. sp. - *Annales de la Société entomologique de France*, LXI, Bulletin entomologique: CL.

375 NORRIS F.B. 1892 - Notes on Rhopalocera from Italy - *The Entomologist*, XXV: 239-241, 261-267.

376 NORRIS F.B. 1892 - Notes on Italian Rhopalocera - *The Entomologist*, XXV: 95.

377 POZZI L. 1892 - Note Lepidotterologiche - *Atti della Società dei* Naturalisti, Modena, Ser. III, Vol. XI, Anno XXVI: 1-11.

378 PÜNGELER R. 1892 - Sopra due specie di Psychidi di Sicilia (Ueber zwei Psychiden-Arten aus Sizilien) - *Il Naturalista Siciliano*, XI (9-10-11): 212-218.

379 RAGUSA E. 1892 - Breve gita entomologica all'Isola di Lampedusa - *Il Naturalista Siciliano*, XI (9-10-11): 234-238.

379bis REBEL H. 1892 - Ueber *Cidaria tempestaria* HS. - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereinse*, II (1891): 51-54.

380 ROGENHOFER A.F. 1892 - Ueber *Lithosia caniola*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLII (1): 61.

380bis RÜHL F. 1892 - Neue europäische Dasypolien - *Societas Entomologica*, VI (22): 169-171.

381 STANDFUSS M. 1892 - Neue Formen der Macrolepidopteren aus dem Alpengebiet - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, VIII (9): 368-370.

382 STAUDINGER O. 1892 - Lepidopteren aus Tunis - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* V: 277-300.

383 STAUDINGER O. 1892 - Neue Arten und Varietäten von paläarktischen Geometriden - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, V (1): 141-260.

384 STAUDINGER O. 1892 - Neue Arten und Varietäten von Lepidopteren des paläarktischen Faunengebietes - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, IV (1891): 224-339.

385 SPADA L. 1892-1893 - Contribuzione alla Fauna marchegiana. I Lepidotteri finora trovati nel territorio di Osimo - *Il Naturalista Siciliano*, (1892) XII (3): 58-63; (1893) XII (4): 90-95, (5): 109-114, (6): 133-143, 7-8): 184-193, (9): 216-223, (10): 249-254.

386 BOHATSCH O. 1893 - Mittheilungen über Eupithecien - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* VI: 1-35.

387 RAGUSA E. 1893 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano,* XII (9): 206-207.

388 RAGUSA E. 1893 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, XIII (1-2): 17-21.

389 RAGUSA E. 1893 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Sicilia*no, XIII (3): 47-51.

390 REBEL H. 1893 - Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Südtirols, insbesondere der Umgebung Bozens - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLII (4): 509-536, (1892).

390bis REBEL H. 1893 - Nachträgliches über *Cidaria tempestaria* HS. - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines*, III (1892): 49-50.

390ter REBEL H., ROGENHOFER A. 1893 - Zur Kenntnis der Genus *Parnassius* Latr. in Oesterreich-Ungarn - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines*, III (1892): 51-70, Taf. I.

391* HABSBURG LOTHRINGEN L. S. 1894 - Die Liparischen Inseln; Achtes Heft: Allgemeiner teil - H. Mercy, Praha, X+159 pp.

392 TACCONI G. 1894 - La fauna. In: Marinelli G., II. Guida del Canal del Ferro - Società Alpina Friulana Editrice, Udine: 73-99.

393 CALBERLA H. 1895 - Ueber einige transalpine Zygaenen - *Correspondenzblatt des Entomologischen Vereins "Iris" zu Dresden*, XII: 203-228.

393bis MAY H. 1895 - Ueber *Colias chrysotheme* Esp. - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines*, V (1894): 41-46, Taf. I.

393ter MORIN L. 1895 - Ein Sammelplätzchen in Süd-Tirol - *Entomologische Zeitschrift,* IX (6): 42-43.

394 STAUDINGER O. 1895 - Neue Lepidopteren-Arten und Varietäten aus dem paläarktischen Faunengebiet - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* VII (2) (1894): 241-296, Tav. IX.

395 STEFANELLI P. 1895 - Appunti sulla *Vanessa egea* Cr. in: Processi verbali delle adunanze tenute nell'anno 1895 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, XXVII: 2-6.

396 TUTT J.W. 1895 - Entomological Reminiscences of the Tyrol. I. - A day in the Mendel Pass - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, VII (8): 49-52.

397 LEMANN F.C. 1896 - Supplementary notes on *Erebia melas* - *The Entomologist's Monthly Magazine*, 2° ser., II (XXXII): 4.

398 LEMANN F.C. 1896 - Reminiscenses of the Tyrol - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, VII (9): 221-224.

399 LOCKE H. 1896 - Mein zehnter Besuch im Ortler-Gebiete (Stilfserjoch) 1895 - *Entomologische Zeitschrift*, X (6): 43-44.

400 MASSALONGO O. 1896 - Nuova contribuzione alla fauna entomologica del Veronese. Lepidoptera - Stab. Tipo-Lit. G. Franchini, Verona: 89-120, 5 Tavv.

401 MORIN L. 1896 - Entomologisches aus Südtirol - *Entomologische Zeitschrift, X (6): 44.*

402 OBERTHÜR C. 1896 - Notes on *Erebia melas* - *The Entomologist's Monthly Magazine*, 2° ser., II (XXXII): 1-3.

403 PROUT L.B. 1896 - *Melanippe fluctuata* - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, VIII: 54-57.

404 RAGUSA E. 1896 - Note Entomologiche - *Il Naturalista Siciliano*, N.S., I (1-2-3): 63-65.

405 SOHN O. 1896 - *Neuronia* Hb. *cespitis* F. var. *decolor* Sohn, nov. var. - *Societas Entomologica*, XI (14): 115.

406 CECCONI G. 1897 - Contributo alla Fauna Vallombrosana. Invertebrati: Lepidotteri - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXIX: 214-224.

407 DAMRY 1897 - Notes sur la chasse aux Lépidoptères en Sardaigne - *Societas Entomologica*, Frankfurt a. M., XII (17): 129-130.

408 FOUNTAINE M.E. 1897 - Notes on the Butterflies of Sicily - *The Entomologist,* XXX (404): 4-11.

408bis HIRSCHKE H. 1897 - Sammelreise auf das Stilfserjoch. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLVII: 641.

409 KALCHBERG, VON, A. 1897 - Ueber die Lepidopteren-Fauna von Haifa in Syrien - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, IX (1896): 161-184.

410 METZGER A. 1898 - Macrolepidopterenfauna von Raibl in Ober-Kärnten und Preth in Istrien - *Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereins*, VIII (1897): 31-45.

411 PINCITORE MAROTT J. 1897 - Allevamenti e ricerche entomologiche - *Bollettino del Naturalista collettore, allevatore, acclimatatore, Siena*, XVII (11), 2 pp.

412 TETZNER R. 1897 - Entomologisches von Schlern (Südtirol) - *Entomologische Zeitschrift*, XI (3): 19-20.

413 GARBOWSKI T. 1898 - Lepidopterologische Notizen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLVIII: 95-97.

414 MERRIFIELD F. 1898 - *Attacus ricini* in Lombardy - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, X (8): 204.

415 OBERTHÜR C. 1898 - Observations sur des *Zygaena* (Lép. Hétér.) des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 3: 21-25.

416 POSTANS R.B. 1898 - The Rhone Valley in June - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, X: 34-36.

417 TUTT J.W. 1898 - Contributions to the fauna of Piedmont - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, X (4): 89-91, (5): 118-120.

418 CASPARI W. 1899 - Über *Agrotis saucia* Hbn. und deren neue aberration: ab. *philippsi* Casp. - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, 52: 185-201, Tav. IV (pars).

419 CHAPMAN T.A. 1899 - Entomological Notes from the Riviera and Locarno - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XI (6): 150-153.

420 DE JOANNIS J. 1899 - Note sur *Mamestra implexa* Hb. (Lép.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 4: 23-26.

421 DEL GUERCIO G. 1899 - Catalogo della mostra di animali diversi, di parti di piante o prodotti guasti composta di saggi delle collezioni della R. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze e inviata alla Esposizione nazionale generale di Torino nell'anno 1898. Ord. Lepidoptera - Firenze, Tip. M. Ricci: XXII-XXXII.

422 FUCHS A. 1899 - Macrolepidopteren der Loreley-Gegend und verwandte Formen - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, 52: 117-158.

423 PINCITORE MAROTT J. 1899 - Bruchi di *Lasiocampa Quercifolia* L. e di *Cossus Ligniperda* F. - *Bollettino del Naturalista collettore, allevatore, acclimatatore,* Siena, XIX (5), 3 pp.

424 REBEL H. 1899 - Zweiter Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Südtirols - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* XLIX (2/3): 158-185, Taf. IV.

425 ROWLAND BROWN H. 1899 - Susa in June: A further contribution to the Fauna of Piedmont - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XI (11): 290-293.

426 TUTT J.W. 1899 - Contributions to the Fauna of Piedmont - The Butterflies of Pre St. Didier - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XI (9): 227-230.

427 TUTT J.W. 1899 - Eggs of Lepidoptera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XI (8): 219-220.

428 TUTT J.W. 1899 - The British species belonging to the Fumeids - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XI (9): 237-238.

429 WALSINGHAM T. 1899 - *Talaeporia* (*Bankesia*, Tutt) *staintoni*, n. sp. and *montanella*, n. sp. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XI (10): 256-259.

430 KOLLMORGEN F. 1899-1900 - Versuch einer Macrolepidopteren-Fauna von Corsica - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XII (1899): 307-328, XIII (1900): 189-204.

431 AGASSIZ G. 1900 - Catalogue des Variétés et Aberrations de ma collection. Macrolépidoptères de la zône paléarctique - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, X (6): 237-256.

432 CANNAVIELLO H. 1900 - Courte note sur les Lépidoptères du Sous-Genre *Pyrameis* Hübn. - *Miscellanea Entomologica*, Narbonne, VIII (2): 17-20.

433 DEL GUERCIO G. 1900 – Osservazioni naturali ed economiche sugli insetti che devastano le coltivazioni erbacee nella valle del Bientina - *Nuove Relazioni intorno ai lavori della Regia Stazione di Entomologia Agraria di Firenze*, Ser. I (2): 269-303.

433bis DEL GUERCIO G. 1900 - Osservazioni naturali ed economiche sugli insetti che devastano le coltivazioni erbacee nella valle del Bientina - *Nuove Relazioni intorno ai lavori della Regia Stazione di Entomologia Agraria di Firenze,* Ser. I (3): 143-159.

434 DEL GUERCIO G. 1900 - Insetti ed insetticidi contro le larve delle cavolaie - *Atti della Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze*, Quarta Serie, Vol. XXIII: 242-254.

435 GALVAGNI E. 1900 - Beitrag zur Lepidopterenfauna des Brennergebietes - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, L, Abhandlungen: 561-576, 3 figg.

436 STAUDINGER O. 1900 - Neue Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XII (1899) (2): 352-403, Tavv. V, VI.

437 STEFANELLI P. 1900 - Nuovo Catalogo illustrativo dei Lepidotteri Ropaloceri della Toscana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 32: 156-191, 325-374, 381-396.

438 CAVARA F. 1900 ? inizio - Danneggiamenti della *Liparis dispar* L. alle Sughere della Sardegna - *Rivista di Patologia vegetale*, estr. 6 pp.

439 ROWLAND BROWN H. 1900-1901 - Over Three Passes-the Splugen, the Stelvio, and the Brenner- with some notes on the Butterflies by the way - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XII (1900): 309-312, XIII (1901): 95-97.

440 DE STEFANI PEREZ T. 1901 - Contribuzione all'entomocecidiologia della Flora Sicula - *Nuovo Giornale Botanico Italiano*, N. S., VIII (3): 441-455, (4): 543-556.

441 FUCHS A. 1901 - Neue Geometriden der Genera Acidalia und *Eupithecia* aus Sicilien - *Stettiner entomologische Zeitung*, 62: 119-126.

442 FUCHS A. 1901 - Fünf neue Formen europäischer Macrolepidopteren - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, 54: 51-58.

443 GALVAGNI E. 1901 - Lepidopteren-Ausbeuten in der weiteren Umgebung von Triest und Nordtirol - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LI (1): 7-8.

444 GALVAGNI E. 1901 - Eine neue lokalform vom *Biston Hirtaria* Cl. *istriana* f. nov. und *Argynnis Pales* ab. *Napaea* Hb. - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LI (8): 625-626.

445 HABICH O. 1901 - *Psyche* (*Phalacropteryx*) *Calberlae* Heyl. und *Epichnopteryx ardua* von Bad Ratzes - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LI (8): 624.

446 NEUSTETTER H. 1901 - Ein lepidopterologischer Ausflug in die Euganaeen u. nach Battaglia in Ober-Italien - *Jaresbericht des wiener entomologischen Vereines 1900*, XI: 87-102.

447 PREISSECKER F. 1901 - Lepidopteren von Raibl und Spitz. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LI (8): 625.

448 STAUDINGER O., REBEL H. 1901 - Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes. III Ed. I. Theil: Famil. Papilionidae-Hepialidae - R. Friedländer et Sohn, Berlin, XXXII+411 pp.

449 GALVAGNI E. 1902 - *Taeniocampa rorida* H.-S. am Triester Bahnhof. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LII: 225.

450 GALVAGNI E. 1902 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LII: 586-587.

451 GIANELLI G. 1902 - *Zygaena carniolica*, Sc. Ent. Carn. var. *Ragonoti* - Gian. - *Zoologischer Anzeiger*, Leipzig, 509.

452 HABICH O. 1902 - Ueber Lepidopteren aus Ratzes. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LII: 12-13.

453 LOWE F.E. 1902 - Collecting Lepidoptera in 1902 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XIV: 330-334.

454 LOWE F.E. 1902 - Notes from Bozen on the South Tirol, 1n 1901-1902 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XIV: 281-283.

455 PREISSECKER F. 1902 - Ueber Lepidopteren vom Predilpass. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LII: 13.

456 SCHULZ G.L. 1902 - Eine neue Varietät von *Arctia maculosa* Gerning - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 15: 328-329.

457 TUTT J.W. 1902 - The Lepidoptera of Piedmont: Torre Pellice - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XIV: 169-171.

458 WAGNER F. 1902 - Ueber *Senta maritima* und *Caradrina noctivaga*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LII: 143-144.

459 CANNAVIELLO E. 1902-1904 - Osservazioni sulle "Phalaenae" dell'Italia meridionale - *Rivista italiana di Scienze Naturali*, XVII (1902) (11-12): 149-153, XXIII (1903) (1-2): 5-11, (5-6): 63-66, (7-8): 91-99, XXIV (1904) (1-2): 16-21.

460 BACOT A.W., 1903 - Notes on the Life-history of *Coenonympha corinna* - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XV: 94-96.

461 DEL GUERCIO G. 1903 - Notizie e suggerimenti pratici per conoscere e combattere gli animali nocivi alle piante coltivate ed ai loro frutti nel campo e nei locali per la conservazione. Ord. Lepidoptera - *Nuove Relazioni intorno ai lavori della Regia Stazione di Entomologia Agraria di Firenze,* Ser. I, N° 5: 37-208.

461bis DEL GUERCIO G. 1903 - Intorno alle principali cause che producono il diradamento dei seminati ed a quelle che guastano il frutto dei cereali nel campo e nel granaio. Lepidotteri - *Nuove Relazioni intorno ai lavori della Regia Stazione di Entomologia Agraria di Firenze*, Ser. I, N° 6: 277-291.

462 FAVRE E. 1903 - Supplément à la Faune des Macrolépidoptères du Valais - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XI (1), 46 pp.

463 FUCHS A. 1903 - *Stilbia insularis* n. sp. - *Societas entomologica*, XVIII (2): 9-10.

464 PERLINI R. 1903 - Contributo alla Fauna dei lepidotteri d'Italia. Alcune seconde apparizioni inavvertite o dubbiose - *Bollettino del Naturalista*, Siena, XXIII (2): 5 pp.

465 ROSTAGNO F. 1903 - Contributo allo studio della fauna romana. Una aberrazione della *Saturnia pavonia* L. ed un'altra della *Pieris rapae* L. - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, XII (4/6): estr. 3 pp.

466 SCHIMA K. 1903 - Fang von *Pieris rapae* L. var. *Rossii* Stef. in Brignano bei Triest - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* Wien, LIII: 566-568.

467 SICH A. 1903 - Spring Lepidoptera at Menaggio - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XV: 155-156.

468 SIMES J.A. 1903 - Notes on some Winter Lepidoptera of the Mediterranean littoral - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XV: 132-133.

469 STEFANELLI F. 1903 - Nuove osservazioni sulla *Rhodocera* (*Gonepteryx*) *cleopatra* L. var. *italica* Gerh. - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXV (1-2): 78-82.

470 TURATI E. 1903 - Contribuzioni alla fauna dei Lepidotteri italiani. Note critiche, biologiche e morfologiche - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, XLII: 17-44.

471 TUTT J.W. 1903 - Lepidoptera of the Italian Riviera - Alassio, Albenga, Laigueglia - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XV: 222-224.

472 VERITY R. 1903 - Aberrations nouvelles ou peu connues de *Lycaena Icarus* Linné (Lépidopt. Rhopal.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 8: 287-289.

473 VERITY R. 1903 - Observation biologique - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 8: 283.

474 VERITY R. 1903 - Lepidotteri Ropaloceri scoperti recentemente in Toscana - *Florentia, Rivista dell'Istituto Domengé-Rossi,* Anno I (I-II): 3-10, 1 Tav., Firenze.

475 ZICKERT F. 1903 - *Zygaena scabiosae* Esp. - *Entomologische Zeitschrift*, XVII (16): 61.

476 PERLINI R. 1903-1904 - Elenco dei Lepidotteri propri soltanto all'Italia - *Rivista italiana di Scienze Naturali*, XXXIII (1903) (11-12): 129-138, XXXIV (1904) (1-2): 1-5, (5-6): 65-67, (7-8): 112-114, (8-9): 117-118, (9-10): 118-119.

477 BALESTRE L. 1904 - Note sur six *Plusia* nouvelles pour les Alpes-Maritimes (Lép.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 9: 167-268.

478 BARTEL M. 1904 - Ueber die Variabilität von *Lycaena coridon* Poda und Beschreibung einer neuen Lokalform dieser Art - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, XVIII (30): 117-118.

479 DE STEFANI T. 1904 - Il Rodilegno nei limoni - *Nuovi Annali d'Agricoltura Siciliana*, Palermo, XV (1): 7-13.

480 DIETZE K. 1904 - Beiträge zur Kenntnis der Eupithecien - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XVI (1903) (2): 331-387, Taf. IV.

481 GIANELLI G. 1904 - *Syntomis phegea* L. ab. *sexmaculata* Gianelli - *Il Naturalista Siciliano*, XVII (2-3): 25.

482 HOFFMANN P. 1904 - Einige transalpine Zygaenenformen - *Entomologische Zeitschrift*, XVIII (2): 5-9.

483 LEONHARD W. 1904 - Ist *Lycaena icarus* "ab. *melanotoxa* Pincit." identisch mit "ab. *arcuata* Weymer"? - *Entomologische Zeitschrift*, XVIII (9), 2 pp.

484 LOWE F.E. 1904 - *Pararge achine* on the Mendel - *The Entomologist*, XXXVII (N. 498): 272.

485 PROUT L.B. 1904 - An interesting form of *Chesias spartiata* (var. *capriata*, n. var.) - *The Entomologist*, 37: 60-61.

486 PÜNGELER R. 1904 - Die Entwickelungeschichte von *Agrotis* (*Epipsilia*) *faceta* Tr. - *Il Naturalista Siciliano*, XVII (4): 65-67.

487 QUAJAT E. 1904 - Dei bozzoli più pregevoli che preparano i lepidotteri setiferi - Fratelli Drucker Ed., Padova-Verona, 100 pp.

488 RAGUSA E. 1904 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, XVII (1): 18-20, (2-3): 42, 108-115, 141-143.

489 ROSTAGNO F. 1904 - Contributo allo studio della fauna della Campagna Romana. Una aberrazione della *Pieris rapae* L. ed un'altra della *Melitaea didyma* O. attinenti alla fauna della

campagna romana - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, V (4/6): 167-170.

490 ROWLAND BROWN H. 1904 - Butterfly Hunting in the South Tyrol - *The Entomologist*, 37: 222-226.

491 SCHAWERDA K. 1904 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LIV: 29-30.

492 STEFANELLI P. 1904 - (*Lycaena Escheri* var. *splendens*). In: Adunanza del 5. Giugno 1904 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 36: 10-11.

493 STEFANELLI P. 1904 - (*Lycaena icarus*). In: Adunanza del 1. Maggio 1904 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 36: 4-5.

494 VERITY R. 1904 - Sur le *Parnara nostrodamus* F. et sur son développement (Lép.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 9 (15): 233-235.

495 VERITY R. 1904 - New forms and new localities of some European butterflies - *The Entomologist*, XXXVII (490): 53-59, Tav. IV.

496 VERITY R. 1904 - (*Lycaena icarus* e *Pieris brassicae*). In: Adunanza del 1. Maggio 1904 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 36: 5-6.

497 VERITY R. 1904 - Lepidotteri. In: Adunanza del 5. Giugno 1904 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 36: 11-12.

498 WAGNER F. 1904 - *Lycaena arion* L. nov. var. - *Societas entomologica*, XIX (1): 1.

499 ZICKERT F., 1904 - *Dysauxes punctata* ab. (et var.?) *Ragusaria* Zkt. - *Il Naturalista Siciliano*, XVII (5): 97-98.

500 ZICKERT F. 1904 - Contributo ad un Catalogo delle Zygene dell'Italia meridionale con descrizione di varietà ed aberrazioni poco note - *Il Naturalista Siciliano*, XVII: 67-74.

501 COSTANTINI A. 1905 - Materiali per la fauna entomologica del Modenese e del Reggiano - *Rivista Italiana di Scienze Naturali*, Siena, XXV (1-2): 15-18, (5-6): 61-66.

502 GALVAGNI E. 1905 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LV: 25-27.

503 KRÜGER C. 1905 - Ein Beitrag zur Lepidopteren Fauna Siciliens - *Il Naturalista Siciliano*, XVIII: 49-51.

504 LEONHARDT W., 1905 - Ueber *Lycaena icarus* Rott. ab. *polyphemus* Esper - *melanotoxa* Pincitore - *Il Naturalista Siciliano*, XVIII (1): 1-3.

505 PERLINI R. 1905 - Forme di Lepidotteri esclusivamente italiane - Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 78 pp., 6 Tav.

506 RAGUSA E. 1905 - Catalogo dei Lepidotteri di Sicilia esistenti nella collezione di Enrico Ragusa - *Il Naturalista Siciliano*, XVII (7-8): 145-164; XVIII (1): 10-24.

507 REBEL H. 1905 - Lepidopterologische Mitteilungen In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LV (1/2): 28.

508 ROSTAGNO F. 1905 - Contributo allo studio della fauna della Campagna Romana. La *Pieris ergane* Hüb. - Una aberrazione della *Thecla ilicis* Esp. - Il *Biston graecarius* Stgr. e la sua varietà *florentina* Stef. - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, VI (1/3): 90-92.

509 SCHAWERDA K. 1905 - Mitteilungen über Pieriden. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LV: 515-516.

510 SCHAWERDA K. 1905 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LV (1/2): 27-28.

511 SCHIMA K. 1905 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LV: 31.

512 SCHIMA K. 1905 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LV: 24-25.

513 SILVESTRI F. 1905 - L'Ocnogina betica (*Ocnogyna baeticum* Ramb.) conosciuta volgarmente allo stato larvale col nome di Bruco peloso - *R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici (Laboratorio di Entomologia Agraria), Bollettino* N. 10, Ser. II: 12 pp.

514 STEFANELLI F. 1905 - Nota sopra alcuni Lepidotteri nuovi per l'Italia o per la Toscana - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVI (3) (1904): 184-185.

515 TURATI E. 1905 - Alcune nuove forme di Lepidotteri. I - *Il Naturalista Siciliano*, XVIII (2-3): 25-48.

516 TUTT J.W. 1905 - Eggs of Lepidoptera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XVII: 134-135.

517 VERITY R. 1905 - Elenco dei Lepidotteri raccolti sul littorale del Lucchese (Forte dei Marmi) - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, XXXVI (4) (1904): 123-170.

518 VERITY R. 1905 - Elenco dei Lepidotteri raccolti nell'Appennino Pistoiese (700 metri) (15 Luglio -3 Settembre 1903) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVI (1904): 58-93.

519 VERITY R. 1905 - Description et métamorphose d'une nouvelle *Orgya* (Lép.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 10: 59-61.

520 VERITY R. 1905 - Osservazioni lepidotterologiche - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVI (3) (1904): 185-188.

521 VIAPPIANI A. 1905 - L'Ocnogyna betica (*Ocnogyna baeticum* Ramb.) - *Italia agricola*, LII: 251-255, 1 tav.

522 ZICKERT F. 1905 - Einige neue in der Provinz Avellino erbeutete Zygaenen-Aberrationen - *Entomologische Zeitschrift*, XIX (20): 117.

523* VERITY R. 1905-1911 - Rhopalocera palaearctica (1). Papilionidae et Pieridae - Pubbl. dall'Autore, Firenze: 368 pp., 86 Tavv.

524 BARTEL M. 1906 - *Ino turatii*, eine neue Art aus Italien - *Societas Entomologica*, Zurich, XX (23): 178-179.

525 COSTANTINI A. 1906 - Materiali per la fauna entomologica del Modenese e del Reggiano - *Rivista Italiana di Scienze Naturali*, Siena, XXV: 135-138.

526 DIETZE K. 1906 - Beiträge zur Kenntnis der Eupithecien - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XIX: 55-67, 121-126, 4 Tavv.

527 FLEISCHMANN F. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (1/2): 11.

528 GALVAGNI E. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (3): 81-85.

529 KRÜGER C., 1906 - Zweiter Beitrag zur Lepidopteren Fauna Siciliens - *Il Naturalista Siciliano,* XVIII (6): 121-124.

530 PREISSECKER F. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (3): 85-88.

531 PÜNGELER R. 1906 - *Hadena platinea* Tr. var. nov. *ferrea* - *Societas Entomologica, XXI (6): 42.*

532 RAGUSA E. 1906 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano*, XVIII (11-12): 287-288, XIX (3-4-5): 56-60.

533 REBEL H. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (1/2): 4-6.

534 ROCCI U. 1906 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Piemonte. I. Note sui Lepidotteri dei dintorni di Torino - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVIII (1): 52-79.

535 ROSTAGNO F. 1906 - Note entomologiche - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, VII (7/9): 269-274.

536 SCHAWERDA K. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (1/2): 15.

537 SCHAWERDA K. 1906 - Über *Parasemia Plantaginis* L. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (4/5): 239-241.

538 SCHAWERDA K. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (4/5): 230-232.

539 SPITZ R. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI: 616.

540 STICHEL H. 1906 - Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren Gattung *Parnassius* Latr. - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, LI: 81-94, tav. II.

541 WAGNER F. 1906 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (4/5): 226-228.

542 BANG-HAAS A. 1907 - Neue oder wenig bekannte palaearktische Macrolepidopteren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XX: 69-88, Tav. 3.

543 CONIGLIO FANALES G. 1907 - Primo contributo alla conoscenza della Fauna Entomologica di Caltagirone - *Il Naturalista Siciliano,* XIX: 130-134.

544 COSTANTINI A. 1907 - Materiali per la fauna entomologica del Modenese e del Reggiano - *Rivista Italiana di Scienze Naturali,* Siena, XXVII: 11-13.

544bis FÖRSTER W. 1907 - Lepidopterologische Mitteilungen - *Zeitschrift für Entomologie, Breslau*, N. F. II, XXXII: 26-27.

545 KRAUSSE A.H. 1907 - Die Sizilien eigentümlichen Gross-Schmetterlinge - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 1 (3): 43-44.

546 KRAUSSE A.H. 1907 - Die Sardinien eigentümlichen Gross-Schmetterlinge - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 1 (2): 9.

547 MARTELLI G. 1907 - Di alcuni parassiti dell'*Ocnogyna baeticum* Ramb. osservati nei dintorni di Catanzaro - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, I: 225-230.

548 MARTELLI G. 1907 - Contribuzioni alla biologia della *Pieris brassicae* L. e di alcuni suoi parassiti ed iperparassiti - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, I: 170-224.

549 OBERTHÜR C. 1907 - Observations sur la *Zygaena transalpina* Esp. (Lèp. Hètèr.) - *Annales de la Société entomologique de France,* LXXVI: 37-48.

550 PERLINI R. 1907 - Lepidotteri della Lombardia. Parte prima - *Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti in Bergamo*, XIX (1903-1906): 1-86, 1 Tav., 1 carta.

551 PÜNGELER R. 1907 - Neue palaearctische Macrolepidopteren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XIX (1906): 216-226.

552 REBEL H. 1907 - Lepidopterologische Mitteilungen - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVI (1906): 642-650.

553 TURATI E. 1907 - Nuove forme di Lepidotteri. II - *Il Naturalista Siciliano*, XX (1, 2, 3): 1-48.

554 VERITY R. 1907 - Elenco dei Lepidotteri della Vallombrosa (Appennino Toscano) (800-900 metri) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XXXVIII (1906) (1-2): 20-51.

555 KRAUSSE A.H. 1907-1908 - Auf Sardinien - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 1 (1907) (13): 86-95, (14): 78-87, (23): 166-171, (24): 177-183; 1 (1908) (N. 41): 312-321.

556 CECCONI G. 1908 - Contributo alla fauna delle Isole Tremiti - *Bollettino dei Musei di Zoologia e Anatomia Comparata della R. Università di Torino,* XXIII, N. 583: 51 pp.

556bis DZIURZYNSKI C. 1908 - Die palaearktischen Arten der Gattung *Zygaena* F. - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, LIII: 1-60, Taf. I-II.

557 FRUHSTORFER H. 1908 - Neue *Parnassius*-Rassen - *Entomologische Zeitschrift*, XXII: 12.

558 FRUHSTORFER H. 1908 - Neue paläarktische Satyriden-Rassen - *Entomologische Zeitschrift*, XXII (31): 127-128.

559 FRUHSTORFER H. 1908 - Neue *Argynnis* und *Melitaea* - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 1 (41): 310-311.

560 FRUHSTORFER H. 1908 - Neue Satyriden des paläarkt. Faunen-Gebietes - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 1 (47): 358-359.

561 FRUHSTORFER H. 1908 - Neue paläarktische Satyriden - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 2 (2): 9-11.

561bis FRUHSTORFER H. 1908 - Drei neue *Limenitis* Rassen - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 2 (8): 50.

562 FRUHSTORFER H. 1908 - Neue paläarktische Satyriden - *Entomologische Zeitschrift,* Stuttgart, 22: 93.

563 FRUHSTORFER H. 1908 - Eine neue *Zerynthia* - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 2: 129.

564 FRUHSTORFER H. 1908 - Neue paläarktische Rhopaloceren - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 2 (29): 194-196.

564bis FRUHSTORFER H. 1908 - Neue paläarktishe (sic) Rhopaloceren - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 2: 214-215.

565 GALVAGNI E. 1908 - Über *Venilia macularia* L. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVIII (4/5): (158)-(159).

566 HELLWEGER M. 1908 - Über die Zusammensetzung und den vermutlichen Ursprung der tirolischen Schmetterlingsfauna - XXXIII. Jahresberichte des fürstbischöflichen Privat-Gymnasium am Seminarium Vicentinum in Brixen a. E.: 1-52.

567 HIRSCHKE H. 1908 - *Parnassius phoebus* Prun. (Delius Esp.) ab. femm. *barthae* (n. ab.) - *Jahres-Bericht des Wiener entomologischen Vereines*, XIX: 127-128.

568 HOFFMANN F. 1908 - Ausflug nach Adelsberg in Krain und Triest-Muggia in Istrien - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 2: 538-546.

569 KOCH A. 1908 - Sammlungs-Verzeichnis, Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europäische Gross-Schmetterlinge - Ernst A. Böttcher Verlag, Berlin, 100 pp.

570 MAYER L. 1908 - Ueber Ursache und Zweck der Kreuzungen un Aberrationen - *Entomologische Zeitschrift,* XXII (50): 214-216.

571 OBERTHÜR C. 1908 - Observations sur les variations de *Cerigo Cytherea* Fabr. (Lép. Hét.) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 13: 291-292.

572 RAGUSA E. 1908 - Due giorni di caccia entomologica sulle Madonie - *Il Naturalista Siciliano,* XX: 129-134.

573 RAGUSA E. 1908 - Note Lepidotterologiche - *Il Naturalista Siciliano,* XX (9): 139-147.

574 REBEL H. 1908 - Über *Phalacropteryx apiformis*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVIII (4/5): (157).

575 ROSTAGNO F. 1908 - Su alcune importanti catture di lepidotteri - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, IX (1/2): 79-80.

576 ROSTAGNO F., ZAPELLONI L. 1908 - Lepidoptera faunae romanae. Papilionidae - Pieridae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana,* Ser. II, IX (9/10): 289-305.

577 SCHAWERDA K. 1908 - Neue Aberration von *Parasemia plantaginis*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* Wien, LVIII (1): (29)-(30).

578 SCHULTZ O. 1908 - Über einige verdunkelte Lepidopteren-Formen - *Societas Entomologica*, XXII (24): 185-186.

579 SCHULTZ O. 1908 - Über die Variabilität von *Argynnis daphne* Schiff., sowie Auftreten von Strahlenzeichnung bei aberrativen Erscheinungen in der Gattung *Argynnis* F. - *Entomologische Zeitschrift*, XXII (9): 38-39, (10): 39-40.

580 SCHWINGENSCHUSS L. 1908 - Aberration von *Erebia lappona* Esp. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LVIII (2/3): (73).

581 SPULER A. 1908 - Die Schmetterlinge Europas, vol. I - Stuttgart, 385 pp.

582 TRAUTMANN W. 1908 - Mitteilung über die Variabilität einiger Vertreter der Familie Psychidae und Beschreibung zweier neuer südeuropäischer Formen - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 2: 421-423.

583 VON DER GOLTZ F. 1908 - Sammeltage an der Riviera - *Entomologische Zeitschrift*, XXI (44): 255-257.

584 WAGNER A. 1908 - *Parnassius apollo* in Südtirol - *Entomologische Zeitschrift*, XXI (47): 269-270.

585 MARTELLI G. 1908-1909 - Le *Pieris brassicae* L. e *rapae* L. parassite del *Capparis rupestris* Sm. - *Memorie della Classe di Scienze della R. Acc. degli Zelanti*, 3° Serie, VII: 3-4.

586 PIONNEAU P. 1908-1909 - Liste d'Espèces et Variétés de Lépidoptères Recuillis en Sicile et Sardaigne - A - Macrolépidoptères - *L'Echange, Revue Linnéenne*: 24 (1908): 55, 62-64, 68-69, 75-76, 86-88, 96; 25 (1909): 110-111, 118-120, 124-125.

587 BOHATSCH O. 1909 - Lepidopterologische Beiträge. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LIX (7/8): (237).

588 BROWN H., 1909 - Moeurs et métamorphoses d'*Agrotis constanti* Millière (Lép. Noct.) - *Annales de la Société entomologique de France*, LXXVIII: 1-4, Tav. 1.

589 COSTANTINI A. 1909 - Tre sere di caccia col lume all'alto Appennino modenese (1200-1500 m) - *Bollettino del Naturalista collettore, allevatore, coltivatore, acclimatatore, Siena*, 29 (7-8): 49-53.

590 DANNEHL F. 1909 - *Hemerophila japygiaria* Costa und ihre Stände - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII (4): 19-20.

591 DANNEHL F. 1909 - *Mamestra* Hb. *calberlai* Stgr. - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII: 46-47.

592 DANNEHL F. 1909 - *Hemerophila serraria* Costa und ihre Stände - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII (16): 75-77.

593 FORSTER W. 1909 - Lepidopterologische Mitteilungen von einer Sammelreise nach Tirol i. J. 1907 - *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau*, 2: 29-36.

594 FRINGS C. 1909 - *Pieris Manni* Mayer - *Societas Entomologica,* XXIV (10): ??? ante 77.

595 FRINGS C. 1909 - *Ematurga atomaria* L. nov. var. *transalpinaria* Frgs. - *Societas Entomologica*, XXIV (10): 77.

596 FRÜHSTORFER 1909 - Neue palaearktische Rhopaloceren - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, III: 20-21.

597 FRUHSTORFER H. 1909 - Neues über *Pieris manni* - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII (8): 41-42.

597bis FRUHSTORFER H. 1909 - Neuer über *Parnassius apollo* - *Entomologische Zeitschrift, Stuttgart*, XXIII (34): 150-151.

598 FRÜHSTORFER H. 1909 - Neue Palaearkten - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, III: 112-113, 120-121.

599 FRÜHSTORFER H. 1909 - Neue Satyriden - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 3 (23): 130-131, (24): 133-135.

600 FRUHSTORFER H. 1909 - Neue palaearktische Pieriden - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, III: 88.

601 FRUHSTORFER H. 1909 - Neues über *Satyrus cordula* - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, III: 88-89.

602 FRUHSTORFER H. 1909 - Neue *Erebia*-Rassen - *Societas entomologica,* XXIV (16): 123-126.

603 GALVAGNI E. 1909 - Die zoologische Reise des Naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatiens im April 1906. B. Spezieller Teil. Bearbeitung des gesammelten Materiales. 13. Lepidoptera (Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Adriatischen Inseln) - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines an der Universität Wien, VII (5): 154-173, (6): 178-244, (7): 245-254.

604 GAY G. 1909 - Su la presenza di *Euchloe* in Val Pellice - *Monitore Zoologico Italiano*, Firenze, XX: 83-84.

605 KERTÉSZ A. 1909 - *Parnassius Phoebus* nov ab. *Ines* - *Archivium Zoologicum*, I (8): 29-30.

606 MARTELLI G. 1909 - Contribuzioni alla conoscenza della *Dicranura vinula* L. e di alcuni suoi parassiti - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, III (1908): 239-260.

607 MARTELLI G. 1909 - Sul modo di combattere due farfalle dannose agli alberi da frutto e di bosco - R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici, Bollettino N. 2, Serie IV, 10 pp.

608 MASI L. 1909 - Contribuzione alla conoscenza dei Calcididi italiani - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, III (1908): 86-149.

609 MAYER L. 1909 - Ein Sammelausflug nach Sizilien - *Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark*, 45 (1908), Sitzungsberichte: 455-459.

610 NEUSTETTER H. 1909 - *Lycaena coridon* Poda - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 3 (37): 198-199.

611 OBERTHÜR C. 1909 - Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères - *Études de Lépidopterologie Comparée*, III (VI): 101-413, Pl. XI, XVI-XX, XXIII-XXVI.

611bis PAGENSTECHER A. 1909 – Ueber die Verbreitungsbezurke und die Lokalformen von *Parnassius apollo* L. – *Jahrbücher des Nassauischen Vereins und Naturkunde,* Wiesnaden, 62: 116-210.

612 PETERSEN W. 1909 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Eupithecia* Curt. - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XXII (4): 203-314, 28 Tavv.

612bis PÜNGELER R. 1909 - Neue palaearctische Macrolepidopteren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXI (IV) (1908): 286-303, Taf. IV.

613 REBEL H. 1909 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LIX (7/8): (241)-(242).

614 REVERDIN J.L. 1909 - Lepidoptera of the Grisons-Santa Maria to Munster - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXI (9): 225-226.

615 ROSTAGNO F. 1909 - Sulla "*Melanargia arge*" Sulz., della Campagna romana - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, X (7/8): 233-235.

616 ROSTAGNO F., ZAPELLONI L. 1909 - Lepidoptera faunae romanae. Nymphalidae. Libytheidae. Erycinidae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, X: 471-493.

617 SCHAWERDA K. 1909 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LIX (9): (326)-(329).

618 SCHULTZ O. 1909 - Ueber einige palärktische Varietäten und Aberrationen der Gattung *Catocala* Schrk. - *Entomologische Zeitschrift*, XXIII: 168-169.

619 SCHWINGENSCHUSS L. 1909 - *Psodos quadrifaria* f. *stenotaenia*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LIX (9): (330).

620 STEFANELLI F. 1909 - Miscellanea lepidotterologica per la fauna d'Italia - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, XL (3-4) (1908): 252-257.

621 TRAUTMANN W. 1909 - Sammeltage im Alpengebiet - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* 3 (9): 49-55.

622 TURATI E. 1909 - Nuove forme di Lepidotteri e note critiche III - *Il Naturalista Siciliano*, XXI, N. S. Vol. I (1-8): 1-133.

623 VERITY R. 1909 - Elenco di Lepidotteri Ropaloceri raccolti nell'Isola d'Elba - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, XL (1-2) (1908): 106-116.

623bis VON DER GOLTZ F. 1909 - Fangplätze alpiner Tagfalter – *Entomologische Zeitschrift,* Stuttgart, XXIL (46): 193-195.

624 WAGNER A. 1909 - *Exaereta ulmi* in Südtirol - *Entomologische Zeitschrift,* XXII (49): 205.

625 WAGNER A. 1909 - *Libythea celtis* in Südtirol - *Entomologische Zeitschrift*, XXIII: 206-207.

626 WAGNER F. 1909 - Einige neue Lepidopterenformen - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII (4): 17-19.

627 WHEELER G. 1909 - A Lepidopterist's Summer in Central Italy - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 21 (11): 248-253, (12): 281-285.

628 HAFNER J. 1909-1912 - Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Grossschmetterlinge - *Carniola d. nathist. Mus. f. Laibach*, 1909 (3, 4): 77-108; 1910 (1): 109-128; (2): 129-148, (3-4): 149-168; 1911 (1-2): 169-188, (3): 290-309; 1912, N.s. (3) (1912): 43-74, tav. VI-VIII.

629 COSTANTINI A. 1909-1910 - Lepidotteri raccolti nel 1908 da A. Costantini nel Modenese - Estratto dal Bollettino dei Naturalisti (1909), e dalla Rivista italiana di Scienze naturali, Siena, (1910), 16 pp.

630 PIONNEAU P. 1909-1911 - Liste d'Espèces et Variétés de Lépidoptères Recuillis en Sicile et Sardaigne -II - Microlépidoptéra - *L'Echange, Revue Linnéenne*: 25 (1909): 184, 187-188; 26 (1910): 7-8, 37-38, 43-44, 55-56, 84-85, 96; 27 (1911): 102-103, 110-111, 116-117.

631 CULOT J. 1909-1913 - Noctuelles et Géometrés d'Europe. Premiére Partie. Noctuelle. Vol. I. - Imp. Oberthür, Rennes-Paris. Reprint, Ed. Apollo Books, Ristampa 1986, 220 pp, tavv. 1-38.

632 WARREN W. 1909-1913 - Noctuidae - in Seitz A.: The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna - Vol. 3 - Stuttgart.

633 BANG-HAAS A. 1910 - Neue oder wenig bekannte palaearktische Macrolepidopteren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 24 (3): 27-51, Taf. III-IV.

634 BARGAGLI P. 1910 - Osservazioni sui danni della "*Ocneria dispar*" (L.). In: Adunanza del 5. Marzo 1910 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 41 (1909): 269-270.

635 BARRETT J.P. 1910 - The Butterflies of Sicily - *Proceedings od the South London Entomological and Natural History Society*, 9 pp.

636 DE STEFANI PEREZ T. 1910 - Notizie preventive e informazioni sulla "*Sphenoptera lineata* F." (*Geminata* Ill.) (Coleottero buprestide) e la larva di un Lepidottero che attaccano la Sulla (*Hedysarum coronarium* L.) della Tunisia e della Sicilia - Atti I° Congresso Internazionale d'Entomologia, Bruxelles: 185-194.

637* DIETZE K. 1910 - Biologie der Eupithecien. Erster Teil - Friedländer & Sohn, Berlin.

638 FRUHSTORFER H. 1910 - Neue palaearktische Argynnisrassen - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV (7): 37.

639 FRUHSTORFER H. 1910 - Neue *Erebia*-Rassen - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV (7): 37-38.

640 FRUHSTORFER H. 1910 - Neue paläarktische Satyriden - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII: 210-212.

641 FRUHSTORFER H. 1910 - Neues über *Eumenis fagi* und *alcyone* - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV (14): 71-73, (15): 75-77, (16): 82-83, (17): 86-88.

642 FRUHSTORFER H. 1910 - Neue palaearktische Satyriden - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII (12): 239-240, XXIV (1): 3-4.

643 FRUHSTORFER H. 1910 - Neue palarerktische Rhopaloceren - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV (26): 144.

644 FRUHSTORFER H. 1910 - Neue paläarktische Rhopaloceren - *Societas entomologica*, XXV (13): 50-52.

645 FRUHSTORFER H. 1910 - Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebiets - *Societas entomologica*, XXV (12): 47-48.

645bis FRÜHSTORFER H. 1910 – Zwei neue Rassen von *Argynnis adippe* L. - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, IV (9): 48.

646 FRÜHSTORFER H. 1910 - Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebietes - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, IV (10): 55, (12): 62-63.

647 FRUHSTORFER H. 1910 - Parnassiusrassen aus der Schweiz und Piemont - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV (28): 155-156.

648 GALVAGNI E. 1910 - Über *Parnassius mnemosyne* und *Parnassius apollo*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LX (7/8): (219).

649 GRAMANN A. 1910 - Über den Simplon zum Lago Maggiore - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV: 19-20, 25-26, 29-31.

650 HAFNER J. 1910 - Makrolepidopetren von Görz und Umgebung - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, XXIV: 20-21, 31-32, 49-50, 56-57, 62, 67, 73-74, 79-80, 85, 91, 95-96, 101-103, 108-110, 114-115.

651 HEYDEMANN F. 1910 - Einige neue paläarktische Lepidopteren-Formen - *Entomologische Zeitschrift*, XXIII: 177-178.

652 HIRSCHKE H. 1910 - Neue Aberrationen palaearktischer Lepidopteren - *Jahres-Bericht des Wiener Entomologischer Vereins*, XXI: 93-95.

653 HIRSCHKE H. 1910 - Neue Aberrationen paläarktischer Lepidopteren - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LX (7/8): 411-416; (9/10): 417.

654* MARCHI G. 1910 - I Ropaloceri del Trentino - Società degli Alpinisti Tridentini, Trento.

655 MARTELLI G. 1910 - Intorno a due insetti che attaccano l'*Inula viscosa* - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, IV (1909): 307-315.

656 MENDES C. 1910 - Lepidopteros Romanos (Roma, Castelli Romani) - *Broteria*, ser. Zool., 8: 135-149.

657 OBERTHÜR C. 1910 - Heterocera. I. - Zygaenidae - *Études de Lépidoptèrologie Comparée*, IV (II): 419-638.

658 OBERTHÜR C. 1910 - Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères (Suite) - *Études de Lépidoptérologie comparée*, IV: 15-417.

659 OSTHELDER L. 1910 - Zwei Sammeltage im Tale von Cogne - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 1: 23-25, 57-62.

660 PERLINI R. 1910 - Contribuzioni alla fauna dei Lepidotteri italiani. Alcune rare specie rinvenute nel Monferrato - *Rivista italiana di Scienze Naturali*, Siena, XXX (7): 97-105.

661 REBEL H. 1910 - Psychidae. In Berge: Schmetterlingsbuch nach dem gegenwärtigen Stande der Lepidopterologie - Stuttgart, Neunte Auflage: 452-462.

662 REBEL H. 1910 - Beschreibung zweier neuer Lepidopterenformen aus Albanien. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LX (1): (4)-(6).

663 REBEL H. 1910 - Zwei neue melanotische Geometridae-Aberrationen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, LX (2/3): (16)-(18).

664 ROSTAGNO F., ZAPELLONI L. 1910 - Lepidoptera faunae romanae. Lycaenidae. Hesperiidae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana,* Ser. II, XI (1910): 333-350.

665 SCHAWERDA K. 1910 - Neue Lepidopteren Formen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LX (7/8): (219)-(221).

666 SCHWINGENSCHUSS L. 1910 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LX (2/3): (18).

667 SPULER A. 1910 - Die Schmetterlinge Europas, voll. II-III - Stuttgart, 523 pp.

668 TETLEY A.S. 1910 - Note on the Habits of *Nemeobius lucina* - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXII: 163.

669 TURATI E. 1910 - Zwei neue italienische *Melitaea aurinia* Formen - *Entomologische Zeitschrift,* XXIII: 223.

670 TURATI E. 1910 - La *Zygaena transalpina* Esp. e le sue forme italiane - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia generale e di Agraria della R. Scuola Superiore di Agricoltura di Portici*, IV: 134-162.

671 TURATI E. 1910 - Note critiche sulla *Pieris ergane* H. G. - *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano, XLIX: 36-51.

672 TUTT J.W. 1910 - *Agriades polonus*, Zeller, mit Bemerkungen über die bekannten exemplaren dieser Form - *Societas Entomologica*, 25 (1): 3-4.

673 TUTT J.W. 1910 - The Lepidoptera of the Tyrol - The Sarnthal - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXII: 156-159.

674 TUTT J.W. 1910 - The Lepidoptera of the Tyrol - The Mendel Pass - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXII: 160-163.

675 TUTT J.W. 1910 - The Lepidoptera of the Tyrol - Meran - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXII: 178-179.

676 TUTT J.W. 1910 - The Lepidoptera of the Tyrol - Neu Spondinig - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXII: 180-181.

677 VERITY R. 1910 - (*P. venusta*). In: Adunanza del 5. Marzo 1910 - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, 41 (1909): 269.

678 VIGIANI D. 1910 - Sui mezzi atti a difendere il tabacco dalle Agrotidi - *Atti della Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze*, Quinta Serie, Vol. VII: 272-278.

679 VON DER GOLTZ F. 1910 - Die Erebien des Grödner-Tales - *Entomologische Zeitschrift*, XXIV (2): 6-7.

680 WAGNER F. 1910 - Zwei neue mitteleuropäische Lepidopteren-Formen - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 4 (38): 208-209.

681 WHEELER G. 1910 - Three weeks in the Abruzzi - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXII: 254-258, 275-286.

682 COURVOISIER L.G. 1910-1911 - Entdeckungsreisen und kritische Spaziergänge ins Gebiet der Lycaeniden - *Entomologische Zeitschrift,* Stuttgart XXIV (1910) (12): 59-60, (13): 65-67, (14): 70-71, (16): 81-82, (17): 88-89, (18): 92-94, (19): 99-101, (20): 106-108, (21): 112, (23): 125-127, (24): 131-132, (26): 141-142, (27): 147-149, (28): 156, (31): 167-170, (32): 175-177, (33): 181-182, (34): 185-188, (35): 190-192, (36): 196-199, (37): 201-204, (38): 205-209, (39): 210-214; Frankfurt a. M. XXIV (1911) (40): 227-228, (41): 230-231, (42): 233-236, (43): 237-238, (44): 241-242, (45): 245-247, (46): 249-250, (47): 253-255, (48): 257-259, (49): 261-263, (50): 265-266, (51/52): 269-270; XXV (1): 2-7, (2): 9-11, (3): 13-17, (4): 22-23.

683 JORDAN K., JANET A., SEITZ A., STRAND E., DENSO P., GRÜNDBERG K., WARREN W., BARTEL M., PFITZNER R., ROTHSCHILD W. 1910-1912 - The Palearctic Bombyces & Sphinges - in: Seitz A., The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna - Vol. 2 - Stuttgart.

684 BETHUNE-BAKER G.T. 1911 - Five days at Macugnaga - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXIII: 206-208.

685 CECCONI G. 1911 - La "*Oenistis quadra*" L. nella faggeta di Vallombrosa - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLI (1-4) (1909): 235-243.

686 COSTANTINI A. 1911 - *Hylophila fiorii* n. sp. (Lepidoptera) - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie IV, Vol. XIII, Anno XLIV: 81-84, figg. 1-4.

687 COSTANTINI A. 1911 - Caccie ed osservazioni lepidotterologiche fatte nel 1907 a Montegibbio (Prov. Modena - m. 403 s./m.). Particolare contributo alla Fauna di M. Gibbio e valli circonvicine - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena,* Serie IV, vol. XII, Anno XLIV: 1-16.

688 COSTANTINI A. 1911 - Description de quelques Macrolépidoptères nouveaux ou peu connus et notes faunistiques - *Entomologische Zeitschrift,* XXIV (45): 247.

689 COSTANTINI A. 1911 - Caccie lepidotterologiche nelle Alpi centrali - *Entomologische Zeitschrift,* XXIV (40): 226-227.

690 DIETZE K. 1911 - *Eupithecia gueneata* Millière und *Eup. schiefereri* Bohatsch aus Süd-Tirol - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, V (33): 232.

691 FRUHSTORFER H. 1911 - Neue paläarktische Rhopaloceren - *Societas entomologica*, XXV (24): 95-96.

692 FRUHSTORFER H. 1911 - Neue palaearktische Rhopaloceren - *Societas entomologica,* XXVI (6): 23-24.

693 GIANELLI G. 1911 - I Microlepidotteri del Piemonte e specialmente della Valle d'Aosta con i bruchi nocivi alle derrate e all'agricoltura ed il nome delle derrate di cui si nutrono - *Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino*, LIII (1910): 3-143.

694 KITT M. 1911 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (3/4): (78)-(79).

695 MARTELLI G. 1911 - Brevi notizie sulla *Saturnia pavonia* L. e su un suo parassita - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria,* Portici, V: 209-213.

696 OBERTHÜR C. 1911 - Supplément aux Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères - *Études de Lépidoptèrologie Comparée,* Vol. III et IV, Fascicule V: 183-225, Rennes.

697 PAGENSTECHER A. 1911 - Über die Geschichte, das Vorkommen und die Erscheinungswise von *Parnassius mnemosyne* L. - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde,* Wiesbaden, 64: 262-310.

698 QUERCI O. 1911 - La *Zygaena Transalpina*, Esp., del Lazio meridionale - In: Oberthür Ch., *Études de Lépidoptérologie Comparée*, Vol. III et IV, Fascicule V: 214-219, Rennes.

699 ROSTAGNO F. 1911 - Lepidoptera faunae romanae. Sphingidae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, XII (5-8): 99-124.

700 ROSTAGNO F., ZAPELLONI L. 1911 - Lepidoptera faunae romanae. Addenda - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. II, XII (1-4): 1-28.

701 SCHAWERDA K. 1911 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (1/2): (53)-(54).

702 SCHAWERDA K. 1911 - Das Ei von *Erebia nerine* var. *morula* Spr. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (3/4): (90)-(91).

703 SCHAWERDA K. 1911 - *Erebia glacialis* Esp. und ihre Formen in den Hochalpen Österreichs. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (1/2): (29)-(40).

704 SCHIMA K. 1911 - Variabilität von *Ematurga atomaria* L.. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (1/2): (47)-(50).

705 SCHULTZ O. 1911 - Ueber einige aberrierende und gynandromorphe pal. *Papilio*-Formen - *Societas Entomologica*, XXVI (9): 33-34.

706 SILVESTRI F. 1911 - Contribuzioni alla conoscenza degli insetti dannosi e dei loro simbionti. II. *Plusia gamma* (L.) (Lepidoptera - Heterocera) - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, V: 287-320.

707 STAUDER H. 1911 - Beiträge zur kenntnis der Makrolepidopteren-Fauna der adriatischen Küstengebiete - *Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali,* Trieste, 25: 93-120.

708 TURATI E. 1911 - Lépidoptères nouveaux ou peu connus - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 16 (14): 287-295.

709 TURATI E. 1911 - Notes (sic!) su alcune Lycaenidae italiane - *Societas entomologica*, XXV (21): 81-84.

710 TURATI E. 1911 - Einige neue italienische Rhopalocerenformen - *Societas Entomologica*, XXVI (18): 67-69.

711 TURATI E. 1911 - Lepidoptera aus Sardinien - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, Berlin, VII (7-8): 205-213.

712 TURATI E. 1911 - Lepidotteri del Museo Zoologico della R. Università di Napoli. Descrizioni di forme nuove e note critiche - *Annuario del Museo Zoologico della R. Università di Napoli*, (N. S.) III (18): 1-31.

713 TURATI E. 1911 - Über italienische Lycaeniden - *Societas Entomologica*, Frankfurt a. M., XXV (23): 89.

714 TURATI E., VERITY R. 1911 - Faunula Valderiensis nell'Alta Valle del Gesso (Alpi Marittime). Materiali per una Faunula lepidotterologica della Valderia. Rhopalocera - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, XLII: 170-265. (1910).

715 VERITY R. 1911 - Alcuni Lepidotteri inediti o non ancora figurati - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLII (1910): 268-281.

716 VERITY R. 1911 - Races inédites de Satyridae européenns (Lep. Rhopalocera) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 16: 311-314, 372 (Corrigendum).

717 VERITY R. 1911 - Studio comparato dello sviluppo del "*Pieris manni*" L. (sic) e "*Rapae*" Mayer (sic) - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, XLII (1910): 131-141.

718 VERITY R. 1911 - (*Apatura ilia* e altre specie). In: Adunanza dell'11 Febbraio 1911 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 42 (1910): 289-290.

719 KRAUSSE A.H. 1911-1912 - Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Sardiniens - *Entomologische Rundschau,* 28 (1911): 173-175; 29 (9) (1912): 62-64.

720 ANDREUCCI A. 1912 - Sul mimetismo della larva di "*Spintherops* (B) *spectrum* (Esp.)" - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLIII (1911): 234-237.

721 ASHBY E.B. 1912 - A Summer Trip in France, Switzerland, and Italy - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXIV: 15-17.

722 BARRETT J.P. 1912 - Butterfly collecting in Sicily and Calabria in 1911 - *The Entomologist*, XLV (n. 593): 303-306.

723 BRYK F. 1912 - Aktuelle Parnassiusfragen - *Entomologische Mitteilungen*, 1 (12): 376-382, Berlin.

723bis BRYK F. 1912 - Vornehme Parnassiusfragen - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, 65: 2-35, Taf. I.

723ter BRYK F. 1912 – "Parnassiana". V. Zur Synopsis der asiatischen *Mnemosyne – Societas entomologica*, XXVII (20): 87-89.

724 CHAPMAN T.A. 1912 - An unrecognised European *Lycaena* identified as *Agriades thersites* (Boisd. MSS.) Cantener - *The Transactions of the Entomological Society of London:* 662-676, Tavv. XXXI-XXXV.

725 DRAGONI-RABENHURST, VON, W.E. 1912 - Ein neuer Fundort von *Colias crocea* Fourc. (*edusa* F.) ab. *coerulea* Verity - *Entomologische Zeitschrift,* 26: 115.

726 GALVAGNI E. 1912 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (9/10): (172), (1911).

727 HARRISON J.W.H. 1912 - The Genus *Ithysia* (Hubner) - *The Entomologist*, 45: 315-321.

728 KRAUSSE A. 1912 - Zwei neue sardische Satyrus-Varietäten - *Archiv für Naturgeschichte,* 97, Abt. A (9): 150.

729 KRAUSSE A. 1912 - Einige neue sardinische Lepidopteren-Varietäten - *Archiv für Naturgeschichte*, 97, Abt. A, (7): 167-168.

730 KRAUSSE A. 1912 - *Acidalia ornata* var. n. *paucisignata* m. & *Lythria purpuraria* var. n. *aucta* m. - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 6: 132.

731 PAGENSTECHER A. 1912 - Über *Parnassius phoebus* Fabr. (*delius* Esp., *smintheus* Doubl.) - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, Wiesbaden, 65: 36-98, Taf. II.

732 PAGENSTECHER A. 1912 - Nachtrag zu dem Artikel Über *Parnassius phoebus* Fabr. (*delius* Esp., *smintheus* Doubl.) - *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, Wiesbaden, 65: 179-188.

733 QUERCI O. 1912 - Notizie sulle *Zygaena* del Lazio meridionale - In: Oberthür Ch., *Études de Lépidoptérologie Comparée*, VI (IV): 137-155, Rennes.

734 RAMME W. 1912 - Entomologische ergebnisse einer Reise nach Oberitalien und Südtirol (1910) - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, LVI (1911): 11-32.

735 REBEL H. 1912 - Neue Arten der Lepidopterenfauna Österreich-Ungarns. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* LXII (3/4): (104)-(108).

736 ROCCI U. 1912 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Piemonte. Note ed Osservazioni. I. - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXII (1911) (1): 153-221.

737 ROCCI U. 1912 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Piemonte. 2a. Note ed Osservazioni. II - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXIII (3): 161-196.

738 ROSTAGNO F. 1912 - Lepidoptera faunae romanae. Addenda a Rhopalocera et Sphinges - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. III, I (V-VIII): 145-148.

739 SCHAWERDA K. 1912 - Versammlung der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (9/10): 175-177 (1911).

740 SCHAWERDA K. 1912 - Lepidopterologische Mitteilungen. *Erebia glacialis* var. *nicholli* Obth. in der Brenta. *Larentia kollariaria* H. S. in Gröden. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (9/10): (175)-(177) (1911).

741 SCHULZE P. 1912 - *Drepana lacertinaria* L. und ihre Formen - *Berliner Entomologische Zeitschrift,* LVII: 113-120.

742 STAUDER H. 1912 - Beitrag zur Rassenfrage von *Zygaena achilleae* Esp. - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 18, 6 pp.

743 TETLEY A.S. 1912 - The Rhone Valley and Italian Lakes in Spring - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXIV: 112-114.

744 TURATI E. 1912 - *Taeniocampa* (*Amathes, Orthosia*) *witzenmanni* Standfuss en Algérie et en Sardaigne (Lep. Noctuidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 17 (20): 414-417.

745 TURATI E. 1912 - New Species and new Forms of Lepidoptera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXIV (12): 303-306.

746 TURATI E. 1912 - Sur la *Zygaena transalpina* - In: Oberthür Ch., *Études de Lépidoptérologie Comparée*, VI (V): 180-195, Rennes.

747 TURATI E., VERITY R. 1912 - Faunula Valderiensis nell'Alta Valle del Gesso (Alpi Marittime). Heterocera - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLIII (1911): 168-233.

748 VERITY R. 1912 - Considerazioni sulla classificazione dei Lepidotteri e loro applicazione allo studio di alcuni problemi della evoluzione - *Monitore Zoologico Italiano*, Firenze, XXIII (3): 45-56.

748bis VON DER GOLTZ F. 1912 - Erebien 1911 und anderes - *Entomologische Rundschau*, 29 (20): 127-130.

749 WAGNER F. 1912 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXII (8/9): (210)-(211).

750 ZERNY H. 1912 - Lepidopterenausbeute aus Bad Ratzes in Südtirol. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXI (9/10): (177)-(181), (1911).

751 ZERNY H. 1912 - Lepidopterenausbeute aus Bad Ratzes in Südtirol. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXII (8/9): (216)-(218).

752 KITT M. 1912-1913 - Über die Lepidopterenfauna des Ötztales - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXII (8/9): 320-384 (1912); (10): 385-416 (1913).

753 PROUT L.B. 1912-1920 - Geometridae - in Seitz A: The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna - Vol. 4 - Stuttgart, 479 pp.

754 ANONIMO 1913 - Piccole Notizie - Avversità e malattie: Invasione di *Biston graecarius* - *"Il Coltivatore"*, Casale Monferrato, 59 (22): 121-122.

755 COSTANTINI A. 1913 - *Hydroecia Puengeleri* Turati forma (an sp.?) n. - *Entomologische Zeitschrift*, XXVII (22): 123.

756 CURWEN B.S. 1913 - Early Summer in the Valais and North Italy - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXV (12): 300-303.

757* DIETZE K 1913 - Biologie der Eupithecien. Zweiter Teil - Friedländer & Sohn, I-III + 172, Berlin.

757bis HOFFMANN F. 1913 - *Poecilocampa populi* L. var. *alpina* Frey in Oesterreich-Ungarn - Entomologische Zeitschrift, XXVII (2): 8.

758 KAMMEL J.F. 1913 - Sammelergebnisse auf den Hochstrassen Tirols - *Entomologische Zeitschrift*, XXVI (40): 157-158, (41): 161-162, (42): 166-167.

759 KAMMEL J.F. 1913 - Zwei neue Formen der Familie Satyridae - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXVII (15): 82-83.

760 KITSCHELT R. 1913 - Ausbeute in dem Gebiete von Görz - *Jahres-Bericht des Wiener entomologischen Vereines*, XXIV: XIV-XV.

761 KITSCHELT R. 1913 - *Larentia multistrigaria* Hw. var. *olbiaria* Mill. In: Versammlung der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII (1/2): (20).

762 KRAUSSE A. 1913 - Eine merkwürdige Aberration von Sterrha *sacraria* L. aus Sardinien - *Archiv für Naturgeschichte*, Abt. A, 79 (7): 186.

763 KRAUSSE A. 1913 - Individuelle Variabilität bei *Epinephele tithonus* auf Sardinien. - *Archiv für Naturgeschichte*, Abt. A, 79 (6): 41-42.

764 KRÜGER G.C. 1913 - Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der italienischen Lepidopteren - *Entomologische Mitteilungen*, II (4): 106-112.

765 MÖBIUS E. 1913 - Septemberfang in Bozen - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 27: 104-107.

766 NAUFOCK A. 1913 - Zwei neue Lepidopteren aus der Umgebung von Triest - *Bollettino della Società Adriatica*, 27: 101-103.

767 NEUSTETTER H. 1913 - Über eine Massenwanderung von *Hypogymna morio*-Raupen. In: Versammlung der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII (3/4): (56)-(57).

768 PEARSON D.H. 1913 - Tyrol in 1913 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXV (11): 280-282.

769 REBEL H. 1913 - Über eine Aufsammlung, welche Herr Schimanko im Juni und Juli 1911 in Südtirol und angrenzenden Gebieten Oberitaliens gemacht. In: Versammlung der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII (1/2): (24)-(26), 2 figg.

770 REBEL H. 1913 - Über das Weibchen, die ersten Stände und systematische Stellung von "*Fumea raiblensis* Mn.". In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII (1/2): (14)-(17), figg. 2-4.

771 RICHTER V.K.J., HOFFMANN F. 1913 - Beschreibung der ersten Stände von *Agrotis multifida* Led. In: Versammlung der Sektion für Lepidopterologie – *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII (1/2): (29)-(33).

771bis ROCCI U. 1913 - Alcune nuove forme di *Zygaena*. Nota preliminare - *Societas entomologica*, XXVIII (13): 56.

772 ROSTAGNO F. 1913 - Lepidoptera faunae romanae. Bombyces - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. III, I (11-12): 287-311 (1912).

773 ROSTAGNO F. 1913 - Lepidoptera faunae romanae. Aggiunte e rettificazioni alle note sui Bombyces della Campagna romana - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. III, vol. III (1-4): 154-163.

774 SCHWINGENSCHUSS L. 1913 - *Lycaena donzelii* B. v. *septentrionalis* Krul. vom Stilfserjoch. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII (3/4): (53).

775 SCHWINGENSCHUSS L. 1913 - *Melitaea cynthia* Hb. und *Erebia flavofasciata* Heyne-Rühl. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII (1/2): (17).

776 SEITZ A., STICHEL 1913 - Rhopalocera - in: Seitz A., The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna - Vol. I - Stuttgart.

777 STAUDER H. 1913 - Weitere Beiträge zur kenntnis der Makrolepidopteren - Fauna der adriatischen Küstengebiete - *Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali*, Trieste, 27 (1): 105-166.

778 STAUDER H. 1913 - *Syntomis phegea* L. aus dem österr. Litorale und Mittel-Dalmatien - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, Berlin, IX (8/9): 236-239.

779 STAUDER H. 1913 - Beiträge zur Biologie der Raupen von *Lymantria dispar* L., und *Phalacropterys praecellens* Stgr. - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, Berlin, IX (6/7): 148-151.

780 TURATI E. 1913 - Une nouvelle *Caradrina* (Lep.) de Sardaigne - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 18 (16): 406-409.

781 TURATI E. 1913 - Un Record Entomologico. Materiali per una faunula dei Lepidotteri della Sardegna - *Atti Società italiana di Scienze Naturali*, Milano, LI (1912) (3-4): 265-365.

782 TURATI E. 1913 - New Species and new Forms of Lepidoptera from Sardinia - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXV (1): 16-18.

783 VERITY R. 1913 - Revision of the Linnean Types of Palaearctic Rhopalocera - *Linnean Society's Journal-Zoology*, XXXII: 173-191.

783bis VON DER GOLTZ F. 1913 - Entomologisches aus Capri - *Entomologische Rundschau*, 30 (14): 79-80.

784 BARRETT J.P. 1914 - Butterfly collecting in Sicily and Calabria in 1912 and 1913 - *The Entomologist*, XLVII (611): 132-134, (612): 152-156.

785 BURGEFF H. 1914 - Kommentar zum palaärktischen Teil der Gattung *Zygaena* des von Ch. Aurivillius und H. Wagner

herausgegebenen Catalogus Lepidopterorum - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 5 (5-8): 35-70.

786 CECCONI G. 1914 - Le pioppete dell'Avenza danneggiate dalla Saperda maggiore e dal Perdilegno - *"L'Alpe"*, ser. II, I (11): 351-356.

787 COSTANTINI A. 1914 - *Luperina Pozzii* Curò - *Atti della Società di Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie V, vol. I (XLVII): 114-120.

788 DE STEFANI T. 1914 - Insetti occasionalmente dannosi alle viti - Palermo, Tip. Di Giorgi, 14 pp.

789 HICKS J.B. 1914 - Butterflies of Venice and Neighbourhood - *The Entomologist*, XLVII (614): 206-217.

790 KEYNES J.N. 1914 - Butterflies in the Tyrol in 1911 and 1912 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXVI: 129-132.

791 KITT M. 1914 - Sammelausbeute in Seis a. Schlern. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIV (5/6): (147)-(148), (7/8): (171).

792 KRAUSSE A. 1914 - Entomologischen Notizen - *Archiv für Naturgeschichte*, Abt. A, 80 (2): 96-104.

793 KRAUSSE A. 1914 - Die Artischockenraupe - *Archiv für Naturgechichte*, 8: 118-121.

794 OBERTHÜR C. 1914 - Faune de Lépidoptères de la Barbarie - *Études de Lépidoptérologie comparée*. X: 49-139, tavv. CCLXXXIV, CCLXXXV - Rennes (Septembre 1914).

795 PEARSON D.H. 1914 - Switzerland and Tyrol in 1914 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXVI (11): 246-248.

796 REBEL H. 1914 - Ueber die *Alveus*- und *Malvae*-Gruppe der Gattung *Hesperia*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIV (7/8): (189)-(201).

797 ROCCI U. 1914 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Piemonte. 2a. Note ed Osservazioni. III - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche,* Genova, XXIV (1913) (2): 131-216.

798 ROCCI U. 1914 - Nuove forme di *Zygaena*. 2° Nota preliminare - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXIV (1913): 113-116.

799 ROCH 1914 - Chasses dans l'Italie méridionale, en Sicile et en Tunisie - *Comptes Rendus des séances de la Société lépidoptérologique de Genève*, III (1): 14 (1913).

800 ROSTAGNO F. 1914 - Lepidoptera faunae romanae. IV Addenda - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. III, III (12): 187-190.

801 SCHAWERDA C. 1914 - Über die Lepidopterenfauna des südwestlichen Winkels von Niederösterreich - *Abhandlungen des Wiener entomologischen Vereines*, XXIV: 83-174, 1 fig, (1913).

802 STANCANELLI M. 1914 - La coltivazione del nocciolo in provincia di Messina - *Annali della R. Stazione Sperimentale di Agrumicoltura e Frutticoltura in Acireale*, II: 129-214.

803 STAUDER H. 1914 - Neue Lepidopteren-Formen aus dem österreichischen Litorale - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 28 (1): 13-17.

804 STAUDER H. 1914 - Bemerkungen über *Euchloë falloui* Allard (femm. = *seitzi* Röber) und *Amicta ecksteini* Led. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris",* XXVIII: 229-236.

805 STAUDER H. 1914 - Mikrolepidopteren des Triester Gebietes und aus Inneristrien - *Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris",* XXVIII: 4-12.

806 STAUDER H. 1914 - *Lycaena argus* L. (*aegon* Schiff.) femm. *flavodentata* m. aberr. nova - *Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris",* XXVIII (2): 119-120.

807 TURATI E. 1914 - Contribuzioni alla Fauna d'Italia e descrizione di specie e forme nuove di Lepidotteri. I. Lepidotteri della Valcamonica. II. Faunula dei Monti Aurunci e delle Mainarde (Lazio Meridionale) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali,* Milano, LIII (1914): 468-619.

808 TURATI E. 1914 - Revisione di una specie di *Erebia*. *Erebia alecto* Hb. (*nerine* Frr.) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LIII, 49 pp.

809 VERITY R. 1914 - Le "*Hesperiae*" del gruppo dell' "*alveus*" Hüb. - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLV (1-4) (1913): 155-162.

810 WAGNER A. 1914 - *Daphnis nerii* in Tirol - *Entomologische Zeitschrift,* Frankfurt a. M., XXVII (48): 275-276.

811 STAUDER H. 1914-1915 - Eine Sammelreise nach Unteritalien. Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der sorrentinischen Halbinsel und des Cocuzzo-Massivs in Calabrien - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie,* Berlin, X (1914) (8-9): 265-269; (10-12): 369-379; XI (1915) (1-2): 1-7; (3-4): 71-75; (5-6): 132-137; (7-8): 175-180.

812 STAUDER H. 1914-1916 - Systematische Verzeichnis der von mir 1900 bis 1906 in Südtirol erbeuten Makrolepidopteren - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 8 (1914/15) (30): 168-169, (32): 177-178, (33): 183-185, (34): 188, (35): 197-198, (36): 204; 9 (1915/16) (1): 3-4, (2): 8, (3): 16.

813 CULOT J. 1914-1917 - Noctuelles et Géometrés d'Europe. Premiére Partie. Noctuelle. Vol. II - Imp. Oberthür, Rennes-Paris. Reprint, Ed. Apollo Books, Ristampa 1986, 243 pp, tavv. 39-81.

814 BARLETTA G. 1915 - Una grave minaccia per le sugherete della Sicilia, l'*Ocneria dispar* - *L'Italia Agricola*, 52: 444-446.

815 CORTI A. 1915 - Zuchtergebnisse aus der Gattung *Agrotis* O. *Agrotis wiskotti* Stdfs., *Agrotis culminicola* Stdgr. und *Agrotis helvetina* B. ab ovo - *Mitteilungen der Entomologia Zürich und Umgebung*, 1: 1-11.

816 FRUHSTORFER H. 1915 - Neue palaearktische Lycaeniden - *Societas entomologica*, XXX: 67-68.

817 GIANELLI G. 1915 - Escursioni Zoologiche del Dr. Enrico Festa nella vallata del Sangro (Abruzzi). IV. Lepidotteri - *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata*, Torino, XXX, n. 704: 1-4.

818 KRAUSSE A. 1915 - Zoologische Notizen von Sardinien (nebst Verzeichnis bisheriger Arbeiten des Verfassers) - *Archiv für Naturgeschichte*, Abt. A, 81: 120-128.

819 NITSCHE J. 1915 - Lepidopterenausbeute aus Südtirol. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXV (5/6): (74)-(76).

820 PERLINI R. 1915 - Lepidotteri della Lombardia. Parte seconda - *Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti in Bergamo*, XXIII (1913-1914): 87-116.

821 ROCCI U. 1915 - Ricerche sulle forme del gen. "*Zygaena*." Fabr. I° - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXV (1914): 89-130.

822 ROCCI U. 1915 - Di alcune nuove forme liguri del genere *Zygaena* - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXV (1914): 219-226.

823 SCHAWERDA K. 1915 - Über paläarktische Lepidopteren. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXV (5/6): (85)-(91).

824 STAUDER H. 1915 - Neue mediterrane Lepidopterenformen - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 29: 20-34.

825 STERTZ O. 1915 - Mitteilungen über palaearktische Heteroceren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXIX: 123-132.

826 TRAUTMANN W., G. 1915 - Zucht von *Amicta febretta* und *sera* Wisk. - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 8 (33): 185.

827 TURATI E. 1915 - *Sidemia standfussi* Wsk. = *Luperina pozzii* Curo i.l. = *Hydroecia nicaeensis* Culot (Lep. Noct.) - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie,* Berlin, XI (1. Folge Bd. XX) (7-8): 187-189.

828 VERITY R. 1915 - Contributo allo studio della variazione nei Lepidotteri tratto principalmente da materiale di Toscana, delle Marche e di Calabria - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLV (1913): 203-238.

829 VERITY R. 1915 - Elenco di lepidotteri Ropaloceri dell'Alto Appennino Pistoiese (900-2000 m. circa) - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, XLV (1-4) (1913): 139-154.

830 VERITY R. 1915 - Contributo alle ricerche sull'epoca della comparsa dei Lepidotteri, allo stato di completo sviluppo - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, XLVI: 109-127, (1914).

831 WAGNER A. 1915 - Zur Biologie von *Agrotis culminicola* Stgr. - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, IX (3): 15-16.

832 RAGUSA E. 1915-1916 - Elenco dei Lepidotteri di Sicilia - *Il Naturalista Siciliano*, XXIII, N. Serie, Vol. III (1-6): 27-61, (1915): 144-178 (1919).

833 STAUDER H. 1915-1916 - Lepidopteren aus dem Aspromontegebirge. Material zu einer Zusammenstellung der südkalabrischen Schmetterlingsfauna - *Zeitschrift für wissenschlaftliche Insektenbiologie*, XI (11-12): 281-286; XII (1-2): 10-14; (3-4): 59-63; (5-6): 109-112.

834 COSTANTINI A. 1916 - Alcune nuove forme di lepidotteri emiliani - *Atti della Società di Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie V, vol. III (XLIX): 14-18.

835 COSTANTINI A. 1916 - "*Hepiolus aemilianus*" Costni, bona sp. - *Atti della Società di Naturalisti e Matematici di Modena,* Serie V, vol. III (XLIX): 18-21.

836 COSTANTINI A. 1916 - Note sulla "*Zanclognatha tenuialis*" Rebel - *Atti della Società di Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie V, vol. III (XLIX): 21-24.

837 COSTANTINI A. 1916 - Sinossi delle forme della "*Zygaena transalpina*" Esp. del modenese e del reggiano - *Atti della Società di Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie V, vol. III (XLIX): 25-29.

838 FRUHSTORFER H. 1916 - Neue Rassen von *Melanargia galathea* - *Societas entomologica*, XXXI (7): 33-34.

839 FRUHSTORFER H. 1916 - *Erebia Alecto Rediviva* - *Archiv für Naturgeschichte*, 82, Abt. A, 2. Heft: 7: 121-169, Taf. I-II.

840 KILIAN F. 1916 - Fünf Fangabende bei Riva am Gardasee und was sie mir einbrachten - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 10 (5): 24.

841 MOLA P. 1916 - Catalogo della raccolta delle piante e degli animali esistenti nella regione di Bosa - Tipografia Pietro Valdès, Cagliari, 45 pp.

842 OBERTHÜR C. 1916 - Faune de Lépidoptères de la Barbarie (Partie II) - *Études de Lépidoptérologie Comparée*. XII (IV): 179-387, Rennes.

843 OBERTHÜR C. 1916 - Révision iconographique des Espèces de Phalénites (*Geometra*, Linné) Enumérées et décrites par Achille Guenée, dans les Volumes IX et X du Species général des Lépidoptères, publiés à Paris, chez l'éditeur Roret en 1857 - *Études de Lépidopterologie Comparée*, XII (III): 67-176, 12-29, Pl. CCCLXXXII-CDI.

844 ROCCI U. 1916 - Le forme liguri della *Zygaena transalpina* Esp. - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche,* Genova, XXVII (1): 3-31.

845 SEIFERS 1916 - Einigen neuen Schmetterlings - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 10 (25): 147.

846 VERITY R., 1916 - Sur deux *Lycaena* confondus sous le nom de *L.* (*Agriades*) *coridon* Poda - *Annales de la Société entomologique de France*, LXXXIV (1915): 514-520.

847 VERITY R. 1916 - Faunula della Provincia di Macerata (Marche) - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 47 (1915): 45-78.

848 VERITY R. 1916 - Le variazioni geografiche della "*Lycaena coridon*" Poda nell'Italia centrale - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLVI (1914): 128-133.

849 VERITY R. 1916 - The British Races of Butterflies: their relationship and nomenclature - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXVIII: 73-80, 97-102, 128-133, 165-174.

850 VERITY R., 1916 - Un type de transition entre *Zygaena erythra* Hb. et *Z. rubicunda* Hb. (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 21 (19): 287-289.

851 WILLIAMS C.B. 1916 - A North Italian Valley - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXVIII: 4-7.

852 ZERNY H. 1916 - *Psodos alticolaria* Mann. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVI (3/5): (113)-(115).

853 DEMAISON L. 1917 - Observations sur les Lépidoptères de quelques iles de l'Europe occidentale - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 22: 171-173.

854 FRUHSTORFER H. 1917 - Eine neue Satyridae - *Societas entomologica*, XXXII: 13.

855 FRUHSTORFER H. 1917 - Neue Rhopaloceren aus der Sammlung Leonhard - *Archiv für Naturgeschichte,* LXXXII (1916), Abt. A, (2): 1-28.

856 FRUHSTORFER H. 1917 - Neue Lycaeniden - *Entomologische Rundschau*, 34 (4): 16-18.

857 FRUHSTORFER H. 1917 - Altes und Neues über Erebien - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XXXI: 43-56.

858 FRUHSTORFER H. 1917 - Neue südeuropäische *Melitaea*-Formen - *Archiv für Naturgeschichte*, LXXXIII, Abt. A, Heft 6: 11-13.

859 GALVAGNI E. 1917 - Eine Ausbeute von Lussin und den benachbarten Inseln (Scoglien). In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVI (6/10): (141)-(147), (1916).

860 NITSCHE J. 1917 - Neue Sammelergebnisse aus dem Jahre 1916. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVII (1/2): (46)-(48).

861 QUERCI O. 1917 - Notes on *Agriades coridon*, Poda and *A. aragonensis*, Verity - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXIX: 241-246.

862 RAZZAUTI A. 1917 - Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane. I. Isola di Capraia - *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*, Pisa, 31: 196-224.

863 REBEL H. 1917 - Mitteilungen über Psychiden. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVII (5/6): (133)-(137).

864 REVERDIN J.L. 1917 - Note sur l'armure génitale mâle chez *Lycaena Argus* L. et ses variétés - In: Oberthür Ch., *Études de Lépidoptérologie Comparée*, XIV (I): 17-30, Pl. I-II, Rennes.

865 SCHAWERDA K. 1917 - Über *Mamestra reticulata* Vill. und *Mamestra texturata* Alph. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVII (1/2): (17)-(18).

866 SCHAWERDA K. 1917 - Zehnter Nachtrag zur Lepidopterenfauna Bosniens und der Herzegowina - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVI (6/10): 481-489, (1916).

866bis SCHAWERDA K. 1916 – Die Formen der beiden Arten *Coenonympha arcania* L. und *Coenonympha satyrion* Esp. – *Jahres-Bericht des Wiener entomologischen Vereines*, XXVII: 111-141.

867 STAUDER H. 1917 - Eine Sammelreise nach Unteritalien. Nachtrag - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, XIII: 48-50.

868 TURATI E. 1917 - Revisione delle *Syntomis* paleartiche a doppio cingolo giallo, e saggio di una classificazione delle varie specie e forme - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVI: 179-232.

869 TURATI E. - 1917 - Nouvelle race d'*Euchloë ausonia* Hb. (*belia* Cr.) (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 22 (9): 161-163, 1 fig.

870 VERITY R. 1917 - Sur quelques races inédites de *Zygaena* (Lep. Heterocera) de Sicile et de Calabre - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 22: 222-224.

871 VERITY R. 1917 - Nuove osservazioni sui Lepidotteri Ropaloceri dell'Isola d'Elba - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, 48 (1916): 174-193.

872 VERITY R. 1917 - Contributo alle ricerche sull'epoca della comparsa dei Lepidotteri, allo stato di completo sviluppo. (I Lepidotteri diurni del Pian di Mugnone m. 119-274, presso Firenze). II. Dal 9 aprile al 14 maggio 1916 - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, XLVIII: 194-200 (1916).

873 FRUHSTORFER H. 1917-1918 - Neue paläarktische Rhopaloceren - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXX (26): 99-100; XXXI (20): 77-78.

874 CULOT J. 1917-1919 - Noctuelles et Géometrés d'Europe. Deuxiéme Partie. Géometrés. Vol. III - Imp. Oberthür, Rennes-Paris. Reprint, Ed. Apollo Books, Ristampa 1987, 269 pp, tavv. 1-37.

875 COURVOISIER L.G. 1918 - Ueber *Chrysophanus virgaureae* L. und seine Nebenformen - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XXXII (1/2): 1-32.

876 FRUHSTORFER H. 1918 - Monographische Uebersicht alter und neuer *Erebia*-Formen - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XXXI (1917) (3/4): 83-110.

877 PRINZ J. 1918 - Lepidopterenausbeute aus dem Karstgebiete. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXVII (7/10): (202)-(204), (1917).

878 QUERCI O. 1918 - Notes on Entomological Collections in the Mountains of Sicily - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXX: 105-106.

879 RAGUSA E. 1918 - Observations sur *Zygaena* (*Anthrocera*) *Minos* Boisd. et *Zygaena* (*Anthrocera*) *erythrus* Hb. (Lep. Zygaenidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 23: 203-204.

880 ROCCI U. 1918 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena* Fabr. III. Nuove osservazioni sulla *Zy. transalpina* Esp. - *Atti della Società*

Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche, Genova, XXVIII (1917): 119-139, Tav. II.

880bis ROCCI U. 1918 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena* Fabr. IV. Note su alcuni gruppi liguri - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche,* Genova, XXVIII (1917): 141-157, Tav. III.

881 ROTHSCHILD W. 1918 - Catalogue of Zerynthinae and Allied Genera in the Tring Museum, with critical notes - *Novitates Zoologicae*, XXV: 64-75.

882 STAUDER H. 1918 - Eine Sammelreise nach Unteritalien. II. Nachtrag - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, XIV: 55-58.

883 TURATI E. 1918 - Variabilità del *Parnassius apollo pumilus* Stich. e ricerche sull'origine dei *Parnassius*. (Note biologico-critiche) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVII: 29-89.

884 TURATI E. 1918 - Ancora sulle variazioni del *Parnassius Apollo Pumilus* Stich. (Nota complementare) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVII: 183-188.

885 ZWEIGELT F. 1918 - Beiträge zur Makrolepidopterenfauna der österreichischen Alpenländer - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen Vereines,* Wien, 3 (1): 1-4, (2): 9-12, (3): 17-20, (4): 29-32, (5): 41-43, (6): 53-56.

886 MOLA P. 1919 - Flora e Lepidotterofauna sarda (Regione di Bosa) - Tip. Satta, Sassari, 69 pp.

887 REBEL H. 1919 - Zur Kenntnis palaearktischer Talaeporiiden - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XXXII (1918) (3-4): 95-112.

888 ROCCI U. 1919 - Osservazioni sui Lepidotteri di Liguria. Note comparative (Papilionidae - Pieridae - 1.a parte) – *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche,* Genova, XXX (1): 3-34.

889 ROCCI U. 1919 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena* Fabr. V°. La *Zygaena carniolica* in Liguria - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche,* Genova, XXX (2): 61-82, Tav. IV.

890 ROSTAGNO F. 1919 - Lepidoptera faunae romanae. Noctuidae - *Bollettino della Società Zoologica Italiana*, Ser. IV, I (1-2): 29-45. (da completare)

891 SCHAWERDA K. 1919 - Neue Formen aus meiner Sammlung - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, IV (4): 31-32, (7): 67-68.

892 SCHAWERDA K. 1919 - Eine neue Makrolepidopterenart. *Chesias angeri* Schawerda - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, IV: 24-25.

893 TURATI E. 1919 - A 1000 metri sull'Appennino Modenese. Note di lepidotterologia e descrizione di tre nuove specie di micri - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali,* Milano, LVIII: 147-187.

894 TURATI E. 1919 - Nuove forme di Lepidotteri. Correzioni e note critiche. IV - *Il Naturalista Siciliano*, XXIII (7-12): 203-368, Tavv. I-IV.

895 VERITY R. 1919 - Della schiusura dei Grypocera e dei Rhopalocera europei in rapporto all'altitudine e alla latitudine - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVIII: 289-303.

896 VERITY R. 1919 - Contributo alle ricerche sull'epoca di sviluppo dei lepidotteri allo stato di completo sviluppo. (I Lepidotteri Diurni del Pian di Mugnone, m. 119-274, presso Firenze). III. Dal 5 agosto al 1° ottobre 1917 - *Bullettino della Società entomologica italiana,* Firenze, L (1918): 3-11.

897 VERITY R. 1919 - Le varie modalità di schiusura ed il numero di generazioni annue dei Grypocera e dei Rhopalocera europei illustrati dalle specie toscane di pianura e di collina - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LVIII (1): 1-28.

898 WAGNER F. 1919 - Neue Lepidopterenformen - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 13 (20): 156-160, Taf. 1.

899 WAGNER F. 1919 - Einige neue Lepidopteren-Formen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, IV (2): 10-11.

900 ASHBY E.B. 1919-1920 - Notes on Entomology in France and Italy in 1918 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXI (1919): 111-115, 130-134, 170-173, 186-188, 209-210, 223-226; XXXII (1920): 14-17.

901 CULOT J. 1919-1920 - Noctuelles et Géometrés d'Europe. Deuxiéme Partie. Géometrés. Vol. IV - Imp. Oberthür, Rennes-Paris. Reprint, Ed. Apollo Books, Ristampa 1987, 167 pp, tavv. 38-70.

902 VERITY R. 1919-1922 - Seasonal polymorphism and races of some European Grypocera and Rhopalocera & Additional Notes - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXXI (1919) (2): 27-31, (3): 43-48, (5): 87-89, 121-129, 178-184, 193-201; XXXII (1920): (1): 3-8, (7-8): 140-152; XXXIII (1921) (10): 170-176, (11): 190-193, 210-214; XXXIV (1922) (1): 12-15, (4): 68-73, (5): 89-93, (7-8): 124-142.

903 ASHBY E.B. 1920 - Additional Notes on the Entomological Fauna and on the Flora onserved in the Turin District from July to October, 1919, inclusive - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 228-231.

904 ASHBY E.B. 1920 - Notes on Entomology in Northern Italy in 1919 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXXII: 192-194.

905 ASHBY E.B. 1920 - Notes on Entomology in Italy (1918 and 1919) - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 59-63, 97-100, 207-208.

906 COSTANTINI A. 1920 - Note sui Lepidotteri dell'Emilia - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie V, Vol. V, Anno LI (1919/20): 1-9.

907 FRUHSTORFER H. 1920 - Altes und Neuer über Erebien - *Archiv für Naturgeschichte*, 84 (1918), Abt. A, (7): 83-108.

908 GALVAGNI E. 1920 - Über *Syntomis mariana* Stauder. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX (1/2): (43)-(44).

909 GALVAGNI E. 1920 - Über die Generationsverschiedenheit bei der Geometride *Mesotype virgata*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX (3/5): (82)-(83).

910 GRIBODO G. 1920 - I "Rincoti" ed i "Lepidotteri" delle Oasi xerotropiche di Val di Susa - *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, LV: 329-344.

911 HÖFER K. 1920 - Über *Lycaena arragonensis* Gerh. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX (1/2): (40)-(42).

912 HÖFER K. 1920 - Über den Formenkreis der *Larentia variata* Schiff. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX (1/2): (19)-(24).

913 QUERCI O. 1920 - Comparative data and statistics on some Zygaenae of Peninsular Italy. I. *Zygaena transalpina* Esp. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 25-28.

914 REBEL H. 1920 - Über *Parnassius apollo* (L.) ab. *cohaerens* Schultz. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX: (101)-(104).

915 REISS H. 1920 - *Zygaena* - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 14 (15): 115-118.

916 ROCCI U. 1920 - Osservazioni sui lepidotteri di Liguria - note comparative (Pieridae: 2a parte e Note aggiunte) - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXX (4): 173-206.

917 ROTHSCHILD W. 1920 - Supplement notes to Mr. Charles Oberthür's Faune des Lépidoptères de la Barbarie, with Lists of the specimens in the Tring Museum - *Novitates Zoologicae*, 27 (1): 1-127, Tav. XIV-XVII.

918 SCHAWERDA K. 1920 - Über aberrative Formen heimischer Lepidopteren. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie -

Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien Wien, LXX (3/5): (95)-(97).

919 SCHAWERDA K. 1920 - Über den Formenkreis von *Larentia truncata* und *Larentia immanata*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX (3/5): (92)-(95).

920 SCHAWERDA K. 1920 - Über *Melitaea dejone* H. G. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX (1-2): (44)-(46).

921 SIMES J.A. 1920 - Notes on the Lepidoptera of Brindisi - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 231-236.

922 SIMES J.A. 1920 - Notes on *Melanargia arge* - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 190-192.

923 STAUDER H. 1920 - Neue Zygaenaformen aus Süditalien - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, XVII (2): 30-31.

924 STAUDER H. 1920 - *Syntomis hertula* spec. nova - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 26: 2 pp.

925 STAUDER H. 1920 - Neue mediterrane Geometridae - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, XIV (5): 34-39.

926 STAUDER H. 1920 - Diagnosen neuer Lepidopterenformen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXX: (177)-(178).

927 STAUDER H. 1920 - *Schistostege decussata* Bkh. *transiens* subsp. nova - *Societas Entomologica*, 35 (5): 17-18.

928 VERITY R. 1920 - On *Zygaena rhadamanthus*, Esper, with special reference to the races of its subspecies oxytropis, Boisd. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII (9): 158-162.

929 VERITY R. 1920 - Contributo alle ricerche sulla variazione e la distribuzione dei Lepidotteri in Italia: Zygaenides, Grypocera e Rhopalocera del Massiccio delle Mainarde (Prov. di Caserta) - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, XIV: 33-62.

930 VERITY R. 1920 - On the Geographical Variation of *Zygaena loti*, Wien. Verz. subspecies *transalpina* Esp. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 28-33.

931 VERITY R. 1920 - On Emergence of the Grypocera and Rhopalocera in relation to Altitude and Latitude - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII: 65-71, 107-110.

931bis WELWITSCH V. 1920 - Kriegsausbeuten aus Kriml und Raibl - *Zeitschrift des österreichischen Entomologen Vereines*, 5 (7-8): 47-48, (9-10): 61-62.

932 LOEBEL F. 1920-1921 - Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna Istriens - *Zeitschrift des Österreichen Entomologen-Vereines,* Wien, V (1920): 9-10, 20, 27-28, 35-36, 50, 53; 6 (1921): 3-4.

933 QUERCI O. 1920-1921 - Lepidoptera in Peninsular Italy during the year 1920 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXII (1920): 223-227; XXXIII(1921): 10-15, 25-29, 70-75.

934 STAUDER H. 1920-1923 - Neue seltener Formen in *Parnassius apollo* L. - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, XVII (1922). Beilage: "*Neue Beiträge zur syst. Insektenkunde*" Bd. 11 (1920-23): 85-88.

935 STAUDER H. 1920-1925 - Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro Adriatica) - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, Berlin, XV (1920) (10/12): 201-220; XVI (1921) (1/2): 16-23, (3/4): 43-49, (5/6): 101-108, (7/8): 143-153, (9/10): 165-176, (11/12): 219-224; XVII (1922) (1/2): 14-21, (3/4): 58-64, (5/6): 83-92, (7/8): 135-147, (9/12): 165-176; XVIII (1923) (1/2): 10-18, (3/4): 58-68, (5/7): 106-114, (8/9): 187-202, (10/11): 253-267, (12): 317-327; XX (1925) (8): 191-226; XXI (1926) (8/9): 179-190, (10): 223-238; XXII (1927): 30-45; 1 Carta, 3 Tavv., 26 figg.

936 BRYK F. 1921 - Neue Parnassiiden - *Entomologisk Tidskrift*, 41 (2): 112-119, 12 figg.

937 FRUHSTORFER H. 1921 - Neue *Parnassius apollo*-Rassen- *Entomologischer Anzeiger*, 1 (3): 29-31.

938 FRUHSTORFER H. 1921 - Neue und interessante *Parnassius apollo* Rassen- *Entomologischer Anzeiger*, 1 (4): 41-42.

939 FRUHSTORFER H. 1921 - Tessiner Wanderbilder: III. Der Monte Salvatore (Mit orthopterologischen, malacologischen und herpetologischen Mitteilungen) - *Archiv für Naturgeschichte*, LXXXVI (1920) (9): 104-113.

940 FRUHSTORFER H. 1921 - Neue *Parnassius*-Rassen - *Entomologische Rundschau*, 38 (3): 13-14, (4): 16-17, (5): 20-21.

941 FRUHSTORFER H. 1921 - Eine grandiose Rasse von *Erebia evias* God. - *Entomologische Rundschau*, 38: 53-54.

942 RASETTI E., RASETTI F., 1921 - Note entomologiche - *Bollettino della, Società, entomologica, italiana,* Genova, *53: 19-27.*

943 REISS H. 1921 - *Zygaena carniolica* Scop. Beschreibung neuer Rassen - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 15 (3): 20-21, (5): 38-40.

944 ROCCI U. 1921 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena*. VI°. Note su alcune forme nuove - *Atti della Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche*, Genova, XXXII (2): 33-42.

945 STAUDER H. 1921 - Neues aus Unteritalien - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, 35: 26-31.

946 STAUDER H. 1921 - *Celerio lineata livornica* Esp. subsp. nova *saharae* Stdr. - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXXV: 1-2.

947 STAUDER H. 1921 - *Acasis Mariae* Stdr. species nova - *Societas Entomologica,* 36 (8): 29-30.

948 STAUDER H. 1921 - Neue mediterrane Syntomisformen - *Entomologischer Anzeiger*, I (10): 115-118.

949 STAUDER H. 1921 - Die Variabilitätsneigung von *Dysauxes punctata* F. - *Entomologische Zeitschrift,* Frankfurt a. M., XXXV (3): 16-26.

950 STAUDER H. 1921 - *Melitaea dejone felkeli* sbsp. nova - *Entomologischer Anzeiger,* II (32): 133-134.

951 STAUDER H. 1921 - Die Jagd auf *Argynnis pandora* Schiff. - *Entomologischer Anzeiger*, I (6): 67-69.

952 STAUDER H. 1921 - Der Einfluß des heißen Klimas auf das Flugvermögen der Schmetterlinge in lepidopterogeographischer Betrachtung - *Entomologischer Anzeiger*, I (8): 89-92.

953 STAUDER H. 1921 - Die Zygaenidenarmut der adriatischen Inseln - *Societas entomologica*, 36 (1): 1-4, 6-7

954 STAUDER H. 1921 - Neue Parnassierformen aus Unteritalien - *Societas Entomologica*, 36 (3): 9-11.

955 VERITY R. 1921 - An Essay on the Systematic Study of Variation in the Races of *Zygaena filipendulae* L. and of its subspecies *stoechadis*, Bkh. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXIII, (5): 81-91, (6): 105-114, (7-8): 122-129, (9): 145-151.

956 VORBRODT K. 1921 - Die Schmetterlinge der Schweiz. (4. Nachtrag) - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XIII (3): 175-206.

957 WEHRLI E. 1921 - Monographische Bearbeitung der Gattung *Psodos* nach mikroskopischen Untersuchungen der m.m. und f.f. - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XIII (3-4): 143-175.

958 ASHBY E.B. 1922 - Notes on Entomology in France and Italy, July-August, 1921 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXIV: 158-164.

959 BELLING H. 1922 - *Satyrus actaea* Esp. f. *cordula* F. in Südtirol - *Deutsches Entomologischen Zeitschrift*, II: 215-218.

960 BRYK F. 1922 - Parnassiana. *Parnassius mnemosyne* L. in Europa. Einige südländische Formen meiner Sammlung - *Societas Entomologica*, 37 (2): 5-6, (3): 11-12, (4): 13-16, (5): 18-20, (6): 22-23, (7): 25-26, (8): 29-30.

961 COSTA D. 1922 - Nuova forma di *Melanargia galathea* var. *procida* Hbst. - *Bullettino della Società entomologica italiana*, Firenze, LIII (1921): 112-113.

962 COSTANTINI A. 1922 - Novae aut subnovae species Lepidopterorum - *Atti Società Naturalisti e Matematici di Modena*, Serie V, vol. VI, anno LII (1921): 78-79.

963 COSTANTINI A. 1922 - Bemerkungen über *Luperina* (*Sidemia*) *pozzii* Curò - *Zeitschrift für wissenschlaftliche Insektenbiologie*, XVII: 132-134.

964 DÜRCK H. 1922 - *Parnassius mnemosyne benacensis* - *Entomologische Rundschau*, 39 (9): 33-34, (10): 37-38.

965 GALVAGNI E. 1922 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXI (1921): (24).

966 GEISLER G. 1922 - Eine Exkursion nach der Insel Elba - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXXVI (8): 29-30, 35-36.

967 KOLAR H. 1922 - Neue Lokalformen von *Parnassius apollo* L. und *Coenonympha oedipus* F. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXI (1): (11)-(13), (1921).

967bis KUNZ E., KAMMEL J.E., 1922 – Gesammelte Beiträge zur Kenntnis von *Parnassius mnemosyne* L. (Kunz) I. Eine montane *mnemosyne* Rasse aus Südwesttirol. (Kunz) II. Zur Frage der Benennung von Rassen und Formen der europäischen *Mnemosyne*. (Kammel) III. Zur Kenntnis von *Parn. mnemosyne* var. *venetus* Wagnr. (Kammel) IV. Neue Aberrationen von *Parn. mnemosyne*. (Kunz) V. Weitere Aberrationen von *Parn. mnemosyne*. (Kunz) VI. Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis von *Parn. mnem.* var. *cuneifer* Fruhst – *Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines,* Wien, VII: 12-14, (5/6): 21-23, (7/9): 31-32.

968 LE CERF F. 1922 - Troisième Contribution à l'étude des Aegeriidae. Description d'Espèces et Variétés nouvelles - In: Oberthür Ch., *Études de Lépidoptérologie Comparée*, 19 (1re Partie): 17-39, Pl. DXXXIX-DXL, Rennes.

969 RAGUSA E. 1922 - Note Lepidotterologiche siciliane - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LIV (5): 66-67.

970 REBEL H. 1922 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXII: (18).

971 REVERDIN J.-L. 1922 - *Melitaea athalia* Ritt. et *Melitaea pseudathalia* nova species (?) - *Bulletin de la Société Lépidoptèrologique de Genéve*, V (1): 24-46.

972 SCHAWERDA K. 1922 - Zwölfter Nachtrag zur Lepidopterenfauna Bosniens und der Herzegowina - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXI (1921): 145-170, 1 tav.

973 SCHAWERDA S. 1922 - *Larentia Erichi* spec. nova - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 7 (3/4): 9.

974 STAUDER H. 1922 - Bausteine zur Lepidopterenfauna des Salzkammergutes - *Entomologischer Anzeiger*, II (1/9): 34 pp.

975 STAUDER H. 1922 - Neue Aberrativformen von Lepidopteren - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXXVI: 42-44.

976 STAUDER H. 1922 - Neue Palaearktenformen. I - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 22 (1-6): 17-25.

976bis STAUDER H. 1922 - Neue, seltene Formen in *Parnassius apollo* L. - *Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde, Berlin*, II (9): 85-88.

977 STAUDER H. 1922 - *Lycaena difficilis*, nova species - *Entomologischer Anzeiger*, II (10): 109-111, (11): 124-125.

977bis STAUDER H. 1922 - *Parnassius apollo julianus* Stdr. subspec. n. - *Entomologischer Anzeiger*, II (12), 2 pp, Wien.

978 STAUDER H. 1922 - *Zygaena carniolica* Scop. in mittleren Mediterrangebiete. Nachtrag - *Societas Entomologica*, 37 (12): 45-46.

979 STAUDER H. 1922 - *Zygaena carniolica* Scop. in mittleren Mediterrangebiete - *Societas Entomologica*, 37 (1): 1-3, (2): 6-8, (3): 9-10.

980 STAUDER H. 1922 - *Syntomis phegea plinius* Stdr. subsp. nova. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXI (1): (13)-(14), (1921).

981 VERITY R. 1922 - Notes on *Zygaena rubicundus*, Hb., *Z. erythrus*, Hb., and on the races of *Z. purpuralis*, Brünn, in Europe - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* XXXIV (2): 29-36.

982 WEHRLI E. 1922 - Ueber neue schweizerische und zentralasiatische *Gnophos*-Arten und mikroskopische Bearbeitung einzelner Gruppen der Gattung - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris"*, XXXVI (1/2): 1-29, Taf. I-II.

983 COSTANTINI A. 1922-1923 - Lepidoptera pro fauna italica nova, additis specierum formarumque novarum descriptionibus - *Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde*, II (11) (1922): 97-101; II (12) (1923): 105-107.

984 VERITY R. 1922-1923 - On the Geographical and Seasonal Variations od *Pararge megera* L. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXIV (1922) (12): 209-214, XXXV (1923) (2): 23-29.

985 BELLING H. 1923 - *Parnassius apollo laurinus* subsp. nov. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, III: 271-272.

986 BELLING H. 1923 - Zwei neue Unterarten von *Parnassius apollo* L., *Parn. apollo ladinus* und *Parn. apollo venustus* - *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, III: 287-290.

987 BRYK F. 1923 - Neue Beiträge zur Variabilität schwedischer Lepidopteren. II. Neue skandinavische Formen - *Entomologisk Tidskrift*, 44 (2): 107-116, figg. 2-9.

987bis CARRARA G. 1923 - Zur Kenntnis der Makrolepidopterenfauna der Triester Gegend - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, XVIII: 203-207.

988 COSTA D. 1923 - Contributo alla fauna lepidotterologica del Carso. Forme nuove per l'altipiano raccolte durante l'estate 1922 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LV (4): 49-51.

989 FRUHSTORFER H. 1923 - Neue *Parnassius Apollo*-Rassen - *Entomologischer Anzeiger*, III (4): 41-42.

990 LEONARDI G. 1923 - Elenco delle specie di Insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia fino all'anno 1911. Parte II. Lepidotteri - Tip. Della Torre, Portici: 81-301.

990bis OBERTHÜR C. 1923 - Révision iconographique des Espèces de Phalénites (Geometra, Linné) Enumérées et décrites par Achille Guenée, dans les Volumes IX et X du Species général des Lépidoptères, publiés à Paris, chez l'éditeur Roret en 1857 - *Études de Lépidopterologie Comparée*, XX (IV): 214-283, Pl. CCCLXXXII-CDI, Rennes.

991 OBERTHÜR C., HOULBERT C. 1923 - Contribution à l'étude des Melanargiinae: Première partie. Les Melanarginae thyrreno-iberiques. Deuxième partie. Description et variation des Espèces du genre *Melanargia*. Troisième partie. Distribution géographique des *Melanargia* - *Études de Lépidoptérologie Comparée*, XXI (1-2): 6-18, 19-75, 76-82, Rennes.

992 RAGUSA E. 1923 - Note Lepidotterologiche siciliane - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LV (2): 17-22.

993 RAGUSA E. 1923 - Le Aegeridae (Sesiidae) della Sicilia - *Bollettino del Laboratotio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, XVI (1922): 211-220.

994 REBEL H. 1923 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXIII (1): (6)-(7).

995 ROCCI U. 1923 - Note di Lepidotterologia - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, II: 5-12.

996 SCHAWERDA K. 1923 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXIII (1): (1)-(4).

997 SCHAWERDA K. 1923 - Lepidopterologische Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXII: (91)-(92), (1922).

998 SCHWINGENSCHUSS L. 1923 - Die Palaearktischen *Psodos* Formen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXIII: (79)-(84).

999 STAUDER H. 1923 - Geschlechtswitterung bei *Orgyia trigotephras calabra* Str. - *Entomologischer Anzeiger*, III (3): 29-31.

1000 STAUDER H. 1923 - Neue Schmetterlingsformen aus meiner Sammlung - *Entomologischer Anzeiger*, III (1): 1-7.

1001 STAUDER H. 1923 - *Argynnis lathonia sheljuzhkoi* Stdr. (Lep.) - *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, III: 513-514.

1002 STAUDER H. 1923 - Neue illyro-adriatische Lepidopteren-Formen (Noctuidae) - *Entomologischer Anzeiger*, III (4): 43-44.

1003 TURATI E. 1923 - Spizzichi di Lepidotterologia - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LV (8): 116-122.

1004 TURATI E. 1923 - Cinque anni di ricerche nell'Appennino modenese (Note di Lepidotterologia). Elenco dei Lepidotteri raccolti e note critiche descrittive - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LXII: 4-74.

1005 VERITY R. 1923 - On some Italian races of *Erebia aethiops*, Esp., and *E. pirene*, Hub. (= *stygne*, O.), and on *E. flavofasciata*, Ruhl-Heyne. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXV (9): 134-136.

1006 VERITY R. 1923 - The Nomenclature of the European *Euchloë ausonia*, Hb. (= *belia*, auct. nec L.) - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXV: 169-171.

1007 WAGNER F. 1923 - Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der Provinz Udine (Ital. sept. or.) nebst kritischen Bemerkungen und Beschreibung einiger neuer Formen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 8 (1-4): 14-26, (5-6): 31-44, (7-8): 51-54.

1008 WEHRLI E. 1923 - Neue Psychiden - *Societas Entomologica*, 38 (7): 25-26.

1009 WHEELER G. 1923 - The Lido in May - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXV: 145-146.

1010 ZANGHERI P. 1923 - Fauna di Romagna. Lepidotteri (Prima contribuzione) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, II: 13-49.

1011 ALBRECHT F. 1923-1924 - Ferientage im sonnigen Süden. (1921) - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXXVII (2/3): 6, (7/8): 18-19, (13): 31, (23/24) (1924): 55-56, XXXVIII (1924) (2/3): 7-8.

1012 FRUHSTORFER H. 1923-1924 - Neue und seltene *Parnassius*-Rassen- *Entomologischer Anzeiger*, III (9): 108-109, (11): 131-133; IV (1): 6-7, (2): 17-21.

1013 STAUDER H. 1923-1924 - Lepidopteren aus Unteritalien. I - *Societas Entomologica*, 38 (1923): 5-7, 10-11, 14-16,19-20, 23-24, 27-28, 30-32, 35-36, 37-40, 43-44, 46-48; 39 (1924): 3-4, 7-8, 10-12, 15-16, 19-20, 23-24, 26-28, 29-31, 34-35, 38-39.

1014 STAUDER H. 1923-1924 - Edelwildjagden. Beiträge zur Sammeltechnik und Biologie begehrter Arten und Formen von Lepidopteren; Beschreibung berühmter Flugplätze - *Entomologischer Anzeiger*, III (7): 82-86, (8): 93-96, (9): 103-108, (10): 119-122, (11): 125-129, (12): 139-144; IV (1): 1-5, (2): 13-17, (3): 25-29, (4): 38-42, (5): 51-54, (6): 61-64, (7): 73-75, (8): 79-80, (9): 88-90, (10): 93-95, (11): 104-106, (12): 112-114, (13): 120-122, (14): 127-129, (15): 135-138, (16): 141-142.

1015 VERITY R. 1923-1924 - Geographical Variation in *Hipparchia semele*, L. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXV (1923) (10): 153-156, XXXVI (1924) (2): 21-27.

1016 VERITY R., QUERCI O. 1923-1924 - Races & Seasonal Polymorphism of the Grypocera & of the Rhopalocera of Peninsular Italy - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXV-XXXVI, 46 pp.

1017* VERITY R., QUERCI O. 1924 - Manuale di Entomologia forestale - Tipografia Del Seminario, Padova, pp. XIX + 680.

1018* DE STEFANI M. 1924 - Note intorno ad alcuni animaletti danneggiatori dei carcioffi - Regio Osservatorio di Fitopatologia. Sett. 1924, Palermo.

1019 DE STEFANI T. 1924 - Piccole note su alcuni insetti - Palermo, Tip. Piazza & Cali: 5-20. Ripubblicato nel 1926: *Il Naturalista Siciliano*, XXV. N. Serie, Vol. 5 (1-2): 1-10.

1020 DELLA BEFFA G. 1924 - Osservazioni sugli insetti nocivi delle piante coltivate e forestali notati nella Provincia di Torino nel 1923 - *Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino*, LXVII: 27-35.

1021 FERRARIS T. 1924 - Violenta irruzione della Defogliatrice del pioppo (*Stilpnotia salicis* L.) - "*Curiamo le piante*", Alba, I (5): 73-75.

1022 HARTIG F. 1924 - Neubeschreibungen aus Südtirol - *Entomologische Rundschau*, 41 (11): 42-43, (12): 45-46.

1023 HÖFER K. 1924 - The Variation in *Larentia* (*Thera*) *variata*, Schiff. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXVI (3): 39-41, (6): 88-90, (9): 119-120, (11): 151-154, (12): 167-169.

1024 SCHAWERDA K. 1924 - Faunula Dolomitana - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 14 (6-12): 73-119.

1025 SCHWINGENSCHUSS L. 1924 - Uebersicht über die Formen der *Glaucinaria* Gruppe der Geometridengattung *Gnophos*. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXIII (1923): (84)-(87).

1026 STAUDER H. 1924 - teriolensia. I - *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, IV: 29 pp.

1027 STAUDER H. 1924 - Altes u. Neues über *Coenonympha pamphilus* L. - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 19: 5 pp.

1028 STAUDER H. 1924 - Das Weib von *Syntomis hertula* Stdr. und eine zweite Generation der Art - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 14 (1-5): 56-59.

1029 TURATI E., ZANON V. 1924 - Materiali per una faunula Lepidotterologica di Cirenaica (con 19 specie e forme nuove) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LXI (1922): 132-178.

1030 VERITY R. 1924 - Additions and Corrections to "List of Grypocera and Rhopalocera of Peninsular Italy." - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXVI: 106-111.

1031 WEHRLI E. 1924 - Nice-St. Martin Vésube-Digne. Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Alpes Maritimes und der Basses Alpes - *Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris",* 38 (1): 50-57, (2/3): 59-98, Taf. I.

1032 ZERNY H. 1924 - *Anaitis plagiata* L. und *efformata* Gn. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXIII (7): (190)-(192), (1923).

1033 CORTI A. 1925 - Studien über die gattung *Agrotis* O. VIII. *Euxoa distinguenda* Led. nov. var. *astfälleri* m. - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 15: 86-91.

1034 CORTI A. 1925 - Studien über die Gattung *Agrotis* O. (Lep.). IV. *A. cinerea* Schiff., *A. septentrionalis* Möschl. und *A. turatii* Stdfs. - *Entomologische Mitteilungen*, XIV (3/4): 212-233, Tav. I.

1035 DANNEHL F. 1925 - Neue Formen und Lokalrassen - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., 39 (2): 5-6, (3): 11-12, (4): 15-16.

1036 DANNEHL F. 1925 - *Pieris ergane* Hb. in Südtirol - *Entomologischer Anzeiger*, V (19): 145-147.

1037 GOODMAN O.R. 1925 - Lake Maggiore in Early August of 1923 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 37: 7-11.

1038 KITSCHELT R. 1925 - Zusammenstellung der bisher in dem ehemaligen Gebiete von Südtirol beobachteten Grossschmetterlinge - Im Eigenverlage des Verfassers, Wien, XVII + 421 pp.

1039 NOACK H. 1925 - Eine neue rasse von *Hadena lateritia* - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 19: 280-281.

1040 PASTORE R. 1925 - Agricoltori, difendete i mandorli dalle Campe - "*La Propaganda Agricola*", Bari: 1-3.

1041 PASTORE R. 1925 - La infestione delle Campe del mandorlo - "*La Propaganda Agricola*", Bari: 123-125.

1042 PASTORE R. 1925 - Rilievi sulla campagna di lotta contro le Campe del mandorlo - "*La Propaganda Agricola*", Bari: 169-171.

1043 ROCCI U. 1925 - Forme liguri del gen. *Zygaena* Fabr. (Lep.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, LVII (7): 97.

1044 ROCCI U., TURATI E. 1925 - Materiali per una fauna dell'Arcipelago Toscano. XVIII - Lepidotteri dell'Isola del Giglio - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, ser. 3, X (L): 355-362.

1045 SCHAWERDA K. 1925 - Neue und interessante Lepidopterenformen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, 10: 44-48.

1046 SCOTT E., TWIGG H.J.R., SETH-SMITH D.W. 1925 - Butterflies at Cortina in June, 1924 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 37: 81-85.

1047 STAUDER H. 1925 - Lepidopteren aus Unteritalien. II - *Societas Entomologica*, 40: 3-7, 10-12.

1048 STAUDER H. 1925 - Lycaenologisches Allerlei - *Entomologischer Anzeiger*, V (8): 60-62, (9): 65-68, (10): 73-75.

1049 STAUDER H. 1925 - *Pieris manni* Mayer im Etschlande - *Entomologischer Anzeiger*, V (15/16), 3 pp.

1050 VERITY R. 1925 - New races and forms of Palaearctic Grypocera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 37: 41-44, 54-57, 72-76.

1051 VERITY R. 1925 - A Systematic Index of the Races of Palaearctic Rhopalocera described by H. Fruhstorfer - *Archiv für Naturgeschichte*, XCI (A) 9: 102-120.

1052 WARREN B.C.S. 1925 - Some Observations on Dr. R. Verity's recent Article on Palaearctic Grypocera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 37: 128-131.

1052bis VERITY R. 1925-1926 - Remarks on the evolution of the Zygaenidae and on an attempt to analyze and classify the variations of *Z. lonicerae* Scheven, and of *Z. trifolii*, Esp., and other subspecies - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*,

37 (1925): 101-104, 118-121, 135-138, 154-158; 38 (1926): 9-12, 22-26, 56-62, 69-74.

1053 DANNEHL F. 1925-1929 - Beiträge zur Lepidopteren-fauna Südtirols - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXXIX-XXXXIII: 233 pp.

1054 BANG-HAAS O. 1926 - Novitates macrolepidopterologicae. 1. Band - Dresden-Blasewitz, 238 pp.

1055 BELLING H. 1926 - Schmetterlingsfang im Ortlergebiet - Ein Wegweiser für Sammler von Grossschmetterlingen im Trafoi-, Stilfserjoch- und Suldental - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 20 (17): 133-137, (18): 141-148, (19): 153-156, (20): 161-164, (21): 169-172, (22): 177-180, (24): 197-201, (25): 209-213, (26): 221-224, (27): 233-235, (28): 245-248.

1056 BUBACEK A. 1926 - Sammelreise in den Pyrenäen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXIV: (6)-(10), (1924).

1057 BUBACEK O. 1926 - Drei neue Lepidopterenaberrationen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXV: (173)-(174), (1925).

1058 BURGEFF H. 1926 - Kommentar zum palaearktischen Teil der Gattung *Zygaena* Fab. des früher von Ch. Aurivillius und H. Wagner, jetz von E. Strand herausgegebenen Lepidopterorum Catalogus - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 16 (1-8): 1-86.

1059 BURGEFF H. 1926 - Zygaenidae I (Generis *Zygaena*, palaearctica pars) - in Strand E., Lepidopterorum Catalogus. Pars 33, Junk Ed., Berlin, 91 pp.

1060 CARRARA G. 1926 - I Macrolepidotteri del territorio di Trieste. In appendice: Elenco dei Macrolepidotteri raccolti nel Territorio di Trieste da F. A. Vogel - *Atti del Museo Civico di Storia Naturale Trieste*, XI (Vol. I della III Serie, parte prima): 63-116.

1061 ENGLISCH K. 1926 - Ergebnisse aus seiner zwanzigjährigen Sammeltätigkeit in den Tiroler Zentralalpen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXV: (103)-(106), (1925).

1062 GALVAGNI E. 1926 - Weitere Mitteilungen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXIV: (2)-(3), (1924).

1063 HARTIG F. 1926 - Diagnosi di alcune forme nuove di Lepidotteri della Venezia Tridentina - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, a. VII, Classe II, fasc. II: 114-118.

1064 HARTIG F. 1926 - Note di Lepidotterologia: L'esplorazione faunistica della Venezia Tridentina - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, a. VII, Classe II, fasc. II: 140-164.

1065 KITT M. 1926 - *Nola subchlamydula* Stgr. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXV: (178)-(180), (1925).

1066 NITSCHE J. 1926 - Lepidopterologische Sammelergebnisse aus den Dolomiten vom Sommer 1924. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXV: (62)-(65), (1925).

1067 NITSCHE J. 1926 - Eine monographische Skizze über *Gnophos dilucidarius* Hb. - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 11 (4): 37-39, (5): 41-44, (6): 55-60, (7): 61-73, Taf. I-II.

1068 OSTHELDER L. 1926 - Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil. Die Grossschmetterlinge. 2. Heft. 1. Teil. Schwärmer - Spinner - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 16: 169-222 pp., Tavv. VIII-XI, XII (pars).

1069 RAGUSA E. 1926 - Le Anthocere (Zygaene) della Sicilia - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, XVIII (1924-1925): 81-94.

1070 ROCCI U. 1926 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena* Fabr. VIII. - Note critiche e forme nuove - *Bollettino della Società entomologica italiana,* LVIII (4-5): 63-73.

1071 ROCCI U. 1926 - Ricerche sulle Forme del Gen. *Zygaena* Fabr. (Lep.). VII. - La *Zygaena stoechadis* Bkh. in Liguria - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, IV (1925): 154-176.

1072 SCHWINGENSCHUSS L. 1926 - Beschreibung von Lepidopterenformen. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXV: (141)-(143), (1925).

1073 SCHWINGENSCHUSS L., WAGNER F. 1926 - Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna Süddalmatiens insbesondere der Umgebung Gravosa's - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 10 (1925): 53-57, 66-71, 78-82, 116-119; 11 (1926): 1-3, 9-13, 26-29, 53-54, 67-72, 74-86; 12 (1927): 45-50, 62-64, 68-75.

1074 STAUDER H. 1926 - Die Jagd auf *Melanargia pherusa* Bsd. - *Entomologischer Anzeiger*, VI (14): 106-108, (15): 113-114.

1075 STAUDER H. 1926 - Wetterstürze und Insektenwelt - *Entomologischer Anzeiger*, VI (16): 124-126, (129-132): 113-114.

1076 VON DER GOLTZ F. 1926 - Einige Bemerkungen über Erebien, insbesondere über *Er. euryale* und *ligea* - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* XL (2-3): 69-97.

1077 VON ENGLISCH K. 1926 - Zur Kenntnis von *Arctia flavia* Fuessly in den Ostalpen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 11 (10): 91-94.

1078 WEHRLI E. 1926 - Ein Streifzug in die andalusischen Gebirge - *Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"*, 40 (2/3): 113-129.

1079 TURNER H.J. 1926-1927 - Races of *Polyommatus coridon* Poda, particulary those of Italy and Spain - *Proceedings of the South London Entomological & Natural History Society*: 55-60.

1079bis VERITY R. 1926 - The geographical and seasonal variation of *Coenonympha pamphilus* L. - *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie*, XXI (8/9): 192-208.

1080 VERITY R. 1926-1928 - Zygaenae, Grypocera and Rhopalocera of the Cottian Alps compared with other races - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 38 (1926): 101-106, 120-126, 170-176; 39 (1927): 122-126, 154-157, 172-175; 40 (1928): 142-144, 160-163.

1080bis AUE A.U.E. 1927 – Zuchten von *Erebia evias* God. (Lepidopt.) – *Entomologische Zeitschrift,* Frankfurt a. M., XXXXI (18): 364-367.

1081 BELLING H. 1927 - Auf dem Bummel und dem Schmetterlingsfang in den Dolomiten Südtirols - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 21 (9): 65-67, (10): 73-75, (11): 81-84, (12): 89-93, (14): 118-120, (16): 121-123, (17): 129-130, (18): 137-140, (19): 147-150, (20): 155-156, (21): 163-165.

1082 COOKE B.H. 1927 - Rhopalocera in the Dolomites and South Tyrol, 1926 - *The Entomologist*, LX, n. 768: 104-108, n. 769: 127-132.

1083 COOKE B.H. 1927 - Heterocera in the South of France and Southern Tyrol, 1925-6 - *The Entomologist*, LX, n. 772: 202-206, n. 773: 227-231.

1084 DANNEHL F. 1927 - Neue Formen und geographische Rassen aus meinen Rhopaloceren - Ausbeuten der letzten Jahre - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 17 (1-6): 1-8.

1085 DANNEHL F. 1927 - Sammelreise nach Mittelitalien 1926 und ihre Ergebnisse - *Lepidopterologische Rundschau*, 1: 11-12, 26-28, 35-37, 46-48.

1086 DANNEHL F. 1927 - *Herminia gryphalis* H. S. und ihre Stände - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 17 (1-8): 14-19.

1087 GALVAGNI E. 1927 - Heimische *Chrysophanus* Arten. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXVII (1): (2)-(3).

1088 GURNEY G.H. 1927 - Three weeks' butterfly collecting in Tyrol - *The Entomologist*, LX, n. 764: 3-6, n. 765: 27-30, n. 766: 54-57.

1089 HARTIG F. 1927 - Raccolte lepidotterologiche della stagione estivo-autunnale inviate al Museo Civico di Storia Naturale - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, Cl. II: Scienze Naturali ed Economiche, VIII (1): 85-100.

1090 KAUTZ H. 1927 - *Pieris napi* L. - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXVI: 44-79, (1926).

1091 OSTHELDER L. 1927 - Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil. Die Grossschmetterlinge. 2. Heft. 2. Teil. Eulen - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 17: 225-376, Tavv. XII (pars), XIII-XVI.

1092 ROCCI U. 1927 - Sul ciclo stagionale in Liguria *della Zygaena stoechadis* Bkh. (Lep.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LIX (1): 11-13.

1093 ROMEI L. 1927 - Notes of Collecting in Spain in 1925-26 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXIX (8): 107-109, (9): 127-129, (10): 136-138.

1094 STAUDER H. 1927 - *Lygris prunata* L. *dolomitica* Stdr. f. (ssp.) nova - *Lepidopterologische Rundschau*, 1 (1): 18-20.

1094bis STAUDER H. 1927 - Über Zucht süditalienischer Syntomiden - *Lepidopterologische Rundschau*, 1 (6): 57-59, (7): 65-67.

1095 TURATI E. 1927 - Novità di Lepidotterologia in Cirenaica. II - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, LXVI: 313-344.

1096 VERITY R. 1927 - La variation géographique dans l'Europe occidentale des *Plebeius idas* L. (= *argus* Schiff. = *argyrognomon* Berg.) et *insularis* Leech. Le nom du *P. lycidas* est de Meigen et non de Trapp - *Annales de la Société entomologique de France*, XCVI: 1-16.

1097 VERITY R. 1927 - On the variations and relationship of *Coenonympha arcania*, L., and *C. gardetta*, De Prun. = *philea*, Hüb. = *satyrion*, Esp. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXIX: 37-40, 70-74.

1098 WARNECKE G. 1927 - Gibt es xerothermische Relikte unter den Makrolepidopteren des Oberrheingebietes von Basel bis Mainz? - *Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder*, Freiburg im Breisgau, II (3): 81-119.

1099 ASHBY E.B. 1928 - Turin Arquata Scrivia and Oulx, in May-June 1927 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XL (6): 91-94.

1100 BELLING H. 1928 - Der Ritten-Apollo, *Parnassius apollo cognatus*, subsp. nov. - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 21 (41): 378-381.

1101 BELLING H. 1928 - Etwas vom Alpenweißling, *Pieris callidice* Esp. (Lep. Pierid.) - *Deutsche entomologische Zeitschrift*, Berlin: 21-28.

1102 BOSELLI F. 1928 - Elenco delle specie d'insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia dal 1911 al 1925 - Laboratorio di Entomologia Agraria, Portici, 264 pp.

1103 BRYK F. 1928 - Ueber *Parnassius phoebus* ab. *Ernae* Eisner- *Societas Entomologica*, 43 (10): 38, 2 figg.

1104 FIEDLER C. 1928 - Melanismus bei *Boarmia angularia* Thnbg. (Lep.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 21 (1928-1928): 370-371.

1105 GOIDANICH A. 1928 - Contributi alla conoscenza dell'entomofauna della Canapa - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, I: 37-64.

1106 HARTIG F. 1928 - Note di Lepidotterologia. Aggiunte alla Fauna Lepidotterologica della Venezia Tridentina - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, IX (1), 65-88.

1107 HARTIG F. 1928 - Relazione sulla IV. Spedizione del Museo Regionale per la V. Tr. nella bassa Valle del Sarca dal 12 al 17 marzo 1927 - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, IX (I): 59-64.

1108 MARIANI M. 1928 - Contribuzione alla conoscenza della biologia dei lepidotteri. *Thamnomona semicanaria* Frr. - *Bollettino della Società di scienze naturali ed economiche di Palermo*, NS XI (5): 37-40.

1109 MÜLLER L. 1928 - *Erebia manto* Esp., unter besonderer Berücksichtigung der nördlichen Kalkalpen - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXVIII (3): 45-100.

1110 NITSCHE J. 1928 - Sammelergebnisse aus dem Plöcken- und Karawankengebiete. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXVIII (1): (13)-(17).

1111 ROCCI U. 1928 - Forme nuove di *Coenonympha oedipus* F. (Lep.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, LX (4): 51-56.

1112 ROCCI U. 1928 - Le forme italiane del *Papilio machaon* L. (Lep.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 60 (3): 25-40.

1113 STAUDER H. 1928 - Zygaenidenjagd in Süditalien. (Lep.) - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXXXII (13): 163-164, (14): 172-173, (17): 209-211, (19): 231-233, (20): 247-248.

1114 STAUDER H. 1928 - Neue Lepidopterenformen aus Sizilien - *Lepidopterologische Rundschau*, II (10): 104-110; (11): 113-116.

1115 STAUDER H. 1928 - Die Insektenarmut der Insel Sizilien - *Lepidopterologische Rundschau*, II (14): 141-147.

1116 STAUDER H. 1928 - *Coenonympha arcania* L. *satyrionides* Stauder, nova subsp. - *Lepidopterologische Rundschau*, II (13): 135-138.

1117 STAUDER H. 1928 - *Isturgia carbonaria* Cl. ab. *fumigata* Stdr. nova forma - *Lepidopterologische Rundschau*, II (12): 1 pag.

1118 STAUDER H. 1928 - *Syntomis marjana* Stdr. subsp. nov. *sontiana* Stauder - *Lepidopterologische Rundschau*, II (9): 92-93.

1119 STICHEL H., 1928 - Lepidoptera Nemeobiinae - *Das Tierreich*, 51: I-XXII, 1-330.

1120 TURATI E. 1928 - Lepidotteri - "*Il Parco Nazionale del Gran Paradiso*", Torino, II: 79-84.

1121 VERITY R. 1928 - Les variations géographiques de l'*Urbicola comma* L. dans l'Europe occidentale (Lep. Gryphocera) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIII: 124-127.

1122 VERITY R. 1928 - Races paléarctiques de Grypocères et de Rhopalocères à distinguer et homonymes à remplacer (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIII: 140-144.

1123 VERITY R. 1928 - Distinction de quelques races de l'*Aricia medon* Hufn. et de l'espèce différente *A. cramera* Ersch. (Lep. Lycaenidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIII: 179-183.

1124 VERITY R. 1928 - An Essay on the Origin of the Geographical Variations of the Rhopalocera in Europe exemplified by *Melitaea aurinia*, Rott. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XL (3): 41-45, (6): 86-91, (7/8): 97-101.

1125 SCHAWERDA S. 1928-1929 - Meine vierte Lepidopteren-Ausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 13 (1928): 111-116, 14 (1929) (1): 9-10, (2): 28-30, (6): 57-61.

1125bis STAUDER H. 1928-1929 - Genus *Syntomis* O. im zirkum-adriatisch-tyrrenisch-ligurischen Gebiete - *Lepidopterologische Rundschau*, II (15): 149-154, (16): 160-164, (17): 165-171, (18): 173-176, (19): 187-190, (20): 200-201, (21): 207-210, (22): 215-218, (23): 227-230, (24): 239-242; IX (1929) (1): 10-12.

1126 BRYK F. 1929 - Parnassiana. Eine neue Rasse von *Parnassius phoebus* - *Societas Entomologica*, 44 (5): 17-18.

1126bis BRYK F. 1929 -.Eine neue subspecies von *Parn. Apollo* aus Piedmont - *Societas Entomologica*, 44 (7): 27.

1127 DANNEHL F. 1929 - Neue Formen und geographische Rassen aus meinen Ausbeuten und Erwerbungen der letzten Jahre - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 19 (5-9): 97-116.

1128 FRINGS C.F. 1929 - Zur Entwicklung von *Malacosoma franconica* Esp. var. *panormitana* Trti. - *Societas Entomologica*, 44 (7): 26.

1129 HEMMING A.F. 1929 - Revision of the *baton* group of the genus *Turanana* Bethune-Baker, with an account of an unrecognised species, *T. vicrama* Moore - *The Entomologist,* 62: 27-34, 60-64, 84-89, 2 tavv.

1130 KOLAR H. 1929 - Verbreitung von *Coenonympha oedipus* F. in Europa. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXVIII (3): (105)-(108), (1928).

1131 MARIANI M. 1929 - Biologia di *Crocallis Boisduvalaria* Luc. - *Giornale di scienze naturali ed economiche,* Palermo, XXX (1927-29): 185-193.

1132 MARIANI M. 1929 - *Heliophobus hispidus* HG e *oditis* Hb. (Note biologiche sulle due specie) - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, N.S., XI (4): 25-30.

1133 OSTHELDER L. 1929 - Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil. Die Grossschmetterlinge. 3. Heft. Spanner - *Beilage zum Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 19: 379-468, Tavv. XVII-XVIII.

1134 PRESTIN P. 1929 - *Apollo - Delius - Societas entomologica*, 44 (10): 37-38, 2 Tavv. et *Studi Trentini di Scienze Naturali*, X (1): 56-59, 2 Tavv.

1135 PROUT L.B. 1929 - On some Geometrid types from the Stauder collection - *Novitates Zoologicae*, XXXV: 150-154.

1136 ROCCI U. 1929 - Lepidotteri di Liguria - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, VIII (I): 90-113.

1137 ROCCI U. 1929 - Sulle pretese due "generazioni" di *Euchloë ausonia* Hb. (Lep.) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, VIII (I): 44-65.

1138 ROCCI U. 1929 - Nuove forme di Lepidotteri (Rhopalocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXI (9): 146-154.

1139 SOHN-RETHEL O. 1929 - Beiträge zur Heteroceren-Fauna Italiens - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 43 (1): 1-23.

1140 STAUDER H. 1929 - Neue und seltene Zygaenidenformen aus Italien - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXXXII (22): 286-287, XXXXIII (1): 4-6, (3): 30-32, (7): 79-81, (11): 132-134.

1141 STAUDER H. 1929 - Einige neue italienische Lepidopterenformen - *Entomologischer Anzeiger*, IX (9): 169-172.

1142 STAUDER H. 1929 - *Lycaena thersites* Chapm. in Südtirol - *Societas entomologica*, 44: 25-26.

1143 STAUDER H. 1929 - *Cidaria primaria* Stauder, nova species - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, 23 (4): 45-52.

1144 STAUDER H. 1929 - *Eupithecia stabiensis* Stauder, nova sp. - *Entomologischer Anzeiger*, IX (6): 105.

1145 STAUDER H. 1929 - *Eupithecia pliniata* Stauder, nova sp. - *Entomologischer Anzeiger*, IX: 191-193.

1146 TURATI E. 1929 - Lepidotteri. Ricerche faunistiche nelle isole italiane dell'Egeo - *Archivio Zoologico Italiano*, Torino, 13 (1-2): 177-186.

1147 VERITY R. 1929 - Races du Midi de la France des *Agriades Escheri* Hb. et *coridon* Poda (Lep. Lycaenidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIV: 156-160.

1148 VERITY R. 1929 - Remarques sur *Coenonympha dorus* Esp. et *Hyponephele lycaon* Rott. et sur l'usage incorrect du nom de *Pararge hiera* F. (Lep. Satyridae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIV (11): 185-188.

1149 VERITY R. 1929 - Les races de la France du *Nytha arethusa* Schiff. (Lep. Satyridae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIV: 197-200.

1150 VERITY R. 1929 - Des races européennes de l'*Argynnis niobe* L. (Lep. Nymphalidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIV: 240-244.

1151 VERITY R. 1929 - Races de l'Europe occidentale de l'*Argynnis phryxa* Bergstr. qu'on nomme, à tort, *adippe* L. (Lep. Nymphalidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXIV: 277-280.

1152 VERITY R. 1929 - Essai sur les origines des Rhopalocères européens et méditerranéens et particulièrement des Anthocharidi et des Lycaenidi du groupe d'*agestis* Schiff. - *Annales de la Société entomologique de France*, 98: 323-360.

1153 VERITY R. 1929 - Notes sur les "Hesperiidi" européens et liste de ceux de la Catalogne - *Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona*, XI (4): 5-18.

1154 WHEELER G. 1929 - *Argus - idas - argyrognomon - insularis - The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XLI (11): 165-167.

1155 ZUKOWSKY B. 1929 - Neue europäische Aegeriidae - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 23 (2): 20-22.

1156 ZÜLLICH R. 1929 - Einige neue Lycaenidenformen aus meiner Sammlung - *Zeitschrift des Österreischen Entomologen-Vereines*, 14 (5): 51-53.

1157 STAUDER H. 1929-1930 - *Celerio euphorbiae* L. *dolomiticola* Stauder nova subsp.- *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXXXIII (22): 268-270.

1158 BELLING H. 1930 - *Parnassius apollo rivalis*, subsp. nov. (Lep. Rhopal.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 24 (16): 191-194.

1158bis BELLING H. 1930 - Der Apollofalter des Martelltales, *Parnassius apollo marmorarius*, subsp. nov. (lep. Rhop.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 24 (32): 341-343.

1159 BELLING H. 1930 - Der Apollofalter des Pustertals - *Parnassius apollo comes*, subsp. nov. (Lep. Rhopal.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 23 (45): 518-520.

1160 BELLING H., BRYK F. 1930 - Der Apollofalter des Passeiertales - *Parnassius apollo andreashoferi*, subsp. nov. (Lep. Rhop.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 24 (14): 176-178.

1161 BUONOCORE A. 1930 - Animali nocivi, pronubi ed utili ai tabacchi - Regio Istituto Sperimentale per la coltivazione dei tabacchi "Leonardo Angeloni", Scafati, 289 pp.

1162 CORTI A. 1930 - Studien über die Subfamilie der Agrotidae (Lep.). XXII. *Agrotis multangula* Hb.; *Agrotis rectangula* Schiff. und deren Formen; *Agrotis vicina* nov. spec.; *Agrotis guberlae* nov. spec.; *Agrotis calorica* nov. spec. und einige verwandte Arten - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, XX (1): 1-20, Tavv. I-III.

1163 CORTI A. 1930 - Studien über die Subfamilie der Agrotidae (Lep.). XXIV. *Euxoa decora* Schiff. und *Euxoa haverkampfi* Stdfs. - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, XXIV (1): 99-114, Tav. VIII.

1164 CORTI A. 1930 - *Feltia crassa* Hb. var. *lata* Tr. und *Feltia dirempta* Stgr. - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXX (1): 9-14.

1165 GRANDI G. 1930 - *Hypopta caestrum* Hb. - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, III: 221-245.

1166 HIGGINS L.G. 1930 - A Lepidopterological Excursion to Piedmont - *The Entomologist*, LXIII: 97-100, 125-127, 152-155, 179-183, 199-203.

1167 MARIANI M. 1930 - Il *Parnassius Apollo Siciliae* Oberthür - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XXVI: 3-14.

1168 MARIANI M. 1930 - Novità di lepidotterologia in Sicilia - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXII (6): 105-110.

1169 MELIS A. 1930 - Contribuzione alla conoscenza degli insetti dannosi alle piante agrarie e forestali della Sardegna - *Redia*, Firenze, 18: 1-120.

1170 MENOZZI C. 1930 - Insetti dannosi alla Barbabietola (Osservazioni ed appunti preliminari). Lepidotteri - Società entomologica italiana, Genova: 89-92.

1171 MONASTERO S. 1930 - Il *Cossus cossus* L. in *Ficus carica* L. - *Bollettino della Società di scienze naturali ed economiche di Palermo*, N. S. XII (2): 42-43.

1172 REHFOUS M. 1930 - Chasses sur la Riviera italienne, aux environs de Sestri Levante, en août 1926 - *Bulletin de la Société Lépidoptérologique de Genéve*, Compte Rendu des Séances 1926, VI (3): 153-154.

1173 ROCCI U. 1930 - Note per una monografia delle forme italiane di *Melanargia galathea* L. (Lepid. - Satyr.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXII (5): 79-88.

1174 ROCCI U. 1930 - Le forme italiane di *Limenitis camilla* L. (= *sibylla* L. et auct.) (Lepid. - Nymphal.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXII (7): 127-133.

1175 ROCCI U. 1930 - Ricerche sulla cosi detta *Melitaea athalia* Rott. (Lepid. - Nymph.). Nota preventiva - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXII (10): 183-185.

1176 ROCCI U. 1930 - Sulla forma autunnale in Lombardia di *Mancipium brassicae* L. (Lep.) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXII (1): 15-17.

1177 SIMMONS A. 1930 - The Life-history of *Epinephele nurag* (Ghil.) - *The Entomologist*, 63, n. 809: 217-221.

1178 STAUDER H. 1930 - *Omia banghaasi* Stauder - nova species - *Entomologische Zeitschrift,* Frankfurt a. M., XXXXIV (1): 2-9.

1179 VERITY R. 1930 - Descrizione di varie razze italiane e di una Portoghese di *Zygaena* e dell'eserge Scozzese della *Z. fulvia* F. chiamata a torto *achilleae* Esp. - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, IX: 12-29.

1180 VERITY R. 1930 - Notes on the relationship between the Melitaeidi and particulary between those of the *athalia* Rott. group - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XXXXII (3): 40-44, (4): 51-54, (5): 71-75, (6): 81-85, (7-8): 108-111, (9): 117-120, (10): 131-135.

1181 VON DER GOLTZ F. 1930 - Neue Erebienformen - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 44: 78-82.

1182 VON DER GOLTZ F. 1930 - Kleine Mitteilungen - catture a Ponte all'Isarco - *Entomologische Zeitschrift*, Frankfurt a. M., XXXXIV (9): 139.

1183 WORM-HANSEN J.G. 1930 - The Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). Notes from a collecting trip in the late-summer 1928 - *Entomologiske Meddelelser*, XVI: 425-432.

1184 HARTIG F. 1930-1931 - Note di Lepidotterologia. Nuove aggiunte alla Fauna Lepidotterologica della Venezia Tridentina - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XI (3) (1930): 231-252; XII (1) (1931): 3-36.

1185 BANTI A. 1931 - Una farfalla perniciosa (*Thaumetopoea* (*Cnetocampa*) *processionea* L.) - *L'Alpe*, XVIII (10): 529-534.

1185bis BELLING H. 1931 - Der Apollofalter des Ultentales, *Parnassius apollo eremita*, subsp. nov. (Lep. Rhop.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 25 (9): 94-95.

1186 CANDURA G.S. 1931 - Osservazioni biologiche sulla *Tephroclystia pumilata* Hb., lepidottero geometride che fa seccare i boccioli di rose - *Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli*, XLIII: 353-359.

1187 DEL GUERCIO G. 1931 - La Tortrice, la Limantria e la Processionea della quercia nei boschi della Pieve a Presciano (Arezzo) dell'azienda del Sig. Conte Serristori - *Redia*, Firenze, 19: 197-211.

1188 DRAUDT M. 1931 - Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Palluperina* Hmps. und Beschreibung einer neuen Art - *Entomologische Rundschau*, 48 (12): 125-132, Tavv. 1-3.

1189 FAGGIOLI D. 1931 - Appunti entomologici. I - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, IV: 219-222.

1190 FIORI A. 1931 - Macrolepidotteri dell'alta valle Rendena - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XII (3): 171-198.

1191 GALVAGNI E. 1931 - *Papilio machaon* L. f. *pseudohospiton* Stauder in Sizilien. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, LXXXI (1): (5) & (14).*

1192 GRANDORI R. 1931 - Osservazioni sullo sviluppo embrionale di *Nyssia florentina* Stefan. - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura*, IV (1): 133-139.

1193 HEMMING A.F. 1931 - Revision of the genus *Iolana*, Bethune-Baker (Lepidoptera, Lycaenidae) - *The Transactions of the Entomological Society of London*, 79 (II): 323-333, tav. XI.

1193bis KAUTZ H. 1931 - Geometriden aus meiner Sammlumg - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines, Wien*, XVI: 62-64, Taf. II.

1194 MARIANI M. 1931 - Novità di Lepidotterologia in Sicilia (Addenda) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIII (1-2): 23.

1195 MARIANI M. 1931 - Il *Parnassius Apollo Siciliae* Obth. (addenda) - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XXXVI: 3-8.

1196 MARTELLI G.M. 1931 - Contributo alla conoscenza dell'"*Aporia crataegi* L." e di alcuni suoi parassiti ed epiparassiti - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, XXV: 171-241.

1197 OSTHELDER L. 1931 - Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil. Die Grossschmetterlinge. 3. Heft. Spanner - *Beilage zum Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 21: 469-537, Tavv. XIX-XX.

1198 ROCCI U. 1931 - Osservazioni Lepidotterologiche - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIII (6-7): 90-98.

1199 ROCCI U. 1931 - Contributo alla conoscenza di *Nytha arethusa* Esp. (Lepid. - Satyr.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIII (8): 127-133.

1200 ROCCI U. 1931 - Ricerche sulle modalità di schiusura e le forme di variazione della cosidetta *Melitaea athalia* Rott. (Lepid. - Nymph.) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, X: 10-35.

1201 SCHAWERDA K. 1931 - Lepidoptera aus St. Ulrich in Gröden. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXXI (1): (15).

1202 TURATI E. 1931 - Spizzichi di Lepidotterologia. II - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIII (9): 139-151.

1203 VERITY R. 1931 - Distinzione, nomenclatura e nuove località italiane delle *Gegenes nostrodamus* F. e *pumilio* Hoffm. - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIII (6-7): 106-112.

1204 VERITY R. 1931 - On the geographical variations and the evolution of *Lycaeides argus* L. (Lycanenidae) - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 45: 30-69.

1205 WEHRLI E. 1931 - Einige neue paläarktische Geometriden aus Syrien, Algerien und Sicilien. (Lepid. Het.) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, XXI (2): 41-46.

1206 WIMMERS C. 1931 - Aus Lepidopteren-Fauna Italiens (Apulien) - *Entomologische Zeitschrift,* 45: 94-97.

1207 CORTI A., DRAUT M. 1931-1938 - Phalaenae, Noctuiform Moths - in Seitz: The Macrolepidoptera of the World. Supplement to vol. 3 - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart, 333 pp., 26 tavv.

1208 BANTI A. 1932 - Boschi infestati dalla *'Euproctis chrysorrhoea'* - *L'Alpe*, rivista Forestale italiana, XIX (1): 31-37.

1209 BERIO E. 1932 - Una nuova forma di *Euxoa puta* Hb.. Considerazioni sulla f. *lignosa* Gdt. - *Bollettino della Società entomologica italiana*, LXIV (8): 146-149.

1210* BRYK F., EISNER C. 1932 - Parnassiana - Vol. 2: 35, 50-60.

1211 EISENBERGER F. 1932 - Raccolta di lepidotteri nella parte orientale del gruppo di Brenta - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XIII (1): 53-55.

1212 FAGGIOLI D. 1932 - Appunti entomologici. II - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, V: 88-92.

1212bis HELBIG R. 1932 - Eine neue Form von *Agrotis rhaetica* Stgr.: ab. *obscura* f. nova - *Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben*, 25 (42): 422-423.

1213 HEYDEMANN F. 1932 - Zur morphologie und Formenbildung der gattung *Miana* Steph. (Lep. Noct.). I. Die *Miana strigilis* L.-Gruppe - *Entomologische Zeitschrift*, XXXXVI (2): 21-24, (3): 29-32, (5): 55-58, (7): 78-82, 2 Tavv.

1214 NITSCHE J. 1932 - Sammel- und Lichtfangergebnisse aus dem Plöckengebiete (Karnische Alpen). In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft*, LXXXII (1): (3)-(4).

1215 PRAVIEL G. 1932 - Hétérocères peu répandus ou nouveaux de France (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXVII: 260-261.

1216 REHFOUS M. 1932 - Note préliminaire sur diverses espèces mèridionales rencontrées dans la région de Genève - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XV (8): 276-321.

1217 ROCCI U. 1932 - Il *Parnassius apollo* L. sull'Appennino Ligure - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIV (8): 149-151.

1218 ROCCI U. 1932 - Osservazioni su "*aurelia*" Nick. e "*britomartis*" Assm. (o "*aureliaeformis*" Ver.) del gen. *Melitaea* F. (Lepid. - Nymphal.) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XI: 30-40.

1219 ROCCI U. 1932 - La struttura e la variabilità delle armature maschili in alcuni gruppi specifici del gen. *Melitaea* F. (Lepidopt. - Nymphal.) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XI: 123-161.

1220 ROCCI U. 1932 - Osservazioni su alcuni gruppi specifici del gen. *Melitaea* F. (Lepidopt. Nymphal.) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, X (1931): 202-211.

1221 ROCCI U. 1932 - Sulla presenza, la diffusione in Liguria e la biologia del "*Charaxes jasius* L." (Lepidoptera-Nymphalidae) - *Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze G. Capellini*, XIII (1): 37-47.

1222 SCHAWERDA K. 1932 - Meine siebente Lepidopterenausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 17 (2/3): 9-13, (4): 29-31, (5): 33-35, (6); 44-46.

1223 SCHAWERDA K. 1932 - *Gnophos*-Arten aus Korsika. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft*, LXXXII (1): (14).

1224 STERNECK J. 1932 - Studien über Acidaliinae (Geometr.). II - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 18 (1932): 63-69.

1225 TURATI E. 1932 - Spizzichi di Lepidotterologia. III - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXIV (4): 50-65.

1226 TURATI E. 1932 - *Parnassius delius paradisiacus* f.n. - "*Il Parco Nazionale del Gran Paradiso*", vol. III: 93-96.

1227 VERITY R. 1932 - The Geographical Variations of *Boloria euphrosyne*, L. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XLIV (8): 110-121.

1228 WARNECKE G. 1932 - Beiträge zur Verbreitung einiger als alpin geltenden Larentien außerhalb des Alpen-gebietes (Lepidoptera Geom.) - *Entomologischer Anzeiger*, XII: 139-141.

1228bis WARREN B.C.S. 1932 - Notes on the Erebiid species - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XLIV: 165-167.

1229 BEURET H. 1932 - *Albulina orbitolus* 1798 et *Agriades glandon* 1798 (Lycaenidae) - *Lambillionea*, XXXIII: 134-146.

1230 BOURSIN C., 1933 - Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifidae". X. Neue *Cucullia* und *Athetis* von Marasch in türkisch Nordsyrien, von der Expedition L. Osthelder und E. Pfeiffer - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 13 (I): 8-26.

1231 DANNEHL F. 1933 - Neues aus meiner Sammlung - *Entomologische Zeitschrift*, XXXXVI: (22): 229-232, (23): 244-247, (24): 259-260; XXXXVII: (2): 19-20, (3): 25-26, (4): 32-33, (10): 81-82, (11): 87-88, (13): 105-106, (15): 123-124, (16): 139-140, (17): 146-147.

1232 DRAUDT M. 1933 - Zuträge und Berichtigungen zur Gattung *Palluperina* Hmps. - *Entomologische Rundschau*, 50 (7): 95-97.

1233 DRAUDT M. 1933 - Neue Heteroceren des paläarktischen Faunengebietes - *Entomologische Rundschau*, 50 (12): 157-160, (13): 167-169, (14): 186-188.

1234 FAGGIOLI D. 1933 - Appunti entomologici. III - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, VI: 164-170.

1235 FAGGIOLI D. 1933 - Elenco degli Insetti più interessanti raccolti in Italia ed entrati a far parte delle collezioni del R. Istituto di Entomologia di Bologna. I - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, VI: 7-24.

1236 FORCHER MAYR H.J. 1933 - Contribuzione alla fauna lepidotterologica della Venezia tridentina. I. *Chrysophanus hippothöe* L. - *Studi Trentini di Scienze Naturali,* XI (1): 35-41.

1237 GIESE H. 1933 - Über die Verbreitung von *Melitaea athalia* Rott. und *pseudathalia* Rev. - *Entomologische Rundschau*, 50 (13): 177-180.

1238 GRANDI L. 1933 - Raccolta di Lepidotteri Bresciani - Commentari dell'Ateneo di Brescia: 261-264.

1239 NITSCHE J. 1933 - Über die Formen der *Cidaria furcata* Thnbg. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXXIII (1/2): (21)-(22).

1240 PAOLI G. 1933 - *Mancipium brassicae* L. (Lepid. Pieridae). In: Repertorio di notizie entomologiche. III - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXV (1): 32-33.

1241 PICTET A. 1933 - *Maniola glacialis* Esp. et sa race *alecto* Hb. (ancienne nomenclature) dans la région du Parc national suisse - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XV (12): 514-528.

1242 PRZEGENDZA D. 1933 - Neue Zygänenrassen (Lep.) - *Entomologische Zeitschrift*, 37 (3): 27-28.

1243 ROCCI U. 1933 - *Leucania* (*Sideridis*) *zeae* Dup. (Lepid. - Noct.). In: Repertorio di notizie entomologiche. 4 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXV (1): 33-34.

1244 ROCCI U. 1933 - Repertorio di notizie entomologiche. 13. *Hydroecia franciscae* Tur. (Lep. Noct.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXV (4): 100.

1245 ROCCI U., TURATI E. 1933 - *Sideridis zeae* Dup. (= *Leucania zeae*) e *Sesamia cretica* Led.; *Sideridis scirpi* Dup. e *sicula* Tr. (Lepid. - Noct.). In: Repertorio di notizie entomologiche. 5 - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXV (8): 192-193.

1246 SAMOGGIA A. 1933 - Reperti morfologici e biologici sul *Trochilium tipuliforme* Clerck (Lepidoptera-Aegeriidae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, VI: 131-150.

1247 TACCANI C. 1933 - *Aporia crataegi* L., *Mancipium brassicae* L. (Lepid. Pieridae). In: Repertorio di notizie entomologiche. III -

Bollettino della Società entomologica italiana, Genova, LXV (7): 168-169.

1248 TURATI E. 1933 - Spizzichi di Lepidotterologia. IV - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXV (1): 12-26.

1249 VERITY R. 1933 - Des variations géographiques et saisonnières du *Boloria dia* L. (Lep. Nymphalidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXVIII: 74-77.

1250 VERITY R. 1933 - Les races occidentales de l'*Argynnis hecate* Schiff. (Lep. Nymphalidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* XXXVIII: 173-176.

1251 VERITY R. 1933 - Des variations géographiques et saisonnières du *Boloria selene* Schiff. (Lep. Nymphalidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XXXVIII: 116-118.

1252 VERITY R. 1933 - The Geographical and Seasonal Variations of *Argynnis* (*Issoria*) *lathonia*, L. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XLIV (4): 56-60.

1253 VON DER GOLTZ F. 1933 - *Er. tyndarus benacensis* Dhl. - *Entomologische Zeitschrift*, 47 (7): 66.

1254 WEHRLI E. 1933 - Sur une nouvelle espece de *Tephronia* et une nouvelle race de *Mannia* - *L'Amateur de Papillons*, VI (13): 211-217.

1255 DRAUDT M. 1933 - Revision einiger *Dianthoecia*-gruppen - *Entomologische Rundschau*, 50 (1933): (10): 291-294, (11): 304-307, (12): 316-322; 51 (1934) (1): 9-13: (2): 20-22; (5): 57-62; (9): 89-95; (10): 100-105; (11): 113-116; (12): 194-200, tavv. 1-2.

1256 ASHBY E.B. 1933-1934 - The Cottian Alps and Turin, June/July 1933 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 46: 81-83, 105-107, 116-117.

1257 ASTFÄLLER B. 1934 - Una escursione entomologica sulla catena Monte Gazza-Paganella - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XV (1): 26-29.

1258 BRYK F. 1934 - Lepidoptera Baroniidae, Teinopalpidae, Parnassiidae pars I - *Das Tierreich*, 64: I-XIX, 1-128.

1259 BRYK F. 1934 - Lepidoptera Parnassiidae pars II (Subfam. Parnassiinae) - *Das Tierreich*, 65: I-LI, 1-790.

1260 BYTINSKI-SALZ H. 1934 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Sardiniens - *Internationale Entomologische Zeitschrift,* Guben, 28 (5): 41-47, 56-62; (9): 89-94; (10): 97-106, 133-137; (14): 165-169, 182-185, 213-216.

1261 CADROBBI M. 1934 - Alcune grotte dei dintorni di Rovereto (Contributo allo studio delle cavità naturali della zona) - *Pubblicazione della Società Museo Civico in Rovereto, LX: 3-34.*

1262 HARTIG F. 1934 - Nuova forma trentina di *Rhyacia senna* H. G. - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXVI (9): 230.

1263 MARIANI M. 1934 - Una grave infestione di *Sesamia vuteria* Stoll. (nonagrioides Lef.) in provincia di Messina - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXVI (6): 128-130.

1264 MARIANI M. 1934 - Ancora sulla infestione di *Sesamia vuteria* Stoll. in provincia di Messina. Morfologia degli adulti e della larva - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXVI (8): 184-188.

1265 MARIANI M. 1934 - La comparsa della *Sesamia* in alcune zone granarie della provincia di Messina - *Agricoltura Messinese*, XXV: 131-137.

1266 NAUFOCK A. 1934 - Ueber Arten und Formen der Gattung *Dysauxes* Hb. - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, XXIII, 1933 (1934): 109-129.

1267 REBEL H. 1934 - Eine neue Geometridae aus den Südalpen - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 19 (11/12): 69-71.

1268 ROCCI U. 1934 - *Ephesia nymphaea* Esp. f. n. *benacensis* Rocci (Lep. Noct.). In: Repertorio di notizie entomologiche. IX - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXVI (6): 136-137.

1269 ROCCI U., TURATI E. 1934 - Le Leucanidi del gruppo *zeae* Dup. e la cosiddetta "Nottua del granoturco" - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XII (1933): 273-293.

1270 ROCCI U., TURATI E. 1934 - Le Leucanidi del gruppo *zeae* Dup. e la cosiddetta "Nottua del granoturco". Parte II. Le specie italiane del genere *Sesamia* Gn. - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, XIII: 5-22.

1271 SCHAWERDA K. 1934 - Der Formenkreis von *Euchloris smaragdaria* F. und *volgaria* Gn. (= *prasinaria* Ev.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 27 (41): 461-465, 1 tav.

1272 VERITY R. 1934 - The Lowland Races of Butterflies of the Upper Rhone Valley - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, suppl., 40 pp.

1273 WOLF B. 1934 - Animalium Cavernarum Catalogus - W. Junk Verlag, Wien, Vol. III, 918 pp.

1273bis ALBERS T., WARNECKE G. 1934-1938 - Die Formenkreise *grisea* Ev. und *albina* Ev. der Gattung *Athetis* Hb. (Lepidopt., Noct. pal.) - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 28 (1934) (27): 337-341, (28): 349-352, (32): 407-409, (35): 445-447, (37/38) (1935): 469-471; 29 (21): 245-248, 1 Taf., 1 Karte.

1274 PROUT L.B., WEHRLI E. 1934-1935 - Die Spanner des Palaearktischen Faunengebietes - in: A. Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde - Supplement zu Band 4 - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart, 766 pp.

1275 AUDEOD G. 1934-1954 - Espèces ou variétés spéciales à la Corse et à la Sardaigne - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XVI (6-7) (1933): 400.

1276 BOURSIN C. 1935 - Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae - Trifinae". XIII. Beschreibung von 3 neuen Formen samt Bemerkungen zu einigen anderen paläarktischen Arten - *Internationale Entomologische Zeitschrift*, Guben, 29: 217-221, 234-245.

1277 CUSCIANNA N. 1935 - La *Sesamia cretica* Led. (Nottua del granoturco) in provincia di Trieste - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, VII: 241-262.

1278 DUFRANE A. 1935 - Hetérocères d'Europe - *Lambillionea*, 35: 50-55.

1279 GRANDI L. 1935 - Lepidotteri bresciani raccolti da Luigi Grandi - *Bollettino Annuale Gruppo Naturalistico "G. Ragazzoni",* in Commentari dell'Ateneo di Brescia: 507-509.

1280 HARRIS H.G. 1935 - A Holiday in Piedmont - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 47: 84-86.

1281 HÖFER K. 1935 - Lepidopterologische Mitteilung. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXXIV (1934): (10)-(12).

1282 ROCCI U. 1935 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena* (Lepid. Zygaen.) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XV: 47-58.

1283 SCHAWERDA K. 1935 - Lepidopteren aus Sardinien. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie - *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXXIV (1934): (20)-(21).

1284 VENTURI F. 1935 - Contributi alla conoscenza dell'Entomofauna delle Graminacee coltivate e spontanee. III - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, VIII: 141-149.

1285 WORM-HANSEN J.G. 1935 - Additional Notes on the Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). Notes from a collecting trip in the spring and early summer of 1931 - *Entomologiske Meddelelser*, København, XIX: 277-285.

1286 BERIO E. 1935 - Contributo alla conoscenza della variazione di *Agrotis puta* (Hb. 1802) Ochs. 1816 (Lepid. Noctuidae) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, LIX: 69-117.

1287 BOURSIN C. 1936 - Contributions à l'Etude des Agrotidae-Trifinae. XIX. Note sur *Athetis proxima* Rbr. bona sp.! nouvelle pour la France, accompagnée d'une mise au point concernant les *A. kadeni* Frr. et *fuscicornis* Rbr. - *Bulletin de la Société entomologique de France*, XLI (18): 299-307.

1288 BYTINSKI-SALZ H. 1936 - New Heterocera from Asia Minor - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XLVIII, suppl.: (1)-(6).

1289 DELLA BEFFA G. 1936 - Contributo alle conoscenza degli Insetti parassiti dei Pioppi. L'*Earias vernana* Hb. (Nottua delle gemme del pioppo bianco) - *Bollettino del Laboratorio Sperimentale e R. Osservatorio di Fitopatologia,* Torino, 13 (5-6): 53-58.

1290 HARTIG F. 1936 - Neue westpalaearktische Lepidopteren - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, Wien, 21 (6): 42-46.

1291 HARTIG F. 1936 - Descrizione di tre nuove specie, e revisione del gen. *Lepidoscioptera* D. Torre (*Scioptera* Rmb.) (Lep. Psychidae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XV: 35-41, Tavv. I-X.

1292 HOLIK O. 1936 - *Syngrapha* (*Plusia*) *interrogationis* L. - *Lambillionea*, XXXVI (8-9): 205-211.

1293 HOLIK O. 1936 - La race de Sardaigne de *Zygaena corsica* Boisd. - *Lambillionea*, XXXVI: 224-226.

1294 MELIS A. 1936 - Contributo alla conoscenza morfo-biologica della *Polia* (*Mamestra*) *Pisi* L. - *Redia*, Firenze, 22: 1-30.

1295 MELIS A. 1936 - Contributo alla conoscenza morfo-biologica della *Barathra* (*Mamestra*) *brassicae* L. - *Redia*, Firenze, 22: 33-34.

1296 OBRAZTSOV N.S. 1936 - Studien über die palaearktischen Amatiden. IV. Was ist *Amata* (*Syntomis*) *hertula* Stdr.? - *Entomologische Rundschau*, 53 (22): 304-308.

1297 ROCCI U. 1936 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena* (Lepid. Zygaen.). X. Forme nuove di *hippocrepidis* Hb.; *transalpina* Esp.; *maritima* Obt. - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXVIII (3): 41-46.

1298 ROCCI U. 1936 - Ricerche sulle forme del gen. *Zygaena* F. (Lepidopt. - Zygaenidae). XI - *Redia*, Firenze, 22: 131-142.

1299 STORACE L. 1936 - Una eccezionale anomalia alare in *Zygaena* - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXVIII (8): 142-143.

1300 AGENJO R. 1936 - Los *Procris* Fabr. de España (Lep. Zygaen.) - *Eos*, Madrid, 12 (1936): 283-322.

1301 ALBERTI B. 1937 - Eine neue alpine *Procris*-Art. *Procris alpina* nov. sp. - *Entomologische Zeitschrift*, L: 435-439, 515-516.

1302 ASTFÄLLER B. 1937 - Die Grubeneule *Thecophora fovea* Tr. Im Vinschgau - *Entomologische Zeitschrift*, L (46): 540.

1303 BYTINSKI-SALZ H. 1937 - Secondo contributo alla conoscenza della Lepidotterofauna della Sardegna - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XV (1936) (2): 194-212.

1304 CARPENTER G.D.H. 1937 - A flight of a Butterfly that appeared to be *Catopsilia florella* Fab. in the Straits of Messina - *Proceedings of the Royal Entomological Society of London*, ser. A, General Entomology, 12 (1-2): 9.

1305 FAGGIOLI D. 1937 - Appunti entomologici. IV - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, IX: 184-195.

1306 GRANDORI R., MARIANI G. 1937 - Una grave minaccia per il Sorgo zuccherino: la *Sesamia cretica* - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura*, VIII: 123-128.

1307 MARIANI M. 1937 - Nuove specie e forme di Lepidotteri di Sicilia ed un nuovo parassita degli Agrumi - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XXXIX (3): 3-15.

1308 MARIANI M. 1937 - Anatomia e fisiologia degli organi genitali femminili delle *Pieris* Schrk. (Lepidoptera, Pieridae) - Festschrift zum 60. Geburtstage von professor Dr. Embrix Strand, Riga: 434-450.

1309 ROCCA L. 1937 - L'*Euphydryas maturna* L. e *wolfensbergeri* Frey in Italia (Lepidoptera - Nymphalidae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVI: 124-128.

1310 ROCCI U. 1937 - La "Zigena della vite" ed alcune specie italiane del gen. *Procris* F. (s.l.) (Lepidoptera Zygaenidae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, IX (1936/1937): 113-152.

1311 SCHAWERDA K. 1937 - Faunula Dolomitana. Die Mikrolepidopteren - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 27: 105-115.

1312 VERITY R. 1937 - Appunti su alcuni Lepidotteri diurni italiani - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVI: 37-50.

1313 VERITY R. 1937 - Classement et distribution des races ou formes géographiques, du *Pyronia tithonus* L. - *Lambillionea*, Suppl. n. 11-12: 221-232.

1314 WAGNER F. 1937 - Sammelergebnisse in Sizilien. In: Versammlungen der Sektion für Lepidopterologie – *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, LXXXVI/LXXXVII (1936/1937): 420-421.

1315 VERITY R. 1937 - Variation of some Butterflies in Anterior Asia and in Morocco - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, XLIX (1937), suppl.: (1)-(8), XL (1938): (9)-(15).

1316 BERIO E. 1937-1938 - Brevi note su due nottue paleartiche - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXX (1-2): 24-25.

1317 FAGGIOLI D. 1938 - Appunti entomologici. V - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, XI: 19-40.

1317bis FORSTER W. 1938 - Die *Lycaena pylaon*-Gruppe - *Entomologische Rundschau*, 55 (21): 213-219, 236-239, 334-337, 361-363, 417-420, (42): 485-487, Taff. 1-14.

1318 GRADL F. 1938 - Kurzer Bericht über *Lythria plumularia* Frr. in Vorarlberg - *Zeitschrift des österreichischen Entomologen - Vereines*, 23 (6): 57-58

1319 HARRIS H.G. 1938 - Sestrières, Clavières and the Baths of Valdieri - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 50 (4): 37-40.

1320 HARTIG F. 1938 - I Macrolepidotteri di Madonna di Campiglio - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVI (1937): 232-270.

1321 KLIMESCH J. 1938 - Piccolo contributo alla conoscenza dei Lepidotteri della Val Venosta- *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XIX (XVI-XVII): 39-51.

1322 LUCCHESE E. 1938 - Contributo alla conoscenza della *Leskia aurea* Fall. (Diptera Larvevoridae Dexiinae) - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, XXXI: 1-40.

1323 LUCCHESE E. 1938 - Contributi alla conoscenza dei Lepidotteri del Melo. II. *Aegeria typhiaeformis* Bkh. - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, XXXI: 158-195.

1324 REBEL H. 1938 - Mitteilungen über Canephorinen und über *Solenobia triglavensis* Rbl. - *Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines*, 23 (7/8): 75-82, Tav. VI.

1325 ROCCI U. 1938 - Ricerche sulle forme del Gen. *Zygaena* F. XII. - Revisione della specie *transalpina* Esp. e descrizione di forme nuove (Lepidopt. Zygaen.) - *Redia*, Firenze, 24: 97-197.

1326 SCHAWERDA K. 1938 - Miscellanea Lepidopterologica. Neubeschreibungen – *Entomologische Rundschau*, 55 (41): 469-471; (45): 523-524; (47): 554-555; (50): 582-584.

1327 STERNECK J. 1938 - Zur Kenntnis von *Lithosia* F. und *Pelosia* Hb. - *Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines*, 23 (2): 13-15, (3): 31-36, (4): 46-48, (5): 54-56, (6): 59-63, (7): 69-74, 4 Tavv.

1328 WARNECKE G. 1938 - Bemerkungen zu einigen Arten der Nolinae (Lepidoptera Arctiidae) - *Entomologische Rundschau*, 55 (41): 472-476.

1329 LEGRAND H. 1938 - Le genre *Apaidia* Hampson (Lithosidae) - *Revue Française de Lepidoptérologie* (*L'Amateur de Papillons*), IX (1938) (8): 116-130, (9): 141-146, (10): 183-194, (11) (1939): 195-206.

1330 VERITY R. 1938-1939 - Supplement to the "Butterfly races and Zygaene of Macedonia" - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, L (1938), suppl.: (1)-(16), LI (1939), suppl.: (17)-(20).

1331 BOURSIN C. 1938-1939 - Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae. XXIII - I. Neue palaearktische Arten unf Formen mit besonderer Berücksichtigung der Gattung *Autophila* Hb. II. Synonymie-Notizen samt verschiedenen Bemerkungen - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, XXX (2): 474-543.

1332 BYTINSKI-SALZ H. 1939 - On *Rhyacia festiva*, Schiff., ssp. *conflua*, Tr., and ssp. *thulei*, Stgr. - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, LI (3): 29-37, Tav. III.

1333 DANIEL F. 1939 - Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Lithosia* F. (Lep. Arct.). I - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 29 (1): 44-54.

1334 DANIEL F. 1939 - Gedanken zu einigen Arctiiden-Formen - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 29: 354-368.

1335 DI STEFANO G. 1939 - Contributo alla conoscenza dell'*Orgya antiqua* L. (Lep. Lymantriidae) - *Redia*, Firenze, 25: 303-318.

1336 HARTIG F. 1939 - Contributo alla conoscenza della Fauna Lepidotterologica dell'Italia Centrale. I. Due nuove razze di Rhopalocera - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVIII: 186-189.

1337 HARTIG F. 1939 - Nuovi contributi alla conoscenza della Fauna delle Isole Italiane dell'Egeo. XIII. Conoscenza attuale della fauna lepidotterologica dell'Isola di Rodi - *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, III: 221-246.

1338 HARTIG F., AMSEL H. G. 1939 - Contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Sardegna. Nuove forme di Lepidotteri - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVII (1938): 63-84.

1339 HIGGINS L.G. 1939 - *Melitaea aureliaeformis* Verity - *The Entomologist*, 72: 40-44.

1339bis JORDAN K. 1939 - Zur Nomenklaur der beiden deutschen *Procris*-Arten mit spitzen Fühlern - *Novitates Zoologicae*, London, XLI: 212-216.

1340 MARIANI M. 1939 - Fauna Lepidopterorum Siciliae. (Catalogo ragionato) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVII (1938) (II): 129-187.

1341 MARTELLI M. 1939 - Contributi alla conoscenza dell'entomofauna del Granoturco (*Zea mays* L.). I. Nota preliminare - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, X, 1937/1938 (1939): 139-166.

1342 MENOZZI C. 1939 - La fauna della grotta della Suja sul Monte Fascie (Genova) ed osservazioni biologiche sulla *Parabathyscia doderoi* Fairm. (Coleopt. Catoptidae), con descrizione della larva e delle caratteristiche morfologiche del suo intestino e di quello dell'adulto - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XVIII: 129-154.

1343 NOACK H. 1939 - Über die echte *Hemerophila serraria* Costa (Lep., Geom.) - *Entomologische Rundschau*, 56 (25): 265-268, 8 figg.

1344 ROMEI L. 1939 - Huit générations de *Pieris rapae* L. en Italie - *Lambillionea*, XXXIX: 128-135.

1345 RUSSO G. 1939 - Contributo alla conoscenza degli Insetti dannosi al Cotone nell'Africa Orientale Italiana. I. Lepidotteri - *Bollettino del R. Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria*, Portici, III: 105-220.

1346 SCHAWERDA K. 1939 - *Chesias züllichi* Schaw. und *Chesias pinkeri* Schaw., species novae - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 24 (10): 145-147, 1 tav.

1347 SCHMIDLIN A. 1939 - Beitrag zur Kenntnis der Variabilität von *Satyrus statilinus* Hufn. - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XVII (10): 500-508.

1348 VERITY R. 1939 - *Parnassius apollo* L. race *romeii* nom. nov. des Abruzzes - *Lambillionea*, XXXIX: 182-183.

1349 VERITY R. 1939 - Essai sur la distinction des espéces du groupe de *Lysandra coridon* Poda - *Lambillionea*, XXXIX: 211-222.

1350 WORM-HANSEN J.G. 1939 - Additional Notes on the Lepidopterous Fauna of San Cataldo (Southern Italy). Notes from a collecting trip in the summer of 1936 - *Entomologiske Meddelelser*, XX: 212-221.

1351 ALBERS T., WARNECKE G. 1939 - Vier europäische Arten der *Dyscia conspersaria* F.-Gruppe (Lepidopt. Geometr.) - *Zeitschrift der Wiener Entomologen-Vereines*, 25: 118-122.

1352 BOURSIN C. 1940 - Contribution à l'Etude des Agrotidae-Trifinae XXV. *Rhyacia palaestinensis* Kalchb., *Rhyacia pulverea* Hps., *Rhyacia* v. *elutior* Alph., et leurs rapports avec *Rh. xanthographa* Schiff. - *Revue française d'Entomologie*, VII (I): 86-93.

1353 BOURSIN C. 1940 - Contributions à l'Étude des "Agrotidae - Trifinae", XXIX. I. Note sur deux *Bryophila* nouvelles pour la faune française, avec description d'une espèce nouvelle. II. Description d'une *Bryophila* nouvelle du Maroc - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 9 (7-10): 109-113.

1354 GARAVAGLIA E. 1940 - Una nuova razza di *Parnassius mnemosyne* L. - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXII (7): 98.

1355 GOIDANICH A. 1940 - A proposito della Zigena della vite (*Theresimina ampelophaga* Bayle-Barelle) in Italia - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXII (1): 3-9.

1356 HELBIG R. 1940 - Einige bemerkenswerte Noctuiden aus den Abruzzen (Lepidopt.) - *Entomologische Zeitschrift*, 54: 55-56.

1357 HELBIG R. 1940 - Ein kurzer Beitrag zur Makrolepidopteren-Fauna Südtirols und Beschreibung einer neuen Form von *Crocallis elinguaria* L.: *prunarioides* var. nova - *Entomologische Zeitschrift*, 53 (33): 285-288.

1358 MELIS A. 1940 - Contributo alla conoscenza del Bombice del Pino (*Dendrolimus pini* L.) - *Redia*, Firenze, 26: 73-175.

1359 MONASTERO S. 1940 - Un decennio di osservazioni entomologiche sui principali insetti nocivi della Sicilia 1929-1939 - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XLI, N. 4: 27 pp.

1360 PROLA G., PROLA G., HARTIG F. 1940 - Una nuova *Erebia* raccolta sul Gran Sasso (Lepid. Satyr.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXII (8): 114-116.

1361 REBEL H. 1940 - Zur Kenntnis einiger Subfamilien der Psychiden - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 25 (3): 59-65; (4): 73-76, Taf. XI.

1361bis ROCCI U., TACCANI C. 1940 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Lago Maggiore - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XIX: 29-69.

1362 VENTURI F. 1940 - Contributi alla conoscenza dell'Entomofauna delle Graminacee. VI - *Redia*, Firenze, 26: 27-70.

1363 VERITY R. 1940 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. I. Hesperides - Ed. Marzocco, Firenze, 128 pp., Tavv. 1-4, I-II.

1364 WARNECKE G. 1940 - Zur Kenntnis der *Dyscia* (Lep. Geometr.) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 30 (3): 1047-1051, 31: Tav. 4.

1365 AGENJO R. 1940 - Monografía de la familia Thaumetopoeidae (Lep. - *Eos*, Madrid, 17: 69-129.

1365bis DAVENPORT D. 1941 - The butterflies of the satyrid genus *Coenonympha* - *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at*

Harvard College, in Cambridge, 87: 213-249 e la bibliografia da 335 in poi.

1366 LOEBEL F. 1941 - Die Rebelien Mitteleuropas - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 26: 271-282.

1367 MENHOFER H. 1941 - *Cosymbia quercimontaria* Bastelb. - ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung (Lep.) - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 26 (5): 137-144.

1368 MORETTI G. 1941 - Interventi d'urgenza contro la *Stilpnotia* del salice - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura*, XI: 75-88.

1369 REISS H. 1941 - Über einige neue europäische und asiatische Zygaenenrassen (Lep.) - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 26: 58-64.

1370 ROCCI U. 1941 - Sulla presenza in Piemonte della *Syntomis marjana* Stauder (Lepidopt. - Syntomidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXIII (9): 132-137.

1370bis ROMEI L. 1941 - Sulle *Zizera lysimon* Hübner e *Zizera minima* Fuesslin (Lepid. Lycaen.) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 73 (4-5): 62-63.

1371 SILVESTRI F. 1941 - Contribuzioni alla conoscenza degli insetti dannosi e dei loro simbionti. VI. La Falena brumale o la Brumale (*Operophthera brumata* L.) - *Bollettino R. Laboratorio di Entomologia Agraria di Portici*, V: 61-120.

1372 STERNECK J. 1941 - Versuch einer Darstellung der systematischen Beziehungen bei den palaearktischen Sterrhinae (Acidaliinae). Studien über Acidaliinae (Sterrhinae) IX. III. Teil: Die Gattung *Rhodostrophia* und deren nahe Verwandte - *Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines*, 26 (6): 150-159, (7): 176-183, (8): 191-197.

1373 WARNECKE G. 1941 - Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis *der Dyscia conspersaria* F.-Gruppe (Lep. Geometr.) - *Zeitschrift der Wiener Entomologen-Vereines*, 26: 208-211, 231-235, 241-246.

1374 AGENJO R. 1941 - Acerca del verdadero concepto de la razza *angelica* Boisd., de *Arctia villica* (L.) y de la validez especifica de *Hyphoraia testudinaria* (Fourcr.), *Hyphoraia dejani* (Godt.) y *Chelis simplonica* (Boisd.) (Lep. Arct.) - *Eos*, Madrid, 18: 347-380.

1375 BERIO E. 1942 - Descrizione di una nuova aberrazione di eritrismo di *Melitaea didyma* Ochs. e di un esemplare asimmetrico della stessa specie - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXIV (8): 97-100.

1376 BERIO E. 1942 - Diagnosi di due nottue paleartiche (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXIV (9): 125-126.

1377 HEYDEMANN F. 1942 - Zur morphologie und anatomia der gattungen *Procus* Oken und *Miana* Stephens (Lep. Noct.). II. Beitrag - *Stettiner entomologische Zeitung*, 103: 3-28, 4 tav.

1378 MENHOFER H. 1942 - Zur Verbreitung der *Cosymbia quercimontaria* Bast. (Erwiderung und Nachträge) - *Zeitschrift der Wiener Entomologen-Vereines*, 27 (7): 161-166.

1379 MENHOFER H. 1942 - Gehört *Cosymbia ruficiliaria* H. S. zum mediterranen oder orientalischen Faunenelement? (Ein Beitrag zu ihrer Verbreitung) - *Zeitschrift der Wiener Entomologen-Vereines*, 27 (12): 283-287.

1380 MENOZZI C. 1942 - Animali e Vegetali dannosi alla barbabietola da zucchero e mezzi per combatterli - Pubblicata a cura della Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero di Genova, 211 pp.

1381 ROCCI U. 1942 - Su di una nuova forma primaria di *Melitaea athalia* Rott. (Lepidoptera - Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXIV (10): 127-132.

1382 ROCCI U. 1942 - Forme piemontesi del Genere *Zygaena* Fabr. (Lepidoptera - Zygaenidae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, XIII (1941): 110-132.

1383 ROMEI L. 1942 - Prima esplorazione entomologica del Parco Nazionale del Circeo. Lep. Ropaloceri - C.N.R., Tip. Spadafora, Salerno, pp. 123-144.

1384 SCHWINGENSCHUSS L. 1942 - Eine Falterausbeute aus Sizilien. I. Teil. Macrolepidoptera - *Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines*, 27 (8): 177-184; (9): 222-224; (10): 244-249.

1385 BEURET H. 1942 - *Philotes vicrama* Moore, eine für die Schweiz neue Lycaenide (?) - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XVIII (12): 523-525.

1386 HOLIK O. 1943 - Verbreitung und Variation der *Zygaena scabiosae* Schev., südlich des Alpenkammes - *Deutsche entomologische Zeitschrift "Iris",* 57: 41-55.

1387 HOLIK O. 1943 - Neue Rassen und Formen von *Zygaena meliloti* Esp. - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 28: 131-135.

1388 MARIANI M. 1943 - Fauna Lepidopterorum Italiae. Parte I. Catalogo ragionato dei Lepidotteri d'Italia - *Giornale di scienze naturali ed economiche*, Palermo, XLII (1940-41), Mem. N. 3, 237 pp.

1389 MENHOFER H. 1943 - Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung der Gattung *Cosymbia*. Die Verbreitung der *Cosymbia orbicularia* Hbn. (Lep. Geom.) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 28: 186-196.

1390 ROMEI L. 1943 - Le Farfalle diurne dell'Alto Appennino - *Atti della Società toscana di Scienze Naturali residente in Pisa*, 52: 1-22.

1391 STORACE L. 1943 - Note su alcune forme di Lepidotteri - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XXII: 74-88.

1392 VERITY R. 1943 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. II. Lycaenida - Ed. Marzocco, Firenze, 401 pp., Tavv. 5-19, III-IX.

1393 BALLI A. 1943 - Ricerche morfologiche e biologiche su *Thais polyxena* Schiff. - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, LXXV: 282-299.

1394 BALLI A. 1944 - Ricerche biologiche su *Vanessa io* L. - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, LXXV: 76-97.

1395 BALLI A. 1944 - Osservazioni ed esperienze sulla vita sessuale di Saturnia pyri Schiff. - *Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*, LXXV: 225-241.

1396 HERBULOT C. 1944 - Une nouvelle forme de *Gnophos tibiaria*, Rbr. (Lep., Geometridae) - *Miscellanea entomologica*, 41: 66-69.

1397 HEYDEMANN F. 1944 - Zur Kenntnis der Gattung *Aplecta* Guen. und zweier "Dualspezies" in derselben. (Lep. Noct.) - *Stettiner entomologische Zeitung*, 105: 11-33, 7 Tavv.

1398 JOHNSON G.F. 1944 - Notes on some Lepidoptera of an Italian garden - *The Entomologist*, 77: 149-154.

1399 LEMPKE B.J. 1944 - On some forms and races of *Phragmatobia fuliginosa* (L.) (Lep. Arct.) - *Eos*, Madrid, 20 (1/2): 31-64.

1400 ROCCA L. 1944 - Su alcune forme di Lepidotteri diurni italiani - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XXIII: 19-25.

1401 BEER S. 1944 - Osservazioni sulle variazioni di colore della larva di *Zerynthia hypsipyle* Schulze - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano*, LXXXIV: 114-124.

1402 BEER S. 1945 - Ricerche sulla biologia di *Zerynthia hypsipyle* Schulze (Lep. Papilionidae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, 25: 34-73.

1403 MELIS A. 1946 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante gli anni 1945-1946 - *Redia*, Firenze, 31, Appendice: XXV-XXXI.

1404 QUERCI O., BEER S. 1946 - The *Parnassius apollo* L. from the Abruzzi - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 58: 9-12.

1405 ROCCA L. 1946 - Aberrazioni cromatiche nuove o poco note di Lepidotteri diurni italiani - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXVI (5-6): 35-37.

1406 VERITY R. 1946 - Descrizione ed ordinamento naturale di alcune razze del genere *Anthrocera* Scop. (= *Zygaena* F.) (Lepidoptera Anthroceridae = Zygaenidae) - *Redia*, Firenze, 31: 55-83.

1407 VERITY R. 1946 - Rassegna delle specie italiane della tribù Adscitidi (= genere *Procris* F. olim) (Lepidopt. Anthrocerides = Zygaenides) - *Redia*, Firenze, 31: 123-162.

1408 HARTIG F. 1946 - Lepidotteri. In: Castellani O., Primo contributo alla conoscenza della fauna entomologica del Matese - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, II (4): 30-31.

1409 MELIS A. 1947 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1947 - *Redia*, Firenze, 32, Appendice: XXV-XXX.

1410 RUSSO G. 1947 - La Zigena della vite nell'Isola d'Elba (*Theresimina* (= *Ino*) *ampelophaga*) (Lepidottero Zygaenidae. Nota biologica - *Annali della Facoltà Agraria*, N. S., VIII (XLVI dalla fondazione), Pisa: 51-55.

1411 VERITY R. 1947 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. III. Papilionida (Papilionidae e Pieridae) - Ed. Marzocco, Firenze, 318 pp, Tavv. 20-37 e X-XIV.

1412 AGENJO R. 1947 - Sobre la morfologia y distribuciòn geogràfica de *Issoria lathonia* (L.) en España (Lep. Nymph.) - *Eos*, Madrid, 24 (1): 29-55.

1413 BOSELLI F. 1948 - Malattie e parassiti delle piante, osservati in Sardegna nel 1947. Malattie e parassiti delle piante ortensi - *Agricoltura Sarda*, Cagliari, XXV (7): 209-213.

1414 CIAMPOLINI M. 1948 - Contributo alla conoscenza morfologica e biologica della *Diloba coeruleocephala* L. (Lepidoptera Noctuidae) - *Redia*, Firenze, 33: 143-189.

1415 DE TOGNI A. 1948 - Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F. P. Pomini. VII. Ropaloceri - *Acta Pontificia Academia Scientiarum*, XII, N. 28: 331-346.

1416 DE TOULGOËT H. 1948 - Chasses de nuit aux Cols du Galibier et du Lautaret (Hautes - Alpes) - *Revue française de Lépidoptérologie*, XI-XII: 265-272.

1417 HARTIG F. 1948 - *Hesperia* (*Sloperia*) *proto* O. - Vrty. Farf. diurne I., 83 - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, III (2/4): 29-30.

1418 HARTIG F. 1948 - *Cucullia formosa* Roghf. nuova per l'Italia - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, III (2/4): 30.

1419 MARIANI M. 1948 - Fauna Lepidopterorum Siciliae. I Addenda - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXVIII (1-2): 15-16.

1420 MELIS A. 1948 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1948 - *Redia*, Firenze, 33, Appendice: XXI-XXVII.

1421 PARDI L. 1948 - *Abraxas pantaria* (L.) defogliatrice del frassino - *Atti Società Toscana di Scienze Naturali*, Pisa, LV (ser. B): 156-160.

1422 PRINCIPI M.M. 1948 - Gli insetti più comunemente dannosi alle Papilionacee (Leguminose) foraggere - *Osservatorio fitopatologico (sezione di Entomologia) annesso all'Istituto di Entomologia dell'Università, Bologna, Circolare N. 8, 12 pp, 7 figg.*

1423 ROCCA L. - 1948 - Faunula Segusina (Lepidotteri diurni) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXVIII (5-6): 45-48.

1424 STORACE L. 1948 - Sull'esistenza in Liguria di alcuni Lepidotteri di provenienza africo-iberica - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXVIII (7-10): 55-58.

1425 THURNER J. 1948 - Die Schmetterlinge Kärnterns und Osttirols - *Carinthia*, (2) Sonderheft 10: 1-200.

1425bis ASTFÄLLER B. 1948 - Der Vinschgau - eine Schmetterlinginsel - *Der Schlern*, 23 (4): 140-142.

1426 DE TOGNI A. 1949 - Su alcuni *Parnassius apollo* L. del Parco Nazionale del Gran Paradiso - *Acta Pontificia Academia Scientiarum*, XIII (10): 97-112, 2 Tavv.

1427 FIORI A., GALASSI R. 1949 - Appunti sulla biologia della larva di *Zerynthia hypsipyle* Schulze (Lepidoptera: Papilionidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 79 (3-4): 21-22.

1428 HARTIG F. 1949 - Nuove specie e forme italiane di Lepidotteri - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia*, 4 (1-2): 2-3.

1429 MARIANI M. 1949 - Elementi faunistici mediterranei di ordine entomologico - *Plinia*, II (1): estr. 8 pp.

1430 MELIS A. 1949 - Elenco delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1949. Lepidotteri - *Redia*, Firenze, 34, Appendice: XXV-XXVII.

1431 ROCCI U., TACCANI C. 1949 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Lago Maggiore. II parte - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 79 (1-2): 2-10.

1432 SIEDER L. 1949 - *Fumea* (nec *Psychidea*) *raiblensis* Mann (Neubeschreibung des Weibchens, der Raupe und des Sackes) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 34: 9-13.

1433 STORACE L. 1949 - Diffusione in Liguria di *Charaxes jasius* L. (Lepidoptera: Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXIX (7-10): 79-82.

1433bis BURMANN K. 1950 - Wo hat *Isturgia carbonaria* Cl. ihre Nord- und Ostgrenze der Alpinen Verbreitung? (Macrolepidoptera, Geometridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, XL (1): 175-180.

1434 DATHE H. 1949 - *Samia cynthia* Walk. in Venetien - *Entomologische Zeitschrift*, 21: 161-162.

1435 GRIESHEIM, VON, I. 1950 - *Anthocharis damone* im Ätnagebiet - *Entomologische Zeitschrift*, 60 (4): 25-29.

1436 HIGGINS L.G. 1950 - A descriptive catalogue of the Palaearctic *Euphydryas* (Lepidoptera: Nymphalidae) - *The Transactions of the Royal Entomological Society of London*, 101 (12): 435-499.

1437 KAUFFMANN G. 1950 - Ulteriori osservazioni biotopiche e genitoanatomiche su *Pyrgus alveus* Hübner, 1803 nella zona dei tre laghi prealpini (Lario, Ceresio, Verbano) (Lep. Hesperiidae) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XXIX: 117-124.

1438 KLIMESCH J. 1950 - Contributo alla Fauna Lepidotterologica del Trentino - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XXXVII (1-3): 11-78.

1439 REALI G. 1950 - Esperimenti di lotta contro *Stilpnotia salicis* L. mediante prodotti a base di D.D.T. - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura*, XVI (1): 3-10.

1440 ROCCA L. 1950 - Appunti critici su "Lepidoptera Pedemontana" di L. De Prunner - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXX (9-10): 82-88.

1441 SANFILIPPO N. 1950 - Le grotte della provincia di Genova e la loro fauna - Club Alpino Italiano, Memorie del Comitato Scientifico Centrale, N. 2, Genova, Tip. F.lli Pagano, 96 pp., 2 figg., 2 tavv.; Lepidotteri pp. 62-63.

1442 STORACE L. 1950 - Note di Lepidotterologia - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXX (1-2): 15-16.

1443 VERITY R. 1950 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. IV. Papilionida (Libytheina, Danaina e Nymphalina: Apaturidae e Nymphalidae) - Ed. Marzocco, Firenze, 380 pp, Tavv. 38-54, XV-XX.

1444 MARIANI M. 1950 - Ancora sulla variabilità del *Parnassius apollo siciliae* Obth. III nota - *Parnassius apollo* razza *siciliae* ab. *lavagnonoi* nova (Lepidoptera - Papilionidae) - *Plinia*, Palermo, III, nota II: 3 pp.

1445 BERIO E. 1950-1951 - Segnalazioni di interessanti catture di Lepidotteri in Italia (Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXI (8-10): 83-85.

1446 BERNARDI G. 1951 - Notes sur la nomenclature des Lycaenidae (Lep. Rhopalocera) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, LVI (2): 30.

1447 BERNARDI G., DE LESSE H. 1951 - Les types de Nymphalidae paléarctiques du Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, LVI (11): 136-143.

1448 BOSELLI F. 1951 - La situazione fitopatologica della Sardegna - *Ortofrutticoltura in Sardegna*, Cagliari: 69-87, 10 figg.

1449 BOURSIN C. 1951 - Description d'une *Hadena* Schrk. nouvelle des Pyrénées orientales françaises (Lep. Phalaenidae = Agrotidae) (Contributions à l'Étude des Agrotidae Trifinae, XLVIII) - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XXIV (4): 401-410.

1450 BOURSIN C. 1951 - Eine seit 175 Jahren verkannte europäische *Derthisa* - Art. (Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae - Trifinae, XLVII) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 36: 44-51.

1451 BURGEFF H. 1951 - Die Meeralpengrenze der Zygaenen (Lep.), eine mit Hilfe der Populationsanalyse der Arten der Gattung *Zygaena* (Lepidoptera) durchgeführte Untersuchung über die lokalisation und die Bedeutung geographischer Rassen in ihrem Zusammenhang mit der Eiszeit - *Biologisches Zentralblatt*, 70 (1/2): 1-23.

1452 CONCI C. 1951 - Contributo alla conoscenza della speleofauna della Venezia Tridentina - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XXX: 5-76.

1453 FOCARILE A. 1951 - Alcune cavità dell'altipiano del Maltese (sic) (Molise) e delle Murge Centrali (Puglia) - *Rassegna Speleologica Italiana*, III (3): 77-81.

1454 FREDIANI D. 1951 - Contributo alla conoscenza della *Sesamia cretica* Led. (Lepidoptera - Noctuidae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici*, XI: 51-98.

1455 KAUFFMANN G. 1951 - Die Hesperiidae der Schweiz. Rassenanalytische Bemerkungen über Verbreitung und Formen dieser Familie - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XXIV (4): 329-376.

1456 KESSLER P. 1951 - Eine neue Form von *Parasemia plantaginis* L. (Lep. Arctiidae) - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, XXIV (4): 411-412.

1457 MELIS A. 1951 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1950 - *Redia*, Firenze, 36, Appendice: III-XVIII.

1458 PARENZAN PIETRO 1951 - Stato attuale delle conoscenze sulla spelebiologia dell'Italia meridionale - Atti del V Congresso Nazionale di Speleologia, Salerno: 89-98.

1458bis PARENZAN PIETRO 1951 - Ricerche biologiche nel sistema di grotte a galleria “alle Fontanelle” (Penisola Sorrentina) - *Bollettino della Società dei Naturalisti*, Napoli, LX: 67-69.

1458ter PEPE G. 1951 - La Processionaria del pino - *Monti e boschi,* II (2): 51-58.

1459 POVOLNY D., SMELHAUS J. 1951 - Novy prispevek k poznani rodu *Procris* Fabr. - *Vestnik Ceskol. zoologické Spolecnosti*, 15: 147-200.

1460 QUERCI O. 1951 - Zygaenides, Hesperides e Rhopalocera del massiccio della Meta - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria di Portici*, 10: 108-130.

1461 QUERCI O. 1951 - Scarcity and Abundance of Insects in Southern Latium in 1950 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, LXIII (9): 167-168.

1462 ROCCA L. 1951 - Sulla identità di alcune specie di Lepidotteri diurni italiani, e sulla toponomastica in "Lepidoptera Pedemontana" di L. De Prunner - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXI (5-7): 56-61.

1463 SIEDER L., LOEBEL F. 1951 - *Psychidea bombycella* Schiff. und ihre Rassen - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 36: 33-44.

1464 SILVESTRI F. 1951 - Lepidoptera - *Bollettino del R. Laboratorio di Entomologia Agraria di Portici*, X: 135-181.

1465 STORACE L. 1951 - Su alcune specie italiane di *Anthrocera* Scop. (Lepidoptera Anthroceridae = Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXI (1-2): 10-17.

1466 STORACE L. 1951 - Su alcune forme del genere *Parnassius* Latr. (Lepidoptera, Rhopalocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXI (8-10): 81-83.

1467 WOLFSBERGER J. 1951 - Ein Beitrag zur Biologie von *Biston* (*Poecilopsis*) *isabellae* Harr. und hire Verbreitung in den Alpen - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 41: 210-216.

1468 ZANGHERI S. 1951 - Contributi alla conoscenza dell'Entomofauna delle Leguminose da seme. I. Nota preventiva sull'Entomofauna del Pisello e della Fava - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, XVIII (1950-1951): 93-116.

1469 BONGIOVANNI G. C. 1951 - La *Laphygma exigua* e la barbabietola - *Informatore fitopatologico*, II (23-24): 177-181.

1470 BOURSIN C. 1952 - Trois "Trifinae" nouvelles pour la faune française avec description de deux races nouvelles (Contributions à

l'Étude des "Agrotidae - Trifinae", LIV) - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 21 (7): 160-164.

1471 BOURSIN C. 1952 - Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, XLIX. Synonymie-Notizen nebst verschiedenen Bemerkungen, III - *Zeitschrift für Lepidopterologie*, Krefeld, 2 (1): 49-68.

1472 CARILLI A. 1952 - La Sesamia e la Piralide. Note biografiche, infestazione e danni da loro causati alle coltivazioni di granturco in provincia di Salerno - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici*, XI: 99-108.

1473 DANIEL F. 1952 - *Dasychira fascelina* L. et ses formes en Europe (Lep. Lymantriidae) - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 74-78.

1474 GIUNCHI P. 1952 - Contributi alla conoscenza dell'Entomofauna dell'Erba Medica. I. (Nota preventiva) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia dell'Università di Bologna*, XIX: 1-30.

1475 HARTIG F. 1952 - Contributo alla conoscenza della Fauna Lepidotterologica del Renon presso Bolzano - *Studi Trentini di Scienze Naturali*, XXIX (1/2): 54-55.

1476 HARTIG F., AMSEL H.G. 1952 - Lepidoptera sardinica - *Fragmenta entomologica*, Roma, 1 (1): 160 pp (1951).

1477 LORKOVIC Z. 1952 - Beiträge zum Studium der Semispecies. Spezifität von *Erebia styrius* Godt. un *Erebia styx* Frr. (Satyridae) - *Zeitschrift für Lepidopterologie*, Krefeld, 2 (3): 159-172, 2 Tavv., 2 figg.

1478 MELIS A. 1952 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1951 - *Redia*, Firenze, 37, Appendice: XVII-XXXIV.

1479 MONASTERO S. 1952 - Secondo decennio di osservazioni entomologiche sui principali insetti nocivi della Sicilia (1940-1950) - *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo*, Serie IV, XII (I): 5-38.

1480 ROELL L. 1952 - Sammeltage in den Süd- und Ostalpen (Bolzano, Gorizia) - *Entomologische Zeitschrift*, 62 (10): 73-80, (11): 85-88, (12): 91-94, (13): 103-104.

1481 ROMEI L. 1952 - The Scarcity of Insects in Southern Latium (Central Italy) in 1951 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, LXIV (1): 8-9.

1482 ROTA P. 1952 - Grave infestazione di *Laphygma exigua* Hb. nel Mantovano nell'estate 1952 (Lepid. Noctuidae) - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura*, 19 (1): 11-24.

1483 ROTA P. 1952 - Infestazione di Agrotidi nella Pianura Padana nel 1952 - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura*, 19 (1): 25-38.

1484 SCOGNAMIGLIO A. 1952 - Un attacco di *Cossus cossus* L. a piante di Pesco - *Bollettino del R. Laboratorio di Entomologia Agraria di Portici*, XI: 183-192.

1485 STORACE L. 1952 - Su alcune Lycaenidae italiane specialmente della zona di Arquata Scrivia (Piemonte) (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XXXI: 132-154.

1486 ZANGHERI S. 1952 - Le agrotidi della barbabietola - *Informatore fitopatologico*, II (10): 76-78.

1487 HOLIK O. 1952 - Die Nahrungspflanzen der Zygaenenraupen und ihre Bedeutung für die Unterteileung der Gattung *Zygaena* Fabr. - *Entomologische Zeitschrift*, 62 (19): 142-144 (1952), (20): 153-159, (21): 182-184; (24): 189-191 (1953); 63 (1953) (1): 3-6, (2): 14-16, (3): 20-32, (4): 38-40, (5): 55-56, (6): 70-71.

1488 BERNARDI G., DE LESSE H. 1952-1953 - Les types de Nymphalidae paléarctiques du Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (Lep.) 2° Note - *Bulletin de la Société entomologique de France*, LVIII (12): 154-160.

1489 MARTELLI M. 1953 - Corologia di due Lepidotteri endofiti del Granoturco (*Zea mays* L.) - *Studi Sassaresi*, Sez. III, I: 179-184.

1490 MELIS A. 1953 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1952 - *Redia*, Firenze, 38, Appendice: XXVII-XXXIII.

1491 PARENZAN PIETRO 1953 - Stato attuale delle conoscenze sulla speleobiologia dell'Italia meridionale - Premier Congrès International de Spéléologie, Paris, Tome III; Sec. 3: 135-150.

1492 PINKER R. 1953 - Studien über die *Cidaria olivata* Schiff. - Gruppe. (Larentiinae. *Cidaria* Tr. Subgenus: *Calostigia* Hbn. Abt. A) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 38 (1): 31-35.

1493 PINKER R. 1953 - Beobachtungen in den Julischen Alpen - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 38 (7): 177-181.

1494 RUNGS C. 1953 - Le complexe de *Leucania loreyi* auct. nec Dup. (Lep. Phalaenidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France*, 9: 138-141.

1495 SIEDER L. 1953 - Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporiinae) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 64 (5): 113-128.

1496 STORACE L. 1953 - Su alcuni Ropaloceri liguri poco noti (Lepidoptera, Diurna) - *Memorie della Società entomologica italiana*, Genova, XXXII: 108-118.

1497 VERITY R. 1953 - Le Farfalle Diurne d'Italia. Vol. V. Papilionida (Nymphalina, Satyridae) - Ed. Marzocco, Firenze, 354 pp., Tavv. 55-74, XXI-XXVI.

1498 WARREN R.G. 1953 - Three unrecognised species of the genus *Pyrgus* - *The Entomologist*, 86: 90-103.

1499 ZOCCHI R. 1953 - Note biologiche sulla *Theresimina ampelophaga* Bayle-Barelle - *Redia*, Firenze, 38: 238-246.

1500 ALBERTI B. 1953 - Über die stammesgeschichtliche Gliederung der Zygaenidae nebst Revision einiger Gruppen (Insecta, Lepidoptera) - *Mitteilungen aus dem zoologischen Museum in Berlin*, 30 (2): 115-480, Tavv. I-LXI.

1501 BIGOT L., STEMPFFER H. 1954 - Un Lycène nouveau pour la fauna Européenne: *Zizera karsandra* Moore - *Revue française de Lépidoptérologie*, 13-14: 123-130.

1502 BROS DE PUECHREDON E. 1954 - Lépidopteres de la Tremezzina (Lac de Côme) - *Revue Française de Lépidoptérologie*, XIV (15/17): 211-217.

1503 DANIEL F. 1954 - Untersuchung der Typen von *Endrosa pseudokuhlweini* Vorbr. (Lep. - Het.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 3 (5): 52-54.

1504 GIRALDI G. 1954 - Rilievi sul comportamento dei bruchi di *Lithosia* (*Ilema*) *caniola* Hb. - *Notiziario sulle malattie delle piante*, Pavia, 29 (N. S. 8): 7-15.

1505 KAUFFMANN G. 1954 - Razze di *Pyrgus carlinae* Rambur, 1839, in Italia con alcune note complementari sulla specie (Lep. Hesperiidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXIV (9-10): 137-142.

1506 LORKOVIC Z., DE LESSE H. 1954 - Nouvelles découvertes concernant le degré de parenté d'*Erebia tyndarus* Esp. et *E. cassioides* Hohenw. - *Lambillionea*, LIV (9-10): 58-67; (11-12): 78-86.

1507 MARTELLI M. 1954 - La Nottua minatrice del Carciofo in Sardegna - *Studi Sassaresi*, Sez. III, II: 23-49.

1508 MELIS A. 1954 - Rassegna delle principali specie animali che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1953 - *Redia*, Firenze, 39, Appendice: III-X.

1509 OBRAZTSOV N.S. 1954 - Revision der palaearktischen Arten der Gattungen *Nycteola* Hb. und *Erschoviella* Gen. nov. (Lepidoptera, Nycteolidae) - *Eos*, Madrid, XXIX (1953): 143-172.

1510 PERNA G., TOMASI G. 1954 - Studio di un complesso carsico presso S. Giacomo in Val di Sole - *Studi trentini di Scienze Naturali*, XXXI (1-2): 25-49.

1511 SCHÜTZE E. 1954 - Eupithecien-Studien III (Lep. Geom.*). Eupithecia egenaria* HS - *Abhandlungen und Bericht LIX des Vereins für Naturkunde zu Kassel e. V.*: 1-9.

1512 SCHWINGENSCHUSS 1954 - Interessante Heterocerenformen aus meiner Sammlung - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 40 (6): 219-219.

1513 WOLFSBERGER J. 1954 - *Hadena* (*Mamestra*) *texturata kitti* Schaw. in den Alpen - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 39: 115-122, Tav. 10.

1514 DANIEL F. 1954 - Monographie der paläarktischen Cossidae I. (Lep.-Het.). Kritische Beurteilung der bisher dem Genus *Stygia* Latr. zugeteilten Arten - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 44-45: 159-181.

1515 AUBERT J.F. 1954-1955 - Révision preliminaire du genre *Entephria* Hb. Description d'un genre nouveau pour *uncinata* Pglr. et quelques précisions concernent une espèce nouvelle pour la faune italienne - *Revue française de Lépidoptérologie*, XV (3): 62-69.

1516 BERIO E. 1955 - Sulla distribuzione geografica della *Noctua algira* L. e sulle specie affini (Lep. Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXV (9-10): 140-148.

1517 BEURET H. 1955 - *Zizeeria karsandra* Moore in Europa und die systematische Stellung der Zizeerinae (Lepidoptera, Lycaenidae). *Zizeeria karsandra* Moore in östlichen Mittelmeer & Berichtigung und Ergänzung - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, N.F., 5 (9): 123-130, 3 Tavv. & 146.

1518 BOSELLI F. 1955 - Prove di lotta mediante l'elicottero contro il Bombice dispari (*Lymantria dispar*) e il Bombice gallonato (*Malacosoma neustria*) nelle sugherete della Sardegna - *Ann. Sper. Agr.*, suppl. vol. IX, n. 3, pp. XVII-L.

1519 BOURSIN C. 1955 - Die *Apopestes* Hb.- und *Autophila* Hb.-Arten aus Dr. h. c. H. Höones China-Ausbeuten). (Beitrag zur Fauna Sinica). (Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXI (71)) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 40: 164-171.

1520 BURMANN K. 1955 - *Endrosa teriolensis* nov. spec. Eine neue Lithosiinae aus Nordtirol (Lepidoptera, Arctiidae) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 40 (66 Vol.) (2): 33-41.

1521 CIAMPOLINI M. 1955 - Note sulla morfologica e sulla biologica dell'*Amathes lychnidis* F. (Lepidoptera Noctuidae) - *Redia*, Firenze, 40: 325-345.

1522 DANIEL F., WOLFSBERGER J. 1955 - Die Föhrengebiete des Alpenraumes als Refugien wärmeliebender Insekten. I. Der Kaunerberghang im Oberinntal - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 40: 13-22, 49-71, 103-110, 130-135.

1523 FORSTER W., WOHLFAHRT T.A. 1955 - Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band II. Tagfalter. Diurna (Rhopalocera und Hesperiidae) - Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 126 pp., 28 Taff.

1524 FRANCISCOLO M.E. 1955 - Lepidoptera. In: Res Ligusticae XCIV - Fauna cavernicola del Savonese - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, Genova, LXVII: 152-157.

1525 FREDIANI D. 1955 - Notizie sulla *Stilpnotia Salicis* L. ed alcuni suoi parassiti ed iperparassiti nella Toscana litoranea - *Annali Facoltà di Agraria*, Pisa, XVI (LIV dalla fondazione): 47-53.

1526 HIGGINS L.G. 1955 - A descriptive catalogue of the genus *Mellicta* Billberg (Lepidoptera: Nymphalidae) and its species, with supplementary notes on the genera *Melitaea* and *Euphydryas* - *The Transactions of the Royal Entomological Society of London*, 106 (1): 1-131.

1527 KAISILA J. 1955 - *Philotes vicrama* Moore (Lep., Lycaenidae) in Finnland - *Annales Entomologici Fennici*, 21 (1): 9-12.

1528 KUSDAS K., THURNER J. 1955 - Beitrag zur insektenfauna der Provinz Udine (Oberitalien) - Atti del 1° Convegno Friulano di Scienze Naturali, Udine 4-5 settembre 1955: 273-334.

1529 LORKOVIC Z., DE LESSE H. 1955 - Note supplèmentaire sur le groupe d'*Erebia tyndarus* Esp. - *Lambillionea*, LV (7-8): 55-58.

1530 MELIS A. 1955 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1954 - *Redia*, Firenze, 40, Appendice: III-XII.

1531 MONASTERO S. 1955 - Il Bosco di Ficuzza minacciato dal Bombice dispari (*Lymantria dispar* L.) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia Agraria e dell'Osservatorio di Fitopatologia di Palermo*, I: 167-174.

1532 POVOLNY D., MOUCHA J. 1955 - On the high Mountain Geometridae of the Genus *Psodos* Tr. with regard to the question of the origin of species in mountain regions - *Acta Societatis entomologicaa Cechosloveniae*, LII: 183-188.

1533 ROBERTI D. 1955 - Osservazioni sulla lotta biologica contro la Processionaria del Pino - *Pubbl. dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Annali della Facoltà di Agraria*, Nuova serie, LI: 86-96.

1534 SICHEL G. 1955 - Su una nuova aberrazione di *Issoria lathonia* L. (Lepidoptera) - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania*, Serie IV, III (3): 1-3.

1535 SIEDER L. 1955 - Erster Beitrag zu "Wissenswertes über die Gattung *Epichnopteryx* Hb. (Lep. Psychidae)" - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 66: 157-164.

1536 SIEDER L. 1955 - Dritte Vorarbeit über die Gattung *Solenobia*. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporiinae). Spec. nov. Sol. *Solenobia meieri* - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 40 (1): 4-9.

1537 VESSIA R. 1955 - Primo contributo alla conoscenza del *Trichosoma baeticum* Rbr. (Lepidoptera - Arctiidae) - *Annali della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari*, IX: 5-35.

1538 ZANGHERI S. 1955 - I Lepidotteri del Promontorio del Gargano - *Commentationes Acta Pontificia Academia Scientiarum,* Città del Vaticano, XVII: 17-31.

1539 BARAJON M. 1955 - Problemi di tassonomia con particolare riferimento ai Lepidotteri nuovi o poco noti per l'Italia - *Natura, Rivista della Società Italiana di Scienze Naturali,* Milano, XLVII (4): 147-152, 3 tavv.

1540 BARAJON M. 1956 - Gen. *Siona* Dup. (= *Schistostege* Hb.) (Lep. Geometriidae) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia Naturale in Milano*, XCI (1/2): 125-126.

1541 BERIO E. 1956 - Appunti su alcune specie del genere *Calpe* Tr. (Lep. Noctuidae) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, XXXV: 109-119.

1542 BERIO E. 1956 - *Grammodes geometrica* F. e le specie affini (Lep. Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXVI (3-4): 34-43.

1543 BOURSIN C. 1956 - Qu-est-ce-que l' "*Agrotis*" *nictymera* B.? (Lep. Phal.). (Contributions à l'Étude des "Agrotidae - Trifinae", LXXIX) (Note préliminaire) - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 25 (1): 3-6.

1544 BOURSIN C. 1956 - Über "*Agrotis*" *nictymera* Boisduval nebst Angaben über die Gattung *Standfussiana* Brsn. (Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXIII (83)) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 41: 105-115.

1545 CIAMPOLINI M. 1956 - Note biologiche sulla *Brithys pancratii* Cyr. (Lepidoptera, Noctuidae) infeudata in Italia a piante del gen. *Pancratium* L. - *Redia*, Firenze, 41 (2° serie): 511-524.

1546 DANIEL F. 1956 - Die Formen von *Trichiura crataegi* L. (Lep. Lasiocamp.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 5 (7): 67-71, (8): 78-80, (9): 87-94.

1547 DE LESSE H. 1956 - Quinze jours de récoltes en Italie centrale et découverte d'*Erebia pandrose* Bkh. aux Monti della Laga - *Lambillionea*, LVI (1-2): 9-16.

1548 EISNER C. 1956 - Parnassiana Nova IX - Kritische Revision der Gattung *Parnassius* (Fortsetzung 6) - *Zoologische Mededelingen*, XXXIV (13): 201-222.

1549 FAGGIOLI D. 1956 - Campagna di ricerche dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna nella "Foresta Umbra" (Gargano). II. Elenco delle specie raccolte - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXI: 167-177.

1550 FENILI G.A. 1956 - Contributo alla conoscenza morfo-biologica della *Dicranura vinula* L. (Lepidoptera - Notodontidae) - *Redia*, Firenze, 41 (2° serie): 343-510.

1551 FIORI A., GALASSI R. 1956 - Specie di Lepidotteri raccolte durante i mesi invernali degli anni 1951-1956 sul "Colle della Guardia" (Bologna) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXI: 297-312.

1552 GIUNCHI P. 1956 - Un lepidottero poco noto ai frutticoltori - *Informatore fitopatologico*, VI (1): 8-9.

1553 GRANDI G. 1956 - Piralide e Nottua del granoturco - *Pubblicazione del Ministero Agricoltura e Foreste*, 16 pp.

1554 HEINICKE W. 1956 - Monographie über *Heliophobus* (*Hadena* - *Mamestra*) *texturata* Alpheraky, 1982 (Lep. Noctuidae) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 41: 145-159, 174-180.

1555 KOZHANCHIKOV I.V. 1956 - Fauna of the U.S.S.R. Lepidoptera. Vol. III. No. 2. Psychidae - *Zoologicheskii Akademii Nauk SSSR,* N.S. No. 62, 517 pp. (Translated from Russian. Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem, 1969, 225 pp.).

1556 MELIS A. 1956 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1955 - *Redia*, Firenze, 41, Appendice: III-XII.

1557 MELLINI E. 1956 - Studi sui Ditteri Larvevoridi. III. *Sturmia bella* Meig. su *Inachis io* L. (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna*, XXII: 69-98.

1558 MENTZER, VON, E. 1956 - *Plebejus pylaon* Fisch.-Wald. (*sephyrus* Friv.) ssp. *augustanus*, ssp. nova (Lep., Lycaenidae) - *Entomologisk Tidskrift*, 77 (2-4): 125-129.

1559 POVOLNY D., MOUCHA J. 1956 - On the high Mountain Geometridae of the Genus *Psodos* Treitschke, 1828 with regard to their species in the Mountains of Czechoslovakia and the question of the origin of a species in mountain regions - *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, XXX (1955): 143-192, 13 Tavv.

1560 SCHÜTZE E. 1956 - Eupithecien-Studien VII und VIII. VII. Die *semigraphata*-Gruppe. VIII. Über *Eupithecia mesogrammata* Dietze und einige andere Eupithecien aus Nordiran (Lep. Geom.) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, 41: 306-320, 328-339.

1561 SERVAZZI O., MARTELLI M. 1956 - Indagine sulla situazione fitosanitaria della Sardegna - *Studi Sassaresi*, sez. III, Ann. Fac. Agr., Sassari, IV: 49-144.

1562 SICHEL G. 1956 - Primo contributo alla conoscenza dei Ropaloceri della zona montana etnea - *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania*, X (1955): 121-139.

1563 STORACE L. 1956 - Note di Lepidotterologia. II - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXVI (7-8): 98-108.

1564 STORACE L. 1956 - Su alcune specie italiane di *Anthrocera* Scop. 2.a Nota (Lepidoptera Anthroceridae = Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, LXXXVI (9-10): 137-142.

1565 ZANGHERI S. 1956 - Le attuali conoscenze sui Lepidotteri del Promontorio del Gargano e delle Isole Tremiti, con osservazioni sulle specie a distribuzione transadriatica - *Memorie di Biogeografia Adriatica*, Venezia, III: 245-296.

1566 BIGOT L. 1956 - Biogèographie des Lépidoptères de Sicile (Italie) - *Vie et Milieu*, VIII: 253-264.

1567 BEURET H. 1957 - Die Lycaeniden der Schweiz - *Vol. 2.*

1567bis BOURSIN C. 1957 - Description d'une *Lithophane* nouvelle de l'Alai et de nouvelles races de *Lithophane lapidea* Hb. et *leautieri* Boisd. (Lep. Phal. Cuculliinae) (Note préliminaire). (Contributions à l'Étude des "Agrotidae - Trifinae", LXXXIX (89)) - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 26 (3): 60-65.*

1568 CARNELUTTI J. 1957 - Alpine petrophile Lepidopteren des Karstgebietes - *Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft in Graz: 506-511.*

1569 CAVALLI L.M. 1957 - Contributo alla conoscenza dell'*Earias chlorana* L. (Lepidoptera - Noctuidae) - *Acta Pontificia Academia Scientiarum,* XVI (12): 103-122.

1570 DANIEL F. 1957 - *Celama cicatricalis* Tr. und *confusalis* HS. nebst ihren Formen (Lep. Nolidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 6 (12): 113-116.

1571 DANIEL F. 1957 - *Poecilocampa populi* L. und *Poecilocampa alpina* Frey - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 6 (3): 17-22.

1572 DANIEL F., WOLFSBERGER J. 1957 - Die Föhrenheidegebiete des Alpenraumes als Refugien wärmeliebender Insekten. II. De Sonnenberghang bei Naturns im Vintschgau (Südtirol) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 47: 21-121.

1573 EISNER C. 1957 - Parnassiana Nova XII - Kritische Revision der Gattung *Parnassius* (Fortsetzung 8) - *Zoologische Mededelingen*, XXXV (4): 33-49.

1573bis EISNER C. 1957 - Parnassiana Nova XIV - Kritische Revision der Gattung *Parnassius* (Fortsetzung 9) - *Zoologische Mededelingen*, XXXV (8): 79-111, Taf. IV.

1574 EISNER C. 1957 - Parnassiana Nova XVII - Kritische Revision der Gattung *Parnassius* - *Zoologische Mededelingen*, XXXV (20): 283-298.

1575 FIORI A. 1957 - Un'Agrotina nuova per l'Italia. *Euxoa segnilis* Dup. subsp. nov. *adriatica* mihi - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXII: 185-188.

1576 FIORI A., GALASSI R. 1957 - Sul ritrovamento dell' '*Hydraecia Püngeleri*" Trti. in Liguria. (Lepidoptera Noctuidae Zenobiinae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXII: 305-306.

1577 FIORI A., GALASSI R. 1957 - Specie di Lepidotteri raccolte durante i mesi invernali sul "Colle della Guardia" (Bologna). I Addenda - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXII: 399-405.

1578 FIORI G. 1957 - "*Strymon ilicis*" Esp. (Lepidoptera Lycaenidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXII: 205-256.

1579 FIORI G. 1957 - Ricerche sulla "*Pachytelia villosella*" Ochs. e sulla "*Fumea crassiorella*" Bruand (Lepidoptera Psychidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXII: 277-303.

1580 GRANDI G. 1957 - Bozzolo metallico costruito dalla larva di una *Cerura bifida* Hbn. (Lepidoptera - Notodontidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXIII: 181-185.

1581 JANSE J.A. 1957 - *Sloperia proto* O. on the Italian Continent (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Entomologische Berichten,* 17 (1): 7-8.

1582 LOMBARDI G.M. 1957 - Su di una cattura in Torino di *Pandoriana maja* Cr. (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXVII (7-8): 130-131.

1583 MALTESE EVOLA C. 1957 - Osservazioni su: "*Barathra* (*Mamestra*) *brassicae* L." dannosa agli ortaggi della Sicilia (Nottua del cavolo . Sic. "Corioforte") - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia Agraria e dell'Osservatorio di Fitopatologia di Palermo,* II: 267-275.

1584 MARIANI M. 1957 - Alcuni elementi per lo studio della zoogeografia della Sicilia - *Bollettino di Zoologia,* XXIV: 685-698.

1585 MARIANI M., KLIMESCH J. 1957 - Fauna Lepidopterorum Siciliae (2.a addenda) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXVII (7-8): 113-117.

1586 MEIER H. 1957 - Ein neues Subgenus und neue Arten aus der Gattung *Solenobia* Dup. (Lep. Psych.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 6 (6): 55-61.

1587 MEIER H. 1957 - *Zygaena cynarae* ssp. *tolmezzana*, n. ssp. - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* VI (9): 84-87.

1588 MELIS A. 1957 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1956 - *Redia, Firenze, 42, Appendice:* III-XVII.

1589 NABDYL H. 1957 - Entomologische Ergebnisse und Reiseerinnerungen an Sardinien und Ischia - *Entomologische Zeitschrift,* 67 (12): 137-141, (13): 154-156.

1590 NADBYL H. 1957 - Auf den Spuren des *Papilio hospiton* L. in Sardinien - *Entomologische Zeitschrift,* 67 (1): 1-14.

1591 PARENZAN P. 1957 - Raccolte entomologiche eseguite nel corso della spedizione Speleologica del Bussento (Salerno) nel 1956 - *Studia Spelaeologica,* 2: 110-114, Napoli.

1592 POVOLNY D., MOUCHA J. 1957 - Kritische Bemerkungen zu einigen Geometridengattungen (Lep. Geometridae) - *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae,* XXXI: 125-144, Taff. I-VIII.

1593 SICHEL G. 1957 - Secondo contributo alla conoscenza dei Ropaloceri della zona montana Etnea. Osservazioni biometriche su *Aglais urticae* L. - *Bollettino di Zoologia*, Torino, XXIV (2): 195-200.

1594 SICHEL G. 1957 - Sottospecie di *Pyrgus malvoides* Elw. - Edw. (Lepidoptera - Hesperidae) in Italia - *Giornale di scienze naturali ed economiche,* Palermo, XXXIX, Mem. n. 3 : 39-45 *& Bollettino di Zoologia,* XXVIII (1961): 39-45.

1595 WOLFSBERGER J. 1957 - Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung von *Cidaria lugdunaria* HS. (Lep. Geom.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 6 (12): 120-121.

1596 WOLFSBERGER J. 1957 - Neue Fundorte von *Hadena texturata* kitti Schaw. in den Alpen - (Lep. Noct.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 6 (10): 97-101.

1597 MARTELLI M., ARRU G.M. 1957 - Ricerche preliminari sull'entomofauna della Quercia da sughero ("*Quercus suber*" L.) in Sardegna - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, vol. I: 5-49.

1598 BACCETTI B. 1957-1958 - La biologia di un Nottuide dannoso all'agricoltura. *Autographa* (= *Plusia*) *gamma* L. - *Rivista dell'Ortoflorofrutticoltura Italiana,* Anno 83°, XLII (9-10): 3-11.

1599 BESANA C. 1958 - Note sui lepidotteri al Parco Naz. Gran Paradiso - *"Pro Natura", Unione Italiana per la Protezione della Natura,* Milano, VII (20): 14-15.

1600 BONGIOVANNI G.C. 1958 - Osservazioni sulla "*Barathra brassicae*" L. e su un comportamento allotrofico delle sue larve - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXIII: 87-92.

1601 CAVALLI L.M. 1958 - Contributo alla conoscenza dell'*Earias chlorana* L. - *Pubbl. dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Annali della Facoltà di Agraria,* Nuova serie, LVI: 118-125.

1602 CAVALLI L.M., OTTOLINI P. 1958 - Notizie morfo-biologiche sulla '*Dyspessa ulula*' Borkh. (Lepidoptera Cossidae) - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 1: 133-149.

1603 DUFAY C. 1958 - Révision des *Nycteola* Hübner (*Sarrothripus* Curtis) paléarctiques (Lep. Noctuidae Nycteolinae) - *Annales de la Société entomologique de France,* 127: 107-132.

1604 EISNER C. 1958 - Parnassiana Nova - Kritische Revision der Gattung *Parnassius* - *Zoologische Mededelingen,* 36: 1-5, 5-232, 77-82, 86-112, 129-141.

1605 LEMPKE B.J. 1958 - Notes on some species of *Nycteola* Hb. (Lep., Noctuidae) - *Entomologische Berichten*, 18 (8): 161-164.

1606 MELIS A. 1958 - Rassegna delle principali specie di insetti che hanno prodotto infestazioni degne di nota in Italia durante l'anno 1957 - *Redia*, Firenze, 43, Appendice: III-IV.

1607 MENTZER, VON, E. 1958 - *Erebia calcarius* Lork. ssp. *tridentina*, ssp. nova (Lep., Satyridae) - *Entomologisk Tidskrift,* 79 (1-2): 6-10.

1608 PFISTER H. 1958 - Lichtfang im Adamello - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 7 (11): 105-106.

1609 PFISTER H. 1958 - Jagd auf *Endrosa arterica* Tti. - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 7 (12): 116-117.

1610 PIAZZOLI PERRONI A. 1958 - Quattro anni di osservazioni sui Lepidotteri Diurni dell'Alta Val Malenco (Alpi Retiche, Lombardia) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXVIII (7-8): 103-115.

1611 REISSER H. 1958 - Neue Heteroceren aus Kreta - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 43 (11): 105-128, 1 Tav.

1612 SCHÜTZE E. 1958 - Eupithecien-Studien X. Die graphata-Gruppe (Lep. Geometr.) - *Entomologische Zeitschrift,* 68 (5): 49-64, (6): 71-72, (7): 82-88.

1613 UGOLINI A. 1958 - La "falera" (sic) del tiglio - *Informatore fitopatologico,* VIII (20): 358-360.

1614 VERITY R. 1958 - Catture di Lepidotteri di cui mancano o sono scarse le notizie in Italia - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXVIII (7-8): 118.

1615 ZANGHERI S. 1958 - Osservazioni su alcune interessanti specie di Lepidotteri della Laguna di Venezia - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia,* XI: 19-27.

1616 ZANGHERI S. 1958 - Infestazione di "*Cerapteryx graminis* L." (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) sui pascoli del M. Cesen (Valdobbiadene - Treviso) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXIII: 191-203.

1617 ALBERTI B. 1958 - Über dem stammesgeschlichtlichen Aufbau der Gattung Zygaena F. und ihre Vorstufen (Insecta Lepidoptera) - *Mitteilungen dem Zoologischen Museum der Humboldt-Universität Berlin,* 34 (1958): 245-396; 35 (1959): 203-242.

1618 HARTIG F. 1958-1959 - Microlepidotteri della Venezia Tridentina e delle regioni adiacenti - *Studi Trentini di Scienze Naturali,* XLI (3): 1-142, (4): 143-296.

1619 AGENJO R. 1958-1971 - Las *Catocala* Schrk., 1802, españolas, con màs amplias consideraciones respecto a las de mayor interés forestal (Lep. Noct.) - *Eos,* Madrid, 35 (4): 301-384.

1620 BIBOLINI C. 1959 - Nota sulla *Zamacra flabellaria* Heeger (Lepidoptera - Geometridae) - *Frustula entomologica*, 2 (2): 1-10.

1621 BIBOLINI C. 1959 - Danni causati al pesco e al susino da *Gastropacha quercifolia* L. (Lep.-Lasiocamp.) - *Rivista di Ortoflorofrutticoltura italiana,* Firenze, XLIII (1-2): 1-11.

1622 BOSELLI F. 1959 - Un nuovo importante parassita del riso in Sardegna: la perforatrice dei culmi, *Sesamia nonagrioides* (Lef.) Tams (Lep. Noctuidae) - *Annali della Sperimentazione Agraria, Roma,* n.s., XIII (1): 47-69.

1623 BOURSIN C. 1959 - Über zwei für Europa neue *Hadena*-Arten (= *Dianthoecia* B.). *Hadena clara* Stgr. (1901), bona sp.! und *Hadena urumovi* Dren. (1931), bona sp.! (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", C (100)) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 44: 113-131.

1624 BRETHERTON R.F. 1959 - Spring Butterflies round Lake Garda - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 71: 150-151.

1625 BULLINI L. 1959 - Sul rinvenimento di *Gonepteryx cleopatra* L. nel Bolognese (Lepidoptera Rhopalocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXIX (7-8): 123-124.

1626 DE LESSE H. 1959 - Caracteres et repartition en France d'*Erebia aethiopellus* Hoffmsg. et *E. mnestra* Hb. - *Alexanor,* I: 72-81.

1627 EISNER C. 1959 - Parnassiana Nova XXV - Kritische Revision der Gattung *Tadumia* - *Zoologische Mededelingen,* 36 (14): 233-247.

1628 FRIESE G. 1959 - *Dysauxes punctata* (F.) und *famula* (Frr.) und ihre Rassenkreise (Lep. Syntomidae) - *Deutsche entomologische Zeitschrift,* N. F. 6 (I-III): 251-259.

1629 GRANDI G. 1959 - Campagna di ricerche dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna nel Parco Nazionale d'Abruzzo. I. Sguardo d'insieme ai resultati della Campagna - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXIII: 133-166.

1630 JANSE J.A. 1959 - Die Verbreitung von *Brenthis hecate* Schiff. in Italien (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Entomologische Berichten,* 19 (12): 246-247.

1631 MASUTTI L. 1959 - Reperti sull'entomofauna del *Pinus nigra* Arn. var. *austriaca* Hoess nelle Prealpi Giulie - *Annali dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali,* Firenze, VIII: 263-308, Tavv. I-IV.

1632 PARENZAN PIETRO, DAVIDE B. 1959 - Su una campagna di ricerche speleologiche in Contrada Pruno (Laurino - prov. di Salerno) - *Studia Spelaeologica,* 4: 65-79.

1633 PRÖSE H 1959 - Eine Fahrt ins Schnalsertal - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 8 (6): 52-54.

1634 REALI G. 1959 - Su due Lepidotteri dannosi alla Soja in Lombardia - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, vol. 2: 236-238.

1635 RUSSO G. 1959 - I principali parassiti dei lepidotteri defogliatori forestali in Italia - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* XVII: 172-188.

1636 SAUTER W., DE BROS E. 1959 - Note sur la faune des Lépidoptères de Zeneggen - *Bulletin de la Murithienne, Soc. valais. Sc. Nat.,* LXXVI: 107-129.

1637 SICHEL G. 1959 - terzo contributo alla conoscenza dei Ropaloceri della zona Etnea - *Bollettino di Zoologia, U.Z.I.,* XXVI (II): 193-201.

1638 TACCANI C. 1959 - Ricerche sui Lepidotteri (Sfogliando gli appunti di caccia....) - *Natura, Rivista di Scienze Naturali, Milano,* L (3): 102-110.

1639 UGOLINI A. 1959 - La cavolaia - *Informatore fitopatologico,* IX (12): 254-256.

1640 VILLA R. 1959 - Sul rinvenimento di *Plebejus argus* L. nell'Isola d'Elba (Lepidoptera Rhopalocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXIX (5-6): 91.

1641 WOLFSBERGER J. 1959 - *Chloridea nubigera* H. Sch. eine für Mitteleuropa neue Noctuide (Lep.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* VIII (2): 15-16.

1642 BARAUD J. 1959 - Deux espèces de *Dysauxes* Hb. nouvelles pour la France (Lep. Ctenuchidae) - *Alexanor,* I (7): 205-208.

1643 BERNARDI G. 1960 - La répartition insulaire de deux espèces jumelles d'*Aricia* R. C. (Lep. Lycaenidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 65 (1-2): 49-52.

1644 BIBOLINI C. 1960 - Sulla biologia della *Gastropacha quercifolia* L. (Lepidoptera - Lasiocampidae) - *Frustula entomologica,* 3 (2): 1-93.

1645 BOURSIN C. 1960 - Ein für Spanien neue *Scotia*-Art (*Agrotis* auct.), *Scotia schawerdai* Byt.-Salz (= "*Agrotis*" *santoruana* Hartig, nov. Syn.) (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", 106) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 45: 68-70.

1646 BURMANN K. 1960 - *Sidemia zollikoferi* Frr. in Alpenraum - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 45: 65-67.

1646bis CUSCIANNA N. 1960 - I problemi fitosanitari delle colture floreali ed ornamentali, nella Riviera dei fiori - *Notiziario sulle Malattie delle Piante*, 53 (N.S. 32): 3-17 (estratto).

1647 FORSTER W., WOHLFAHRT T.A. 1960 - Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band III. Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphinges) - Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 239 pp., 24 Taff.

1648 GALASSI R. 1960 - Sul rinvenimento della "*Lycaeides idas* L." (Lepidoptera Lycaenidae) in Sardegna - *Studi Sassaresi,* Sez. III, VII: 139-141.

1649 LIPSCOMB C.B. 1960 - Late Summer in North Italy - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 72 (10): 210-213.

1650 LORKOVIC Z., DE LESSE H. 1960 - *Erebia calcarius* au Monte Cavallo au Nord de Venise - *Bollettino della Società entomologica italiana, Genova,* XC (7-8): 123-129.

1651 MARTELLI G.M. 1960 - Lepidotteri minori dell'Olivo - Circolare n.16 (N.S.), Osservatorio Malattie delle Piante, Bari, 16 pp.

1652 MENTZER, VON, E. 1960 - Ueber die Spezifizität von *Erebia neleus* Frr. und *Erebia aquitania* Frhst. (Lep., Satyridae) - *Entomologisk Tidskrift,* 81 (3-4): 77-90.

1653 PFISTER H. 1960 - Im Sarcatal - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 9 (1): 5-7.

1654 PROLA C. 1960 - Lepidoptera. in Zavattari e Coll. - Biogeografia delle Isole pelagie. Fauna - *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL,* Roma, S. IV, XI: 349-358.

1655 VESSIA R. 1960 - Gli insetti dannosi alle coltivazioni del pomodoro in Campania - *Rivista dell'Ortoflorofrutticoltura Italiana,* Anno 85°, XLIV (9-10): 23 pp.

1656 WOLFSBERGER J. 1960 - Die Grossschmetterlinge des Gardaseegebietes als Ausdruck des dortigen mediterranen Klimas - Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona, VII: 127-146.

1657 WOLFSBERGER J. 1960 - Wo hat *Tephrina arenacearia* Schiff. die Westgrenze ihrer südalpinen Verbreitung? (2. Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Südalpen) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* IX (5): 41-45.

1658 ZANGHERI S. 1960 - Ricerche faunistiche e zoogeografiche sui Lepidotteri delle Puglie e della Lucania - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 39: 5-35.

1659 BERIO E. 1960 - Faunula di Noctuidae della regione del Monte Penice negli Appennini liguri. Primo contributo - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, XL: 65-140.

1660 BERTOLANI M., BERTOLANI D., MOSCARDINI C., ROMPIANESI P., 1961 - Le cavità naturali dell'Emilia-Romagna. Parte prima. Le grotte del territorio gessoso tra i torrenti Savena e Zena (Provincia di Bologna) - *Le Grotte d'Italia,* serie 3°, III (1959-60): 143-170.

1661 BRIZZI G. 1961 - Sulla etologia del *Paranthrene tabaniformis* Rott. (Lepidoptera Aegeriidae) dannoso ai pioppi - *Redia,* Firenze, 46: 145-156.

1661bis DANIEL F. 1961 – Monographie der paläarktischen Cossidae V. Die Genera *Parahypopta* g. n., *Sinicossus* Clench und *Catopta* Stgr. – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 51: 160-212, Taff. XVI-XVII.

1662 DE LESSE H. 1961 - Les nombres de chromosomes chez *Agrodiaetus dolus* Hübner et les espéces voisines (Lycaenidae) - *Alexanor,* II (2): 57-63.

1663 DUFAY C. 1961 - Les *Nycteola* Hübner (*Sarrothripus* Curtis) de la Collection Staudinger (Lep. Noct.) - *Deutsche Entomologische Zeitschrift,* N.F., 8 (V): 431-440.

1664 FLORIANI G.C. 1961 - Sulla presenza in Italia della *Strymon esculi* Hüb. - *Natura, Rivista di Scienze Naturali, Milano,* LII (1): 13-15.

1665 GENDUSO P. 1961 - terzo decennio di osservazioni entomologiche sui principali insetti nocivi della Sicilia (1951-1960) - *Note di Fitopatologia, Palermo,* N. 20: 1-44.

1666 JANSE J.A. 1961 - Neue Fundorte italienischer Tagfalter - *Entomologische Berichten,* 22 (7): 129-130.

1667 MARINELLI M.C. 1961 - Le Nottue più dannose nella Sardegna del Nord - *Informatore fitopatologico,* XI (14): 305-308.

1668 MASUTTI L. 1961 - I principali insetti dannosi alle conifere nelle valli del t. Torre e del t. Vegliato (Prealpi Giulie) - Camera di

Commercio, Industria e Agricoltura, Udine, Collana "Tesi di Laurea", N. 4, 65 pagg.

1669 PARENZAN PIETRO 1961 - La grotta del Lete - *La Speleologia, Numero unico: Roma,* anno 1, n. 1: 5-8.

1670 PFISTER H. 1961 - Wunderland Monte Baldo - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 10 (10): 105-108.

1671 REISSER H. 1961 - Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae (Lep., Geom.) IV. Über gleichgerichtete Formenbildungen bei vielen Arten - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 46: 173-189.

1672 ROELL L. 1961 - Hüben und drüben. Aufzeichnungen über eine Sammelreise nach Sizilien-Tunisien-Südfrankreich - *Entomologische Zeitschrift,* 64 (3): 25-35, (4): 43-48, (5): 62-64, 5 figg.

1673 RUSSO G., TREMOLA E. 1961 - I risultati della sperimentazione di lotta contro gli insetti del pomodoro eseguita in Campania negli anni 1958-1959 - *Annali della Facoltà di Agraria,* Portici, 26 (3): 61-83.

1674 SANSAVINI S. 1961 - Danneggiamenti delle Nottue ai peschi - *Informatore fitopatologico,* XI (3): 42-43.

1675 STORACE L. 1961 - Considerazioni sulla *Colias australis* Verity (Lepidoptera Diurna, Pieridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXI (3-4): 34-43.

1676 STORACE L. 1961 - Su alcune Hesperidae italiane specialmente della zona di Arquata Scrivia (Piemonte) (Lepidoptera, Diurna) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXI (5-6): 90-94.

1677 STORACE L. 1961 - Osservazioni sulle *Amata phegea* O. raccolte ad Arquata Scrivia (Piemonte) nel biennio 1942-1943 (Lepidoptera, Euchromiidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXI (9-10): 135-138.

1678 STORACE L. 1961 - Diagnosi preliminare di una nuova razza d'*Anthrocera hilaris* Ochs. (Lepidoptera Anthroceridae = Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXI (9-10): 143.

1679 TREMBLAY E. 1961 - Osservazioni su un insetto dannoso ai fiori. La *Gymnoscelis pumilata* Hb. (Lepidoptera-Geometridae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* XIX: 199-214.

1680 VIGGIANI G. 1961 - La Processionaria del Pino in Campania - *Agricoltura Napoletana,* 10: 3-12.

1681 WOLFSBERGER J. 1961 - Die von Graf G. B. Cartolari in der Umgebung von Cancello in den Lessinischen Voralpen

gesammelten Macrolepidopteren - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* IX: 197-266.

1682 WOLFSBERGER J. 1961 - Eine neue unterart von *Ptilophora plumigera* Esp. aus den Lessinischen Voralpen in Oberitalien (Lep.) - *Studi Trentini di Scienze Naturali,* 48: 65-66.

1683 ZAMBELLI N. 1961 - Contributo alla conoscenza della entomofauna delle Piante ortive da seme - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXIV: 281-322.

1684 ZANGHERI S. 1961 - Reperti preliminari sui Lepidotteri del M. Terminillo (Appennino Centrale) - *Atti dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Rendiconti,* VIII (1960): 191-217.

1685 ZANGHERI S. 1961 - La "Nottua del pomodoro" in alcune regioni - *Informatore fitopatologico,* XI (7): 138-139.

1686 ALBERTI B. 1961 - Notiz über *Procris alpina* Alb. - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 11 (9): 96.

1687 FERRI F. 1962 - La Conopia del Kaki (*Conopia typhiaeformis* Bork.). In "Le avversità delle piante agrarie" - Ed. REDA, Roma, III: 158-195.

1688 FORCHER MAYR H. 1962 - *Thersamonia dispar* Haw. r. *rutilus* Wern. in Südtirol - *Der Schlern,* 36 9-10): 295-297, 1 Taf.

1689 INSERRA I. 1962 - Grave infestazione di *Cossus cossus* L. a piante di carciofo nella Sicilia meridionale - *Tecnica Agricola,* Catania, XIV (5): 473-480.

1690 LIOTTA G. 1962 - Una grave infestazione sul pomodoro tardivo - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia Agraria e dell'Osservatorio di Fitopatologia di Palermo,* IV:237-240.

1691 MELLINI E. 1962 - Studi sui Ditteri Larvevoridi. VIII. *Strobliomyia tibialis* R. D. su *Lithosia complana* L. (Lepidoptera Arctiidae) e generalità sulla sopravvivenza degli insetti ospiti all'esodo dei parassotoidi - (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXVI: 103-129.

1692 MELLINI E. 1962 - *Nemoraea pellucida* (Meig.) su *Spilarctia lubricipeda* L. (Lepidoptera Arctiidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXVI: 241-272.

1693 PFISTER H. 1962 - Im Val Nervia - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 11 (2): 14-16.

1694 REISSER H. 1962 - Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae (Lep., Geom.), V. Was ist *Sterrha dilutaria praeustaria* Lah. (Mann i.l.)? - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 47: 21-24.

1695 SICHEL G. 1962 - Il differenziamento subspecifico di *Pyrgus malvoides* (Elw., Edw.) nel suo areale (Lepidoptera) - *Bollettino*

della Società entomologica italiana, Genova, LXXXXII (3-4): 38-44.

1696 SICHEL G. 1962 - *Hipparchia semele* (L.) ed *Hipparchia aristaeus* (Bon.) in Sicilia (Lepidoptera-Satyridae) - *Fragmenta entomologica, Roma,* 4 (4): 43-47.

1697 SICHEL G. 1962 - Quarto contributo alla conoscenza della fauna ropalocerica etnea. Considerazioni zoogeografiche - *Atti dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Rendiconti,* X: 113-118.

1698 SICHEL G. 1962 - Contributo alla conoscenza del genere *Pyrgus*. Le specie del "gruppo *malvae*", con particolare riguardo alla loro origine ed evoluzione - *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Università di Napoli,* XIV (3): 1-27.

1699 STORACE L. 1962 - Note di Lepidotterologia. III - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXII (3-4): 35-38.

1700 STORACE L. 1962 - Una sottorazza inedita di *Zerynthia hypsipyle* Schulz. (= T*hais hypermnestra* Scop., = *Thais polyxena* Schiff.) (Lepidoptera, Papilionidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXII (5-6): 94-95.

1701 STORACE L. 1962 - La *Zygaena hilaris* O. nella Liguria centrale (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXII (7-8): 102-108.

1702 STORACE L. 1962 - *Lysandra albicans* H.-S. (= *hispana* H.-S.) razza *iriensis* nov. (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXII (7-8): 127.

1703 STORACE L. 1962 - La *Zygaena occitanica* (de Villers) in Liguria (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXII (9-10): 151-154.

1704 UGOLINI A. 1962 - Un singolare caso di allotrofia in larve di *Cossus cossus* L. (Lepidoptera - Cossidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXVI: 15-19.

1705 VARIN G. 1962 - Les sous-espèces françaises d'*Hipparchia fagi* Sc., *alcyone* Denis et Schiff. et *neomiris* God. (Satyridae) - *Alexanor,* 2: 313-324.

1706 AGENJO R. 1962 - Morfologia y distribuciòn geogràfica de los *Satyrus actaea* (Esp., 1780) y *brice* (Hb., 1790-93) en España (Lep. Satyridae) - *Eos,* Madrid, 39: 313-336.

1707 BERIO E. 1963 - *Litophane lapidea* in Liguria (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCIII (9), 164.

1708 BERIO E. 1963 - Note su alcune *Gortyna* paleartiche (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIII (1-2): 6-13.

1709 BOURGOGNE J. 1963 - *Oreopsyche tabanivicinella* Bruand. Répartition française, éthologie et relations avec *O. pyrenaella* H. S. (Psychidae) - *Alexanor,* III (3): 137-144; (4): 177-182.

1710 BOURSIN C. 1963 - Nouvelles races de Noctuidae palearctiques (Lep. Noctuidae) (Contributions à l'Étude des "Noctuidae - Trifinae", 140) - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon,* 32 (9): 254-262.

1711 BOURSIN C. 1963 - Nouvelles races de Noctuidae palearctiques avec une note synonymique (Lep.) - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon,* 31: 302-305 (1962).

1712 CROSSON DU CORMIER A. 1963 - La variation géographique de *Boloria napaea* Hoffmannsegg in Europe (Lep. Nymphalidae) - *Alexanor,* III (6): 243-252; (7): 313-319.

1713 CROVETTI A. 1963 - Contributi alla conoscenza della entomofauna della *Ferula communis* L. IV. Ricerche condotte in Sardegna sugli insetti della parte epigea - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XI (3): 651-899.

1714 DANIEL F. 1963 - Die Vertreter des Genus *Procris* in Südtirol, Trentino und dem südlich anschlissenden Gebirgsland - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 13 (2): 17-23.

1715 HARTIG F. 1963 - Per la prima volta una *Bramaea* (sic!) in Europa - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 17 (1): 5-7.

1716 HARTIG F., PROLA G. 1963 - Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Ocneria* Hbn. (Lep., Lymantriidae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 53: 55-69.

1717 KLIMESCH J. 1963 - Piccolo contributo alla fauna lepidotterologica della zona di Cogne (Valle d'Aosta) - *Parco Nazionale Gran Paradiso, Contributo scientifico* No. 17: 5-16.

1718 LA GRECA M. 1963 - Considerazioni sul popolamento faunistico della Sila - *Archivio Botanico e Biogeografico Italiano,* XXXIX, 4° Serie, Vol. VIII, Fasc. IV, 20 pp.

1719 MEIER H.G. 1963 - Zur Kenntnis der Gattungen *Pseudobankesia* gen. nov. und *Bankesia* Tutt - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 53: 1-23.

1720 MILANI CRISTOFOLINI S. 1963 - Contributo alla conoscenza della distribuzione altimetrica dei Lepidotteri Ropaloceri sul Monte Baldo - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* XI: 179-195.

1721 PROTA R. 1963 - Note morfo-etologiche su *Trogus violaceus* (Mocs.) (Hymenoptera, Ichneumonidae) endoparassita solitario delle larve di *Papilio hospiton* Gené (Lepidoptera, Papilionidae) - *Bollettino*

dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna, XXVI: 289-318.

1722 SACCUMAN G. 1963 - Contributo alla conoscenza della *Euproctis chrysorrhoea* L. Cenni sulla morfologia, biologia e mezzi di lotta - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* XXI: 271-322.

1723 SBORDONI V. 1963 - Reperti. 8. - *Parnassius mnemosyne* L. (Lepidoptera Papilionidae). 9. - *Anthocharis euphenoides* Stdgr. razza *italorum* Dannehl (Lep. Pieridae). 10. - *Gegenes pumilio* Hoffm. (= *lefebvrii* Rambur = *pygmaeus* F.) (Lep. Hesperiidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 17 (C): II (1962).

1724 SBORDONI V. 1963 - Reperti. 4. - *Zerynthia hypsipyle* Schulz. (= *Thais hypermnestra* Scop., = *T. polyxena* Schiff.) (Lepidoptera Papilionidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 18 (1): 11.

1725 SICHEL G. 1963 - Elenco dei Ropaloceri della Sicilia nord orientale nella collezione dell' I.N.E. - *Fragmenta entomologica,* Roma, 4 (5): 49-61.

1726 STORACE L. 1963 - Appunti su alcune specie liguri e piemontesi del gen. *Zygaena* F. (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIII (3-4): 37-42.

1727 STORACE L. 1963 - Note di Lepidotterologia. IV - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIII (3-4): 51-67.

1728 STORACE L. 1963 - Una razza inedita di *Brenthis hecate* Schiff.? (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIII (5-6): 83-84.

1729 STORACE L. 1963 - La *Zygaena purpuralis* Brünn. nella Liguria centrale. Una precisazione (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIII (8-9): 133.

1730 STORACE L. 1963 - Esiste il *Palaeochrysophanus candens* (H.-S.) in Italia ? (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCIII (5-6): 93.

1731 VENTURI F. 1963 - La *Gastropacha quercifolia* L. dannosa alle Rosacee da frutto (Lepid. Lasiocampidae) - *Osservatorio per le Malattie delle Piante (Sez. Entomologia),* Pisa, Circolare N. 2, 32 pp.

1732 WOLFSBERGER J. 1963 - Ein weiterer nachweis von *Hydraecia püngeleri* Trt. (Lep. Noct.) - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* XVI: 125-127.

1733 ZANGHERI S. 1963 - Considerazioni sulla fauna Lepidotterologica dei massicci montani della Calabria - *Archivio Botanico e Biogeografico Italiano,* XXXIX, 4° serie, vol. VIII (IV), 23 pp.

1734 FORSTER W., WOHLFAHRT T.A. 1963 - Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band IV. Eulenfalter (Noctuidae) - Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 329 pp., 32 Taff.

1735 ANGIUS A. 1963-1970 - Osservazioni su alcuni Lepidotteri dannosi alla Quercia da sughero (*Quercus suber* L.) - Tesi di Laurea. Università di Sassari, Facoltà di Scienze Agrarie, Istituto di Entomolologia agraria, A.A. 1963-64, 80 pp., 5 Tav.

1736 BALDIZZONE G. 1964 - Note di Lepidotterologia. Reperti di Ropaloceri nel Piemonte meridionale - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCIV (9-10): 164-167.

1737 BERIO E. 1964 - Rettifiche alla mia "Faunula di Noctuidae della regione del Penice" - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, XLIII: 121-128.

1738 DANIEL F. 1964 - Die Lepidopterenfauna Jugoslavisch Mazedoniens. II. Bombyces et Sphinges - *Prirodonaucen Muzej Skopje,* 2: 1-74.

1739 DELLA BRUNA D. 1964 - Reperti. 1. *Maculinea alcon* Schiff. (Lepidoptera Lycaenidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 19 (1): 14.

1739bis FIORI G. 1964 – *Papilio hospiton* Gené - *Natura e Montagna*, IV (4): 192-194.

1740 FLORIANI G. 1964 - Osservazioni sui Ropaloceri dell'Elba - *Natura, Rivista di Scienze Naturali, Milano,* LV (3): 169-178; id. (4): 241-253.

1741 GREENWOOD J.A.C. 1964 - Collecting in Elba *Charaxes jasius* L. and other Species - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 76 (6): 159-164.

1742 LEMPKE B.J. 1964 - *Noctua orbona caroni*, nov. subsp. (Lep., Noctuidae) - *Entomologische Berichten,* 24: 262-263.

1743 MALICKY H. 1964 - Eine studienreise durch Sardinien - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* N. F. 14 (2): 30-38.

1744 MARTELLI G.M. 1964 - I parassiti animali dannosi alle colture orticole nell'Italia Centro-Meridionale - *Notiziario sulle Malattie delle Piante,* 70-71 (N.S. 49-50): 125-150.

1745 MASUTTI L. 1964 - Ricerche sui parassitoidi oofagi della *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. - *Annali del Centro di Economia Montana delle Venezie,* IV: 203-271, Padova.

1746 MASUTTI L. 1964 - Les parasites des oeufs de *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. Premiers rérultats de recherches biologiques consuites sur quelques espèce actives dans les pineraies dea Alpes orientales - Proceedings of the first International Congres of Parasitology, Roma, 21 st-26 th September 1964.

1747 MEIER H. 1964 - Zur Kenntnis der Gattungen Peloponnesia Sieder und *Montanima* Sieder (Lep. Psychidae) (6. Beitrag zur Kenntnis der Psychiden) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 49: 47-61.

1748 MINEO G. 1964 - Osservazioni sulla biologia della *Gymnoscelis pumilata* Hb. (Lepidoptera - Geometridae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia Agraria e dell'Osservatorio di Fitopatologia di Palermo,* V: 173-193.

1749 ROBERTI D. 1964 - Contributo alla conoscenza dell'entomofauna dell'erba medica nel territorio di Piacenza – *Annali della Facoltà di Agraria,* Piacenza, IV (III): 489-527.

1750 SBORDONI V. 1964 - Sulla presenza di *Boloria pales* Schiff. Nei Monti Sibillini. Considerazioni tassonomiche intorno a *Boloria pales medioitalica* Turati (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 18 (4): 35-38. (1963).

1751 SBORDONI V. 1964 - *Colutea arborescens* pianta alimentare di *Syntarucus pirithous* (L.) (Lepidoptera Lycaenidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 19 (3-4): 43-44.

1752 SCHMIDLIN A. 1964 - Übersicht über die europäischen Arten der Familie Geometridae (Lep.) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 14: 77-137.

1753 SICHEL G. 1964 - Nuovi dati sulla presenza del genere *Gegenes* (Lepidoptera, Hesperiidae) in Sicilia e nell'Italia meridionale - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania,* Ser. IV, vol. VIII (4): 247-255.

1754 SICHEL G. 1964 - Differenziamento subspecifico di *Sloperia proto* (Ochsenheimer) e diffusione della specie in Italia - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali in Catania,* Ser. IV, VIII (4): 256-264.

1755 SOLINAS M. 1964 - L'*Agrotis segetis* Hb. - *Annali della Facoltà di Agraria,* Milano, IV (2): 327-361.

1756 STORACE L. 1964 - Reperti eccezionali di *Graphium podalirius* (L.) (Lepidoptera, Papilionidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIV (3-4): 48-49.

1757 STORACE L. 1964 - Su alcune forme apparentemente poco frequenti di *Zygaena carniolica* Scopoli e scarsità di detta specie a Genova e ad Arquata Scrivia nel 1963 (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIV (3-4): 76-78.

1758 STORACE L. 1964 - L'*Arethusana erythia* Hnb. (sic) (= *arethusa* Schiff.) sull'Appennino ligure-piemontese: una precisazione (Lepidoptera, Satyridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIV (3-4): 78-80.

1759 STORACE L. 1964 - Sulla diffusione della *Zerynthia hypsipyle* Schulz. (= *Thais polyxena* Schiff.) in Liguria (Lepidoptera, Papilionidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXIV (1-2): 16-18.

1760 DUJARDIN F. 1964 - Description de sous-espèces et formes nouvelles de *Zygaena* F. d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord (3) - *Entomops,* Nice, 1: 16-22; 2: 33-64.

1761 ANTONGIOVANNI E., SIDDI G. 1964-1965 - Mezzi di lotta contro la *Zeuzera pyrina* - *Progresso Agricolo,* XI (5), 4 pp.

1762 ARRU G.M. 1965 - *Pygaera anastomosis* (L.) (Lepidoptera Notodontidae). Studio morfologico ed etologico - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 6: 207-272 (1964-65).

1763 BALDIZZONE G. 1965 - Note di Lepidotterologia. Reperti di Ropaloceri nel Piemonte meridionale. II - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCV (3-4): 62-64.

1764 BASSI N. 1965 - Sulla presenza di *Heteropterus morpheus* Pallas nei dintorni di Firenze (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXV (5-6): 66.

1765 BILEK A. 1965 - Die raupe von *Brahmaea europaea* Hartig 1963, und deren aufzucht aus dem ei - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* XX (1): 5-8.

1766bis CHOF A. 1965 - Beitrag zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes von *Erebia flavofasciata* Ruehl - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* N.F., 15 (5): 80-81.

1767 BRETHERTON R.F. 1965 - Sampling The Butterflies of Sicily - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 77: 168-176.

1768 BRETHERTON R.F. 1965 - Burnets and Forestrers (Zygaenidae) in Sicily: a correction - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 77: 294.

1769 DALLAI R. 1965 - *Aspilates ochrearia* Rossi, un lepidottero nocivo alle leguminose foraggere - *Redia,* Firenze, 49: 71-80.

1770 DANIEL F. 1965 - Das Genus *Harpyia* L. (= *Cerura* auct.) im palaearktischen Raum unter Einschluss der naheverrwandten nordamerikanischen Formen - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 50: 5-49.

1771 DE BROS E. 1965 - *Amata* (*Syntomis*) *mariana* Stauder (Lepidoptera, Ctenuchidae), eine "neue" Art nahe unserer Tessiner Grenze - *Mitteilungen entomologische Gesellschaft Basel,* (N.F.) 15: 51-52.

1772 DUFAY C. 1965 - *Amata mariana albionica* subsp. nova. Nouvelles observations sur cette espèce en Haute Provence (Lep. Ctenuchidae) - *Entomops,* Nice, 3: 93-97.

1773 FLORIANI G. 1965 - *Erebia manto* Schiff. ssp. *valmaritima* n. delle Alpi Marittime (Lepidoptera Satyridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXV (9-10): 149-152.

1774 HARTIG F. 1965 - Contributo alla conoscenza del gruppo generico *Ocneria* Hb. (Lepidoptera, Lymantriidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 20 (2): 30-36.

1775 LIOTTA G., GIUFFRIDA I. 1965 - Osservazioni biologiche sulla *Zeuzera pyrina* L. in Sicilia (Lep. Cossidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia Agraria e dell'Osservatorio di Fitopatologia di Palermo,* VI: 29-60.

1776 MARTELLI G., G.M. 1965 - Appunti di entomologia agraria raccolti nell'Italia meridionale (II - Lepidoptera) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* XXIII: 174-192.

1777 MONASTERO S. 1965 - Un nemico degli alberi da frutto. La *Zeuzera pyrina* - *Giornale di Agricoltura,* n. 1: 3-4.

1778 NUCIFORA A. 1965 - Appunti sulla biologia di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) in Sicilia - Atti VI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Padova 11-14 settembre 1965: 82.

1779 PASSIN R. 1965 - Quelques captures interessantes de Noctuidae pour la faune française et italienne - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon,* 34 (5): 144.

1780 PINKER R. 1965 - Erinnerung an eine Frühjahrsfahrt nach Istrien - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 50: 222-225.

1781 ROBERTI D., FRILLI F., PIZZAGHI W. 1965 - Contributo alla conoscenza dell'entomofauna del Piacentino (Specie raccolte nel decennio 1955-64) - *Entomologica,* Bari, I: 1-118.

1782 SBORDONI V. 1965 - Notizie su *Laelia coenosa* Hüb. e rinvenimento della specie in Italia (Lepidoptera Lymantriidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXV (5-6): 82-86.

1783 SICHEL G. 1965 - Precisazioni su *Parnassius mnemosyne* in Sicilia (Lepidoptera Papilionidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXV (9-10): 166-167.

1784 STORACE L. 1965 - Appunti sulla diffusione di *Zygaena hilaris* O. in Liguria e nelle regioni contermini (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXV (3-4): 56-62.

1785 TAORMINA E. 1965 - Precisazioni sul *Parnassius mnemosyne* in Sicilia (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXXV (5-6): 93-94.

1786 VARIN G. 1965 - Contribution à l'étude des Satyridae (Lépidoptères). Les Sous-espèces françaises de *Satyrus acteae*

Esper et *Satyrus bryce* Hübner et leur repartition - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse:* 54-64.

1787 WOLFSBERGER J. 1965 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* XIII, 390 pp.

1788 ZANGHERI S. 1965 - Considerazioni ecologiche e biogeografiche sui Lepidotteri della foresta di Campigna (Appennino Tosco-Romagnolo) - *Archivio Botanico e Biogeografico Italiano,* XLI, 4° serie, vol. X (III-IV), 19 pp.

1789 ARRU G.M., COVASSI M., DE BELLIS E. 1965 - Los principales insectos perjudiciales a los montes en Italia - *Boletin del Servicio Plagas Forestales,* Madrid, IX: 17: 31-41.

1790 BALDIZZONE G. 1966 - Ritrovamento *Limenitis populi* L. nelle Alpi Marittime (Lepidoptera, Rhopalocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCVI (9-10): 144.

1791 BALDIZZONE G. 1966 - Ritrovamento di farfalle ibridi nel Tortonese (Rhopalocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCVI (5-6): 99.

1792 BERNARDI G., VIETTE P. 1966 - Les types et typoides de *Parnassius* (s.l.) se trouvant au Museum de Paris (Lep. Papilionidae) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 71 (3-4): 95-100; (5-6): 163-166; (9-10): 229-233; (11-12): 304-307.

1793 BOURSIN C. 1966 - Une nouvelle *Allophyes* Tams, de Sardaigne, avec description de deux nouvelles formes d'*Agrochola* Hb. (Lep. Noctuidae) (Contributions à l'Étude des Noctuidae - Trifinae, 155) - *Studi Sassaresi,* sez. III, vol. XIV: 45-50.

1794 BOURSIN C. 1966 - Eine neue *Conisania* Hps. aus Sining nebst Synonymie-Notizen. (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae" 154) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 51: 154-159.

1795 BRETHERTON R.F. 1966 - A distribution list of the butterflies (Rhopalocera) of Western and southern Europe – *Transaction of the Society for British Entomology,* 17 (1): 1-94.

1796 DANIEL F., DIERL W. 1966 - Zur Biologie und Anatomie von *Heterogynis penella* (Hbn.) (Lep.) - *Zoologischer Anzeiger,* Leipzig, 176 (6): 449-464.

1797 DE CARLI C. 1966 - Note Lepidotterologiche - *"Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali,* Brescia, II (2): 53-62.

1798 DE LESSE H. 1966 - Variation chromosomiques chez *Agrodiaetus dolus* Hubner (Lep. Lycaenidae) - *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), 2 (1): 209-214.

1799 DIERL W. 1966 - Zur Kenntnis einiger *Solenobia* - Arten (Lep., Psychidae). Ein Beitrag zur Fauna Bavarica - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 56: 190-196.

1800 GREENWOOD J.A.C., GREENWOOD D. 1966 - Some Butterflies and Moths in Sardinia, July and August 1965 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 78 (10): 224-226.

1801 GROSS F.J. 1966 - Über Zygaenidae der Gattung *Procris* aus den Abruzzen (Lep.) - *Entomologische Zeitschrift,* 76 (5): 54-55.

1802 HARTIG F. 1966 - Auf *Brahmaea* - Fang in der Basilicata (Lep. Bombycidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 15 (11-12): 102-105.

1803 JANNONE G. 1966 - Risultati di alcuni controlli fitosanitari su vegetali e prodotti vegetali esteri nel porto di Genova. IV. Sulla presenza delle larve di tre specie di Lepidotteri in partite di banane provenienti dalle Isole Canarie - *Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale, Firenze,* 60 (1-3): 5-34.

1803bis KÜNNERT R. 1966 - Lepidopteren-Beobachtungen im Jahre 1965 - *Entomologische Zeitschrift*, F. a. M., 76 (9): 97-104.

1804 OBRAZTSOV N.S. 1966 - Die Palaearktischen Amata-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae) - *Veröffentlichungen der Zoologischen Staatsammlung München,* 10: 1-383.

1805 PROTA R. 1966 - Osservazioni sull'etologia di *Sesamia nonagrioides* (Lefebvre) in Sardegna - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XIII: 336-360.

1806 PROTA R. 1966 - Contributi alla conoscenza dell'entomofauna della Quercia da sughero (*Quercus suber* L.). V. Osservazioni condotte in Sardegna su *Oencyrtus kuwanai* (Howard) (Hymenoptera Encyrtidae) nuovo per la fauna italiana - *Stazione Sperimentale del Sughero, Tempio Pausania,* Memoria 17, 26 pp.

1807 RUSSO G. 1966 - La Falena Brumale o Brumale *Operophtera brumata* (L.) syn. *Cheimatobia brumata* (L.) - Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" e Osservatorio per le malattie delle piante (sez. entomologia); 4 pp.

1808 RUSSO G. 1966 - Gli insetti dannosi della patata - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri" Portici,* XXIV: 227-246.

1809 SICHEL G. 1966 - Nuovi dati concernenti la distribuzione di *Anthocharis damone* (Boisduval, 1836) - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania,* 8: 593-599.

1810 STORACE L. 1966 - Ancora sulla diffusione della *Brenthis hecate* (Schiff.) nel Piemonte sudorientale (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCVI (1-2): 36.

1811 STORACE L. 1966 - Appunti su alcune Zygaenidae del Piemonte sudorientale e del genovesato (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCVI (3-4): 58-61.

1812 TREMEWAN W.G. 1966 - On some Type Specimens of the Genus *Zygaena* Fabricius (Lepidoptera: Zygaenidae) in the British Museum (Natural History) - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 78 (2): 29-37.

1813 VAN OORSCHOT H. 1966 - Dagvlinderonderzoek in Noord Italiaë van 19 juli tot 6 aug. 1963 - *Entomologische Berichten,* Amsterdam, 26: 97-107.

1814 VILLA R. 1966 - Descrizione dell'uovo di *Pyronia* (*Idata*) *cecilia* Vall. (Lepidoptera Satyridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCVI (7-8): 122.

1815 WARREN B.C.S. 1966 - On the Nature and Origin of certain races of the *napi*-group of the genus *Pieris* (Lepidoptera) - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 78 (3): 57-65.

1816 WOLFSBERGER J. 1966 - Eine neue Art der Gattung *Psodos* Tr. vom Monte Baldo in Oberitalien (Lep., Geometridae) - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* XIV: 449-454.

1817 BALDIZZONE G. 1966 - *Brenthis hecate* Schiff. razza *lemnis* nov. (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 22 (4): 59-61.

1818 BILEK A. 1967 - Das Ergebnis meiner Zucht von *Acanthobrahmaea europaea* Hartig, 1963. En Beitrag zur Variationsbreite dieser Art (Lep., Brahmaeidae) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 52: 88-90.

1819 CHINCA M. 1967 - Reperti 5. *Brintesia circe* Fabr. (Lep. Satyridae). Reperti 1. *Erebia tyndarus* Esp. (Lep. Satyridae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 22 (1): 16, (4): 66.

1820 DANIEL F. 1967 - Die Makrolepidopteren-Fauna des Sausal-gebirges in der Südsteiermark - *Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum "Joanneum" in Graz,* 30 (1968): 147 pp.

1821 DELLA BRUNA F. 1967 - Nuovi dati riguardanti quattro interessanti eteroceri italiani (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCVII (5-6): 82-85.

1822 PRIORE R. 1967 - Ricerche sulla *Zamacra flabellaria* Heeg. (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri" Portici,* XXV: 35-45.

1823 PROTA R. 1967 - Difesa del granoturco dagli insetti nocivi mediante una trappola luminosa - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XV (2): 267-292.

1824 PROTA R., DELRIO G. 1967 - Efficacia di una trappola luminosa sulla sanità e produttività del granoturco - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XV (2): 293-307.

1825 REISS H., TREMEWAN W.G. 1967 - A Systematic Catalogue of the Genus *Zygaena* Fabricius (Lepidoptera: Zygaenidae) - Series Entomologica, vol. 2, 329 pp., Ed. Schimitschek E. - W. Junk - Den Haag.

1825bis REHNELT K. 1967 - Zur Schmetterlingsfauna des oberen Ahr-, Rein- und Tauferer Tales - *Der Schlern,* 41 (10): 495-499.

1826 ROMANO F.P., 1967 - In Sicilia, una colonia di *Melitaea aetherie* Hüb. vive anche alle Madonie (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, XLVI (I): 126.

1827 RUSSO G. 1967 - Insetti dannosi al Nocciuolo in Campania - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestri" Portici,* XXV: 261-294.

1828 SAUTER W. 1967 - Zur systematischen Stellung von *Brahmaea europaea* Hartig (Lep. Brahmaeidae) - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft,* XL (1-2): 125-129.

1829 SBORDONI V. 1967 - *Melitaea diamina* (Lang) in Lucania, e alcune osservazioni sulla variabilità geografica della specie (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Fragmenta entomologica,* Roma, 5 (1): 123-131.

1830 SBORDONI V., MARZOLLA G., PANSECCHI F., PEDONE F. 1967 - Su alcune ricerche speleologiche nel Matese e nel Cilento e note faunistiche - *Notiziario del Circolo Speleologico Romano,* XII (13-14): 3-16.

1831 SCHMIDT-KOEHL W. 1967 - Macrolepidopteres aus dem Vinschgau (Ergebnisse einer Sammelreise im August 1965 nach Südtirol) - *Entomologische Zeitschrift,* 77 (22): 257-264, (23): 265-270.

1832 VAN SCHEPDAEL J. 1967 - Un évènemeny capital an Entomologie: Découverte d'un *Brahmaea* en Italia: *Brahmaea europaea* Hartig. Endémisme ou relique miocène? - *Linneana Belgica,* 3 (5): 91-103.

1833 WAGENER S. 1967 - *Autographa* Hübner (*Chrysaspidia* Hübner) *gracilis* Lempke neu für Österreich (Lep., Noctuidae) - *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft,* 52: 108-111.

1834 BOSCOLO L.F. 1967 - Ricerche faunistiche nel Covolo della Guerra (n. 127 V-VI) Colli Berici - *Rassegna Speleologica Italiana,* XX (3/4): 1-23.

1835 BRIOLINI G., CELLI G. 1968 - Risultati delle catture di Lepidotteri eseguite per un triennio con una trappola luminosa tipo "Pennsylvania" - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXIX: 61-80.

1836 DUFAY C. 1968 - Revision des Plusiinae Paléarctiques. I. Monographie du genre *Euchalcia* Hübner - *Veröffentlichungen der Zoologischen Staatsammlung München,* 12: 21-154.

1837 EISNER C., EPSTEIN H.J. 1968 - Parnassiana nova XLIII. Nachträgliche Betrachtungen zu der Revision der Subfamilie Parnassiinae (Fortsetzung 16). *Parnassius mnemosyne* L. in der Südschweiz und in Norditalien - *Zoologische Mededelingen,* 43 (2): 15-17.

1838 FLORIANI G. 1968 - Le generazioni annue di *Heteropterus morpheus* Pall. nel Nord-Italia (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, LXXXVIII (7-8): 115-118.

1839 HARTIG F. 1968 - Einige neue Lepidopterenrassen und - formen und eine wiederentdeckte Noctuide aus Süditalien - *Reichenbachia,* 12 (1): 1-13.

1840 HARTIG F. 1968 - L'*Araschnia levana* L. nella Pusteria - *Studi Trentini di Scienze Naturali,* Sez. B, XLV (2): 213-215.

1841 HERBULOT C. 1968 - Sur quelques Geometridae de Sardaigne - *Alexanor,* V: 231-232.

1842 HERBULOT C. 1968 - Sur cinq Geometridae de Corse - *Alexanor,* V (5): 244-246.

1843 INSERRA R., BARBAGALLO S. 1968 - Una massiccia infestazione di *Spodoptera littoralis* (Boisduval) (Lepidoptera Noctuidae) insidia le colture della Sicilia sud-orientale - *Tecnica Agricola, Catania,* XX (5): 478-493.

1844 MARTINOTTI A. 1968 - Elenco sistematico e geografico della fauna cavernicola del Piemonte e della Valle d'Aosta - *Rassegna Speleologica Italiana,* XX (1): 3-34.

1845 PARENZAN P. 1968 - I Ropaloceri del litorale jonico pugliese - Tesi di Laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Bari, A. A. 1967-1968, 106 pp., 16 figg.

1846 PROTA R., DELRIO G. 1968 - Note sulla cattura alla lampada di *Ostrinia nubilalis* (Hbn.) (Lep. Pyraustidae) e di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) (Lep. Noctuidae) e sul comportamento fototropico del nottuide - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XVI (1): 56-79.

1847 QUAGLIA F. 1968 - Sulla biologia della *Pachytelia* (*Canephora*) *unicolor* Hfn. (Lepidoptera - Psychidae) - *Frustula entomologica,* 10 (2): 1-42.

1848 ROBERTI D. 1968 - La difesa del carciofo dai parassiti animali - *Entomologica,* Bari, IV: 127-165.

1849 SBORDONI V., PEDONE F. 1968 - Il Pozzo del Faggeto (N. 343 La) nei Monti Lepini e la sua fauna - *Rassegna Speleologica Italiana,* 3-4: 1-8.

1850 SIEDER L. 1968 - Beitrag zu *Episcioptera dellabeffai* Hart. und *Episcioptera sciopterella* Hart. (Lepidoptera, Psychidae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 58: 87-90.

1851 WOLFSBERGER J. 1968 - *Polyploca flavicornis meridionalis* ssp. nov., eine Unterart aus den Südtälern der Alpen (Lep., Cymatophoridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 58: 36-37.

1852 ZANGHERI S. 1968 - Attuali conoscenze sulla costituzione della Lepidotterofauna italiana - Atti VII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Verona, 1967: 62-112.

1853 BÄNZIGER H. 1968 - Erste Beobachtungen über früchtestechende Noctuiden in Europa - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft,* XLII (1-2): 1-10.

1854 BARONIO P. 1969 - Massiccia comparsa del misurino della medica nel Modenese - *Informatore fitopatologico,* XIX (11): 299-301.

1855 BASSI N. 1969 - Una sottospecie inedita di lepidottero dell'Appennino Marchigiano: *Erebia aurinia teobaldellii* subspecies nova (Lep. Nymphalidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 24 (4): 97-98.

1856 BAUMANN H., REHNELT K. 1969 - Beitrag zur Tagfalterfauna des Thinnebachthales bei Klausen (5. Mitteilung zur Schmetterlingskunde Süd-Tirols) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 18 (3): 33-42.

1857 BOURSIN C. 1969 - *Sympistis nigrita* Bsd. espéce nouvelle pour la France. (Contributions à l'Étude des Noctuidae Trifinae, 165) - *Entomops,* Nice, 14: 208.

1858 BULLINI L., SBORDONI V., RAGAZZINI P. 1969 - Mimetismo mülleriano in popolazioni italiane di *Zygaena ephialtes* (L.) (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Archivio Zoologico Italiano,* Torino, LIV: 181-214.

1859 CASINI P. 1969 - Dubbia l'appartenenza alla sottospecie *carboncina* Vrty. degli esemplari di *Erebia gorge* Hüb. delle Alpi Apuane (Lep. Satyridae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 24 (3): 59-60.

1860 CASINI P. 1969 - Una terza zona dell'Italia popolata da *Coenonympha dorus* Esp.: le Alpi Apuane (Lep. Satyridae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 24 (4): 99.

1861 CASTELLARI P.L. 1969 - Osservazioni sul comportamento di due specie di Lepidotteri Nottuidi: (*Mamestra brassicae* L. e *Mamestra oleracea* L.), dannosi al melo - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXIX: 123-138.

1862 CIAMPOLINI M., BARBIERI L. 1969 - Rilievi ecologici sulla *Hypopta caestrum* Hübner (Lepidoptera, Cossidae) ed indirizzi di lotta contro di essa - Atti Giornate fitopatologiche 1969: 195-207.

1863 DE LESSE H. 1969 - Les nombres de chromosomes dans le groupe de *Lysandra coridon* (Lep. Lycaenidae) - *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), 5 (2): 469-522.

1864 DUFAY C. 1969 - *Herminia gryphalis* H. S., espèce nouvelle pour la France (Lep. Noctuidae Hypeninae) - *Alexanor,* VI (1): 5-6.

1865 DUJARDIN F. 1969 - Observations concernant les sous-espèces françaises de *Melitaea varia* Meyer-Dür - *Entomops,* Nice, 16: 276.

1866 EITSCHBERGER U. 1969 - Die Unterscheidungsmerkmale der europäischen Arten der Gattung *Pieris* Schrank - *Atalanta,* Würzburg, 2 (7): 211-223.

1867 FLORIANI G. 1969 - La presenza di *Pieris bryoniae* Hüb. nella regione del Lago d'Orta (Lepidoptera, Pieridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCIX-CI (5-6): 95-104.

1868 HESSELBARTH G., VALLETTA A. 1969 - Collecting Round Toramina (sic!) - Sicily - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 81 (9): 234-237.

1869 HIGGINS L.G. 1969 - An Undescribed European Butterfly (Lep. Satyridae) - *The Entomologist,* 102 (1968): 60.

1870 JANSE J.A. 1969 - Eine Schmetterlingsaubeute von der Insel Elba - *Entomologische Berichten,* Amsterdam, 29 (11): 208-212.

1871 LIOTTA G. 1969 - Grave infestazione di *Lymantria dispar* L. o Bombice dispari su fruttiferi in Sicilia - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia Agraria e dell'Osservatorio di Fitopatologia di Palermo,* VII: 301-304.

1872 PIETANZA U. 1969 - L'*Heliothis armigera* Hb. sul garofano in Puglia - *Entomologica,* Bari, V: 57-68.

1873 PROTA R. 1969 - Prove di sterilizzazione dei maschi di *Lymantria dispar* L. mediante l'impiego di raggi gamma - Atti Giornate Fitopatologiche 1969: 305-312.

1874 PROTA R. 1969 - Descrizione di un esemplare ginandromorfo di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali,* Anno III, Vol. V: 1-10.

1875 PROTA R. 1969 - Nuove prospettive di lotta contro la *Sesamia nonagrioides* dannosa al granoturco in Sardegna - *Informatore fitopatologico,* XIX (12): 342-348.

1876 TASSI F. 1969 - Endemismi italiani. 3. *Melanargia arge* Sulzer (Lep. Satyridae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 24 (3): 57-58.

1877 TAUBER W. 1969 - *Saturnia pyri ilvana* n. ssp. (Lep.: Saturniidae) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österr. Entomologen,* 3 (21): 57-60.

1878 TEOBALDELLI A. 1969 - Seconda cattura in Italia della *Ocneria prolai* Htg. per la prima volta rinvenuta sul versante adriatico (Lepidoptera Lymantriidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, XCIX-CI (9-10): 205-207.

1879 TREMBLAY E. 1969 - Sulla carpofagia abituale delle larve di alcune specie di lepidotteri Nottuidi - *Notiziario sulle Malattie delle Piante,* III Ser., 7-8: 139-143.

1880 TRIGGIANI O. 1969 - Infestazione di *Plusia* (*Chrysodeixis*) *chalcites* Esp. su fagiolino coltivato in serra - *Entomologica,* Bari, V: 69-77.

1881 WILTSHIRE E.P. 1969 - Beiträge zur *Kenntnis* der Fauna Afghanistans. Quadrifinae, Noctuidae, Lep. (Middle East Lepidoptera XXX) - *Acta Musei Moraviae,* LIV, Supplementum: 431-446.

1882 WOLFSBERGER J. 1969 - *Erebia pluto burmanni* ssp. n. vom Monte Baldo (Lep. Rhop.) - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* XVII: 237-239.

1883 WOLFSBERGER J. 1969 - Die Verbreitung von *Gortyna püngeleri* Trt. (Lep. Noct.) - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* XVII: 241-246.

1884 WOLFSBERGER J. 1969 - *Cryphia muralis obscurior* ssp. n., eine neue Unterart aur Oberitalien (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 18 (1): 1-3.

1885 ZANGHERI P. 1969 - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna. Lepidotteri - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* F. S. N.1, Tomo III: 828-1015.

1886 ZUCCHERELLI G. 1969 - Un insetto dannoso al Kaki. Osservazioni su "*Synanthedon tipuliformis* Clerck" e sui danni in Emilia-Romagna al *Dispyros kaki* L. - *Frutticoltura,* XXXI (4): 235-238.

1887 ZUCCHERELLI G. 1969 - Biologia della *Zeuzera pyrina* L. Ricerche nella provincia di Forlì e orientamenti sui mezzi di lotta - *L'Italia agricola,* 106 (10): 831-840.

1888 AGENJO R. 1969 - Seis géneros y veinte especies de Noctuidae nuevos para España (Lep.) - *Graellsia,* Madrid, XX (1969): 119-140.

1889 AGENJO R. 1970 - Distribuciòn, bionomìa y morfologìa del "pequeño pavòn" *Eudia pavonia* (L., 1758) en España, con descripciòn de una nueva subespecie *burgalesa*, dedicada al excmo. Sr. D. Alejandro Rodriguez de Valcàrcel y Nebreda, Presidente de las

Cortes españolas (Lep. Attacidae) - *Graellsia,* Madrid, XXV: 105-118.

1890 ARZONE A. 1970 - Cenobiosi di *Philosamia cynthia* Drury in Piemonte. I. Un parassita della larva: *Pales pavida* Meigen - *Annali della Facoltà di Scienze Agrarie della Università di Torino,* V: 205-230.

1891 BALDIZZONE G. 1970 - Una nuova razza di farfalla della Puglia (Lep. Lycaenidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 25 (3): 77-78.

1892 BALLETTO E. 1970 - La fauna del Finalese - Italia Nostra - Sez. di Savona, Contributi di studio per un parco naturale, 16 pp.

1893 BARONIO P. 1970 - Nota sul superparassitismo di *Masicera pavoniae* R.-D. (Diptera, Larvevoridae) in *Saturnia pyri* Schiff. (Lepidoptera, Saturniidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 102 (7-8): 144-146.

1894 BAUMANN U. 1970 - Wanderfalter bei Alassio - *Atalanta,* Würzburg, 3 (1): 14-15.

1895 BIBOLINI C. 1970 - Biologia e danni nel Pisano della *Peridroma saucia* Hb. (Lep. Noctuidae) nel quadro della sua geonemia e dietologia mondiale e relativi mezzi di lotta - *Frustula entomologica,* X: 1-98.

1896 BIBOLINI C. 1970 - Comparsa e danni della *Mythimna unipuncta* Hw. (Lep. - Noctuidae) in Versilia e riferimenti alla sua importanza fitopatologica mondiale - *Frustula entomologica,* X: 1-38.

1897 BOURSIN C. 1970 - Neue Funde von interessanten Noctuiden - Arten in Europa. (Beiträge zur Kenntnis der Noctuidae Trifinae Nr. 168) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 18 (4-6): 78-82.

1898 CASTELLARI P.L., UGOLINI A. 1970 - Danni provocati a varie colture da un Lepidottero Nottuide (*Scotia ipsilon* Hfn.) - *Informatore Fitopatologico,* XX (13): 3-8.

1899 DE LESSE H. 1970 - Formules chromosomiques de quelques Rhopalocéres paléarctiques (Lep.) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 75 (7-8): 214-216.

1900 DE WORMS C.G.M. 1970 - *Melanargia arge* Sulzer and other Spring Butterflies in Central Italy, May 1970 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 82: 249-252.

1901 DIERL W. 1970 - Über einige *Solenobia*-Arten aus den Westalpen (Lepidoptera: Psychidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 19 (3): 33-37.

1902 DUFAY C. 1970 - L'éthologie d'*Acanthobrahmaea europaea* (Hartig) (Lep. Brahmaeidae) - *Alexanor,* VI (6): 249-260.

1903 DUFAY C. 1970 - *Amata albionica* Dufay, bona species et son ethologie (Lep. Ctenuchidae) - *Entomops,* Nice, 17: 31-40.

1904 GROSS F.J. 1970 - Über *Coenonympha corinna* nebst einer neuen Unterart sowie andere Lepidopteren von der Mittelmeerinsel Capraia - *Entomologische Zeitschrift,* 80 (17): 161-168.

1905 HARTIG F. 1970 - Neue Heteroceren - Rassen aus Kalabrien - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 19 (6): 114-118.

1906 HERBULOT C. 1970 - Sur quelques Geometridae de Sardaigne (2° note) - *Alexanor,* VI: 247-248.

1907 KOBES L. 1970 - *Gluphisia crenata danieli* ssp. nova, eine neue Subspecies aus Venezien/Italien - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 19 (2): 23-24.

1908 MANLEY W.B.L., ALLCARD H.G. 1970 - A field guide to the Butterflies and Burnets of Spain - Ed. E. W. Classey, England, 192 pp.

1909 PROTA R. 1970 - Descrizione dell'allotipo di *Rhegmatophila ricchelloi* Hartig, specie endemica della Sardegna (Lepidoptera Notodontidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 102 (5-6): 95-108.

1910 PROTA R. 1970 - Contributi alla conoscenza dell'entomofauna della Quercia da sughero (*Quercus suber* L.). VI. Osservazioni su alcuni Lepidotteri dannosi alla Quercia da sughero (*Quercus suber* L.) in Sardegna - *Stazione Sperimentale del Sughero,* Tempio Pausania, Mem. 30, 80 pp.

1911 TEOBALDELLI A. 1970 - Scoperta la pianta nutrice della *Ocneria prolai* Htg. (Lepidoptera Lymantriidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 102 (3-4): 75-76.

1912 THOMSON G. 1970 - Trans Alpine Insect Safari, 1970 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 82 (11): 284-292.

1913 VALLETTA A. 1970 - Collecting on Mt. Etna, Sicily - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 82: 203-208.

1914 WIEGEL K. - H. 1970 - Zwei neue Zygaenenrassen (Lepidoptera, Zygaenidae) aus Apulien (Unteritalien) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 60: 57-79.

1915 WOLFSBERGER J. 1970 - *Meliana stenoptera* Stgr. eine für Europa neue Noctuide (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 102 (5-6): 91-94.

1916 WOLFSBERGER J. 1970 - Eine neue südalpine Unterart von *Dichonia aprilina* L. (Lepidoptera, Noctuidae) (10. Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Südalpen) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 18 (4-6): 59-60.

1917 ZANGHERI S. 1970 - Nel mondo delle farfalle. I bruchi - Mondadori ed., Milano, 201 pp., 275 figg.

1918 ZUCCHERELLI G. 1970 - Un pericoloso nemico del kaki: la sesia del Ribes (*Synanthedon tipuliformis* Clerck). Ricerche e mezzi di lotta - *Rivista dell'Ortoflorofrutticoltuta Italiana,* 54: 523-534.

1919 ARZONE A. 1970 - Cenobiosi di *Philosamia cynthia* Drury in Piemonte. II. Un Imenottero iperparassita: *Eupteromalus arzoneae* Boucek - *Annali della Facoltà di Scienze Agrarie della Università degli studi di Torino,* VI (1970/71): 73-86.

1920 ARZONE A. 1971 - Biocenosi di *Philosamia cynthia* Drury in Piemonte. III. *Anastatus bifasciatus* Fourcroy parassita delle uova - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 103 (5-6): 87-97.

1921 BALDIZZONE G. 1971 - La femmina dell'*Erebia manto* Schiff. ssp. *valmaritima* Floriani (Lepidoptera Satyridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 103 (1-2): 42-43.

1922 BALDIZZONE G. 1971 - Reperti di Ropaloceri nel Piemonte meridionale. III - *Bollettino dell'Associazione romana di Entomologia,* 26 (1-2): 19-26.

1923 BOSCOLO L., MANTOVANI M.G. 1971 - La grotta della guerra - *L'Universo, Rivista bimestrale dell'Istituto Geografico Militare,* LI (5): 1195-1206.

1924 BOURSIN C. 1971 - *Lithophane lapidea* Hb. et *Lithophane leautieri* Bsd. Étude figurative. (Contributions à l'Étude des Noctuidae Trifinae, 171) - *Entomops,* Nice, 20: 129-135.

1925 CASINI P. 1971 - Presenza di *Heodes virgaureae apennina* Calb. nelle Alpi Apuane - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 26 (3/4): 66.

1926 DUJARDIN F. 1971 - Captures intéressantes - *Entomops,* Nice, 21: 151-154.

1927 DUJARDIN F. 1971 - Description de *Zygaena ephialtes perodeaui* ssp. n. des Alpes italiennes occidentales - *Entomops,* Nice, 22: 177-178.

1928 EISNER C., RACHELI T. 1971 - Parnassiana nova XLVI. Nachträgliche betrachtungen zu der Revision der Subfamilie Parnassiinae (Fortsetzung 19). Eine neue italienische subspecies von *Parnassius mnemosyne* L. - *Zoologische Mededelingen,* 45 (6): 89-90.

1929 EITSCHBERGER U., REISSINGER E. 1971 - Der Baumweissling im Mittelmeerraum. Zur Taxonomie und Systematik von *Aporia crataegi* (L.) (Lepidoptera, Pieridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 81 (4-5): 25-50.

1930 HABELER H. 1971 - Die Grossschmetterlings-Fauna mit Funddaten von Kleinschmetterlingen des Bezirkes Weiz - Gesch. u. Landschaft in Einzeldarstellung - Weiz: 73-152.

1931 HARTIG F. 1971 - Contributo alla conoscenza di alcuni Lepidotteri lucani - *Entomologica,* Bari, VII: 49-60.

1932 JUNGE G. 1971 - Eine neue Subspezies von *Plebejus pylaon* F.W. in Südtirol (Lep. Lycaenidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 20 (3): 33-35.

1933 REISSINGER E. 1971 - Wanderbericht von *Colias hyale* (L.) und *Colias alfacariensis* Ribbe 1966-1940 (Lepid. Pieridae) - *Atalanta,* 3 (3): 176-204.

1934 SBORDONI V., BULLINI L. 1971 - Further observations on mimicry in *Zygaena ephialtes* (Lepidoptera Zygaenidae) - *Fragmenta Entomologica,* Roma, VIII (2): 49-56, Tavv. I-II.

1935 SCALI V. 1971 - Imaginal diapause and gonadal maturation of *Maniola jurtina* (Lepidoptera: Satyridae) from Tuscany - *Journal of Animal Ecology,* 40: 467-472.

1936 SCALI V. 1971 - Spot distribution in *Maniola jurtina* (L.) (Lepidoptera Satyridae): Tuscan Mainland 1967-1969 - *Monitore Zoologico Italiano,* (N. S.) 5: 147-163.

1937 SOLINAS M. 1971 - *Oria musculosa* Hb. (Lep. Noctuidae): importante agente del fenomeno "spiga bianca" (white ear) in Puglia - *Entomologica,* Bari, VII: 87-114.

1938 TARANTINO L. 1971 - Contributo alla conoscenza della biologia della *Sesamia cretica* Led. in Puglia e Basilicata - *L'Agricoltura Jonica,* VI (5): 3-18.

1939 TEOBALDELLI A. 1971 - Alcune interessanti catture di Lepidotteri sui Monti Sibillini (Appennino Marchigiano) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 103 (7-8): 148-150.

1940 TEOBALDELLI A. 1971 - *Erannis ankeraria* Stgr. in Italia (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 103 (10): 228-229.

1941 VALLETTA A. 1971 - Mt. Etna (Sicily) Re-visited - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 83: 234-236.

1942 VIETTE P. 1971 - Sur *Lymantria atlantica* (Rambur, 1837) de Corse et de Sardaigne - *Entomops,* Nice, 21: 146-150.

1943 WOLFSBERGER J. 1971 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Monte Baldo in Oberitalien - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* F.S. n. 4, 336 pp.

1944 ZANGHERI S., CIAMPOLINI M. 1971 - Gravi infestazioni di *Scotia ipsilon* Hfn. nell'Italia centro-settentrionale - Atti Giornate Fitopatologiche 1971: 543-554.

1945 ZOCCHI R. 1971 - Contributo alla conoscenza dell'entomofauna delle Tamerici in Italia - *Redia,* Firenze, 52: 31-129.

1946 REISSINGER E. 1971 - Die geographisch - subspecifische Gliederung von *Colias alfacariensis* Ribbe unter Berücksichtigung der Migrationsverhältnisse (Lepidoptera, Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, 3 (4) (1971): 145-176; (6) (1972): 349-372, 5 (1) (1974): 1-33.

1947 BERIO E. 1971-1974 - Prima segnalazione di *Leucania arbia* Brs. - Rgs. in Italia (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 104 (9-10): 218.

1948 CAVALLORO R., PROTA R. 1972 - Metodo di allevamento di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) (Lepidoptera, Noctuidae) con diete artificiali - *Redia,* Firenze, 53: 395-411.

1949 DE JONG R. 1972 - Systematic and geographic history of the Genus *Pyrgus* in the Palaeartic region (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Tijdschrift voor Entomologie,* 115 (1): 1-121, Taf. 1-6.

1950 DE WORMS C.G.M. 1972 - Two Collecting Trips in Europe during 1960 (Arquata Scrivia, Piedmont) - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 72: 235-238.

1951 EITSCHBERGER U. 1972 - Zur Systematik europäischer Pieriden (Lep.) - *Entomologische Zeitschrift,* 82 (17): 193-198.

1952 FLORIANI G. 1972 - Considerazioni sulla presenza di *Cupido sebrus* Hüb. nelle Alpi Cozie (Lepidoptera Lycaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 104 (8): 174.

1953 HABELER H. 1972 - *Erebia stirius morula* Speyer in den Judicarischen Alpen (Lep. Satyridae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 21 (4): 78-79.

1954 HABELER H. 1972 - Eine weitere Fundstelle von *Procris albanica* Nauf. im Alpenraum (Lep. Zygaenidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 21 (5): 94-95.

1955 HABELER H. 1972 - Zur Kenntnis der Lebensräume von *Coenonympha oedippus* F. (Lep. Satyridae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 21 (3): 51-54.

1956 MORISI A. 1972 - Note faunistiche per l'anno 1971-1972 - *Mondo ipogeo, Annuario del Gruppo Speleologico Alpi Marittime, Cuneo,* VII: 52-57.

1957 SCALI V. 1972 - Spot distribution in *Maniola jurtina*: Tuscan Arcipelago 1968-1970 - *Heredity,* 29: 25-36.

1958 SCHEURINGER E. 1972 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Schnalstales (Vinschgau - Südtirol) - *Studi Trentini di Scienze Naturali,* Trento, Sez. B, XLIX (2): 231-448.

1959 SIEDER L. 1972 - Zusammenfassung der Familie Psychidae, Sackträger, in Kärtnen, einschliesslich der angrenzenden Länder (Lepidoptera, Psychidae) - *Carinthia,* II, 82 (162): 285-300.

1960 TORNAR G. 1972 - Improvvisa comparsa e danni causati in Versilia da *Mythimna unipuncta* Hw. (Lep. - Noctuidae) - *Osservatorio per le Malattie delle Piante (Sez. Entomologia), Pisa, Circolare* N. 19, 20 pp.

1961 TREMBLAY E. 1972 - Notizie sullo svernamento di alcune specie di Lepidotteri Noctuidae e Tortricidae - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* XXX: 117-130.

1962 WOLFSBERGER J. 1972 - Die Verbreitung von *Thecophora fovea* Tr. in den Alpen - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona,* XX: 223-225.

1963 ALBERTI B. 1972 - Zweite Mitteilung über einige neue oder bemerkenswerte Lepidoptera-Formen aus dem Grossen Kaukasus und Transkaukasien (Lepidoptera) - *Atalanta,* Würzburg, 4 (6): 380-394.

1964 BALDIZZONE G. 1973 - Sulla presenza di *Carterocephalus palaemon* nell'Appennino (Lepidoptera Hesperidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 105 (9-10): 161-162.

1965 BARAJON F. 1973 - Manuale dei Lepidotteri italiani - *76 pp., 37 Tavv.*

1966 BARONIO P. 1973 - Studio eto-morfologico della *Cyrtophleba ruricola* Meig. (Diptera, Larvevoridae) su *Apopestes spectrum* Esp. (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXI: 27-48.

1967 BURMANN K. 1973 - *Odontosia carmelita* Esp. nov. ssp. *montana* (Lep. Notodont.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 22 (6): 98-101.

1968 CASALE A. 1973 - Popolazione di *Antheraea yamamai* (Guér. Mén.) spontaneamente ambientata in peculiare autonomo biotopo italiano (Lep. Saturniidae) - *Annali della Facoltà di Scienze Agrarie della Università di Torino,* VIII: 309-324.

1969 CASSOLA F. 1973 - L'entomofauna sarda e i problemi della conservazione. Primo elenco delle specie da proteggere - *Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali,* 12: 141-149.

1970 DEVARENNE M. 1973 - Randonnées entomologiques en Sardaigne - *Les Naturalistes Belges,* 54 (5): 221-230.

1971 EITSCHBERGER U., STEINIGER H. 1973 - Appeal for International Cooperation in the Research of the Migration of Insects - *Atalanta,* Würzburg, 4 (3): 133-192.

1972 EITSCHBERGER U., STEINIGER H. ET AL. 1973 - Jahresbericht 1972 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen - *Atalanta,* Würzburg, 4 (5): 257-304.

1973 GALLO E. 1973 - *Zygaena vesubiana* Le Ch. nelle Alpi Marittime italiane (Lepidoptera Zygaenidae) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, LII: 98.

1974 LAPLANCHE G. 1973 - Chasse en Lucanie. Mont Vulture (Lep. Brahmaeidae, Rhopalocera) - *Alexanor,* VIII (5): 105-107.

1975 PROTA R. 1973 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. I. Specie catturate alla lampada nella Sardegna Nordoccidentale - *Studi Sassaresi,* Sassari, Sez. III, XXI (2): 705-793.

1976 PROTA R. 1973 - Contributi alla conoscenza dell'entomofauna della Quercia da sughero (*Quercus suber* L.). VII. indagini sulla composizione e consistenza della lepidotterofauna di una sughereta e sul dinamismo delle principali specie nocive - *Stazione Sperimentale del Sughero,* Tempio Pausania, Mem. 35, 130 pp.

1977 PROTA R. 1973 - Osservazioni sul comportamento di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) allo scopo di condurre allevamenti massivi in laboratorio - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XXI: 705-793.

1978 PROTA R., CAVALLORO R. 1973 - Osservazioni sul comportamento di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) (Lepidoptera, Noctuidae) allo scopo di condurre allevamenti massivi in laboratorio - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XXI (1): 3-22.

1979 PUDDU S., PIRODDA G. 1973 - Catalogo sistematico ragionato della fauna cavernicola della Sardegna - *Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari,* XLIII: 180-184.

1980 TEOBALDELLI A. 1973 - Considerazioni sulla fauna lepidotterologica del Maceratese e dei Monti Sibillini - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* N. S., II (1971): 313-322.

1981 TEOBALDELLI A. 1973 - Allevamento di *Ocneria prolai* Htg. e descrizione del bruco (Lepidoptera Lymantriidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 105 (1-3): 30-40.

1982 THOMSON G. 1973 - Geographical variation of *Maniola jurtina* (L.) (Lepidoptera, Satyridae) - *Tijdschrift voor Entomologie,* 116 (12): 185-227, 4 figg., 7 Carte, 2 Tavv.

1983 VIGGIANI G., MAZZONE P. 1973 - Nuovi attacchi di *Synanthedon tipuliformis* sul kaki segnalati in Campania - *L'Informatore Agrario,* 29: 13076-13077.

1984 VILLA R. 1973 - Osservazioni sull'uovo di *Polygonia egea* Cr. (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana, Genova,* 105 (7-8): 89-92.

1985 WIEGEL K. H. 1973 - Zweiter Beitrag zur Zygaenenfauna des Litoralgebietes von Apulien (Unteritalien) (Lep. Zygaenidae) - *Atalanta,* Würzburg, 4 (4): 224-240.

1986 WILTSHIRE E.P. 1973 - A Holiday in or near the Western Alps in June-July 1971, with notes on the Lepidoptera - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 85 (3): 41-47.

1987 WOLFSBERGER J. 1973 - *Mythimna unipuncta* Haw. in Südbayern (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 22 (3): 33-35.

1988 ZAHM N. 1973 - Eine Wanderung von *Colias crocea* (Geoffroy, 1785) im Mittelitalien im Juni 1973 (Lep. Pieridae) - *Atalanta,* 4 (6): 378-379.

1989 ZANGHERI S. 1973 - Considerazioni generali sui macrolepidotteri dell'Appennino Centrale - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* N.S., vol. II (1971): 301-312.

1990 BASSI N. 1973 - Reperto di tre nuove colonie di Lepidotteri Ropaloceri in Piemonte - *Atti della Accademia delle Scienze di Torino, I-Classe Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali,* 108: 259-264.

1991 BURMANN K. 1974 - *Anarta cordigera* Thnbg. nov. ssp. *alpestris* (Lep., Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 23 (2): 20-23.

1992 CAPOLONGO D., CANTILENA S., PANASO R. 1974 - Specie cavernicole di Campania - *Annuario Istituto e Museo di Zoologia,* XX: 33-214.

1993 COLA L., FREUDE H. 1974 - Prima nota sulla fauna delle grotte nella zona di Genga (Ancona) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 106 (1/2): 37-39.

1994 DE JONG R. 1974 - Notes on the genus *Carcharodus* (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Zoologische Mededelingen,* 48 (1): 1-9.

1995 DE JONG R. 1974 - Systematics and evolution of the Palaeartic *Spialia* species (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Tijdschrift voor Entomologie,* 117 (5): 225-271, 37 figg., 6 carte.

1996 DE WORMS C.G.M. 1974 - Butterflies in Tuscany, May-June 1973 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 86 (2): 45-48.

1997 DUFAY C. 1974 - *Ocneria prolai* Htg. et *Tephrina arenacearia* Schiff. en Latium (Lepidoptera Lymantriidae et Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova 106 (3-4): 75-77.

1998 DUFAY C. 1974 - *Plebeius pylaon* trappi Vrty. dans le Val di Antrona et le Val Vigezzo (Lepidoptera Lycaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 106 (3-4): 77-79.

1999 DUFAY C. 1974 - *Tephrina arenacearia* Schiff. espèce nouvelle pour la France en Corse (Lep. Geometridae, Ennominae) - *Entomops,* Nice, 33: 15-16.

2000 EISNER C. 1974 - Parnassiana Nova XLIX - Die Arten und unterarten der Baroniidae, Teinopalpidae und Parnassiidae (Erster Teil) (Lepidoptera) - *Zoologische Verhandelingen,* n. 135: 3-96.

2001 GALLO E., DELLA BRUNA C. 1974 - Recherches lépidoptèrologiques en Italia Méridionale (Rhopalocera) - *Alexanor,* VIII (5): 249-255.

2002 HABELER H. 1974 - Zum Problem *Horisme tersata* Schiff. / *testaceata* Hbn. (Lep., Geometridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 64: 1-12.

2003 LEMPKE B.J. 1974 - Zwei für die deutsche Fauna neue Psychidae (Lep.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 23 (6): 109-110.

2004 LORKOVIC Z. 1974 - Die Verteilung der variabilität von *Hipparchia statilinus* Hufn. (Lepid., Satyridae) in beziehung zum Karstboden des ostadriatischen küstenlandes - *Acta entomologica Jugoslavica*, 10 (1-2): 41-53.

2005 MINELLI A. 1974 - Studio preliminare della fauna di Treviso con riflessioni sulla fauna degli ambienti urbani - *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,* CXXXII: 115-156.

2006 PROTA R. 1974 - Note sulla cenosi lepidotterica di *Quercus suber* L. e sulle fluttuazioni di alcune specie dannose fotosensibili. Contributi alla conoscenza dell'entomofauna della Quercia da sughero (*Quercus suber* L.) VIII - *Redia,* Firenze, 55: 439-461.

2007 PROTA R. 1974 - Appunti su alcuni Lepidotteri nuovi o poco conosciuti per la fauna sarda - Atti X Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sassari, 20-25 Maggio 1974: 225-226.

2008 PROTA R. 1974 - Note sulla cenosi lepidotterica di *Quercus suber* L. e sul dinamismo di alcune specie nocive fotosensibili - Atti X Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sassari, 20-25 Maggio 1974: 297-298.

2009 SBORDONI V. 1974 - *Lelia coenosa* Hüb. al lago di Burano - *Rivista del WWF,* vol. 3 (2): 2 pp.

2010 SBORDONI V. 1974 - Endemismi italiani: *Amata* (*Syntomis*) *ragazzii* (Turati) (Lepidopetra Ctenuchidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 29 (3-4): I-II.

2011 WOLFSBERGER J. 1974 - *Chrysaspidia putnami gracilis* Lempke in den Südalpen (Lep. Noct.) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona,* I: 397-399.

2012 WOLFSBERGER J. 1974 - *Caradrina albina rougemonti* Spuler in den Nordostalpen (Lep. Noct.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 23 (4): 65-67.

2013 WOLFSBERGER J. 1974 - Neue und interessante Makrolepidopteren-funde aus Südbayern und den angrenzenden

Nördlichen Kalkalpen (7. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 23 (3): 33-56.

2014 WOLFSBERGER J. 1974 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes (I. Nachtrag) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona,* I: 167-193.

2015 LEESTMANS R. 1974 - *Amatha phegea* (Linné, 1758) (Lepidoptera Ctenuchidae). Considerations biogeographiques et ecologiques - *Linneana Belgica,* VI (1): 11-24; (2): 36-46; (3): 62-74.

2016 AGENJO R. 1974-1975 - *Hyppa rectilinea* (Dup., 1788) género y especie nuevos para la Peninsula Ibérica (Lep. Noctuidae) - *Eos,* Madrid, 49 (1973): 9-12.

2017 ARILLO A., BALLETTO E., CAGNOLARO L., ORSINO F. 1975 - Proposte di Riserve Naturali in Liguria. Individuazione delle aree di maggior interesse faunistico, floristico e vegetazionale - Atti del V Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura, Bari, 22-27 Aprile 1975: 7-58, 9 figg.

2018 ARNSCHEID W. 1975 - Psychidenfunde aus der Umgebung von Naturns in Südtirol (Lep., Psychidae) - *Entomologische Zeitschrift, 85* (13): 147-151.

2019 BALLETTO E., TOSO G.G. 1975 - Reperti di Ropaloceri nelle Alpi Liguri - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 107 (9-10): 160-163.

2020 BECCARI F., GERINI V. 1975 - Catalogo della collezione entomologica. Volume I. Lepidoptera - *Istituto Agronomico per l'Oltremare,* Firenze, 123 pp.

2021 BOLLAND F. 1975 - Chasse de nuit au Val Vigezzo (Italie) - *Bulletin du Cercle des Lépidopteristes de Belgique,* IV (2): 21.

2022 BURMANN K. 1975 - *Philea flavicans* Hb. *wolfsbergeri* ssp. nov. (Lepidoptera, Endrosidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 24 (2): 17-20.

2023 CIAMPOLINI M., ZANGHERI S. 1975 - *Sesamia nonagrioides* (Lef.) e *Peridroma saucia* Hb. (Lep. Noctuidae) dannose a colture floricole - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 13 (1975/1976): 37-47.

2024 DE TOULGOËT H. 1975 - Remarques sur le genre *Endrosa* Hübner et sur la valeur taxonomique des *Endrosa andereggi* H.-S. et *flavicans* Bellier (Lep. Arctiidae Lithosiinae) - *Bulletin de la Société entomologique de France,* 80 (7-8): 233-238.

2025 DUFAY C. 1975 - *Dryobotodes carbonis* Wagner, bona species, espèce nouvelle en Europe et en France (Lép., Noctuidae Cucullinae) - *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon,* 44 (1): 24-27.

2026 EISNER C. 1975 - Parnassiana nova L. Neue Unterarten der Parnassiidae - *Zoologische Mededelingen,* 49 (8): 81-84.

2027 EITSCHBERGER U., STEINIGER H. 1975 - Die geographische variation von *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780) in der westlichen Palaearktis (Lep. Lycaenidae) - *Atalanta,* Würzburg, 6 (2): 84-125.

2028 EITSCHBERGER U., STEINIGER H., STEINIGER C. 1975 - Jahresbericht 1974 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswande-rungen - *Atalanta,* Würzburg, 6 (3): 129-174.

2029 FRILLI F., PIZZAGHI W. 1975 - Contributo alla conoscenza dell'entomofauna dell'Appennino e della pianura attorno a Piacenza - *Entomologica,* Bari, XI: 29-80.

2030 HARTIG F. 1975 - Au Mont Gennargentu, en Sardaigne - *Linneana Belgica:* 26-30.

2031 HIGGINS L.G. 1975 - *Lycaeides argyrognomon* Bergst. in Sardinia - *Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali,* Anno IX, vol. XV, pp. 1.

2032 KÖNIG F. 1975 - Catalogul colectiei de Lepidoptere a Muzeului Banatului - Timisoara, 284 pp.

2033 KUDRNA O. 1975 - A revision of the genus *Gonepteryx* Leach (Lep., Pieridae) - *Entomologist's Gazette,* 26 (1): 3-37.

2034 KUDRNA O. 1975 - On a hitherto undescribed european Species of the Genus *Hipparchia* Fabricius (Lep., Satyridae) - *Entomologist's Gazette,* 26 (3): 197-207.

2035 MAZZUCCO K. 1975 - Bericht der Österreichischen Forschungs-zentrale für Schmetterlingswanderungen (Salzburg) im Jahre 1974 - *Atalanta,* Würzburg, 6 (3): 175-179.

2036 MENTZER, VON, E. 1975 - Geographische Verbreitung und verwandtschaftliche Beziehungen von *Lygephila glycyrrhizae* Rambur (Lep. Noctuidae) - *Entomologisk Tidskrift,* 96 (3-4): 150-161.

2037 NUCIFORA A. 1975 - Ricerche preliminari bio-etologiche sulla "processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa* Schiff.) nelle pinete dell'Etna - Atti X Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sassari, 20-25 Maggio 1974: 265-268.

2038 PARENZAN P. 1975 - Contributi alla conoscenza della Lepidottero-fauna dell'Italia meridionale. I. Rhopalocera di Puglia e Lucania - *Entomologica,* Bari, XI: 87-154.

2039 PARENZAN P. 1975 - Aberrazioni di *Polygonia c-album* L. e *Brenthis daphne* L. (Lep. Nymphalidae) rinvenute in Italia Meridionale - *Entomologica,* Bari, XI: 155-160.

2040 PLANTE J. 1975 - *Blepharita spinosa* (Chrétien) en Corse (Noctuidae Cuculliinae) - *Alexanor,* IX (1): 2-8.

2041 PROTA R. 1975 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. II. Appunti su alcuni Lepidotteri nuovi o poco conosciuti per la fauna sarda - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Milano,* A. IX, Vol. XV: 7-43.

2042 RAUCH H. 1975 - Beiträge zur Zygaenenfauna de Promontorio del Gargano in Apulien (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 24 (3): 40-52.

2043 SCHEURINGER E. 1975 - Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von *Oligia versicolor* Bkh. in Südbayern, Südtirol und dem südlich anschliessenden Gebirgsland (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 24 (1): 1-4.

2044 SCHEURINGER E. 1975 - Zur Verbreitung von *Abrostola agnorista* Dufay in Südtirol und dem südlich anschliessenden Gebirgsland. (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 24 (3): 58-59.

2045 SCHMIDT-KOEHL W. 1975 - Chorologische und faunistische Betrachtungen zur Tagfalter-Fauna der Insel Korsika (Insecta Lepidoptera) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel* (N.F.) 25: 38-71.

2046 SIEDER L. 1975 - Psychidenfang (Lepidoptera) in der Umgebung von Taormina, Sizilien - *Entomologische Zeitschrift,* 85 (5): 93-95.

2047 TARANTINO L. 1975 - Danni alle piante di Fava causati dalla Nottua del carciofo (*Hydroecia xanthenes* Germ.) - *Informatore fitopatologico,* XXV (3): 22-24.

2048 TEOBALDELLI A. 1975 - *Noctua interposita* Hbn. rinvenuta sui Monti Sibillini (Appennino marchigiano) (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 107 (6-8): 116-119.

2049 VIGGIANI G., MAZZONE P. 1975 - Osservazioni biologiche su *Synanthedon tipuliformis* Cl. (Lep. Aegeriidae) in rapporto a *Diospyros kaki* L., con notizie preliminari sul suo allevamento in laboratorio - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* XXXII: 145-155.

2050 WILLIEN P., RACHELI T. 1975 - Description d'une nouvelle sous-espèce d'Italie de *Erebia pandrose* Borkhausen (Lep. Satyridae) - *Entomops,* Nice, 36: 101-104.

2051 ZANGHERI S. 1975 - La Lepidotterofauna delle Prealpi Venete sulla base della Collezione A. Ancillotto - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXI: 215-250.

2052 ZANGHERI S. 1975 - La Lepidotterofauna della Sardegna - Atti X Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sassari, 20-25 Maggio 1974: 29-45.

2053 ARNSCHEID W., ROOS P. 1975 - Eine neue Subspecies von *Erebia cassioides* aus Norditalien (Lep., Satyridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 86 (7): 69-71.

2054 BALLETTO E., TOSO G.G. 1976 - Nuovi reperti di Ropaloceri nelle Alpi Liguri. Secondo contributo - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 108 (3-4): 50-52.

2055 BALLETTO E., TOSO G.G. 1976 - *Euphydryas aurinia tiragalloi* n. ssp. dell'Appennino ligure - piemontese (Lepidoptera Nymphalidae) - *Doriana, supplemento Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, V: 1-7.

2056 BERIO E. 1976 - Una nuova specie di *Agrochola* scoperta in Italia (Lepidoptera Noctuidae Cuculliinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 108 (1-2): 22-23.

2057 BERIO E. 1976 - Riabilitazione di *Euxoa ambrosiana* Brs. e primo reperto in Italia (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 108 (5-7): 142-144.

2058 BOLLAND F. 1976 - *Mythimna straminea* Treitschke, une Noctuelle Trifide, nouvelle pour l'Espagne - *SHILAP, Revta. lepid.,* 4: 245-246.

2059 BRETHERTON R.F. 1976 - *Brithys pancratii* (Cyrillo, 1787) a subspecies of *Brithys crini* (Fabricius, 1775) (Lep., Noctuidae) - *Entomologist's Gazette,* 27 (4): 226-228.

2060 BURMANN K. 1976 - Wandernde Lepidopteren (Macro- und Microlepidoptera). Eine weitere Ergänzung der Wanderfalterliste - *Atalanta,* Würzburg, 7 (2): 49-55.

2061 CASTELLARI P.L. 1976 - Recente infestazione di *Peridroma saucia* Hb. su Peschi cv. Stark Red Gold - *Informatore fitopatologico,* XXVI (2/3): 21-28.

2062 DE LAEVER E. 1976 - Une sous-espece de *Allophyes protai* (Brsn.) sur le continent - *Bulletin du Cercle des Lépidopteristes de Belgique,* V (5): 74-76.

2063 DI MURO A., LORITO N. 1976 - Esperienze di lotta contro larve di *Agrotis* spp. del tabacco - *Informatore fitopatologico,* XXVI (8): 17-21.

2064 DUFAY C. 1976 - *Agrochola dujardini* Dufay espèce française méconnue (Lep. Noctuidae Cuculliinae) - *Entomops,* Nice, 38: 211-218.

2065 EISNER C. 1976 - Parnassiana nova XLIX. Die Arten und Unterarten der Parnassiidae (Lepidoptera) (Zweiter Teil) - *Zoologische Verhandelingen,* Leiden, 146: 99-266.

2066 HARTIG F. 1976 - Ein Nachtfang im Winter am Gennargentu (Sardinien) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* N.F., 26 (1): 14-19.

2067 HARTIG F. 1976 - Au Mont Gennargentu, en Sardigne. II - *Linneana Belgica,* VI (8): 182-188.

2068 HARTIG F 1976 - Naturschutz oder Ausrottung? - *Entomologische Zeitschrift,* 86 (5): 45-47.

2069 HELFRICH A. 1976 - Fang und Zucht von *Iolana jolas* O. - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N.F., 1 (3): 52-54.

2070 HIGGINS L.G. 1976 - *Hipparchia algirica sardoa* Spuler 1902 Type Locality Sardinia. Syn. *Papilio aristaeus* Bonelli 1826 (invalid homonym) - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 88: 30.

2071 KUDRNA O. 1976 - Two new taxa of the genus *Hipparchia* Fabricius (Lep. Satyridae) - *Atalanta,* Würzburg, VII (3): 168-171.

2072 LEIGHEB G. 1976 - Contributo allo studio delle *Erebia* alpine italiane: I. - *Erebia christi* Raetzer (Lepidoptera Satyridae), specie nuova per l'Italia. II. - *Erebia flavofasciata* Heyne (Lepidoptera Satyridae): morfologia, eto-ecologia, corologia - *Redia,* Firenze, III ser., LIX: 331-353.

2073 MONACO R., IPPOLITO R. 1976 - Attuali conoscenze sulla fauna del carciofo in Italia e problemi di difesa - "Nuovi studi sul carciofo", Atti 2° Congr. Internaz. sul Carciofo (1973): 877-888.

2074 NUZZACI G. 1976 - I principali Artropodi dannosi al Garofano in Puglia - 1° Convegno su la Floricoltura del Salento, Taviano, 29-30 ottobre 1976: 117-128.

2075 PARENZAN P. 1976 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. II. Nuovi reperti di Noctuidae e Geometridae - *Entomologica,* Bari, XII: 153-169.

2076 PARENZAN P. 1976 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. III - *Polyploca neoridens* n. sp. (Lepidoptera, Thyatiridae) - *Entomologica,* Bari, XII: 203-211.

2077 PARENZAN P. 1976 - Osservazioni sulla Lepitterofauna (sic) di alcuni ambienti caratteristici dell'Italia meridionale - Atti del VI Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura, Bari, 26-29 Aprile 1976: 301-312.

2078 PROTA R. 1976 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. III. Note sui principali Lepidotteri migratori rilevati in Sardegna - *Bollettino della Società Sarda di Scienxe Naturali,* A. X, Vol. XVI: 17-26.

2079 ROOS P., ARNSCHEID W. 1976 - Zur Verbreitung und subspezifischen Gliederung von *Erebia pandrose* Bkh. im Alpenraum (Lep., Satyridae). Beitrag zur Kenntnis der Erebien, III - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 25 (6): 119-123.

2080 SBORDONI V. 1976 - Endemismi italiani: *Zygaena* (*Mesembrinus*) *rubicundus* Hübner (Lepidopetra, Zygaenidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 31 (1-4): I-II.

2081 SCHEURINGER E. 1976 - *Oligia dubia* Heydem., eine für Italien neue Noctuide (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 25 (3): 51-54.

2082 SIEDER L. 1976 - Eine neue Psychidae aus Sardinien (Lepidoptera, Psychidae) *Scioptera hartigi* spec. nov. - *Entomologische Berichten, Amsterdam,* 36: 43-45.

2083 STROBINO R. 1976 - *Euchloe insularis* Staudinger bona species, de Corse et Sardaigne - *Entomops,* Nice, 38: 203-210.

2084 TEOBALDELLI A. 1976 - *Korscheltellus bertrandi* (Le Cerf): primo rinvenimento in Italia (Lepidoptera Hepialidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 108 (5-7): 102-104.

2085 TEOBALDELLI A. 1976 - I Macrolepidotteri del Maceratese e dei Monti Sibillini (Appennino Umbro-Marchigiano). (Primo contributo alla conoscenza dei Lepidotteri delle Marche) - *Note ed appunti sperimentali di Entomologia Agraria,* Perugia, XVI: 81-346.

2086 TEOBALDELLI A. 1976 - Un caso di intersessualità in *Gonepteryx cleopatra* L. (Lepidoptera, Pieridae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 30 (1-4): 20-22. (1975).

2087 THOMSON G. 1976 - Le genre *Maniola* Schrank (Lepidoptera Satyridae): Notes sur les génitalia mâles et femelles - *Linneana Belgica,* VI (6): 126-142.

2088 TOSO G.G., BALLETTO E. 1976 - Una nuova specie del genere *Agrodiaetus* Hübn. (Lepidoptera Lycaenidae) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, LXXXI: 124-130.

2089 VALLETTA A. 1976 - Collecting Lepidoptera and Other Insects in Sicily in 1975 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 88: 113-118.

2090 VENTURINI V. 1976 - Nuovi ospiti di *Spodoptera littoralis* Boisduval (Lepidoptera Noctuidae) in Italia - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 13 (1975-76): 167-172.

2091 ALBERO R.A. 1976 - Contributo alla conoscenza dei Lepidotteri del M. Terminio (AV) - Tesi di laurea in Zoologia, Corso di Laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, 88 pp.

2092 ARNSCHEID W., ROOS P. 1977 - Differenzierung der Subspecies von *Erebia euryale* Esper in Mitteleuropa unter besonderer Berücksichtigung von Mischpopulationen (Lep., Satyridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 87 (18): 201-211.

2093 BALLETTO E., TOSO G., BARBERIS G., ROSSARO B. 1977 - Aspetti dell'ecologia dei Lepidotteri Ropaloceri nei consorzi erbacei alto appenninici - *Animalia,* Catania, 4 (3): 277-343.

2094 BENINI G. 1977 - La *Coenonympha dorus* nel Bolognese - *Rivista Entomologica,* Bologna, II (2): 13-15.

2095 BIGGER T.R.L. 1977 - Some notes on sicilian butterflies (Lep., Rhopalocera) - *Entomologist's Gazette,* 28 (4): 211-213.

2096 BONZANO C., AMELIO M. 1977 - Sintesi della fauna cavernicola della Provincia di Imperia - *Bollettino del Gruppo Speleologico Imperiese - C.A.I,* VII (8): 15-47.

2097 CAPELLI F. 1977 - *Limenitis camilla* L. Una nuova colonia in Emilia - *Rivista Entomologica,* Bologna, II (5): 13.

2098 DE FREINA J.J. 1977 - Zur Systematik von Gonepteryx cleopatra (Linné, 1767) und ihrer Unterarten und die Beschreibung einer neuen Unterart (Lep. Pieridae) - Atalanta, Würzburg. VIII (4): 270-278.

2099 DE LAEVER E. 1977 - *Lythria* Hübner *purpuraria* Linné en Espagne - *SHILAP, Revta. lepid.,* 5: 153-154.

2100 GALLO E., DELLA BRUNA C. 1977 - Recherches lépidoptérologiques en Italie méridionale (Rhopalocères). II. Nouvelles captures sur le Massif du Pollino (Apennin de Lucanie) - *Alexanor,* X (2): 77-85.

2101 HARTIG F 1977 - Sardinien einst und jetz - *Entomologische Zeitschrift,* 87 (11): 118-120.

2102 KUDRNA O. 1977 - On the status of Lasiommata paramegaera (Hübner) (Lep. Nymphalidae) - Atalanta, Würzburg. VIII (4): 290-293.

2103 KUDRNA O. 1977 - A revision of the genus *Hipparchia* Fabricius - E. W. Classey, Faringdon, 300 pp.

2104 LEESTMANS R. 1977 - Sur la répartition géographique de *Brintesia circe* F. (Lepidoptera Satyridae) - *Linneana Belgica,* VII (2): 39-42.

2105 LEIGHEB G., CAMERON-CURRY V. 1977 - Distribuzione in Piemonte ed in Liguria di alcune Lycaenidae rare in Italia (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 109 (1-3): 46-48.

2106 MONACO R., PARENZAN P., TRIGGIANI O. 1977 - L'*Euxoa temera* Hb. (Lepidoptera - Noctuidae) dannosa in Puglia - *Entomologica, Bari, XIII: 165-181.*

2107 OCCELLI P. 1977 - Una preoccupazione primaverile per i viticoltori: le nottue - *L'Informatore Agrario,* 16: 26311-26315.

2108 PARENZAN P. 1977 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia Meridionale. IV. Heterocera (Bombyces et Sphinges) di Puglia e Lucania - *Entomologica,* Bari, XIII: 183-245.

2109 PARENZAN P. 1977 - Presenza in Puglia di *Laelia coenosa* Hb. e *Leucania arbia* Brs.-Rgs. (Lepidoptera: Lymantriidae, Noctuidae) - *Entomologica,* Bari, XIII: 15-20.

2110 PROTA R. 1977 - Beiträge zur Kenntnis der sardischen Lepidopterenfauna III. Anmerkungen über die hauptsächlichen, in Sardinien vorkommenden Wanderlepidopteren - *Atalanta,* Würzburg, 8 (1): 1-10.

2111 RAUCH H. 1977 - Ein Beitrag zur Zygaenenfauna Bosniens (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreischen Entomologen,* 28 (4) (1976): 109-116.

2112 REZBANYAI L. 1977 - *Calostygia puengeleri* Stertz in der Zentralschweiz. *Calostigia puengeleri sauteri* ssp. nova - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* N.F., 27 (1): 10-24.

2113 SCHMIDT-KOEHL W. 1977 - Geographische und lepidopterologische Eindrücke zweier Frühjehrsreisen in das adriatische Jugoslawien im April 1976 und 1977 - *Entomologische Zeitschrift,* 87 (21): 237-248.

2114 TACCANI C. 1977 - Contribuzione allo studio dei Lepidotteri Ropaloceri del Lago Maggiore: nuove aggiunte - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 109 (9-10): 164-165.

2115 TEOBALDELLI A. 1977 - Eine neue *Hepialus*-Art aus Italien. (Lepidoptera, Hepialidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 26 (3): 38-43.

2116 TEOBALDELLI A. 1977 - *Hepialus anselminae* Teob., 1977, della Valle d'Aosta (Lepidoptera Hepialidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 109 (7-8): 127-129.

2117 TREMEWAN W.G. 1977 - The publications on Lepidoptera by O.G. and A. Costa and the nominal taxa described therein - *The Bulletin of the British Museum (Nat. Hist.),* 5 (3): 223-232.

2118 VILLA R. 1977 - Rinvenimento a Bologna di *Rhyparia purpurata* L. (Lepidoptera Arctiidae) - *Rivista Entomologica,* Bologna, II (1): 3.

2119 VILLA R. 1977 - Un allevamento di *Papilio hospiton* Géné - *Rivista Entomologica,* Bologna, II (6): 15-17.

2120 VILLA R. 1977 - Una aberrazione di *Maniola jurtina* L. - *Rivista Entomologica,* Bologna, II (1): 5-6.

2121 WAGENER S. 1977 - Bemerkungen zu den *Parnassius*-Formen des Apennin aus geographische-ökologische Sicht (Papilionidae) - *Nota lepidopterologica,* 1 (1): 23-37.

2122 ARNSCHEID W., ROOS P. 1977 - Über der Zucht und die Präimaginalstadien von *Erebia alberganus* Prunner (Lep., Satyridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 88 (6): 66-68.

2123 BALLETTO E., TOSO G. 1978 - *Zygaena minos* (Schiffermüller) dans les Alpes ligures - *Entomops,* Nice, 46: 197-200.

2124 BALLETTO E., TOSO G.G. 1978 - Nuovi reperti di Ropaloceri nelle Alpi Occidentali (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 110 (1-3): 35-38.

2125 BENINI G. 1978 - *Gonepteryx cleopatra* L. sua diffusione nel bolognese - *Rivista Entomologica,* Bologna, III (3/4): 17-18.

2126 BENINI G. 1978 - Un caso di ibridismo: *Lysandra bellargus* Rott. x *Lysandra coridon* Poda - *Rivista Entomologica,* Bologna, III (1): 9-11.

2127 BERIO E. 1978 - Novità paleartiche del genere *Hadena* Schk. (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 56 (1977): 233-238.

2128 BOLLAND F. 1978 - *Phyllophila obliterata* Rambur. Une Noctuelle Quadrifine, nouvelle pour l'Espagna. (Lep. Noctuidae, Quadrifinae) - *SHILAP, Revta. lepid.,* 6: 142.

2129 BURMANN K. 1978 - Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Tirols. V. Zwei für Österreich neue Noctuides (Insecta: Lepidoptera, Noctuidae) aus Nordtirol - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreischen Entomologen,* 29 (3-4) (1977): 117-120.

2130 CIAMPOLINI M., ZANGHERI S. 1978 - Gravi e tipici danni di *Mamestra brassicae* L. (Lepidoptera, Noctuidae) alle coltivazioni di Cavolo broccolo nel Foggiano - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 14 (1977/1978): 173-179.

2131 DE FREINA J.J. 1978 - Beitrag zur Kenntnis von *Ocnogyna baetica* und dessen Verbreitungsareal (Lep., Arctiidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 88 (3): 22-25.

2132 DE JONG R. 1978 - Monograph of the Genus *Spialia* Swinhoe (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Tijdschrift voor Entomologie,* 121 (3): 24-146.

2133 EISNER C. 1978 - Parnassiana nova LIV. Dr. S. Wagener's Bemerkungen zu den *Parnassius*-Formen des Apennin aus Geografisch-Ökologischer sicht - *Zoologische Mededelingen,* 53 (21): 237-242.

2134 FLORIANI G.C. 1978 - Attuali conoscenze sulla distribuzione di *Erebia pronoe* Hüb. in Italia (Lepidoptera Satyridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 110 (7-8): 146-148.

2135 GALLO E. 1978 - Alcune interessanti catture di Lepidotteri in Italia (Rhopalocera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 110 (4-6): 84-85.

2136 HENNUY J.J. 1978 - Captures dans la nature d'*Antheraea yamamai* Guerin in Italie - *Lambillionea,* LXXVII (9-10): 67-68.

2137 IPPOLITO R., PARENZAN P. 1978 - Contributo alla conoscenza delle *Gortyna* Ochs. europee (Lepidoptera, Noctuidae) - *Entomologica,* Bari, XIV: 159-202.

2138 LEIGHEB G. 1978 - Notes on Sicilian species of the genus *Hipparchia* Fabricius. (Satyridae) - *Nota lepidopterologica,* 1 (3): 119-124.

2139 LEIGHEB G. 1978 - Sulla sopravvivenza di *Mellicta britomartis* (Assmann) in Italia (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 33: 12-18.

2140 MARCHETTI A. 1978 - L'*Agrodiaetus ripartii* in Val di Susa. Aggiornamento dei dati di distribuzione riportati nell'attuale bibliografia - *Rivista Entomologica,* Bologna, III (2): 10.

2141 PROLA C., PROVERA P., RACHELI T., SBORDONI V. 1978 - I Macrolepidotteri dell'Appennino centrale. Parte II. Noctuidae - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 32 (1977) (1-4): 1-238.

2142 PROLA C., PROVERA P., RACHELI T., SBORDONI V. 1978 - I Macrolepidotteri dell'Appennino Centrale. Parte I. Diurna, Bombyces e Sphinges - *Fragmenta entomologica,* Roma, 14: 1-217.

2143 RACHELI T., PROLA C., PROVERA P. 1978 - Note su alcuni Lepidotteri dell'Italia centrale - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 33 (1-4): 19-39.

2144 TEOBALDELLI A. 1978 - I Macrolepidotteri dell'alto Appennino marchigiano (Lepidoptera) - Atti XI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Portici-Sorrento, 10-15 maggio 1976, 215-227.

2145 TEOBALDELLI A. 1978 - Macrolepidotteri della Riserva Naturale di Torricchio - La Riserva Naturale di Torricchio, Università di Camerino, Vol. 3: 1-181.

2146 TIBERI R. 1978 - Notizie preliminari sull'incidenza dei parassiti oofagi nelle popolazioni di processionaria del pino in giovani pinete dell'Italia centrale - *Redia,* Firenze, III ser., LXI: 487-501.

2147 VAILATI D. 1978 - Nota preliminare sulla fauna della grotta Omber en Banda al Büs del Zel (247 Lo-BS) - *Natura Bresciana, Annali del Museo Civico di Scienze Naturali,* Brescia, 15: 60-68.

2148 VALLETTA A. 1978 - A Short Visit to Mt. Etna in 1976 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 90: 8-10.

2149 VARGA Z., 1978 - Remarques sur la validité et sur la répartition de "l'espèce" *Apatura metis* (Freyer, 1829) (Lepidoptera Nymphalidae) - *Linneana Belgica,* VII (6): 192-208.

2150 VIGGIANI G., CURRADO I. 1978 - Sul parassitismo di *Cales noacki* (How.) (Hym. Aphelinidae) in uova di *Phalera bucephala* L. (Lep. Notodontidae) - Atti XI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Portici-Sorrento, 10-15 maggio 1976: 317-319.

2151 VILLA R. 1978 - Ginandromorfismo bilaterale di *Lycaeides argyrognomon* Bergstr. - *Rivista Entomologica,* Bologna, III (2): 7-8.

2152 ZANGHERI S., CIAMPOLINI M. 1978 - *Spodoptera littoralis* Boisduval (Lepidoptera, Noctuidae) abituale nemico delle Solanacee in serra nella Sicilia sud-orientale - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 14: 165-172, tav. II.

2153 BACK W. 1978 - Zur Biologie der europäischen und nordwestafrikanischen Populationen von *Euchloe ausonia* Hübner 1804 (Lep. Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, X (3): 225-244.

2154 BALLETTO E., TOSO G.G. 1979 - On a new species of *Agrodiaetus* (Lycaenidae) from Southern Italy - *Nota lepidopterologica,* 2 (1-2): 13-25.

2155 BIERMANN H. 1979 - Ein Fund von *Plusidia cheiranthi* Tausch am Colle di Oggia bei Imperia (Italien) (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 28: 95.

2156 BOLOGNA M.A., ZAPPAROLI M. 1979 - Note sulla fauna delle grotte della Montagna dei Fiori (Abruzzo, Teramo) - *Notiziario del Circolo Speleologico Romano,* 24 (1/2): 81-94.

2157 BURMANN K. 1979 - Beiträge zur Kenttnis der Lepidopterenfauna Tirols. VI. Zur Biologie von *Autophila hirsuta* (Stgr.) und Kurzbeschreibung der ersten Stände (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 28 (2): 23-28.

2158 CALANDRI G., GRIPPA C., RAMELLA L. 1979 - Lo Sgarbu di Barraico in Val Nervia (Provincia di Imperia) - Riviera dei Fiori, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Imperia: 3-13.

2159 DE LAEVER E. 1979 - Considérations sur le genre *Conistra* Hb. et son sous-genre *Dasycampa* Gn. avec description d'une espèce nouvelle pour la science: *Conistra camastra* n. sp. d'Italie méridionale (Lepidoptera - Noctuidae) - *Entomologica,* Bari, XV: 145-157.

2160 FANFANI A., GROPPALI R. 1979 - La Fauna di Montecristo - Arcipelago Toscano (Studi sulla Riserva Naturale dell'Isola di Montecristo - XXIII) - *Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia,* 9: 1-52.

2161 FERRARI R., TIBERI R. 1979 - Efficacia di una prova di lotta con diflubenzuron contro la *Thaumetopoea pityocampa* (Den. & Schiff.) e prime osservazioni sull'azione dell'insetticida nei riguardi degli Imenotteri Calcidoidei parassiti oofagi del lepidottero in Toscana - *Redia,* Firenze, III ser., LXII: 315-323.

2162 FIORITO G. 1979 - Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna del Monte Taburno (BN) - Tesi di laurea in Zoologia, Facoltà di Scienze Biologiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, 82 pp.

2163 HOLZINGER H., HOLZINGER R. 1979 - *Zygaena cynarae picena*, eine neue Subspecies von den Marche, Italien (Lepidoptera Zygaenidae)

- *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreischen Entomologen,* 30 (3/4): 95-96.

2164 IPPOLITO R., PARENZAN P. 1979 - Dinamica di popolazione dei Lepidotteri del carciofo in Puglia - Atti 3° Congr. Internazionale sul Carciofo, Bari, 1979: 949-967.

2165 KÜHNERT H. 1979 - Tagfalterbeobachtungen im Aostatal (N-Italien) - *Entomologische Zeitschrift,* 89 (13): 145-152, (14): 158-167, (15): 169-174.

2166 MARINI M., TRENTINI M. 1979 - Reperti di Eteroceri nell'Appennino lucchese (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 111 (7-10): 136-140.

2167 MARINI M., TRENTINI M. 1979 - Osservazioni sui Lepidotteri di Bagni di Lucca. I. Rhopalocera - *Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Rendiconti,* Serie XIII, Tomo VI: 107-110.

2168 PARENZAN P. 1979 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia Meridionale. V. Heterocera: Noctuidae - *Entomologica,* Bari, XV: 159-278.

2169 PROLA C., RACHELI T. 1979 - I Geometridi dell'Italia centrale. Parte I. Oenochrominae, Hemitheinae, Sterrhinae, Larentiinae (Pars) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXIV: 191-246.

2170 RAUCH H. 1979 - Zur Zygaenenfauna der Tremiti-Inseln in Italien (Lepidoptera, Zygaenidae) - Ein Beitrag zur Biogeographie des Mittelmeeres - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreischen Entomologen,* 30 (3-4) (1978): 87-94.

2171 SMITH D. 1979 - *Strymonidia pruni* L. in the valley of the Ticino (Lycaenidae, Theclinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 111 (4-6): 87.

2172 TARMANN G. 1979 - *Procris cuprea* Rambur, 1866, un synonime de *Procris* (*Roccia*) *budensis* (Speyer & Speyer), 1858 (Lep. Zygaenidae) - *Alexanor,* XI (1): 31-33.

2173 TARMANN G. 1979 - Die *Statices*-Gruppe des Genus *Procris* F. (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 68: 45-108.

2174 TEOBALDELLI A. 1979 - Lépidoptères capturés en Val d'Aoste - *Alexanor,* XI (3): 98-104, (4): 145-152.

2175 TEOBALDELLI A. 1979 - Il popolamento lepidotterologico dei corsi d'acqua e stagni nelle Marche (Lepidoptera) - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* N. S., VI (1976): 395-406.

2176 TROIANO G., BALLETTO E., TOSO G.G. 1979 - The karyotype of *Agrodiaetus humedasae* Toso & Balletto, 1976 (Lepidoptera

Lycaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 111 (7-10): 141-143.

2177 URBAHN E., H. 1979 - Gibt es eine *Anaitis sardalta* Bytinski-Salz 1934 ? (Lep. Geom.) - *Deutsche Entomologische Zeitschrift,* N. F. 26 (1): 77-83.

2178 VALLETTA A. 1979 - Collecting in Sicily in the Spring of 1977 and 1978 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 91: 247-252.

2179 WITT T. 1979 - *Pelosia hispanica* sp. n. (Lepidoptera, Lithosiinae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 28 (4): 70-74.

2180 ADAMI, OSELLA, GATTI 1979 - Farfalle del Veronese - Ed. Museo Civico di Storia Naturale di Verona: 59-70.

2181 ARCOZZI L., GELOSI A., POLLINI A. 1980 - *Chloridaea viriplaca* (Hfn.) (= *Heliothis dipsacea* L.): una nottua dannosa ai medicai - *Informatore fitopatologico,* XXX (3): 21-22.

2182 BALLETTO E., TOSO G.G. 1980 - Valeur taxonomique de la conformation des tegulae dans le genre *Agrodiaetus* Hübner (Lycaenidae) - *Nota lepidopterologica,* 3 (1-2): 33-38.

2183 BERIO E. 1980 - Una nuova specie di *Cucullia* della Toscana (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 112 (1-3): 39-40.

2184 BERIO E. 1980 - Novità e note critiche in materia di Noctuidae europee (Lepidoptera) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di* Genova, LXXXIII: 223-235.

2185 BERTACCINI E., CONTARINI E., FIUMI G. - 1980 - Contributo alla migliore conoscenza della Macrolepidotterofauna della Romagna - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona,* VII: 501-517.

2186 BIERMANN H., HESCH F.-J. 1980 - Ein Fund von *Brenthis hecate* (Lep.: Nymphalidae) im Aosta-Tal (NW Italien) - *Entomologische Zeitschrift,* 90 (13): 148-149.

2187 CAMERON-CURRY V., LEIGHEB G., CAMERON-CURRY P. 1980 - Due ibridi di *Lysandra bellargus* Rott. (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 112 (1-3): 41-42.

2188 DE LAEVER E. 1980 - Une nouvelle espèce de Noctuelle de Sardaigne: *Paradrina pseudoterrea* sp. n. - *Bulletin du Cercle des Lépidopteristes de Belgique,* IX (5): 75-77.

2189 EPSTEIN H.J. 1980 - The foodplant of *Erebia aethiopella* (Hoffmannsegg, 1806) (Satyridae) - *Nota lepidopterologica,* 2 (4): 137-138.

2190 ESSAYAN R., CINTRÉ C. 1980 - Note sur les Rhopalocères de la Péninsule balkanique et de la Turquie occidentale - *Alexanor,* 11 (6): 261-271.

2191 HENDERICKX H. 1980 - Bijdrage tot de biologie van *Oreopsyche plumifera* (Lep., Psychidae) - A. Henderickx, uitgever, Mol, 77 pp., 23 pl.

2192 HIGGINS L.G., RILEY N.D. 1980 - A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe - (Guide des papillons d'Europe) - Ed. Collins Sons & Co. Ltd., London, 4° ed., 384 pp (1980). Delachaux et Niestlé S. A., Neuchâtel (Switzerland), 414 pp (1971).

2193 LEHRER A.Z., LUCIANO P. 1980 - Sarcophagides (Diptera) parasites de *Porthetria dispar* (L.) en Sardaigne et leur cartographie dans le réseau U. T. M. - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XXVII (1979): 161-173.

2194 MAINI S., PASQUALINI E. 1980 - *Conopia* (= *Synanthedon*) *myopaeformis* Bkh. (Lepidoptera, Sesiidae) in Emilia Romagna segnalata mediante trappole a feromone sessuale sintetico - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXV: 181-188.

2195 MARINI M., RUSSO I. 1980 - Interessanti reperti di Lepidotteri in Calabria - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXV: 249-265.

2196 MARINI M., TRENTINI M. 1980 - Osservazioni sui Lepidotteri di Bagni di Lucca e dintorni. II. Hepialidae, Cossidae, Zygaenidae, Limacodidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Attacidae, Drepanidae, Thyatiridae, Sphingidae, Notodontidae, Dilobidae, Thaumetopoeidae, Lymantriidae, Arctiidae, Ctenuchidae, Nolidae - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXV: 231-248.

2197 MENTZER, VON, E. 1980 - *Eilema torstenii* n. sp. und *E. iberica* n. sp. from Spain, with notes on *E. pseudocomplana* (Daniel) (Lepidoptera: Arctiidae) - *Entomologica scandinavica,* Lund, 11: 9-16.

2198 MENTZER, VON, E. 1980 - *Idaea ibizaria* n. sp. from Spain (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologica scandinavica,* Lund, 11 (1): 206-208.

2199 NARDELLI U. 1980 - Prima segnalazione per il Trentino della *Lomographa* (*Stegania*) *cararia* Hbn. - *Natura Alpina,* 31 (22, II ser.): 134-135.

2200 NAUMANN C.M., SCHROEDER A. 1980 - Ein weitere Zwillingsarten-Paar Mitteleuropäischen Sesiiden: *Chamaesphecia tenthrediniformis* (Denis & Schiffermüller, 1775) und *Chamaesphecia empifrons* (Esper, 1783) (Lepidoptera, Sesiidae) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreischen Entomologen,* 32 (1/2): 29-46.

2201 PARENZAN P. 1980 - Una nuova specie di *Condica* Walker, genere nuovo per l'Europa: *Condica* (*Platysenta*) *europaea* n. sp. (Lepidoptera - Noctuidae) - *Entomologica,* Bari, XVI: 81-87.

2202 PARENZAN P. 1980 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. VI. Rhopalocera (addenda) - *Entomologica,* Bari, XVI: 17-29.

2203 PROLA C., RACHELI T. 1980 - I Geometridi dell'Italia centrale. Parte II. Larentiinae, Ennominae - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXV: 29-108.

2204 RACHELI T. 1980 - Bemerkungen zu einigen Schmetterlingsarten aus Mittelitalien - *Atalanta,* Würzburg, XI (1): 48-55.

2205 RAGAZZINI D., BRIOLINI G. 1980 - La Sesia del Kaki - *Informatore Agrario,* Verona, 36 (29): 11449-11453.

2206 RUSSO I.E. 1980 - Contributo alla conoscenza dei Lepidotteri Eteroceri della Calabria centro settentrionale - Tesi di Laurea, Facoltà di Sc. Mat. Fis. e Nat., Un. della Calabria, Dip. di Ecologia, Cosenza, 91 pp.

2207 TARMANN, VON, G. 1980 - Zur Biologie und Zucht von *Procris* (*Lucasiterna*) *subsolana* (Staudinger, 1862) (Lepidoptera: Zygaenidae) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreischen Entomologen,* 31 (3-4) (1979): 81-91.

2208 ZAPPAROLI M. 1980 - Note sulla fauna delle cavità artificiali di Roma - *Notiziario del Circolo Speleologico Romano,* 25 (1/2): 27-57.

2209 HEINICKE W., NAUMANN K. 1980 - Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Noctuidae - *Beiträge zur Entomologie,* 30 (1980) (2): 385-448; 31 (1981) (1): 83-174; 31 (2): 341-448; 32 (1982) (1): 39-188.

2210 BALLETTO E., TOSO G.G., TROIANO G. 1980-1982 - *Aricia cramera* (Erschscholtz, 1821) in Sardinia (Lycaenidae, plebejinae) - *Nota lepidopterologica,* 4 (3): 81-92.

2211 ARNSCHEID W. 1981 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Sonnental - Nonsberggebietes (Val di Sole und Val di Non in Oberitalien) (Insecta: Lepidoptera) - *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica,* 57 (1980): 95-245.

2212 BAUER E. 1981 - *Smerinthus ocellata protai* Speidel & Kaltenbach, 1981, eine kürzlich neubeschriebene Art der Abendpfaunauges aus Sardinien - *Das Insekt,* 1: 19.

2213 BERIO E. 1981 - Considerazioni sistematiche e corologiche sul gen. *Condica* Wlk. 1856 (= *Platysenta* Grote, 1874), (Lepid. - Noctuidae) con riferimento alla nuova specie *C. europaea* Parenzan, prima del genere rinvenuta nell'Europa continentale - *Entomologica,* Bari, XVI: 89-95.

2214 BERIO E., FIUMI G. 1981 - *Caradrina* (*Eremodrina*) *vicina* Stgr. catturata in Italia. Il biotopo - *Doriana, suppl. Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, V (242): 1-4.

2215 BRANDSTETTER C. 1981 - Zur Vorkommen von *Rhegmatophila riccheloi* (sic) Hartig in Sardinien (Not., Lep.) - *Entomologische Nachrichten, 1 (1): 66-67.*

2216 BULLINI L., CIANCHI R., STEFANI C., SBORDONI V. 1981 - Biochemical Taxonomy of the Italian Species of the *Amata phegea complex* (Ctenuchidae, Syntominae) - *Nota lepidopterologica,* 4 (4): 125-127.

2217 CAMERON-CURRY P., CAMERON-CURRY V. 1981 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 6-7. *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 113 (1-3): 51.

2218 CASINI P.M. 1981 - Distribution and voltinism of *Lycaena dispar* Haw. (Lycaenidae) populations in Northern Italy - *Nota lepidopterologica,* 4 (1-2): 12-15.

2219 CASSULO L.A. 1981 - Alcune interessanti catture di Lepidotteri nelle Alpi e negli Appennini liguri (Rhopalocera et Zygaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 112 (9-10) (1980): 186-188.

2220 CHAULIAC A. 1981 - Répartition d'*Agrodiaetus dolus* Hb. et d'*A. ripartii* Freyer en France. (Lepidoptera Lycaenidae). Contribution lépidoptèrique française à la cartographie des invertebrés européens (C.I.E.). XIII - *Alexanor,* 12 (2): 70-72.

2221 DE FREINA J.J. 1981 - Über die Berichtigung von Unterarten des Wiener Nachtpfauenauges, *Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775), in Kleinasien (Lep.: Saturniidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 91 (3): 17-24.

2222 DE LAEVER E. 1981 - Étude des Caradrina (III). Le genre *Paradrina* Boursin - *SHILAP, Revta. lepid.,* 9 (35): 203-211.

2223 DREWS O. 1981 - Beitrag zur Kenntnis der Nymphalidae (Lep.) im Vingschau (Oberitalien) - *Entomologische Zeitschrift,* 91 (8): 91-95.

2224 DUFAY C. 1981 - *Chersotis grammiptera* (Rambur, 1839), bona sp., en France et en Espagne. (Lép. Noctuidae Noctuinae) - *Alexanor,* 12 (3): 103-117.

2225 FAZEKAS I. 1981 - Die Gattung *Oligia* Hb. in der Lepidopterensammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums, Budapest, I. (Lepidoptera: Noctuidae) - *Folia Entomologica Hungarica,* XLII (XXXIV) (2): 61-63.

2226 FORTI D. 1981 - La Sesia del melo - *Terra e Vita,* XXII (13): 42-43.

2227 FORSTER W., WOHLFAHRT T.A. 1981 - Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band V. Spanner (Geometridae) - Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 312 pp., 26 Taff.

2228 HENDERICKX H. 1981 - Dispersion de *Phalacropteryx graslinella* (Boisduval, 1852) (Lepidoptera Psychidae) en Europe - *Linneana Belgica,* VIII (5): 207-218.

2229 HENRIKSEN H.J. 1981 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 8 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 113 (1-3): 51.

2230 IPPOLITO R., PARENZAN P. 1981 - Osservazioni su catture di Lepidotteri in agro di Polignano (Bari) - *Entomologica,* Bari, XVI: 143-182.

2231 LUCIANO P., PROTA R. 1981 - La dinamica di popolazione di *Lymantria dispar* L. in Sardegna. I. Indicatori della gradazione ricavati dalle ovideposizioni - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XXVII (1979): 137-160.

2232 MAFFEI A. 1981 - Nuovo contributo alla conoscenza dei Lepidotteri Eteroceri della Calabria - Tesi di Laurea, Facoltà di Sc. Mat. Fis. e Nat., Un. della Calabria, Cosenza, 75 pp.

2233 MASSA B. 1981 - Le regime alimentaire de quatorze especes de rapaces en Sicile - *Annales du Centre Recherches Ornitologique de la Provence,* 1: 119-129.

2234 MENTZER, VON, E. 1981 - The group *Aplocera lythoxylata* (Hübner), with *A. dervenaria* n. sp. and *A. palumbata* n. sp. (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologica scandinavica,* Lund, 12: 49-56.

2235 PARENZAN P. 1981 - Descrizione di una nuova specie di *Cardepia*, genere nuovo per l'Italia. *Cardepia hartigi* n. sp. (Lepidoptera - Noctuidae, Hadeninae) - *Entomologica,* Bari, XVI: 97-111.

2236 PASQUALINI E., MAINI S. 1981 - Lepidotteri Sesiidi dannosi al melo con particolare riferimento a *Conopia myopaeformis* Bkh. - *Informatore Agrario,* Verona, 37 (24): 16101-16103.

2237 PRIORE R., TREMBLAY E. 1981 - *Pseudovipio castrator* F. (Hymenoptera Braconidae) entomofago di *Gortyna xanthenes* Germ. (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* 38: 275-281.

2238 RAINERI V. 1981 - Sulla presenza in Liguria occidentale di *Serryvania yvanii* (Dup.), nuova per la fauna italiana (Lepidoptera - Noctuidae) - *Doriana, suppl. Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, V (240), 4 pp.

2239 REZBANYAI L. 1981 - *Oligia dubia* Heydemann, 1942 neu für die Schweiz sowie neutsliche hinweise zur Unterscheidung der vier Schweizer Oligia-Arten (Lepidoptera, Noctuidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* N.F., 31 (1): 1-9.

2240 REZBANYAI L. 1981 - Zur verbreitung der *Horisme*-Arten *tersata* Denis & Schiffermüller 1775 und *laurinata* Schawerda 1919 in Europa (Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 4 (4): 159-166.

2241 RIGONI P. 1981 - Lepidotteri Geometridi dell'Altopiano dei Sette Comuni - *Natura e Montagna,* XXVIII: 77-82.

2242 ROTUNDO G., GIACOMETTI R. 1981 - L'allevamento di *Gortyna xanthenes* Germ. (Lepidoptera: Noctuidae) su dieta semiartificiale - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* 38: 245-250.

2243 ROTUNDO G., MASSARDO P., TONINI C., PICCARDI P. 1981 - Il feromone sessuale di *Gortyna xanthenes* Germ. (Lep. Noctuidae): analisi delle sostanze presenti negli apici addominali delle femmine vergini - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* 38: 231-243.

2244 RUNGS C.E.E. 1981 - Catalogue raisonné des Lépidoptères du Maroc. Inventaire Faunistique et observations écologiques. Tome II - *Travaux de l'Institut Scientifique, Rabat, Série Zoologie,* N. 40, 365 pp.

2245 WITT T. 1981 - *Rhegmatophila aussemi* sp. n. (Lepidoptera, Notodontidae) - *Entomofauna,* Linz, 2 (7): 81-92.

2246 BALLETTO E., LATTES A., TOSO G.G. 1981 - Le comunità di Lepidotteri Ropaloceri come strumento per la classificazione e l'analisi della qualità degli alti pascoli italiani - *Quaderni sulla "Struttura delle zoocenosi terrestri". II. 2. I pascoli altomontani:* 97-139.

2247 BALLETTO E., TOSO G. 1982 - Lepidotteri Ropaloceri dei littorali (sic) a duna dell'Italia meridionale - *Quaderni sulla "Struttura delle Zoocenosi terrestri", CNR,* 3 (1): 153-158.

2248 BALLETTO E., TOSO G.G., BARBERIS G. 1982 - Le comunità di Lepidotteri Ropaloceri di alcuni ambienti relitti della Padania - *Quaderni sulla "Struttura delle zoocenosi terrestri". 4. I boschi della pianura padano-veneta:* 45-67.

2249 BIEBINGER A.D., HANIGK H., KALTENBACH T., SPEIDEL W. 1982 - Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sardinien unter besonderer Berücksichtigung der Wanderfalter - *Atalanta,* Würzburg, XIII (1): 3-27.

2250 BIERMANN H. 1982 - Beiträge zur Tagfalterfauna Sardiniens (Lep., Rhopalocera u. Hesperiidae) - *Atalanta,* Würzburg, XIII (4): 266-293.

2251 BIERMANN H., HESCH F.-J. 1982 - Beitrag zur Tagfalterfauna (Lepid., Rhopal. u. Hesp.) von Elba, Capraia und Giglio (Italien) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 3 (2): 25-50.

2252 BIN F. 1982 - Species of *Gryon* and *Telenomus* (Hym., Scelionidae) questionably reared from the eggs of the Gypsy Moth (Lep.,

Lymantridae (sic)) - *Frustula entomologica,* N. S. III (XVI) (1980): 213-218.

2253 CARCHINI G., GIGLIO G., RAMPINI M., SBORDONI V. 1982 - Studi ecologici nella grotta di Valmarino. I: Morfologia, clima, datazione e popolamento faunistico - *Lavori della Società italiana di Biogeografia,* N.S., VII (1978): 869-892.

2254 CASSOLA F. 1982 - Il popolamento cavernicolo della Sardegna - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* N.S., VII (1978): 614-755, Tavv. I-III.

2255 CONTARINI E., FIUMI G. 1982 - Catalogo dei Lycaenidae di Romagna (Lepidoptera, Rhopalocera) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona,* IX: 17-44.

2256 DE LAEVER E. 1982 - Étude des *Caradrina* (VII). Qu'est ce que *Paradrina clavipalpis* Scopoli? - *SHILAP, Revta. lepid.,* 10 (39): 183-186.

2257 DE PRINS W., VAN DER POORTEN D. 1982 - Overzicht van het Genus *Pseudophilotes* in Europa en Noord-Afrika, met Beschrijving van een Sort uit Sardinie, nieuw voor de Wetenschap (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Phegea,* 10 (2): 61-76.

2258 DUFAY C. 1982 - Deux Noctuidae nouveaux pour la France capturés en Corse (Lépidopt., Noctuidae Hadeninae) - *Alexanor,* XII (6): 278-282.

2259 FELLIN M. 1982 - Prove di lotta contro la Sesia del melo - *Informatore Agrario,* Verona, 50 (38): 23668 (sic!)

2260 GEIGER H., SCHOLL A. 1982 - *Pontia daplidice* (Lepidoptera, Pieridae) in Südeuropa - eine Gruppe von zwei Arten - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft,* 55: 107-114.

2261 GEIGER H., SCHOLL A. 1982 - Enzyme electrophoretic approach to the systematics and evolution of the Butterfly *Euchloe ausonia* - *Experimentia,* 38: 927-928, Birkhäuser Verlag.

2262 LARSEN T.B. 1982 - *Gegenes pumilio* Hoffmannsegg, 1804; a rewiew with cytological evidence that two species are involved (Hesperiidae) - *Nota lepidopterologica,* 5 (2/3): 103-110.

2263 LORKOVIC Z. 1982 - Bemerkungen zu dem Fund von *Leptidea morsei* in Griechenland - *Nota lepidopterologica,* 5 (2-3): 111-113.

2264 LUCIANO P., DELRIO G., PROTA R. 1982 - I defogliatori delle foreste a *Quercus suber* L. - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XXIX: 321-365.

2265 LUCIANO P., PROTA R. 1982 - La dinamica di popolazione di *Lymantria dispar* L. in Sardegna. II. Osservazioni sul parassitismo nel corso della gradazione - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, LX (1981): 227-234.

2266 LUCIANO P., PROTA R. 1982 - Indagini sul parassitismo in aree forestali ad alta densità di *Lymantria dispar* L. - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XXVIII (1980-81): 152-167.

2267 LUCIANO P., PROTA R. 1982 - Osservazioni sulla densità di popolazione di *Lymantria dispar* L. nelle principali aree subericole della Sardegna - *Studi Sassaresi,* Sez. III, XXVIII (1980-81): 168-179.

2268 MARINI M., TRENTINI M. - 1982 - I Lepidotteri Eteroceri delle zone umide dell'Emilia - Romagna orientale (2° Contributo) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 114 (8-10): 165-178.

2269 MARINI M., TRENTINI M. 1982 - Alcune osservazioni sui Drepanidi italiani (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 114 (1-3): 5-16.

2270 MARINI M., TRENTINI M. 1982 - I Lepidotteri Eteroceri delle zone umide dell'Emilia-Romagna orientale (1° contributo) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 114 (4-7): 70-78.

2271 MARINI M., TRENTINI M. 1982 - Presenza di *Hydraecia osseola hucherardi* Mab. in Europa (Lepidoptera Noctuidae) - *Giornale italiano di Entomologia,* Cremona, 1: 59-62.

2272 MARINI M., TRENTINI M. 1982 - Osservazioni sui Lepidotteri dell'Appennino Lucchese. III. Noctuidae - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXVI: 191-225.

2273 NARDELLI U. 1982 - Costumi inconsueti di *Phalacropteryx praecellens* Stgr. (Lepidottero Psychide) nel Trentino - *Natura Alpina,* XXXIII (32): 1-8.

2274 PARENZAN P. 1982 - Bombyces e Sphinges (Lepid. - Heterocera) dell'Italia meridionale (addenda) - *Entomologica,* Bari, XVII: 103-125.

2275 PARENZAN P. 1982 - Segnalazione di alcune specie di Nottuidi nuove per la fauna italiana, e descrizione di due nuove sottospecie (Lepidoptera - Noctuidae) - *Entomologica,* Bari, XVII: 127-147.

2276 PARENZAN P. 1982 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. IX. *Dryobotodes servadeii* n. sp. (Lepidoptera Noctuidae Cuculliinae) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 60 (1981): 279-287.

2277 PASQUALINI E., BORTOLOTTI A., MAINI S., BARONIO P., CAMPADELLI G. 1982 - Impiego di feromoni sintetici nella lotta contro *Cossus cossus* L. (Lepidoptera: Cossidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXVII: 123-135.

2278 RAINERI V. 1982 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 18-21 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 114 (4-7): 117-118.

2279 SANNINO L., AVIGLIANO M. 1982 - Gli Agrotidi del tabacco in Campania: danni e lotta - *Annali Istituto Sperimentale per il Tabacco,* Scafati, VII (1980): 47-58.

2280 TEOBALDELLI A. 1982 - Lepidotteri rinvenuti all'interno di alcune caverne nelle Marche (Lepidoptera) - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* N.S., VII (1978): 809-816.

2281terZANI F. 1982 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 17 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 114 (4-7): 117.

2282 TREMBLAY E., ROTUNDO G., PARENZAN P. 1982 - La *Gortyna xanthenes*: un vecchio nemico del carciofo ancora poco conosciuto - *L'Informatore Agrario*, Verona, XXXVIII (1): 18735-18739.

2283 ZANDIGIACOMO P., DALLA MONTÀ L. 1982 - Prime osservazioni sull'entomofauna della Soia (*Glycine max* (L.) Merril) nel Veneto e nel Friuli - *Redia,* Firenze, 65: 215-227.

2284 BALLETTO E., CASSULO L.A., TOSO G.G. 1982 - Nuovi reperti di Lepidotteri dalle Alpi agli Appennini - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 115 (4-7): 111-115.

2285 BERIO E. 1983 - *Dasypolia calabrolucana* Hartig bona sp. (Lep. Noctuidae) - *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino,* 1 (1): 127-130.

2286 BERIO E. 1983 - Riabilitazione di *Conistra intricata* (Bdv.) e suoi rapporti morfologici e sistematici con *C. veronicae* (Hbn.) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova,* LXXXIV: 349-372.

2287 BIEBINGER A.D., SPEIDEL W., HANIGK H. 1983 - Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sardinien: *Noctua tirrenica* n. sp. (Lep.: Noctuidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 93 (7): 81-86.

2288 BIEBINGER A., SPEIDEL W., HANIGK H. 1983 - *Noctua tirrenica* - eine mediterrane Noctuide erstmal in Farbe - *Neue Entomologische Nachrichten,* 6: 39-42.

2289 BIN F., TIBERI R. 1983 - Notizie preliminari sui parassitoidi oofagi di *Thaumetopoea processionea* (L.) in Italia centrale (Hym., Chalcidoidea; Lep., Thaumetopoeidae) - *Redia,* Firenze, 66: 449-459.

2290 BURMANN K. 1983 - Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von *Callistege mi* ssp. *elzei* de Freina, 1976 (Lep., Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, XIV (1): 5-8.

2291 BURMANN K. 1983 - Beiträge zur Kenttnis der Lepidopterenfauna Tirols. IX. *Calostigia sericeata* (Schwingenschuss, 1925). Über eine Eizucht und Beschreibung der ersten Stände (Lepidoptera, Geometridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 72: 129-136.

2292 BURMANN K., TARMANN G. 1983 - Neues und Taxonomie der Gattung *Psodos* Treitschke, 1827 - *Entomofauna,* Linz, 4 (26): 467-480.

2293 BURMANN K., TARMANN G. 1983 - Neue Ergebnisse zur Taxonomie der *Thera variata* - Gruppe mit Beschreibung einer neuen Unterart, *Thera variata mugo* ssp. n. - *Entomofauna,* Linz, 4 (26): 417-434.

2294 BURMANN K., TARMANN G. 1983 - Zur taxonomischen Stellung von *Entephria nobiliaria* (Herrich-Schäffer, 1852) und ihrer 'var. *flavata* Osthelder, 1929': *Entephria flavata* (Ostherler, 1929) stat. n. - *Entomofauna,* Linz, 4 (26): 408-413.

2295 CALLE J.A. 1983 - Noctuidos españoles - *Boletìn del Servicio contra Plagas e Inspecciòn Fitopatològica,* F.S. n.1 (1982): 430 pp.

2296 CAMERON-CURRY P., LEIGHEB G., RIBONI E., CAMERON-CURRY V. 1983 - *Euchloe tagis* Hb. and *Artogeia ergane* G.-H. in Piedmont (North Italy). Pieridae- *Nota lepidopterologica,* 6 (1): 35-37.

2297 CARCHINI G., RAMPINI M., SBORDONI V. 1983 - La comunità troglofila della Grotta di Valmarino: patterns spaziali e temporali - Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Sestriere-Torino, 27 giugno - 1° luglio 1983: 295-298.

2298 CARPANETO G., GRATANI L., MARINUCCI C., SPANÒ C. 1983 - Ecologia del Narciso marino (*Pancratium maritimum*) - *Agricoltura Ambiente,* N. 21, Anno V: 1-14.

2299 CASINI P.M. 1983 - Distribution of *Heteropterus morpheus* Pallas (Hesperiidae) in Northern Italy - *Nota lepidopterologica,* 6 (2-3): 81-83.

2300 COMOTTI G. 1983 - Nuovi dati per una fauna cavernicola bergamasca - *Rivista del Museo di Scienze Naturali di Bergamo,* 6: 75-94.

2301 CORRADINI L., OLIVA D., MONTERMINI A. 1983 - Più approfondite conoscenze sui bruchi defogliatori della zona di Cadé, Cella, Prato Fontana - *Notiziario Fitopatologico, Consorzio Fitosanitario Reggio Emilia,* n. 8: 2.

2302 DE FREINA J.J. 1983 - Revision der *Hadena luteago* ((Denis & Schiffermüller), 1775) - *andalusica* (Staudinger, 1859) - Gruppe nebst beschreibung einer neuen Art der Gattung *Hadena* Schranck, 1802, aus Sardinien (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae) - *Spixiana,* München, 6 (1): 45-59.

2303 DE FREINA J.J., WITT T.J. 1983 - Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera, Lymantriidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 32 (3): 81-88.

2304 DE FREINA J.J., WITT T.J. 1983 - Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera: Notodontidae I) - *Entomologische Zeitschrift,* 93: 21-29.

2305 DE LAEVER E. 1983 - Le genre *Dysauxes* Hübner (1819) Famille des Ctenuchidae (= Syntomidae). Création d'un nouveau genre: *Parauxes* - *SHILAP, Revta. lepid.,* 11 (41): 33-35.

2306 DELRIO G., LUCIANO P., PROTA R. 1983 - I parassiti di *Malacosoma neustria* L. in Sardegna - Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Sestriere-Torino, 27 giugno - 1° luglio 1983: 237-244.

2307 DESEÖ K.V., FLORI P. 1983 - Osservazioni sulle malattie fungine del rodilegno rosso (*Cossus cossus* L. Lepidoptera; Cossidae) con particolare riferimento a quelle fungine - *La difesa delle piante,* 3-4: 145-152.

2308 DOMENICHINI G., CRAVEDI P., MOLINARI F. 1983 - Studi per le applicazioni di lotta guidata nei frutteti dell'Oltrepo pavese - *"Pavia Economica",* 2: 59-88.

2309* EITSCHBERGER U. 1983 - Systematische Untersuchungen am *Pieris napi-bryoniae*-Komplex (s. l.) (Lepidoptera, Pieridae) - *Herbipoliana,* 1 (1): 1-504 (1983).

2310 FIUMI G. 1983 - Bemerkungen über das Vorkommen von *Aglia tau* L. in der Romagna, Italien (Lepidoptera: Saturniidae) - *Neue Entomologische Nachrichten,* 6: 65-66.

2311 FOSCHI S., DESEÖ K.V. 1983 - Risultati di lotta con Nematodi entomopatogeni su *Zeuzera pyrina* L. (Lepidopt.; Cossidae) nel 1982 - *La difesa delle piante,* 3-4: 153-156.

2312 HACKER H. 1983 - Faunistische und taxonomische Beiträge zur Noctuidenfauna des Mittelmeergebietes (Lepidoptera: Noctuidae) - *Neue Entomologische Nachrichten,* 6: 43-57.

2313 KUDRNA O. 1983 - An Annotated Catalogue of the Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) named by Roger Verity - *Journal of Research on the Lepidoptera,* 21 (1982) (1): 1-106.

2314 LASTUVKA Z., SPATENKA K. 1983 - The identity of *Synanthedon mimus* Le Cerf, 1922 (Lepidoptera, Sesiidae) - *Acta entomologica bohemoslovaca,* 80: 234-236.

2315 LONGO S. 1983 - Prime osservazioni sulla dinamica di popolazione di *Euproctis chrysorrhoea* L. in Sicilia - Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Sestriere-Torino, 27 giugno - 1° luglio 1983: 375-382.

2316 LUCIANO P., PROTA R. 1983 - Indagini su una infestazione di *Lymantria dispar* L. in un comprensorio forestale della Sardegna - Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Sestriere-Torino, 27 giugno - 1° luglio 1983: 383-390.

2317 NAUMANN C.M. 1983 - Zur Kenntnis der von Ruggero Verity beschriebenen Taxa der *Zygaena purpuralis* Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Entomofauna,* Linz, 4 (10): 141-153.

2318 NAUMANN C.M., RICHTER G., WABER V. 1983 - Spezifität und Variabilität im *Zygaena-purpuralis*-Komplex (Lepidoptera, Zygaenidae) - Theses Zoologicae, Verlag von J. Cramer, Braunschweig. 2: 263 pp., 137 figg., 4 Carte.

2319 PUCCI C., DOMINICI M. 1983 - Analisi dei danni prodotti da *Theresimina ampelophaga* Bayle-Barelle (Lep., Zygaenidae) e valutazione della convenienza economica di trattamenti insetticidi - *Redia,* Firenze, III ser., LXVI: 491-509.

2320 PUCCI C., FORCINA A. 1983 - Differenze morfologiche tra le uova di *Sesamia cretica* (Led.) e di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) (Lepidoptera Noctuidae) per il loro riconoscimento - Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Sestriere-Torino, 27 giugno - 1° luglio 1983: 97-104.

2321 RACHELI T., CIANCHI R., BULLINI L. 1983 - Differenziamento e variabilità genetica di alcune sottospecie di *Parnassius apollo* (Lepidoptera: Papilionidae) - Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Sestriere-Torino, 27 giugno - 1° luglio 1983: 491-498.

2322 REZBANYAI L. 1983 - Ein weiterer Beitrag zur Morphologie und Verbreitung von *Selidosema plumaria* ((Denis & Schiffermüller), 1775) und *Selidosema brunnearia* (de Villers, 1789) - *Entomofauna,* Linz, 4 (26): 435-442.

2323 REZBANYAI L. 1983 - *Agrochola dujardini* Dufay 1976 bona species oder nur subspecies von *nitida* D. & Sch. 1775? Wissenwertes über die beiden taxa sowie ihre Verbreitung in der Schweiz (Lep., Noctuidae) - *Nota lepidopterologica,* 6 (2-3): 137-174.

2324 ROTUNDO G., IPPOLITO R., PARENZAN P. 1983 - Catture di *Gortyna xanthenes* Germar (Lepidoptera - Noctuidae) con trappole di diverso tipo. Nota preliminare - Atti XIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Sestriere-Torino, 27 giugno - 1° luglio 1983: 245-252.

2325 SCHEURINGER E. 1983 - Die Macrolepidopteren-Fauna des Schnalstales (Vinschgau - Südtirol) 1. Nachtrag - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 32 (3): 65-74.

2326 TEOBALDELLI A., FLORIANI G. 1983 - *Pararge petropolitana centralapennina* n. ssp. dei Monti della Laga (Appennini) (Lepidoptera Satyridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 115 (8-10): 161-163.

2327 WARREN E.J.M. 1983 - A note on *Pyrgus warrenensis* Verity its history and distribution (Hesperiidae) - *Nota lepidopterologica,* 6 (1): 61-64.

2328 BACK W. 1983 - Beschreibung der Präimeginalstadien von *Euchloe tagis pechi* Staudinger, 1885 (Lep., Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, XV (1/2): 152-164, Tavv. 1-2.

2329 BERIO E. 1984 - *Charanyca erubescens* Turati bona species in Sicilia (Lepidoptera Noctuidae Amphipyrinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 116 (8-10): 179-180.

2330 BERTUCCI B.M. 1984 - *Euproctis chrysorrhoea* una minaccia per boschi e fruttiferi - *Informatore fitopatologico,* XXXIV (6): 11-15.

2331 BOLOGNA M., VIGNA TAGLIANTI A. 1984 - Res Ligusticae CXIV - Fauna cavernicola delle Alpi Liguri. Lepidoptera - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, LXXXIV bis: 270-273.

2332 BORDONI A. 1984 - *Limenitis populi* (L.) dans les Alpes Ligures (Lep. Nymphalidae) - *Nota lepidopterologica,* 7 (2): 107-108.

2333 CANTARELLI M., DI COLA G., DELRIO G., LUCIANO P., PROTA R. 1984 - Analysis of some lepidopter populations inhabiting Sardinian cork oaks - Atti 4° Simposio Dinamica Popolazioni, Parma, 22-24 ottobre 1981: 141-152.

2334 CASINI P.M. 1984 - First confirmed report of *Thersamonia thersamon* Esp. (Lycaenidae) in Tuscany, Northern-Central Italy - *Nota lepidopterologica,* 7 (2): 109-112.

2335 CONTARINI E., FIUMI G. 1984 - *Chamaesphecia palustris* Kautz nuova specie per la fauna italiana ed osservazioni sulla biologia larvale (Lepidoptera Aegeriidae) - *Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali,* Venezia, 9 (1): 33-38.

2336 COUTSIS J.G. 1984 - Description of the female genitalia of *Hipparchia fagi* Scopoli *Hipparchia semele* Linnaeus (Satyridae) and their related taxa - *Journal of Research on the Lepidoptera,* 22: 161-203.

2337 DE FREINA J.J., WITT T.J. 1984 - Modifications taxinomiques dans les Sphingides et Syntomides d'Europe et de l'Afrique du Nord occidentale (Lepidoptera) - *Alexanor,* 13 (6): 283-288.

2338 DESEÖ K.V., GOVONI L., MILLER L.A. 1984 - Impiego di Nematodi entomopatogeni (Rhabditida, Stainernematidae) contro diverse specie di *Synanthedon* (Lepidoptera, Aegeriidae) in meleti e diospireti - *La Difesa delle Piante,* 7 (5-6): 315-330.

2339 DUFAY C. 1984 - *Chersotis oreina* n. sp., noctuelle méconnue des montagnes de l'Europe occidentale (Noctuidae, Noctuinae) - *Nota lepidopterologica,* 7 (1): 8-20.

2340 EITSCHBERGER U. 1984 - Die rasterelektronische Darstellung des Eies von *Melanargia arge* (Sulzer, 1776) (Lepidoptera, Satyridae) - *Atalanta,* Würzburg, XV (3/4): 338-341.

2341 HELLRIGL K. 1984 - Zur Bionomie des grünen Weidenprachtkäfers *Scintillatrix* (= *Lampra*) *dives* Guill. (Coleopt., Buprestidae) und des kleinen Weidenglasflüglers *Synanthedon* (= *Sesia*) *formicaeformis* Esp. (Lepid., Aegeriidae) - *Zeitschrift für angewandte Entomologie,* 98: 499-506.

2342 KISER K., REZBANYAI-RESER L. 1984 - Die Schmetterlingssammlung von Pater Michael Schönenberger (1860-1936), Benediktiner-Kloster, Sarnen (Obwalden) (Macrolepidoptera) - *Entomologische Berichte Luzern,* 11 (1984): 49-93.

2343 KUDRNA O. 1984 - On the taxonomy of the Genus *Hipparchia* Fabricius, 1807, with description of two new species from Italy (Lepidoptera, Satyridae) - *Fragmenta entomologica,* Roma, 17 (2): 229-243.

2344 KUDRNA O., BALLETTO E. 1984 - An Annotated Catalogue of the Skippers (Lepidoptera: Hesperiidae) named by Roger Verity - *Journal of Research on the Lepidoptera,* 23 (1): 35-49.

2345 LOZZIA G.C., DAOLIA E. 1984 - Due fitofagi del melo: *Eriosoma lanigerum* e *Synanthedon myopaeformis* - *Informatore Fitopatologico,* XXXIV (9): 34-38.

2346 MARINI M., TRENTINI M. 1984 - I Lepidotteri Eteroceri crepuscolari e notturni del bosco della Mesola - *Giornale italiano di Entomologia,* Cremona, 3: 99-117.

2347 MARINI M., TRENTINI M. 1984 - Osservazioni sui Lepidotteri dell'Appennino Lucchese. IV. Geometridae - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXIX: 17-36.

2348 MONTERMINI A., OLIVA G. 1984 - Impariamo a conoscere l'Ifantria americana - *Informatore fitopatologico,* XXXIV (1): 35-40.

2349 NARDELLI U. 1984 - Prima segnalazione per il Trentino del Lepidottero Aegeridae "*Synanthedon andraeneformis*" Lasp. - *Natura Alpina,* XXXV (2): 25-30.

2350 PARENZAN P. 1984 - Noctuidae (Lepidoptera, Heterocera) dell'Italia meridionale (addenda) - *Entomologica,* Bari, XIX: 97-134.

2351 PINZARI M. 1984 - Alcune osservazioni su *Thecla betulae* L. nei dintorni di Vallemare (Monti Reatini) (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 37 (1-4): 7-11.

2352 REZBANYAI-RESER L. 1984 - *Horisme laurinata* Schawerda 1919 syn. nov. zu *H. radicaria* De La Harpe 1855, nebst weiteren

Angaben zur Verbreitung der Art (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 7 (4): 350-360.

2353 RIEMIS A. 1984 - Sardinia 14th-20th May 1983 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 96: 92-95.

2354 RONKAY L. 1984 - Notes on the genus *Agrochola* Hübner, 1821 (Lepidoptera: Noctuidae). Part II - *Acta Zoologica Hungarica,* 30 (1-2): 179-187, 9 figg.

2355 SANNINO L. 1984 - Indagini sulla Lepidotterofauna del tabacco. 1. Osservazioni su 4 specie di Nottuidi parassiti del tabacco in Campania - *Annali Istituto Sperimentale per il Tabacco,* Scafati, IX (1982): 111-131.

2356 SANNINO L., BALBIANI A. 1984 - Su un attacco di *Scopula ochroleucaria* H.S. (Lepidoptera, Geometridae) al tabacco in Campania - *La difesa delle piante,* 5-6: 289-300.

2357 SEYER H. 1984 - Der Rassenkreis von *Anthocharis damone* im Mittelmeerraum und eine neue Subspezies aus der Türkei (Lep.: Pieridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 94 (16): 233-237.

2358 STRAPAZZON A., GRANATA L. 1984 - Relazione tra Sesia (*Aegeria myopaeformis* (Borkh.)) e "cancri" del melo. Distribuzione sulla pianta ed efficacia di trattamenti localizzati - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXVIII: 181-191.

2359 STRAPAZZON A., GRANATA L. 1984 - Controllo della Sesia del melo e dei "cancri" con trattamenti localizzati - *Informatore Agrario,* Verona, 40 (26): 59-61.

2360 TIBERI R. 1984 - Ospite vegetale, numero di ovature, luoghi di ovideposizione e loro influenza sull'attività dei parassitoidi oofagi di *Thaumetopoea pityocampa.* (Hym., Chalcidoidea) - *Redia,* Firenze, III ser., LXVII: 1-18.

2361 TIBERI R., NICCOLI A. 1984 - Osservazioni pluriennali sull'impiego di trappole con il feromone sessuale di *Thaumetopoea pityocampa* (Den. & Schiff.) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) - *Redia,* Firenze, III ser., LXVII: 129-144.

2362 VALLE M. 1984 - Il restauro della Raccolta lepidotterologica dell'ing. Antonio Curò - *Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi",* Bergamo, 7: 1- 202.

2363 VARGA Z., RONKAY L. 1984 - Zwei neue Plusiinae-subspezies von der Balkanhalbinsel (Lepidoptera: Noctuidae) - *Acta Zoologica Hungarica,* 30 (1-2): 205-211, 2 Tavv.

2364 ZANGHERI S., CIAMPOLINI M., SÜSS L. 1984 - I gravi danni causati al mais dall'*Agrotis ipsilon* - *L'Informatore Agrario,* Verona, XL (11): 71-78.

2365 BROCKMANN E. 1984 - Beitrag zur Makrolepidopterenfauna des Aosta-Tales (italienische Alpen). 1.: Allgemeiner Teil. 2.: Spezieller Teil: Papilionidae, Pieridae. 3.: Spezieller Teil: Satyridae, Nymphalidae. 4.: Spezieller Teil: Libytheidae, Lycaenidae, Hesperiidae - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 5 (1984) (2/3): 21-42; 6 (1985) (1): 1-17, (2): 61-98, (3): 131-156.

2366 BERIO E. 1984-1985 - Indagini su alcuni taxa allopatrici del genere *Allophyes* Tams e su individui catturati nelle zone di confine (Lepidoptera Noctuidae Cuculliinae) - *Frustula entomologica,* N. S. VII-VIII (XX-XXI): 27-54.

2367 ARNSCHEID W. 1984-1985 - Ein Beitrag zur Systematik der europäischen Arten der Gattung *Solenobia* Duponchel, 1842 (Lepidoptera, Psychidae, Taleporiinae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., Suppl. 4 (1984): 1-56.

2368 AUSSEM B., DE FREINA J.J., WITT T.J. 1985 - Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Zur Situation der Gattung *Paidia* Hübner, (1819) 1916 in Europa und Nordwestafrika (Lepidoptera, Arctiidae VII) - *Atalanta,* Würzburg, 16 (3/4): 109-113.

2369 BACK W. 1985 - Zur Biologie von *Anthocharis damone* (Boisduval, 1836) und *Anthocharis gruneri* (Herrich-Schäffer, 1851) (Lep., Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, 16 (3/4): 105-108.

2370 BALLETTO E., CASSULO L.A., TOSO G.G. 1985 - Contributo alla biogeografia degli Zigenidi delle Alpi Liguri (Lepidoptera: Zygaenidae) - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* N. S., IX (1982): 489-565.

2371 BALLETTO E., KUDRNA O. 1985 - Some aspects of the conservation of Butterflies in Italy, with recommandations for a future strategy (Lepidoptera Hesperiidae & Papilionoidea) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 117 (1-3): 39-59.

2372 BERIO E. 1985 - Una nuova specie di *Enargia* catturata in Sardegna (Lep. Noctuidae, Amphipyrinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 117, inserto occasionale, 3 pp.

2373 BERIO E. 1985 - Lepidoptera Noctuidae. I. Generalità Hadeninae Cuculliinae - Fauna d'Italia, Vol. XXII, 970 pp., 32 tavv., Ed. Calderini, Bologna.

2374 BORDONI A. 1985 - *Zygaena* (*Agrumenia*) *orana sulcitana* ssp. n. du Sulcis et considérations sur la distribution de l'espèce en Sardaigne (Lep. Zygaenidae) - *Nota lepidopterologica,* 8 (3): 267-278.

2375 BURMANN K., TARMANN G. 1985 - Kurze systematische Übersicht über die aurita-Gruppe der Gattung *Setina* Schranck, 1802 mit Beschreibung ainer neuen Unterart, *Setina aurita* ssp. *pfisteri* ssp. n. - *Nota lepidopterologica,* 8 (3): 242-266.

2376 CAMPBELL J.L. 1985 - Migrating *Cynthia cardui* in Tuscany - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 97: 202.

2377 CAMPORESI S., FIUMI G. 1985 - Ecologia delle farfalle diurne delle zone costiere di Romagna (Lepidoptera Rhopalocera) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona,* X: 79-107.

2378 CAPIZZI A., ARSURA E., SPINELLI P. 1985 - Individuazione in campo di attrattivi sessuali per alcune specie di Lepidotteri - Atti XIV Congresso nazionale italiano di Entomologia, Palermo, Erice, Bagheria: 355-362.

2379 CONTARINI E. 1985 - La recente espansione del lepidottero *Lycaena dispar* in Romagna - *Natura e montagna,* 32 (2-3): 81-83.

2380 CONTARINI E. 1985 - Profilo sintetico della fauna dei coleotteri e dei lepidotteri della "Vena del Gesso" romagnola - *Natura e Montagna,* 32 (4): 31-42.

2381 CORTELLINI W., MONTERMINI A. 1985 - L'Ifantria americana, pericolo per le piante frutticole ed ornamentali - *L'Informatore agrario,* 41 (29): 57-60.

2382 CRAVEDI P. 1985 - Avversità animali del mais - *Il giornale del maiscoltore,* 2: 34-37.

2383 CURRADO I., BRUSSINA G. 1985 - Esperienze di lotta con *Bacillus thuringiensis* Berl. nelle foreste del Piemonte - *La difesa delle piante,* 2: 339-344.

2384 DALLA MONTA' L. 1985 - La Sesia del melo, *Synanthedon myopaeformis* Borkh.: osservazioni bio-etologiche e prospettive di lotta - Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Palermo, Erice, Bagheria: 391-399.

2385 DE FREINA J.J., WITT T.J. 1985 - Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Über Taleporiinae Tutt 1900 (Lepidoptera: Psychidae III) - *Entomologische Zeitschrift,* 95 (7): 84-90.

2386 DE TOULGOËT H. 1985 - Mise au point sur la variation infraspécifique et la répartition de *Chelis maculosa* Gerning (Lépidoptères Arctiidae Arctiinae) - *Alexanor,* 14 (2): 69-80.

2387 DELRIO G., LUCIANO P. 1985 - I parassiti ed i predatori di *Euproctis chrysorrhoea* L. in Sardegna (Nota preliminare) - Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Palermo, Erice, Bagheria: 825-832.

2388 DESEÖ K.V., CORTELLINI W., MONTERMINI A. 1985 - Nuove acquisizioni in Italia sulla biologia di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera: Arctiidae) e sui mezzi per contenerla - *La difesa delle piante,* VIII (1): 43-60.

2389 DESEÖ K.V., DOCCI R. 1985 - Lotta microbiologica contro *Zeuzera pyrina* L. (Lepidoptera: Cossidae) - *La difesa delle piante,* 2: 285-292.

2390 FIUMI G., CAMPORESI S. 1985 - Quattro interessanti reperti dalle zone umide del litorale romagnolo (Lepidoptera Noctuidae) - *Giornale italiano di Entomologia,* Cremona, 2: 285-288.

2391 FLAMIGNI C. 1985 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 70 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 117 (8-10): 184.

2392 FONTENEAU J.-M. 1985 - À propos de *Maniola nurag* Ghiliani, 1852 (Lep. Nymphalidae Satyrinae) - *Alexanor,* 14 (2): 89-92.

2393 GATTO A. 1985 - Ripresa di *Danaus chrysippus* L. in quel di Palermo (Sicilia) (Lepidoptera, Danaidae) - *Giornale italiano di Entomologia,* Cremona, 2: 369-370.

2394 HÄCHLER M. 1985 - *Catocala nymphagoga* Esp. (Noctuidae), un nouveau migrateur occasionnel pour la Suisse romande - *Bulletin Romand d'Entomologie,* 3: 117-121.

2395 INSERRA R., CALABRETTA C. 1985 - L'attacco dei nottuidi: problema ricorrente nelle colture in serra della costa ragusana - *Tecnica agricola,* XXXVII (3-4): 283-297.

2396 INSERRA R., CALABRETTA C. 1985 - Attacchi di *Spodoptera littoralis* (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) su Gerbera in coltura protetta ed esito di interventi con *Bacillus thuringiensis* Berliner ed altre tecniche di lotta - *La difesa delle piante,* 2: 255-262.

2397 IPPOLITO R., PARENZAN P. 1985 - *Hoplodrina ambigua* D. & S. (Lepidoptera - Noctuidae) e altri Nottuidi del carciofo in Puglia - *Entomologica,* Bari, XX: 147-158.

2398 LUCIANO P., PROTA R. 1985 - Due metodi per valutare la densità di popolazione di *Lymantria dispar* L. - Atti XIV Congresso nazionale italiano di Entomologia, Palermo, Erice, Bagheria: 599-606.

2399 LUCKENS C.J. 1985 - *Hypodryas intermedia* Ménétriès in Europe: an account of the life history - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 97: 37-45.

2400 MAGNOLER A. 1985 - Valutazione in campo di un Baculovirus contro le larve di *Malacosoma neustria* L. in Sardegna - *La difesa delle piante,* 2: 329-338.

2401 MAGNOLER A. 1985 - L'impiego di due Baculovirus nella lotta contro *Malacosoma neustria* L. e *Lymantria dispar* L. nei querceti della Sardegna - *La difesa delle piante,* 4: 451-462.

2402 MONTERMINI A., CORTELLINI W., DESEÖ K.V. 1985 - Lotta microbiologica contro l'*Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera: Arctiidae) in Nord Italia - *La difesa delle piante,* VIII (2): 345-352.

2403 NARDELLI U. 1985 - Contributo per una migliore conoscenza dell'*Endrosa alpestris* Z. (Lepidoptera - Endrosidae) - *Natura Alpina,* XXXVI (1): 1-7.

2404 PARENZAN P., DE LAEVER E. 1985 - Une espèce nouvelle du genre *Peribatodes* Wehrli; *Peribatodes dragone* sp. nov. - *SHILAP, Revta. lepid.,* 13 (51): 178.

2405 PARENZAN P., IPPOLITO R., ORTU S., ROTUNDO G., SINACORI A., TREMBLAY E. 1985 - Dati comparati sulla bio-etologia della *Gortyna xanthenes* Germ. (Nottua del carciofo) in diverse aree dell'Italia meridionale e insulare - *Informatore fitopatologico,* XXXV (9): 35-40.

2406 PARENZAN P., PORCELLI F. 1985 - Notizie bio-etologiche sulla *Pachypasa otus* Drury (Lepidoptera - Lasiocampidae) in Italia meridionale - *Entomologica,* Bari, XX: 109-123.

2407 PASQUALINI E., GAVIOLI F., BARONIO P., MALAVOLTA C., CAMPADELLI G., MAINI S. 1985 - Studi sulla possibilità di realizzazione del metodo della cattura in massa per *Cossus cossus* L. (Lep. Cossidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XXXIX: 187-199.

2408 RAINERI V. 1985 - Ricerche sui Geometridi delle Alpi Liguri. (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 117 (4-7): 102-112.

2409 RAINERI V. 1985 - Taxonomy and distribution of *Gnophos corsica* Oberthür, 1913 (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 8 (2): 152-160.

2410 RAINERI V. 1985 - Noctuoidea, Bombycoidea e Sphingoidea delle Alpi Liguri (Lepidoptera) - *Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* N.S., IX (1982): 613-686.

2411 RAVAGLIOLI L. 1985 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 65-69 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 117 (8-10): 183-184.

2412 RAVAGLIOLI L. 1985 - Nuove stazioni in Italia di *Oligia dubia* Heydemann (Lepidoptera Noctuidae) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale,* Udine, 6 (1984): 221-225.

2413 RAVIGLIONE M.C. 1985 - Lepidotteri Ropaloceri del Biellese (Piemonte) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 117 (1-3): 34-38.

2414 REZBANYAI-RESER L. 1985 - Zur Verbreitung, Häufigkeit und Phänologie von *Trigonophora flammea* Esp. in Mitteleuropa (Lepidoptera, Noctuidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* N.F. 35 (2): 41-53.

2415 RONKAY L., VARGA Z. 1985 - *Luperina diversa* (Staudinger, 1891) bona species, mit der Beschreibung zwei neuer Subspezies (Lepidoptera, Noctuidae) - *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici,* 77: 207-216.

2416 ROVERSI P.F. 1985 - Osservazioni sull'impiego di trappole a feromone sessuale di *Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schiff.) sul promontorio del Gargano (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) - *Redia,* Firenze, III ser., LXVIII: 1-17.

2417 SANNINO L., BALBIANI A., MARULLO R. 1985 - Indagini sulla Lepidotterofauna del tabacco. 2 - Rilievi su alcuni Nottuidi parassiti minori del tabacco in Campania - *La difesa delle piante,* 1: 23-42.

2418 SINACORI A. 1985 - Osservazioni bio-etologiche sulla *Gortyna xanthenes* Germar (Lep.: Noctuidae) in Sicilia - Atti XIV Congresso nazionale italiano di Entomologia, Palermo, Erice, Bagheria: 523-524.

2419 TEOBALDELLI A. 1985 - *Charaxes jasius* L. sulla costa adriatica (Lepidoptera, Apaturidae) - Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Palermo, Erice, Bagheria: 531-534.

2420 TRENTINI M., MARINI M. 1985 - Osservazioni cromosomiche su *Acanthobrahmaea europaea* hartig (Lepidoptera, Brahmaeidae) - Atti XIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Palermo, Erice, Bagheria: 299-303.

2421 WILTSHIRE E.P. 1985 - Notes on *Cucullia scrophulariphaga* Rambur (Noctuidae) and on a few other interesting Sardinien Lepidoptera seen on the Costa Smeralda in mid-May 1984 - *Nota lepidopterologica,* 8 (2): 161-171.

2422° ZAHM N. 1985 - Primi risultati di una ricerca sulla fauna dei Macrolepidotteri della Maiella (Abruzzi, Italia) - Dattiloscritto non pubblicato, 18 pp.

2423 ZANGHERI S. 1985 - Sguardo sintetico sulla lepidotterofauna della foresta di Campigna (Appennino Tosco-Romagnolo) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Verona,* X (1983): 7-19.

2424 BALLETTO E., KUDRNA O. 1985 - An Annotated Catalogue of the Burnets and Foresters (Lepidoptera: Zygaenidae) named by Roger Verity - *Journal of Research on the Lepidoptera,* 24 (3): 226-249 (1985).

2425 BALLETTO E., PASSERIN D'ENTRÈVES P. 1986 - Revisione del materiale tipico dei Lepidotteri ropaloceri descritti da Franco

Andrea Bonelli, con brevi note sui tipi di *Papilio hospiton* Genè e di *Maniola nurag* (Ghiliani) - *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino,* 4 (1): 129-146.

2426 BARBATTINI R., ZANDIGIACOMO P., PARMEGIANI P. 1986 - Indagine preliminare sui fitofagi di *Rumex obtusifolius* L. e *Rumex crispus* L. in vigneti del Friuli - *Redia,* Firenze, III ser., LXIX: 131-142.

2427 BERIO E. 1986 - *Xanthia gilvago* ab. *innotata* Failla = *Cosmia cypreago* Hampson (Lepidoptera Noctuidae - Amphipyrinae (!)) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, X (1-4): 105-107.

2428 BERIO E. 1986 - Nuove specie, sottospecie e forme di Noctuidae della Sardegna (Lepidoptera) - Pubblicato dall'Autore, c/o Istituto Grafico S. Basile s.a.s. di G. Basile & C. - Genova: 4 pp.

2429° BERWIAN K., SCHREIBER H., VOLKER K., ZAHM N. 1986 - Relazione sulle nostre ricerche sulla fauna dei Macrolepidotteri della Maiella dal 14-26 luglio 1985 (Abruzzi, Italia) - Dattiloscritto non pubblicato, 49 pp.

2430 BOILLAT H. 1986 - Biologie et statut taxinomique de *Coenonympha thyrsis* Freyer. Description des états pré-imaginaux (Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae) - *Alexanor,* 14 (6): 263-278.

2431 BROCKMANN E. 1986 - Beitrag zur Makrolepidopterenfauna des Aosta-Tales (italienische Alpen) . 5. Spezieller Teil. Lymantriidae, Arctiidae, Ctenuchidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 7 (2/3): 57-69.

2432 CASTELLARI P.L. 1986 - *Zeuzera pyrina* L. (Lep. Cossidae): indagini biologiche e prove in campo sull'attrattività di miscele di componenti del feromone sessuale - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XL: 239-270.

2433 CASTELLARI P.L. 1986 - Il *Synanthedon myopaeformis* Borkhausen (Lep. Aegeriidae) nei meleti dell'Emilia e i mezzi per combatterlo - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* XLI: 127-146.

2434 CAVALCASELLE B. 1986 - Les insectes nuisibles aux eucalyptus en Italie: importance des dégâts et méthodes de lutte - *Bulletin OEPP,* 16: 293-297.

2435 DE GIOVANNI G., OLIVA G., MONTERMINI A. 1986 - Strategie di difesa dall'Ifantria americana - *Informatore fitopatologico,* XXXVI (2): 11-15.

2436 DE LAEVER E. 1986 - *Paradrina* nouveaux: *Paradrina alpina*, *Paradrina aostae* et *Paradrina corsica* - *SHILAP Revta. lepid.,* 13 (52) (1985): 247-250.

2437 DESEÖ K.V., MONTERMINI A., CORTELLINI W. 1986 - The first outbreak of the fall webworm (*Hyphantria cunea* Drury; Lepid., Arctiidae) in North Italy - *Journal of Applied Entomology,* 101 (3): 201-206.

2438 DESEÖ K.V., ROVESTI L., MONTERMINI A., CORTELLINI W. 1986 - Osservazioni biologiche su *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera: Arctiidae) e prime esperienze di lotta microbiologica per il suo controllo in Italia - In: "L'Ifantria americana (*Hyphantria cunea*, Drury) nella realtà padana", Atti, Consorzio provinciale Fitosanitario Obb. R. E., Reggio Emilia: 17-30.

2439 DESEÖ K.V., ROVESTI L., MONTERMINI A., CORTELLINI W. 1986 - Prime esperienze di lotta microbiologica su Ifantria americana - *Informatore fitopatologico,* XXXVI (2): 17-22.

2440 DEUTSCH H. 1986 - *Herminia tenuialis* Rebel 1899: Zuchtbericht und Kurzbeschreibung der Raupe und Puppe (Lep.: Noctuidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 96 (8): 97-101.

2441 FORESTIERO S., SBORDONI V. 1986 - Farfalle notturne del Parco nazionale del Circeo e qualità dell'ambiente - Atti Convegno "Aspetti faunistici e problematiche zoologiche del Parco Nazionale del Circeo", Sabaudia 10 Novembre 1984: 101-107.

2442 HACKER H., KUHNA P., GROSS F.-J. 1986 - 4. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa, Erken-ntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von Gross und Kuhna aus den Jahren 1968-1984 (Lepidoptera, Noctuidae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 76: 79-141.

2443 HOLZAPFEL O.A. 1986 - Ein Beitrag zur Tagfalterfauna des Monte Baldo (Italien) (Lep., Rhopalocera, Hesperiidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 7 (1): 24-29

2444 LEIGHEB G., CAMERON-CURRY V., RIBONI E., CAMERON-CURRY P. 1986 - Distribution of *Erebia scipio* Boisduval in Italy (Lepidoptera, Satyridae) - *Nota lepidopterologica,* 9 (3-4): 213-215.

2445 LUCIANO P., PROTA R. 1986 - La dinamica di popolazione di *Lymantria dispar* L. in Sardegna. III. Indicatori biologici della gradazione - *Frustula entomologica,* N. S. VII-VIII (XX-XXI): 613-630.

2446 MARINI M. 1986 - Osservazioni su *Dendrolimus pini* (L.) e descrizione di una nuova ssp. dell'Italia meridionale (Lepidoptera Lasiocampidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 118 (1-3): 20-24.

2447 MARINI M., TRENTINI M. 1986 - I Macrolepidotteri dell'appennino lucchese - Arti Grafiche Tamari, Bologna: 136 pp.

2448 MAZEL R. 1986 - Géonémie des formes de *Zygaena filipendulae* L. dans le bassin méditerranéen occidental (Lepidoptera Zygaenidae) - *Alexanor,* 14 (5): 209-218.

2449 NARDELLI U., SALA G. 1986 - Una nuova sottospecie di "*Parnassius phoebus*" Fabricius, 1793 (Lepidoptera,

Parnassiinae) nelle Prealpi bresciane - *Natura Alpina,* XXXVII (2): 33-42.

2450 NICCOLI A., TIBERI R. 1986 - Osservazioni sulla biologia e sul comportamento delle larve di *Thaumetopoea processionea* (L.) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) - *Redia,* Firenze, III ser., LXIX: 285-297.

2451 PROTA R. 1986 - Entomofauna endemica - In: L'ambiente naturale in Sardegna, Carlo Delfino editore, Sassari: 325-336.

2452 PROTA R., LUCIANO P. 1986 - L'entomofauna di interesse forestale. I fitofagi dannosi ai boschi in Sardegna - In: L'ambiente naturale in Sardegna, Carlo Delfino editore, Sassari: 339-348.

2453 PUCCI C., DOMINICI M. 1986 - Biological notes and cyclical outbreaks of *Theresimima ampelophaga* Bayle-Barelle (Lep., Zygaenidae) - *Journal of Applied Entomology,* 101 (5): 479-491.

2454 RAINERI V. 1986 - Ricerche sui Geometridi delle Alpi Liguri. Parte seconda (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 118 (1-3): 25-30.

2455 RAINERI V. 1986 - *Geometra bruzzanaria* Costa, 1863 a synonym of *Zethes insularis* Rambur, 1833 (Noctuidae) - *Nota lepidopterologica,* 9 (3-4): 234-235.

2456 RAINERI V. 1986 - Materiali per una fauna dell'arcipelago Toscano. XXVII. I Lepidotteri dell'Isola di Montecristo - *Doriana, supplemento Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, VI (257): 1-6.

2457 RAPUZZI F. 1986 - Lepidotteri Ropaloceri dell'Alta Val Camonica - *Natura Bresciana, Annali del Museo Civico di Scienze Naturali, Brescia,* 21 (1984): 123-151.

2458 REZBANYAI-RESER L. 1986 - Fauna Italica. *Mesapamea*-Studien VII. *Mesapamea remmi* Rezbanyai-Reser, 1985, anche in Italia (Lepidoptera, Noctuidae) - *Entomologische Berichten Luzern,* 16: 159-164.

2459 REZBANYAI-RESER L. 1986 - *Gnophos italohelveticus* sp. nova, eine bisher übersehene Spannerart aus den Südalpen, und über den crenulatus-Formenkreis Südwesteuropas (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 9 (1-2): 99-142.

2460 ROOS P.H., ARNSCHEID W.R. 1986 - Eine Mermithiden-Art (Nematoda: Adenophorea) als Parasit von *Erebia tyndarus* (Esper) (Lepidoptera: Satyridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 96 (22): 325-327.

2461 SANNINO L., BALBIANI A., PARENZAN P. 1986 - *Dysgonia algira* L. (Lepidoptera: Noctuidae - Catocalinae) dannosa a melograno (*Punica granatum* L.) - *Entomologica,* Bari, XXI: 127-139.

2462 SCHEURINGER E. 1986 - Beitrag zur Verbreitung von *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) und *Mesapamea secalella* Remm, 1983 in den Alpen (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 35 (4): 97-100.

2463 TRENTINI M., MARINI M. 1986 - A chromosome study of *Charaxes jasius* L. (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Genetica,* 68: 157-159.

2464 ZANGHERI S. 1986 - Note sulla distribuzione geografica, la biologie e l'etologia della *Hyphantria cunea* (Drury) (Lep. Arctiidae) - In: "L'Ifantria americana (*Hyphantria cunea*, Drury) nella realtà padana", Atti, Consorzio provinciale Fitosanitario Obb. R. E., Reggio Emilia: 1-8.

2465 ZILLI A. 1986 - Dati faunistici sui Noctuidae dell'Italia centrale (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 40 (1-4): 9-21. (1985).

2465bis ARZONE A. 1987 - 1987 - Artropodofauna di piante ornamentali in serra - *La difesa delle piante*, 10 (1): 63-76.

2466 BERTACCINI E., NARDELLI U. 1986 - Aberrazioni di alcuni Ropaloceri Trentini - *Natura Alpina,* XXXVIII (4): 17-19, 8 figg.

2467 CAMERON-CURRY V., LEIGHEB G., RIBONI E., CAMERON-CURRY P. 1987 - Possible hybrids between *Lysandra bellargus* Rott. and *L. hispana* H.-S. (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Nota lepidopterologica,* 10 (1): 61-64.

2468 DALLA GUDA C., CAPIZZI A., SPINELLI P. 1987 - Indagini sulla presenza di nottuidi parassiti delle colture floricole - *Informatore fitopatologico,* XXXVII (6): 47-50.

2469 DE FREINA J.J., WITT T.J. 1987 - Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Band 1 - Ed. Forschung & Wissenschaft, Verlag GmbH, München, 708 pp.

2470 DE MARTIN P. 1987 - Ricerche faunistiche del Museo Civico di St. Nat. di Venezia nell'Isola di Pantelleria. V. Lepidoptera Rhopalocera - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia,* 37 (1986): 43-46.

2471 FAQUAET M. 1987 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen (Lepidoptera) - *Phegea,* 15 (1): 47-59, (2): 91-107, (3): 131-144, (4): 195-208.

2472 FORTE C., CAMERON-CURRY V., LEIGHEB G. 1987 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 121 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 119 (2): 127.

2473 GAVIOLI F., BARONIO P. 1987 - Riproduzione in laboratorio e tecniche di allevamento di *Cossus cossus* L. (Lepidoptera, Cossidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* 42: 87-100.

2474 GIUNCHI P., POLLINI A. 1987 - Insetti e acari della soia - *Informatore fitopatologico,* XXXVII (3): 13-21.

2475 HELLMANN F. 1987 - Die Macrolepidopteren der Brenta-Gruppe (Trentino - Oberitalien) (Lepidoptera) - *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica,* 63: 3-166.

2476 HENNINGS D., VORBRÜGGEN W. 1987 - Zur Macrolepidopterenfauna des Aostatals (N-Italien) - *Entomologische Zeitschrift,* Essen, 97 (14): 204-208; (15): 209-214.

2477 INFANTI B., MORANDINI C. 1987 - Nuovi ritrovamenti di *Erebia nivalis* Lork. & De Lesse sul versante meridionale delle Alpi (Lepidoptera, Satyridae) - *Gortania, Atti Museo Friulano di Storia Naturale,* Udine, 8 (1986): 243-248.

2478 KAPFER G. 1987 - Eindrücke aus Sardinien (Italien) - *Entomologische Zeitschrift,* 97 (18): 264-269.

2479 LASTUVKA Z. 1987 - On the taxonomy of *Microsphecia tineiformis* (Esper) and *M. brosiformis* (Hübner) (Lepidoptera, Sesiidae) - *Acta Univiversitatis Agriculturae,* Brno, 33 (4) (1985): 183-190.

2480 LEIGHEB G. 1987 - *Lysandra coridon* ssp. *gennargenti* nova (Lepidoptera, Lycaenidae), nuovo licenide della Sardegna - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 5 (2): 447-454.

2481 MANINO Z., LEIGHEB G., CAMERON-CURRY P., CAMERON-CURRY V. 1987 - Descrizione degli stadi preimmaginali di *Agrodiaetus humedasae* Toso & Balletto, 1976 (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino*, 5 (1): 97-101.

2482 MELLINI E. 1987 - Nota su *Chaetogena filipalpis* Rond. parassita di *Apterona crenulella* Bruand (Lep. Psychidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna,* 42: 219-229.

2483 NARDELLI U. 1987 - Ein Freilandhybrid zwischen *Anthocharis damone* Boisd. und *Euchloe simplonia* Frr. mit Angaben über die Biologie beider Arten im Ätna-Gebiet (Sizilien) (Lepidoptera: Pieridae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 8 (2): 83-91.

2484 NARDELLI U., BERTACCINI E. 1987 - Über eine gleichzeitige Winterzucht von *Polymixis serpentina* und *Philapora canescens* (Lepidoptera: Noctuidae: Cuculliinae) - *Entomologische Zeitschrift,* 97 (12): 161-170.

2485 ORTALI A., BERTACCINI E. - 1987 - Le farfalle diurne d'Italia - Pubblicazioni del Museo Ornitologico e di Scienze Naturali di Ravenna, 159 pp.

2486 PROLA G. 1987 - Le farfalle dei Monti della Tolfa - Assessorato Sanità e Ambiente, Prov. di Roma, 40 pp.

2487 PROTA R., LUCIANO P. 1987 - Elementi di previsione delle infestazioni in sugherete sarde e prospettive di difesa - Atti del "Convegno sulle avversità del bosco e delle specie arboree da legno", Firenze 15-16 ottobre 1987: 287-304.

2488 PUCCI C., PAPARATTI B. 1987 - Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna umbra: Catture di adulti effettuate con una trappola luminosa tipo "Pennsylvania" - *Frustula Entomologica,* N. S., X (XXIII): 1-40.

2489 RAPETTI S. 1987 - Danni da rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina* L.) su Eucalyptus da fronda in Liguria - *La difesa delle piante,* 10 (1): 133-138.

2490 REZBANYAI-RESER L. 1987 - *Idaea griseanova* sp. n., eine bisher verkannte Zwillingsart von ruficostata Zeller, 1849, aus dem Westmediterraneum (Lepidoptera, Geometridae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* N.F. 37 (4): 141-182.

2491 RONKAY L., TARMAN G. 1987 - Some notes on the distribution of *Lithophane lapidae* (sic!) (Hübner, (1803-1808)) in the Alps and a curious Alpine specimen of *Autophila ligaminosa amianta* Schawerda, 1919 (Lepidoptera, Noctuidae) - *Folia Entomologica Hungarica,* XLVIII: 225-226.

2492 ROVERSI P.F. 1987 - Osservazioni preliminari su casi di sterilità, arresti di sviluppo embrionale e mortalità larvale in uova di *Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schiff.) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) - *Redia,* Firenze, III ser., LXX: 93-103.

2493 SALA G. 1987 - A new form of *Papilio hospiton* Gène 1831 - *Papilio Int.,* 3 (4) (1986): 210-211.

2494 SANNINO L., BALBIANI A. 1987 - Un defogliatore del melograno - *Terra e Sole,* 533: 42-43.

2495 SANNINO L., BALBIANI A., AVIGLIANO M. 1987 - *Spodoptera littoralis* (Boisduval) and *Spodoptera exigua* (Hub.) (Lepidoptera: Noctuidae) on Tobacco in Italy - *Annali dell'Istituto Sperimentale per il Tabacco, Scafati,* XII (1986): 65-68.

2496 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1987 - Osservazioni morfo-biologiche su alcune specie del genere *Spodoptera* (Lepidoptera: Noctuidae) e rapporti di parassitismo con la coltura del tabacco in Italia - *Informatore fitopatologico,* XXXVII (11): 29-40.

2497 SEYER H. 1987 - Zum taxonomischen Status von *Eudia pavonia ligurica* Weismann 1876 (Lepidoptera: Saturniidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 97 (12): 171-172.

2498 TIBERI R., BIN F. 1987 - *Hyphantria cunea* (Drury) (Lepidoptera, Arctiidae): controllo naturale da entomofagi indigeni a dieci anni

dalla sua introduzione in nord Italia - Convegno sulle avversità del bosco e delle specie arboree da legno, Firenze, 15-12 ottobre 1987: 305-312.

2499 TIBERI R., ROVERSI P.F. 1987 - I parassitoidi oofagi di *Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schiff.) su *Pinus halepensis* Mill. nel Gargano, Puglia (Hymenoptera, Chalcidoidea; Lepidoptera, Thaumetopoeidae) - *Redia,* Firenze, III ser., LXX: 1-19.

2500 TREMATERRA P. 1987 - Indagini preliminari sulla possibilita di mass-trapping nel controllo di *Synanthedon myopaeformis* Bkh. (Lepidoptera Sesiidae) - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 19 (1986-87): 1-12.

2501 WIEMERS M. 1987 - Eine Zucht von *Erebia styx triglites* Fruhst. (Lep., Satyridae) vom Monte Baldo - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 7 (4): 143-148.

2502 WITT T. 1987 - Lepidopterologische Sammelergebnisse der Reisen Franz Daniels nach Istrien in den Jahren 1965 mit 1971 (Lepidoptera, Bombyces et Sphinges) - *Entomofauna,* 8 (28): 413-440.

2502bis BALESTRAZZI E. 1988 - Le farfalle del Parco Ticino - La Biblioteca del Parco, Fabbri Editori, Milano, 127 pp.

2503 BALLETTO E., LATTES A., CASSULO L., TOSO G. 1987 - Studi sull'ecologia dei Lepidotteri Ropaloceri in alcuni ambienti delle Dolomiti - *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica,* Vol. 64 Suppl.: 87-123.

2504 BATTISTI A., COLAZZA S., ROVERSI P.F., TIBERI R. 1988 - Alternative host of *Ooencyrtus pityocampae* (Mercet) (Hymenoptera Encyrtidae) in Italy - *Redia,* Firenze, III ser., LXXI (2): 321-328.

2505 BIN F., COLAZZA S., CURRADO I., LONGO S., SCARAMOZZINO P.L., TIBERI R. 1988 - Egg mass characteristics of Brown Tail Moth and attack strategy of an egg Parasitoid - *Advances in Parasitic Hymenoptera Research,* XXXIV: 379-382.

2506 BROCKMANN E. 1988 - Beitrag zur Makrolepidopterenfauna des Aosta-Tales (italienische Alpen) . 6. Spezieller Teil. Hepialidae, Cossidae, Zygaenidae (pro parte), Psychidae, Sesiidae, Lasiocampidae, Drepanidae, Thyatiridae, Sphingidae, sowie vorläufige Bibliographie - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 9 (1): 1-17.

2507 CARRAI C., LOI G. 1988 - Presenza di *Scopula ochroleucaria* H. S. (Lepidoptera, Geometridae) su coltivazioni di *Saintpaulia ionantha* H. Wendl. in Toscana - *Informatore fitopatologico,* XXXVIII (1): 51-54.

2508 CASINI P.M. 1988 - Distribution de *Lysandra hispana* Herrich-Schäffer en Italie et observations zoogéographiques er

paléogéographiques (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XI (6): 265-270.

2509 CERNIGLIARO A., DI BENEDETTO R., LOMBARDO V. 1988 - Primo contributo alla conoscenza dei Ropaloceri della Sicilia nord-orientale con particolare riguardo al Monte Etna (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 120 (1): 39-42.

2510 CURRADO I., RAVIGLIONE M., SCARAMOZZINO P.L., 1988 - Indagini sui limitatori naturali di *Euproctis chrysorrhoea* L. in Piemonte (Lepidoptera, Lymantriidae) - Atti XV Congresso nazionale italiano di Entomologia, L'Aquila: 981-988.

2511 D'ANTONIO C., FIMIANI P. 1988 - Approccio ad un inventario entomofaunistico dell'Isola di Vivara (NA). Nota preliminare (1° contributo) - *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Università di Napoli,* XXVI (1983): 155-170.

2512 DALLA MONTA' L. 1988 - Osservazioni sulla biologia di *Synanthedon myopaeformis* Borkh. (Lep., Aegeriidae) nel Veneto - Atti XV Congresso nazionale italiano di Entomologia, L'Aquila: 809-815.

2513 DOBLER G. 1988 - *Mesapamea secalis* (L., 1758) und *Mesapamea secalella* Remm, 1983, ein Beitrag zur Verbreitung im Alpenraum (Lepidoptera: Noctuidae) - *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica,* 64, 1987 (1988): 183-189.

2514 FAQUAET M. 1988 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 1 (Lepidoptera) - *Phegea,* 16 (3): 85-92.

2515 FIUMI G. 1988 - *Eupithecia ochridata* Pinker, una specie nuova per la fauna italiana (Lepidoptera, Geometridae) - *Giornale italiano di Entomologia,* Cremona, 4: 1-3.

2516 FIUMI G., CAMPORESI S. 1988 - I Macrolepidotteri. La Romagna Naturale, 1 - Amministrazione Provinciale di Forlì, 264 pp.

2517 GEIGER H., DESCIMON H., SCHOLL A. 1988 - Evidence for speciation within nominal *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758) in southern Europe (Lepidoptera: Pieridae) - *Nota lepidopterologica,* 11 (1): 7-12.

2518 HERRMANN R. 1988 - *Dahlica marmorella* sp. n. - eine neue Psychide aus Italien (Lepidoptera: Psychidae) - *Nota lepidopterologica,* 10: 203-208.

2519 KUDRNA O., LEIGHEB G. 1988 - On the Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of some tyrrhenian Islands (Southern Italy) - *British Journal of Entomology and Natural History,* 1: 133-137.

2520 LASTUVKA Z. 1988 - Zur taxonomie und verbreitung der europäischen arten der gattung *Pyropteron* Newman (Lepidoptera, Sesiidae) - *Acta Universitatis Agriculturae (Brno), Facultas agronomica,* XXXVI (1): 105-111 (1990).

2521 LASTUVKA Z. 1988 - Zur taxonomie und morphologie von *Synansphecia muscaeformis* (Esper) (Lepidoptera, Sesiidae) - *Acta Universitatis Agriculturae (Brno), Facultas agronomica,* XXXIV (4): 177-180 (1989).

2522 MENSI P., LATTES P., SALVIDIO S, BALLETTO E. 1988 - Taxonomy, evolutionary biology and biogeography of South West European *Polyommatus coridon* (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Zoological Journal of the Linnean Society,* 93: 259-271.

2523 MICIELI DE BIASE L., MARULLO R., RUSSO L.F. 1988 - Infestazioni di *Mythimna unipuncta* Hw. (Lepidoptera Noctuidae) al sorgo ed al mais nelle provincie di Caserta e Salerno - *L'Informatore Agrario,* 50: 79-81.

2524 NARDELLI U. 1988 - Riscoperta *Ocnogyna parasita* Hübner, 1790 (Lepidoptera Arctidae) nella Venezia Tridentina - *Natura Alpina,* XXXIX (2): 41-45.

2525 NARDELLI U. 1988 - *Erebia triaria* de Prunner (Lepidoptera: Satyridae) Biologie und Ökologie der Population der Brenta-Gruppe in Italien - *Entomologische Zeitschrift,* 98 (21): 305-320.

2526 PAPARATTI B., FABOZZI R. 1988 - Un nuovo parassita della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schif.), Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - *Informatore fitopatologico,* XXXVIII (9): 45-48.

2527 PARENZAN P. 1988 - Nuove segnalazioni di Geometridae (Lepidoptera) per l'Italia Meridionale - *Entomologica,* Bari, XXIII: 139-160.

2528 PARENZAN P. 1988 - Contributo alla conoscenza della macrolepidotterofauna del Bosco Pantano di Policoro - Convegno "Il Bosco di Policoro nel quadro delle aree protette della Basilicata", Potenza 6 luglio 1988: 55-59.

2529 PASQUALINI E., MALAVOLTA C., MAINI S., BARONIO P., GAVIOLI F., CAMPADELLI G. 1988 - Mass trapping of *Cossus cossus* L.: initial trials - Médiateurs chimiques: comportement et systématique des Lépidoptères Applications en agronomie. Valence, 13-14 décembre 1985, Ed. INRA, Paris, 1988. *Les Colloques de l'INRA,* n° 46: 158-164.

2530 PORCELLI F. 1988 - Morfologia degli stadi larvali di *Habronyx heros* Wesmael (Ichneumonidae - Anomaloninae) con note di biologia - *Entomologica,* Bari, XXIII: 171-189.

2531 RACHELI T., ZILLI A. 1988 - Aspetti faunistici, biogeografici ed ecologici dei Lepidotteri del Gran Sasso - Atti XV Congresso nazionale italiano di Entomologia, L'Aquila: 641-648.

2532 RACHELI T., ZILLI A. 1988 - Modelli di distribuzione dei Lepidotteri nell'Italia meridionale - *Biogeographia, Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* (N. S.), XI (1985): 165-194.

2533 RAINERI V. 1988 - Quelques especes de Geometridae intéressantes pour la Sardaigne - *Bulletin du Cercle des Lépidopteristes de Belgique,* 17 (5): 72-76.

2534 REZBANYAI-RESER L., EXPÓSITO-HERMOSA A. 1988 - Zur Vorkommen von *Gnophos* (*Kemtrognophos*) predotae Schawerda, 1929, in Spanien und zur Morphologie der Arten *predotae* Schaw., *ambiguatus* Dup. und *onustarius* H.-Sch. (Lep., Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 11 (3): 207-222.

2535 RONKAY G., RONKAY L. 1988 - Taxonomic studies on the Palearctic Cuculliae (Lepidoptera: Noctuidae). Part III.: the *chamomillae* group - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 5 (2) (1987): 631-666.

2536 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1988 - Indagini sulla lepidotterofauna del tabacco. 3. Recenti catture e osservazioni sulla biologia di *Phragmatobia fuliginosa* L. (Lepidoptera: Arctiidae) - *Informatore fitopatologico,* XXXVIII (12): 65-70.

2537 SBORDONI V., LUCARELLI M. 1988 - Note preliminari sulla fauna cavernicola del Matese - *Notiziario Circolo Speleologico Romano,* N. S. 3: 91-109.

2538 TEOBALDELLI A. 1988 - Nuovi rinvenimenti di Macrolepidotteri nel territorio marchigiano (2° Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna delle Marche) - Atti XV Congresso nazionale italiano di Entomologia, L'Aquila: 657-664.

2539 TIBERI R., BIN F. 1988 - Parassitismo e altri fattori di mortalità nelle uova di *Thaumetopoea processionea* (L.) in Italia centrale (Hym., Chalcidoidea; Lep., Thaumetopoeidae) - *Redia,* Firenze, III ser., LXXI (2): 299-311.

2540 TREMBLAY E. 1988 - Avversità delle colture di recente o temuta introduzione. Parassiti animali: Insetti - *L'Italia agricola,* 125 (1): 115-128.

2541 TRENTINI M., MARINI M. 1988 - Osservazioni sui cromosomi di *Papilio hospiton* Gn. (Lepidoptera Papilionidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 120 (1): 53-55.

2542 WAGENER S. 1988 - What are the valid names for the two genetically different taxa currently included within *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758)? (Lepidoptera Pieridae) - *Nota lepidopterologica,* 11 (1): 21-38.

2543 ZILLI A. 1988 - Presenza in Puglia di *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 42 (1-4): 19-20. (1987).

2544 ZILLI A. 1988 - Un endemismo appenninico misconosciuto: *Hepialus aemilianus* Costantini, 1911 (Lepidoptera Hepialidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 120 (1): 43-48.

2545 ZILLI A., CIANCHI R., RACHELI T., BULLINI L. 1988 - A new species from southern Italy in the *Heterogynis penella* complex (Lepidoptera, Zygaenoidea, Heterogynidae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 6 (1): 1-9.

2546 ZILLI A., CIANCHI R., RACHELI T., BULLINI L. 1988 - Ricerche sulla biologia e sul differenziamento genetico nel complesso *Heterogynis penella* (Lepidoptera, Zygaenoidea, Heterogynidae) - Atti XV Congresso nazionale italiano di Entomologia, L'Aquila: 801-808.

2547 ARNSCHEID W. 1988 - Ein Beitrag zur Systematik der europäischen Arten der Gattungen *Postsolenobia* Meier, *Brevantennia* Sieder und *Siederia* Meier (Lepidoptera, Psychidae, Taleporiinae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 8 (3/4) (1988): 113-144.

2548 BALLETTO E., TOSO G., LATTES A. 1989 - Studi sulle comunità di Lepidotteri Ropaloceri del litorale tirrenico - *Bollettino del Museo dell'Istuto di Biologia dell'Università di Genova,* 53 (1987): 141-186.

2549 BECK H. 1989 - Verantwortungsvolles Taxieren, Appel an den "International Trust for Zoological Nomenclature". Beschreibung einer neuen Unterart von *Cucullia blattariae* (Esper, 1790): *Cucullia blattariae eugeniae* subspec. n. Synonymien im Genus *Cucullia* (Lep. Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, 19: 189-217.

2550 BERIO E. 1989 - Una nuova specie di *Euchalcia* italiana (Lepidoptera Noctuidae Plusiinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (1): 64-66.

2551 BERIO E. 1989 - Novità in tema di Quadrifine paleartiche (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 120 (3): 216-222.

2552 CAPOLONGO D. 1989 - Specie cavernicole di Campania. Primo agggiornamento - Atti del XV Congresso Nazionale di Speleologia, Castellana Grotte 10-13 settembre 1987, in: Le Grotte d'Italia. Serie 4°, XV (1987-1989): 811-841.

2553 CASSULO L.A., RAINERI V. 1989 - Alcune interessanti raccolte di Eteroceri di Liguria (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (2): 127-136.

2554 CERNIGLIARO A., DI BENEDETTO R., LOMBARDO V. 1989 - Secondo contributo alla conoscenza dei Ropaloceri della Sicilia orientale (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (2): 124-126.

2555 CESARONI D., ALLEGRUCCI G., ANGELICI M.C., RACHELI T., SBORDONI V. 1989 - Allozymic and morphometric analysis of populations in the *Zygaena purpuralis* complex (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Biological Journal of the Linnean Society,* London, 36: 271-280.

2556 CURRADO I. 1989 - Insetti del Pino strobo in Italia - Atti delle "Giornate di Studio sulle avversità del Pino", Ravenna 6-7 novembre 1989: 206-211.

2557 DANTART J., PÉREZ DE-GREGORIO J.J. 1989 - El gènere *Omia* Hübner, 1821, a la península ibèrica: distribució, fenologia i ecologia (Lep.: Noctuidae, Cucullinae) - *Treballs de la Societat Catalana de Lepidopterologia,* IX (1988): 7-22.

2558 DROUET E., TARMANN G. 1989 - Données nouvelles pour la répartition de quelques *Adscita* Retzius en France et en Italie - *Linneana Belgica,* 12 (1): 34-41.

2559 FAQUAET M. 1989 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 2 (Lepidoptera) - *Phegea,* 17 (1): 27-30.

2560 FAQUAET M. 1989 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 3 (Lepidoptera) - *Phegea,* 17 (4): 145-159.

2561 HACKER H. 1989 - Die Noctuidae Griechenland. Mit einer übersicht über die Fauna des Balkanraumes (Lepidoptera, Noctuidae) - *Herbipoliana,* 2, Eitschberger, Markleuthen: 590 pp.

2562 HOLZAPFEL O.A. 1989 - Beitrage zur Fauna Südtirols. 1 - *Entomologische Zeitschrift,* 99 (6): 71-78.

2563 HOLZAPFEL O.A. 1989 - Beitrage zur Fauna Südtirols. 2. Naturkundliche Exkursionen im Uberetsch - *Entomologische Zeitschrift,* 99 (14): 199-204.

2564 INSERRA S. 1989 - Interventi con *Bacillus thuringiensis* Berliner, diflubenzuron ed eptenophos contro *Chrysodeixis chalcites* (esper. (sic)) (Lep. noctuidae) nell'ambito di un programma di lotta integrata su gerbera in coltura protetta - *Informatore fitopatologico,* XXXIX (6): 67-69.

2565 KAILA L. 1989 - *Eupithecia ochridata* Pinker new to northern Europe: morphological and biological studies on the *E. innotata* complex (Lepidoptera, Geometridae) - *Notulae Entomologicae,* 69: 39-45.

2566 LASTUVKA Z., MALICKY H., HÜTTINGER E., RAUSCH H., RESSL F. 1989 - Sesien-Funde aus Europa und dem Mediterrangebiet (Lepidoptera, Sesiidae) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreischen Entomologen,* 41 (3/4): 105-110 (1990).

2567 LONGO S. 1989 - Contributo allo studio delle gradazioni di *Euproctis chrysorrhoea* (L.) in ambiente mediterraneo - Atti del

"Convegno sulle avversità del bosco e delle specie arboree da legno", Firenze, 15-16 ottobre 1987: 235-251.

2568 LONGO S., PALMIERI V., RAPISARDA C. 1989 - Indagini bio-ecologiche sulla "Processionaria" del pino - *Thaumetopoea pityocampa* - in Sicilia - *Tecnica Agricola,* Catania, XLI (3): 233-250.

2569 MARINI M., TRENTINI M. 1989 - *Pachypasa otus* (Drury): aspetti di oomorfologia e cariologia (Lepidoptera Lasiocampidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 120 (3): 223-226.

2570 MARINI M., TRENTINI M. 1989 - SEM morphological observations of *Papilio hospiton* Gn. 1839 and *P. machaon* L. 1758 eggs (Lepidoptera: Papilionidae) - *Nota lepidopterologica,* 12 (3): 175-178.

2571 MARINIELLO L. 1989 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 149 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (1): 78.

2572 MASCAGNI A. 1989 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 150. *Apatura ilia* Schiffermüller, 1775 (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (1): 78.

2573 MAZZARO S. 1989 - Attacchi di *Theresimina ampelophaga* nel Trevigiano e diagnosi precoce delle infestazioni - *Informatore Agrario,* 45: 70-74.

2574 NARDELLI U., BERTACCINI E. 1989 - Angaben zur Biologie, Ökologie und Verbreitung von *Gortyna puengeleri* Turati 1909 in Italien (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 10 (2): 143-158, 36 figg.

2575 PARENZAN P. 1989 - Lepidotteri, in: Parenzan Pietro - Petruscio la Gravina di Mottola. Natura e Civiltà Rupestre - Congedo Editore, Galatina: 153-156.

2576 POOLE R.W. 1989 - Lepidopterorum Catalogus. Fascicle 118. Noctuidae. 3 Vol. - E.J. Brill/Flora & Fauna Publications, 1313 pp.

2577 QUARANTA F., MARIANI G., CUOCOLO L., DELRIO G., ROTUNDO G., SPANU A. 1989 - Sul problema della sesamia e della piralide nella coltivazione del mais da granella in semina estiva - *L'Informatore Agrario,* 45 (14): 73-77.

2578 RAINERI V. 1989 - *Idaea predotaria* (Hartig, 1951) stat. n., comb. n., the valid senior synonym of *I. griseanova* Rezbanyai-Reser, 1987 (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 12 (3): 187-191.

2579 RAINERI V. 1989 - *Horisme predotai* Bytinski-Salz, 1936 a species distinct from *Horisme exoletata* (Herrich-Schaeffer, 1839) (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 12 (2): 153-158.

2580 RAINERI V. 1989 - Geometridi (Lepidoptera) della collezione Ghiliani conservati nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova

- *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, LXXXVII: 149-156.

2581 REISSINGER E. 1989 - Checkliste Pieridae Duponchel, 1835 (Lepidoptera) der Westpalaearctis (Europa, Nordwestafrica, Kaukasus, Klainasien) - *Atalanta,* Würzburg, 20: 149-185.

2582 REZBANYAI-RESER L. 1989 - Ein Musterbeispiel der rezenten Arealerweiterung: *Eupithecia sinuosaria* Eversmann, 1848, bis zur Südostschweiz vorgedrungen (Lepidoptera, Geometridae) - *Atalanta,* Würzburg, 19: 39-50.

2583 SALA G. 1989 - Biologische und ethologische Beobachtungen an *Parnassius apollo pumilus* Stichel und *P. apollo siciliae* Ch. Oberthür in Süditalien (Lepidoptera: Papilionidae: Parnassiinae) - *Entomologische Zeitschrift,* 99 (16): 225-240.

2584 SALERNO P., LORETI M., CARINI V. 1989 - Ricerche in alcune cavità dell'Appennino umbro-marchigiano - Atti del XV Congresso Nazionale di Speleologia, Castellana Grotte 10-13 settembre 1987: 917-930.

2585 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1989 - Sulla presenza di *Athetis hospes* su tabacco in Campania (nota preliminare - *L'Informatore Agrario,* Verona, XLV (24): 69-71.

2586 SCHINTLMEISTER A. 1989 - Zoogeographie der palaearktischen Notodontidae (Lepidoptera) - *Neue Entomologische Nachrichten,* 25: 1-74.

2587 SIEGEL C. 1989 - Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna della Sardegna. 1. Noctuidae raccolte dal 1981 al 1986 - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 67 (2) (1988): 273-290.

2588 SLOT J. 1989 - Vlinders in het Aostatal - *Vlinders,* 4 (3): 19-24.

2589 TIBERI R. 1989 - Egg parasitism of *Euproctis chrysorrhoea* (L.) in Central Italy - *Redia,* Firenze, 72 (1): 291-301.

2590 TREMBLAY E., RAGUSA S., MICIELI DE BIASE L., RUSSO A., RUSSO L.F., ZAGAMI S. 1989 - Notizie sulla presenza massiva di un Lepidottero Psichide in Calabria - *L'Informatore Agrario,* Verona, 13: 113-114.

2591 TRIBERTI P. 1989 - Studi sulla palude del Busatello (Veneto - Lombardia). 20. I Lepidotteri - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona (II ser.), sez. biologica,* 7: 175-192.

2592 VIGGIANI G., LAUDONIA S. 1989 - Le specie italiane di *Trichogramma* Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae), con un commento sullo stato della tassonomia del genere - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* 46: 107-124.

2593 ZAHM N. 1989 - Lepidopteren aus der Oasi di Serranella (Mittelitalien, Abruzzen) (Lepidoptera) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 43 (1-4): 1-9. (1988).

2594 ZILLI A., BERIO E. 1989 - Note tassonomiche e nomenclaturali su *Hadena vulcanica* (Turati, 1907), bona sp. (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (2): 137-141.

2595 ARNONE M., ORLANDO V.E. 1989 - I tipi delle raccolte del Museo Civico di Terrasini. II contributo: Insecta lepidoptera - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XIV (3-4): 101-113.

2596 BAGNOLI B. 1990 - Incidenza delle infestazioni da artropodi e difesa dei vigneti in Toscana - *La difesa delle piante,* 13 (3-4): 89-112.

2597 BERIO E. 1990 - Le Nottue della collezione Luigi Failla Tedaldi (Museo di Zoologia dell'Università di Palermo) (Lepidoptera Noctuidae) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XIV (1-2): 33-49.

2598 BIERMANN H. 1990 - Nachtrag zu "Beiträge zur Tagfalterfauna Sardiniens (Lep., Rhopalocera u. Hesperiidae)" - *Atalanta,* Würzburg, 21 (1/2): 81-82.

2599 BIERMANN H. 1990 - Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Insel Montecristo im Toskanischen Archipel (Lepidoptera) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 11 (3): 179-184.

2600 BONGIOVANNI G.C., BARBINI M., ANSALONI R. 1990 - Risultati di una campagna di monitoraggio con feromoni sintetici su alcuni Lepidotteri Nottuidi dannosi alla barbabietola da zucchero - *L'Informatore Agrario,* 2: 89-99.

2601 BORDONI A. 1990 - Intorno ad alcune Zigene delle Cornate di Gerfalco nelle colline metallifere ed al problema del melanismo litoraneo (Lepidoptera, Zyganeidae) - *Atti del Museo Civico di Storia naturale di Grosseto,* 13: 77-80.

2602 CASINI P.M. 1990 - Répartition géographique d'*Heteropterus morpheus* Pallas en Italie centrale et nouvelles stations dans les Collines Métallifères (Lepidoptera Hesperiidae) - *Linneana Belgica,* XII (6): 245-251.

2603 CASSULO L.A., RAINERI V. 1990 - Eteroceri della Collezione Ghiliani conservati nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova (Lepidoptera) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, LXXXVIII: 285-299.

2604 FABBRIS S. 1990 - Le farfalle diurne del litorale Grossetano (Lepidoptera, Rhopalocera) - *Atti del Museo Civico di Storia naturale di Grosseto,* 13: 37-70.

2605 FIBIGER M. 1990 - Noctuidae europaeae. Vol. 1. Noctuinae I - Entomological Press, Sorø: 208 pp.

2606 FLAMIGNI C. 1990 - Note su alcune specie di Geometridi nuove o poco conosciute per l'Appennino settentrionale (Lepidoptera, Geometridae) - *Giornale italiano di Entomologia,* Cremona, 5: 103-107.

2607 HACKER H. 1990 - Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera) - *Neue Entomologische Nachrichten,* 27: 1-707.

2608 HACKER H. 1990 - Die Gattung *Chersotis* Boisduval, 1840. 1. Die *fimbriola* (Esper, (1803))/*laeta* (Rebel, 1904) - Gruppe - *Spixiana,* München, 13 (3): 277-327, Tavv. 1-10.

2609 HACKER H. 1990 - Systematische und synonymische Liste der Noctuiden Deutschland und der angrenzenden Gebiete (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 1: 5-165.

2610 HAUSMANN A., PARENZAN P. 1990 - Neue und interessante Geometridenarten für die Süditalien-Fauna (Lepidoptera, Geometridae) - *Entomofauna,* Linz, 11 (29): 497-504.

2611 IPPOLITO R., PARENZAN P. 1990 - Contributo alla conoscenza dell'entomofauna del Cartamo (*Carthamus tinctorius* L.) nell'Italia meridionale - *Informatore fitopatologico,* XL (2): 90-95.

2612 LASTUVKA Z. 1990 - Der Katalog der Europäischen Glasflüger (Lepidoptera, Sesiidae) – *Publications de la Faculté des Sciences de l'Université I.E. Purkyne (Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis),* Brno, 20 (9-10): 461-476.

2613 LEIGHEB G. 1990 - Una colonia relitta di *Maculinea alcon* Denis & Schiffermüller in Piemonte (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale,* 11: 129-134.

2614 LERAUT P. 1990 - Contribution à l'étude des Satyrinae de France (Lep. Nymphalidae) - *Entomologica gallica,* 2 (1): 8-19.

2615 MALTZEFF P. 1990 - Reperti. Lepidottera, Sphingidae. *Hippotion celerio* (Linnaeus, 1758) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 44 (1989): 81.

2616 MASCAGNI A., CASINI P.M. 1990 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 154 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (3): 232.

2617 MENTZER, VON, E. 1990 - *Idaea boeklini* sp. n. from South Europe, with notes on the nomenclature and systematics of the *Idaea virgularia* (Hübner) species group (Lepidoptera: Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 12 (4): 290-302.

2618 MENTZER, VON, E. 1990 - *Glossotrophia annae* sp. n. from Spain (Lepidoptera: Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 13 (1): 43-49.

2619 NARDELLI U., GIANDOLFO B., BERTACCINI E. 1990 - Biologisch-ökologische Notizen über *Ocnogyna baetica* Rambur 1836 in

Italien (Lepidoptera: Arctiidae) - *Entomologische Zeitschrift,* Essen, 100 (14): 253-272, 10 figg.

2620 PROLA G., PROLA C. 1990 - Libro rosso delle farfalle italiane - WWF Roma: 1-71.

2621 RACHELI T. 1990 - Sinossi degli Zygaenini italiani (Lepidoptera: Zygaenidae) - Arti Grafiche Tofani Alatri, Roma, 174 pp.

2622 RAINERI V 1990 - Su una teratologia di *Plagodis pulveraria* (Linné, 1758) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 122 (2): 149-150.

2623 REZBANYAI-RESER L. 1990 - Erstnachweis von *Caradrina* (*Paradrina*) *wullschlegeli* Puengeler, 1903, in Graubünden (Val Müstair) sowie Angaben zum Vorkommen im benachbarten Vintschgau, Norditalien (Lep., Noctuidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 39 (4): 160-167 (1989).

2624 REZBANYAI-RESER L. 1990 - Morphologische und faunistische Untersuchungen bei europäischen Mesapamea-Arten (Lepidoptera, Noctuidae) - *Entomologische Berichten Luzern,* 24: 131-136.

2625 REZBANYAI-RESER L., HELLMANN F. 1990 - *Eilema pseudocomplana* (Daniel 1939) auch im Aosta-Tal, NW-Italien (Lepidoptera: Arctiidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 90 (5): 84-89.

2626 ROVERSI P.F. 1990 - Sulle generazioni di *Anastatus disparis* Ruschka in Italia centrale - *Redia,* Firenze, LXXIII (2): 507-516.

2627 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1990 - *Lacanobia oleracea* L.: osservazioni morfologiche (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) - *Informatore fitopatologico,* XL (12): 49-53.

2628 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1990 - Sulla presenza di *Phlogophora meticulosa* L. e di *Noctua pronuba* L. in Campania - *L'Informatore Agrario,* Verona, XLVI (44): 59-62.

2629 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1990 - Descrizione degli stadi di *Athetis hospes* (Frr.) (Lepidoptera Noctuidae Amphipyrinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 121 (3) (1989): 213-219.

2630 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1990 - Biologia di *Athetis hospes* (Freyer 1831), in Campania (Lepidoptera Noctuidae Amphipyrinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 122 (2): 141-148.

2631 SANNINO L., PARENZAN P., BALBIANI A. 1990 - *Axylia putris* L. (Lepidoptera: Noctuidae - Heliothinae) dannosa al tabacco in Campania - *Informatore fitopatologico,* XL (1): 39-44.

2632 SINACORI A. 1990 - Osservazioni bio-etologiche sulla *Gortyna xanthenes* Germar in Sicilia (Lepidoptera Noctuidae) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XIV (1-2): 51-61.

2633 SLOT J. 1990 - Een zomer in het Aostatal - *Vlinders,* 5 (3): 88-90.

2634 SOLDANO M. 1990 - Nuovi dati sulla distribuzione di *Carterocephalus palaemon* Pallas in Piemonte (Lepidoptera, Hesperidae) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale,* 11: 125-128.

2635 TREMATERRA P., FACCIOLI G. 1990 - Studi su alcuni fattori che influenzano l'attività delle trappole a feromone nella cattura di *Synanthedon myopaeformis* Bkh. - *Informatore fitopatologico,* XL (11): 53-56.

2635bis WEIGT H.-J. 1990 - Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 3: *Eupithecia sinuosaria* bis *pernotata* - *Dortmunder Beiträge zur Landeskunde, naturwiss. Mitteilungen,* Dortmund, 24: 5-108.

2636 ZILLI A. 1990 - Novità faunistiche e zoogeografiche sui Nottuidi italiani (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 44 (1-4): 33-53. (1989).

2637 ZILLI A. 1990 - Notes on the nomenclature of *Coscinia libyssa* (Püngeler, 1907) and its occurrence in Sicily (Lepidoptera, Arctiidae) - *Fragmenta entomologica,* Roma, 22 (2): 295-298.

2638 ARNONE M., ROMANO M. 1990 - Nuovi reperti di *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) in Sicilia (Lepidoptera, Danaidae) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XV (3-4): 161-166.

2639 BACK W. 1991 - Eine Korrektur zu "Taxonomische Untersuchungen innerhalb der Artengruppe um *Euchloe ausonia* (Hübner, 1804)" in Atalanta 21 (3/4): 187-206 (Lep., Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, 22 (2/4): 365.

2640 BARI G., TRIGGIANI O. 1991 - Indagini sulla *Zeuzera pyrina* L. negli oliveti in Puglia - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 631-645.

2641 BATTISTI A., LONGO S., TIBERI R. 1991 - Aggiornamenti delle conoscenze sulla processionaria del pino in Italia - Atti delle "Giornate di studio sulle avversità del Pino", Ravenna 6-7 novembre 1989: 185-194.

2642 BERIO E. 1991 - Lepidoptera Noctuidae. II. Sezione Quadrifide - Fauna d'Italia, Vol. XXVII, 708 pp., 16 tavv., Ed. Calderini, Bologna.

2643 BERTACCINI E. 1991 - Biotopi da salvaguardare in Romagna - *Dispar, Boll. AICF, Milano,* 2: 16-20.

2644 BORGO E., RAINERI V. 1991 - Osservazioni sull'alimentazione del Gabbiano reale, *Larus cachinnans*, in Liguria - *Rivista italiana di Ornitologia,* Milano, 61 (3-4): 97-100.

2645 BORIANI M. 1991 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 167. *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 123 (1): 68.

2646 BORIANI M. 1991 - *Chouioia cunea* Yang (Hymenoptera Eulophidae), parasitoids of *Hyphantria cunea* (Drury) (Lepidoptera, Arctiidae), new for Europe - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 23 (2): 193-196.

2647 BRUNTON C.F.A., BAXTER J.D., QUARTSON J.A.S., PANCHEN A.L. 1991 - Altitude-dependent variation in wing pattern in Corsican butterfly *Coenonympha corinna* Hübner - *Biological Journal of the Linnean Society,* 42: 367-378.

2648 CAPIZZI A., DALLA GUDA C., SCORDO E. 1991 - Osservazioni sulla fauna di Noctuidae nell'area floricola di Sanremo - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 669-676.

2649 CARAPEZZA A. 1991 - Nuovi dati sulla distribuzione di alcuni Ropaloceri in Sicilia (Lepidoptera Rhopalocera) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XV (1-2): 110-112.

2650 CASSULO L., RAINERI V. 1991 - Parliamo di *Lycaena dispar* - *Dispar, Boll. AICF, Milano,* 3: 11-14.

2650bis CURRADO I., MAZZOGLIO P.J., VERZÈ P., SCARAMOZZINO P.L. 1991 - Pullulazioni di *Lymantria monacha* (L.) in Valle d'Aosta (Lepidoptera Lymantriidae). Nota preliminare - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 683-688.

2651 DE PERSIIS G. 1991 - Le farfalle diurne della provincia di Frosinone - *Quaderni del Museo di Storia Naturale,* Patrica (FR), 3: 245 pp.

2652 DELRIO G., LUCIANO P., PROTA R., DI COLA G. 1991 - Analisi delle fluttuazioni di lepidotteri infeudati alla Quercia da sughero in Sardegna - Atti Convegno "Problematiche fitopatologiche del genere Quercus in Italia", Firenze, 19-20 novembre 1990: 305-315.

2653 FAQUAET M. 1991 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 4 (Lepidoptera) - *Phegea,* 19 (1): 39-42.

2654 FAQUAET M. 1991 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 5 (Lepidoptera) - *Phegea,* 19 (3): 113-116.

2655 FIBIGER M., HACKER H. 1991 - Systematic List of the Noctuidae of Europe - *Esperiana,* Staffelstein, 2: 1-109.

2656 FIBIGER M., RONKAY L. 1991 - New *Autophila* taxa from Sicily and Turkey (Lepidoptera, Noctuidae) - *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici,* 83: 135-137.

2657 FIUMI G., CAMPORESI S. 1991 - Le farfalle delle siepi padane (Insecta: Lepidoptera) - Atti Convegno Ecologia delle siepi, Bagnacavallo: 23-32.

2658 FÖHST P. 1991 - Ein Beitrag zur Makrolepidopterenfauna des südlichen Teils des Lago d'Iseo in der Lombardei (Prov. Bergamo) - *Atalanta,* Würzburg, 22 (2/4): 271-351.

2659 GATTI E. 1991 - Ricerche sull'entomofauna della Riserva Naturale Vincheto di Celarda - (BL) - Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Collana Verde, 86: 200 pp. (Lepidotteri pp. 114-121).

2660 HAUSMANN A. 1991 - Taxonomische Untersuchungen an der *Idaea obsoletaria* Rmb.-Gruppe (Lep., Geometridae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 40 (2): 33-41.

2661 LA GRECA M. 1991 - La fauna invertebrata. In: Le riserve di Sicilia. Vendicari - Ed. Labor, Palermo, 143 pp. (85-100).

2662 LEIGHEB G. 1991 - La femmina di *Polyommatus* (*Lysandra*) *coridon gennargenti* (Leigheb, 1987) (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 9 (2): 369-373.

2663 LONGO S. 1991 - I principali insetti dei *Pinus* in Sicilia - Atti delle "Giornate di Studio sulle avversità del Pino", Ravenna 6-7 novembre 1989: 212-217.

2664 MASUTTI L., BATTISTI A. 1991 - Entomofaune dei pini del gruppo *Pinus nigra* - Atti delle "Giornate di studio sulle avversità del Pino", Ravenna 6-7 novembre 1989: 147-155.

2665 MAZZEO L. 1991 - Avvistamenti di *Danaus chrysippus* nel Cilento - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 2: 14-15.

2666 MAZZONE P., RUGGIERI A., NOVIELLO TOMMASINO D. 1991 - Notizie sui voli della Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa* - Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) e sul complesso degli ooparassitoidi in provincia di Latina - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (Ta) 23/28 settembre 1991: 747-754.

2667 MENTZER, VON, E., MOBERG A., FIBIGER M. 1991 - *Noctua janthina* ((Denis & Schiffermüller)) sensu auctorum a complex of three species (Lepidoptera: Noctuidae) - *Nota lepidopterologica,* 14 (1): 25-40.

2668 MONTERMINI A., BOSELLI M. 1991 - La diffusione dell'Ifantria americana in Italia - *Informatore fitopatologico,* XLI (7-8): 7-13.

2669 NANNI C. 1991 - L'attività degli entomofagi indigeni su *Hyphantria cunea* - *Informatore fitopatologico,* XLI (7-8): 15-21.

2670 NARDELLI U. 1991 - Über eine Kreuzung zwischern *Parnassius apollo filabricus* (Südspanien, Männchen) und *P. a. siciliae* (Sizilien, Weibchen) (Lepidoptera: Papilionidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 12 (2): 89-92, 1 tav.

2671 NARDELLI U., GIANDOLFO B. 1991 - Eine neue Unterart von von *Parnassius mnemosyne* L. in Sizilien (Lepidoptera: Papilionidae) - *Entomologishe Zeitschrift,* 101 (23): 433-452.

2672 PARENZAN P. 1991 - La macrolepidotterofauna italiana con particolare riferimento all'Italia meridionale e alla Puglia - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 3-32.

2673 PAUKSTADT U. 1991 - Ein Wanderflug von *Pieris brassicae* L. im Ionischen Meer (Lepidoptera, Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, 22 (2/4): 73.

2674 PROLA C., BEER S. 1991 - Le Sesiidae della fauna italiana (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 70 (1): 279-312.

2675 PROTA R., FLORIS I., LENTINI A., LUCIANO P. 1991 - Aspetti entomologici della quercia da sughero e prospettive di protezione in Sardegna - In: Aspetti fitopatologici delle Querce, Atti del Convegno "Problematiche fitopatologiche del genere Quercus in Italia", Firenze 19-20 novembre 1990: 284-304.

2676 RAINERI V. 1991 - Some Geometridae new to Italy (Lepidoptera) - *Nota lepidopterologica,* 14 (3): 234-240.

2677 REZBANYAI-RESER L. 1991 - *Hyphantria cunea* Drury, 1773, und *Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983, im Südtessin, neu für die Schweiz (Lep.: Arctiidae, Noctuidae) - *Entomologische Berichten Luzern,* 26: 135-152.

2678 ROVERSI P.F., TIBERI R., BIN F. 1991 - I parassitoidi oofagi dei principali lepidotteri defogliatori del gen. *Quercus* in Italia - In: "Aspetti fitopatologici delle querce", Atti del Convegno "Problematiche fitopatologiche del genere *Quercus* in Italia", Firenze 19-20 novembre 1990: 316-384.

2679 ROVERSI P.F., TIBERI R., COVASSI M. 1991 - *Ooencyrtus kuwanae* (Howard): presenza e numero di generazioni nell'Italia Centrale (Hymenoptera Encyrtidae) - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23-28 settembre 1991: 429-435.

2680 RUSSO L. 1991 - Morphologie et biologie des premiers états de *Melanargia arge* Sulzer (Lepidoptera Nymphalidae, Satyrinae) - *Alexanor,* 17 (2): 100-102.

2681 SALA G., BOLLINO M. 1991 - *Papilio alexanor* Esper from Italian Maritime Alps: a new subspecies (Lepidoptera, Papilionidae) - *Atalanta,* Würzburg, 22 (2/4): 75-79.

2682 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1991 - Morfologia comparativa negli stadi pre-immaginali di Lepidotteri del Tabacco. 1. Bozzoli e crisalidi. Parte prima: Bozzoli - *Informatore fitopatologico,* XLI (10): 49-54.

2683 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1991 - Notizie bio-etologiche sulla *Noctua pronuba* L. (Lepidoptera: Noctuidae Noctuinae) in Campania - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 781-786.

2684 SEYER H. 1991 - *Saturnia l. ligurica* und zwei neue Subspezies aus Osteuropa: *S. ligurica donauensis* n. ssp. und *S. ligurica melichi* n. ssp. (Lepidoptera: Saturniidae) - *Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen,* 7 (4): 143-152.

2685 SINACORI A., LO VERDE G., PARENZAN P. 1991 - I parassitoidi della Nottua del Carciofo (*Gortyna xanthenes* Germar, Lepidoptera: Noctuidae) in Sicilia (nota preliminare) - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 443-448.

2686 STELLA E. 1991 - Il dolce veleno dell'amore - *Europeo,* (46) 9: 98-99.

2687 SVENDSEN P. 1991 - *Polymixis bischoffi* (Herrich-Schäffer, 1850) - a species new to Europe (Lepidoptera: Noctuidae) - *Nota lepidopterologica,* 14 (3): 244-254.

2688 TIBERI R. 1991 - I lepidotteri defogliatori delle querce decidue: bioecologia e danni - In: Aspetti fitopatologici delle Querce, Atti del Convegno "Problematiche fitopatologiche del genere *Quercus* in Italia", Firenze 19-20 novembre 1990: 239-250.

2689 TIBERI R., ROVERSI P.F., BIN F. 1991 - Egg parasitoids of Pine and Oak Processionary caterpillars in Central Italy - Insect Parasitoids, 4th European Workshop - Perugia 3-5 April, 1991. In: *Redia,* Firenze, LXXIV (3) "Appendice": 249-250.

2690 TRENTINI M., MARINI M. 1991 - Prime osservazioni sulla variabilità cromosomica di *Cerura vinula* L. (Lepidoptera: Notodontidae) - Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari - Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991: 581-585.

2691 ULRICH R. 1991 - Bestandserfassungen und Häufigkeitsuntersuchungen an Tagfaltern im Schnalstal/Südtirol (Insecta, Lepidoptera) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 40 (4): 113-125.

2691bis VIGNALI V. 1991 - Le farfalle diurne della Provincia di Massa Carrara. Un'occasione per parlare d'ambiente - *I Quaderni del circolo, a cura del Circolo Artisti Massesi Pablo Picasso,* 1/91: 28 pp.

2692 ZILLI A. 1991 - *Eilema rungsi* de Toulgoët, 1960 new to the Iberian Peninsula fauna (Lepidoptera: Arctiidae) - *SHILAP, Revta. lepid.,* 19 (76): 269-271.

2693 ZILLI A. 1991 - New data on sphecid wasps (Hymenoptera: Sphecidae) that are parasitois of adult *Zygaena* Fabricius, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae) - *Entomologist's Gazette,* 42: 77-79.

2694 LATELLA L. 1991 - La fauna cavernicola dei Monti Lepini - *Notiziario Circolo Speleologico romano,* N.S. 6-7: 77-119.

2695 ACHTELIK G. 1991-1992 - Entomologische Eindrucke aus dem Ultental, Südtirol - *Entomologische Zeitschrift,* 102: 315-317.

2696 ALLEGRO G., BRACCO L., PICCO F. 1992 - Tre anni di esperienze di lotta in pioppeto contro l'Ifantria americana (*Hyphantria cunea* Drury) con *Bacillus thuringiensis* Berl. var. *kurstaki* applicato a mezzo elicottero - Atti Giornate Fitopatologiche, 3: 307-316.

2697 BARONIO P., BALDASSARI N., ROCCHETTA G., SCARAVELLI D. 1992 - Confronto tra le quantità di maschi di *Thaumetopoea pityocampa* (Den. & Schiff.) (Lepidoptera Thaumetopoeidae) catturati da trappole ad attrattivo sessuale sintetico in una pineta mista - *Frustula entomologica,* N. S. XV (XXVIII): 173-179.

2698 BARONIO P., BALDASSARI N., SCARAVELLI D. 1992 - Evoluzione quantitativa di una popolazione di *Thaumetopoea pityocampa* (Den. & Schiff.) (Lepidoptera Thaumetopoeidae) trattata con il metodo della cattura di massa - *Frustula entomologica,* N. S. XV (XXVIII): 1-9.

2699 BARONIO P., PASQUALINI E., FACCIOLI G., PIZZI G. 1992 - Definizione del numero di delta-trap ad ettaro per l'ottimizzazione della cattura in massa di *Cossus cossus* L. (Lepidoptera: Cossidae) - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi" dell'Università di Bologna,* 46 (1991-02): 223-228.

2700 BERIO E. 1992 - Una nuova specie di *Cucullia* (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 10 (2): 245-248.

2701 BERTACCINI E., FIUMI G. - 1992 - Propagazione del Bombice del Pino (*Dendrolimus pini* L.) nell'area padana meridionale (Romagna) - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 5: 27-30.

2702 BORGO E., CASSULO L., RAINERI V., ZILLI A. 1992 - On the expansion of *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) during the last decade in Italy (Lepidoptera, Nymphalidae, Danainae) - *Atalanta,* Würzburg, 23 (3/4): 407-410.

2703 CASINI P.M. 1992 - Une nouvelle station d'*Euphydryas aurinia*, de *Melanargia russiae* et de *Satyrus ferula* en Italie. Considérations géologiques et zoogéographiques (Lepidoptera Nymphalidae et Satyridae) - *Linneana Belgica,* XIII (5): 271-284.

2704 CASSULO L., RAINERI V. 1992 - *Papilio hospiton*, un vistoso endemita - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 5: 15-18.

2705 CASSULO L., RAINERI V., FALCI A. 1992 - A proposito di *Parnassius apollo.* Alcuni dati su P*arnassius apollo siciliae* - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 4: 16-19.

2706 CERNIGLIARO A., DI BENEDETTO R., LOMBARDO V. 1992 - terzo contributo alla conoscenza dei Ropaloceri della Sicilia orientale (Lepidoptera Hesperiidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 123 (3): 239-244.

2707 CRAVEDI P., UGHINI V. 1992 - Monitoring of some Injurious Lepidoptera in Quince Orchards - *Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica,* 27 (1-4): 185-188.

2708 CURRADO I., MAZZOGLIO P.J. 1992 - Attacchi di *Lymantria monacha* L. alle Peccete della Valle d'Aosta (Lepidoptera Lymantriidae) - Atti del Convegno "Le avversità delle Abetine in Italia", Vallombrosa (FI) 25-26 giugno 1992: 141-153.

2709 DALLA MONTA' L., RENSI F., SALTARIN A. 1992 - Monitoring of the Lepidopteran Fauna in Orchards in the Veneto Region - *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica,* 27 (1-4): 197-203.

2710 DE FREINA J.J., WITT T.J. 1992 - Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Band 2 - Ed. Forschung & Wissenschaft, Verlag GmbH, München, 130 pp.

2711 EITSCHBERGER U. 1992 - *Phlogophora lamii* Schadewald, 1992 - Zur Verbreitung dieser Art (Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, 23 (3/4): 593-597.

2712 EITSCHBERGER U. 1992 - *Autographa messmeri* Schadewald, 1992 und *Autographa voelkeri* Schadewald, 1992 - Anmerkungen zur Verbreitung beider Arten (Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, 23 (3/4): 581-587.

2713 FAQUAET M. 1992 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 6 (Lepidoptera) - *Phegea,* 20 (2): 69-73.

2714 FIBIGER M. 1992 - Records of Noctuid moths from Sicily (April-May 1987) with report of *Metopoceras omar maritima* (Failla-Tedaldi, 1890), bona ssp., stat. n. (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 46 (1991): 77-80.

2715 FIBIGER M. 1992 - Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of Greece. Noctuidae in Crete during November 1991 - with a description of one new species and three new

subspecies (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 3: 379-390.

2716 FIBIGER M., HACKER H. 1992 - Systematic List of the Noctuidae of Europe. Corrigenda et Addenda I - *Esperiana,* Staffelstein, 3: 507-511.

2717 FLAMIGNI C., BASTIA G., 1992 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 199 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 124 (1): 75.

2718 GRILLO N., ROMANO F.P., ZILLI A. 1992 - Reperti: Lepidoptera, Arctiidae. Lepidoptera, Thyatiridae - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 46 (1-4): 81. (1991).

2719 HACKER H. 1992 - Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera). Teil I - *Esperiana,* Staffelstein, 3: 243-361, pl. K-O.

2720 HACKER H., RONKAY L. 1992 - Das Genus *Polymixis* Hübner, (1820) mit Beschreibung neuer Taxa und Festlegung neuer Stati (Lepidoptera: Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 3: 473-496.

2721 HÄTTENSCHWILER P. 1992 - *Megalophanes turatii* (Staudinger, 1877) neu für die Schweiz (Lep. Psychidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 42 (2): 40-45.

2722 HOLZAPFEL O.A. 1992 - Beitrage zur Fauna Südtirols. 3: Die Tagfalter des Burggrafenamtes - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 13: 27-36.

2723 HREBLAY M. 1992 - Paläarktische Taxa der *Mythimna* (*Aletia*) *pallens* L. - *impura* Hb. - Artengruppe (Lepidoptera: Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 3: 513-529.

2724 KAGER S. 1992 - Neuer Fundort von *Danaus chrysippus* Linnaeus, 1758 (Lep., Danaidae) in Sardinien - *Galathea,* 8 (2): 49-50.

2725 LOI G., CANOVAI R. 1992 - Catalogo dei Nottuidi (Lepidoptera Noctuidae) presenti nella collezione del "Dipartimento di coltivazione e difesa delle specie legnose", sez. Entomologia agraria dell'Università degli studi di Pisa - *Frustula entomologica,* N. S. XV (XXVIII): 63-92.

2726 LONGO S. 1992 - Un occasionale fitofago degli agrumi: *Charaxes jasius* - *L'Informatore Agrario,* Verona, XLVIII (3): 69-72.

2727 MENSI P., LATTES A., CASSULO L., CINTI R., BALLETTO E. 1992 - Electrophoretic Studies in the Genus *Melanargia* Meigen, 1828 (Lepidoptera, Satyridae) - *Journal of Research on the Lepidoptera,* 29 (1-2): 11-20 (1990).

2728 NARDELLI U., HIRSCHFIELD G. 1992 - Eine bisher unbekannte Form von *Parnassius apollo* mit symmetrisch teilalbinotischen Habitus (Lepidoptera: Papilionidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 13 (3): 231-238.

2729 PARENZAN P. 1992 - Lepidotteri notturni, in: Parenzan Pietro - La Gravina di Ginosa dalla preistoria ad oggi. Aspetti naturalistici - Congedo Editore, Galatina: 167-168.

2730 PARENZAN P., HAUSMANN A. 1992 - Nuovi interessanti reperti di Geometridi (Lepidoptera) in Italia Meridionale - *Entomofauna,* 13 (8): 157-172.

2731 PROTA R., LUCIANO P., FLORIS I. 1992 - La protezione delle foreste dai Lepidotteri defogliatori - La Celere Editrice, Alghero, 91 pp.

2732 PROVERA P. 1992 - Tabelle faunistiche sui Bombici e Sfingi italiani e delle regioni limitrofe (Lepidoptera) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 46 (1991): 1-35.

2733 RAINERI V. 1992 - Aggiornamento sulla distribuzione in Italia di *Solitanea mariae* (Stauder, 1921) (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 123 (3): 249-252.

2734 RAINERI V. 1992 - Elenco dei typi (s.l.) appartenenti ad alcune famiglie di Macroheteroceri conservati nel Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, LXXXIX: 1-16.

2735 RAINERI V. 1992 - *Idaea boeklini* von Mentzer, 1990, syn. n. of *Idaea camparia* (Herrich-Schäffer, (1825)) (Lepidoptera: Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 15 (2): 152-157.

2736 RAINERI V. 1992 - Considerazioni sulle specie nuove di Geometridi descritte da Vittore Ghiliani nel 1852. (Lepidoptera, Geometridae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 10 (2): 289-294.

2737 RAINERI V. 1992 - Some considerations about *Casilda anthophilaria* (Hübner, (1813)) and *C. consecraria* (Staudinger, 1871) (Lepidoptera, Geometridae) - *Atalanta,* Würzburg, 23 (3/4): 619-622.

2738 RAINERI V., TREMATERRA P., ZILLI A. 1992 - Notizie sulla cenosi lepidotterologica d'altitudine del Gran Sasso d'Italia (Lepidoptera) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 46 (1-4): 57-63. (1991).

2739 RENNWALD E. 1992 - Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1991 - *Atalanta,* Würzburg, 23 (3/4): 347-405.

2740 REZBANYAI-RESER L., ZILLI A. 1992 - *Hadena luteago flavago* (Hartig), nomen nudum (= *behouneki* de Freina 1983) (Lepidoptera: Noctuidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 102 (16): 300-301.

2741 RUSSO L. 1992 - *Melanargia arge* Sulzer, forma individ. nova *gildae* - *Alexanor,* 17 (7): 418-420.

2742 SALA G. 1992 - L'interessante aberrazione *nivalis* Grise-Smith di *Parnassius mnemosyne* Linnaeus - *Natura Alpina,* 42 (4) (1991): 41-42.

2743 SALA G., BOLLINO M. 1992 - A new subspecies of *Parnassius mnemosyne* L. from Tosco-Emilian Apennines and considerations about populations of the same range (Lepidoptera, Papilionidae) - *Atalanta,* Würzburg, 23 (1/2): 123-125.

2744 SALA G., BOLLINO M. 1992 - *Zerynthia polyxena* Denis & Schiffermüller from Venetian Prealps: a new subspecies (Lepidoptera, Papilionidae) - *Atalanta,* Würzburg, 23 (3/4): 449-454.

2745 SANNINO L., BALBIANI A., PIRO F., SAKELLARIDIS M. 1992 - Preliminary observations on the biology of *Lacanobia oleracea* L. (Lepidoptera: Noctuidae) in Italy - *Annali Istituto Sperimentale per il Tabacco,* Scafati, XV-XVI (1989-90): 107-112.

2746 SANNINO L., ESPINOSA B., BALBIANI A. 1992 - Ritrovamento di *Xylena exsoleta* L. (Lepidoptera: Noctuidae - Cuculliinae) su tabacco in Campania e osservazioni sulla morfologia larvale - *Annali Istituto Sperimentale per il Tabacco,* Scafati, XV-XVI (1989-90): 193-202.

2747 SANNINO L., ESPINOSA B., BALBIANI A. 1992 - Morfologia comparativa negli stadi pre-immaginali di Lepidotteri del Tabacco. 1. Bozzoli e crisalidi (Parte seconda: Crisalidi). (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, LXX (2) (1991): 251-266.

2748 SANNINO L., ESPINOSA B., BALBIANI A. 1992 - Note sulla morfologia e sul polimorfismo di *Noctua pronuba* L. (Lepidoptera: Noctuidae - Noctuinae) - *Informatore fitopatologico,* XLII (3): 51-56.

2749 SAUTER W. 1992 - Zoogeographische Gliederung und Faunistische Bestandesaufnahme am beispiel der Schweiz – *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomology,* Giessen, 8: 331-341.

2750 SLOT J. 1992 - Vlinders in het Aostatal - *Vlinders,* 7 (3): 27.

2751 SPATENKA K. 1992 - Weitere neue palaearktische Sesiiden - *Alexanor,* 17 (7): 427-446.

2752 SPATENKA K. 1992 - Contribution a la stabilisation de la taxinomie des Sesiidae palearctiques - *Alexanor,* 17 (8): 479-503.

2753 SVENDSEN P., FIBIGER M. 1992 - The distribution of european Macrolepidopetra, Noctuidae. Vol. 1. Noctuinae I. - European Faunistical Press, Copenhagen, 293 pp., 288 figg.

2754 TREMATERRA P., DAOLIO E. 1992 - Disposizione delle trappole a feromoni per la cattura di *Synanthedon myopaeformis* Bkh.: fenomeni di interferenza e di competizione - *Informatore fitopatologico,* XLII (3): 43-46.

2755 TREMATERRA P., FERRARIO P., BINDA M. 1992 - Sul monitoraggio di *Hyphantria cunea* (Drury) mediante trappole a feromoni - *Atti Giornate Fitopatologiche,* 1: 219-228.

2756 VALENTINI V. 1992 - Lepidotteri diurni, in: Parenzan Pietro - La Gravina di Ginosa dalla preistoria ad oggi. Aspetti naturalistici - Congedo Editore, Galatina: 168-171.

2757 VORBRÜGGEN W. 1992 - *Gnophos onustaria* Herrich-Schäffer im Aostatal (N-Italien) (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 102 (22): 434-435.

2758 ZAHM N. 1992 - Osservazioni sulla fauna di Macrolepidotteri della Majella - In: M. Inglisa (red.): Atti I. Convegno Nazionale "Paolo Borrasso", Caramanico Terme, 21/22 marzo 1992: 83-89.

2759 ZILLI A. 1992 - Troglofilia locale in popolazioni appenniniche di *Nudaria mundana* (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera, Arctiidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 46 (1991) (1-4): 65-75.

2760 ZILLI A. 1992 - *Agrotis lata* Treitschke, 1835, a senior synonym of *A. dirempta* Staudinger, 1859 (Lepidoptera: Noctuidae) - *Nota lepidopterologica,* 15 (1): 70-83.

2761 ZILLI A. 1992 - Endemismi italiani 33. un giallo entomologico: che fine ha fatto *Omia banghaasi* Stauder, 1930? (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 46 (1-4): I-II. (1991).

2762 ZILLI A. 1992 - *Autophila rosea* (Staudinger, 1888) new for the European fauna (Lepidoptera: Noctuidae) - *Folia Entomologica Hungarica,* LII (1991): 187-188.

2763 ZILLI A., ROMANO F.P. 1992 - The moth that contravened the Gause's principle: a solution to the "*Brithys encausta/pancratii*" dilemma (Lepidoptera, Noctuidae, Ipimorphinae) - *Atalanta,* Würzburg, 23 (1/2): 275-282.

2764 TRIGGIANI O., DE LILLO E., ADDANTE R. 1992 - La Processionaria del pino, *Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae), e i suoi nemici naturali in Puglia - *Entomologica,* Bari, 27 (1993): 139-167.

2765 ARZONE A., CURRADO I., MAZZOGLIO P.J., PATETTA A. 1992-1993 - Indagini biologiche su *Calliteara* (*Dasychira*) *pudibunda* (L.) nell'Italia nord-occidentale (Lepidoptera Lymantriidae) - *Redia,* Firenze, 76 (2): 391-401.

2766 AUDISIO P., DE BIASE A. 1993 - Gli elementi faunistici balcanici e ponto-pannonici nel popolamento delle Alpi Occidentali: casistica, congruenze, possibili interpretazioni zoogeografiche - *Biogeographia, Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* (N. S.), XVI (1992): 181-210.

2767 BEHOUNEK G. 1993 - Die holarktischen Arten der Gattung *Lacanobia* Billberg, 1820 (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae) - *Esperiana,* Staffelstein, 3: 33-65.

2768 BERIO E. 1993 - Prima nota sui Noctuidi dell'Isola di Capraia - *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi",* Bergamo, 16: 153-166.

2769 BROCKMANN E., HELLMANN F., KRISTAL P.M. 1993 - I Macrolepidotteri del Parco Naturale del Mont Avic e zone limitrofe (Valle d'Aosta - Val Chalamy, Alpi Graie orientali) - *Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle,* 47: 83-139.

2770 CANOVAI R., LOI L. 1993 - Catalogo dei Geometridi (Lepidoptera Geometridae) presenti nella collezione della sez. Entomologia Agraria del "Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose" dell'Università degli studi di Pisa - *Frustula entomologica,* N. S. XVI (XXIX): 41-64.

2771 CASINI P.M. 1993 - Première station pour l'Italie péninsulaire d'*Euchloe tagis* Hübner (1804) et description de la ssp. *calvensis* (Lepidoptera: Pieridae) - *Linneana Belgica,* XIV (1): 3-14.

2772 CASSULO L., RAINERI V. 1993 - La Cleopatra, un variopinto araldo della primavera mediterranea - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 7: 17-19.

2773 CASSULO L., RAINERI V. 1993 - *Apatura ilia*, una farfalla dalle ali cangianti - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 6: 15-18.

2774 CHEMINI C. 1993 - Farfalle - Ed. Novecento. Trento, 175 pp.

2775 DESEÖ K.V., MONTERMINI A., MARANI F. 1993 - Un virus entomopatogeno in una popolazione di *Hyphantria cunea* Drury in Italia - *Informatore fitopatologico,* XLIII (2): 7-10.

2776 DEUTSCH H. 1993 - *Euphya mesembrina* (Rebel, 1927): Beitrag zur Biologie und Morphologie (Lepidoptera, Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 15 (3/4): 217-227.

2777 FABBRICATORE T. 1993 - *Euproctis chrysorrhoea* (L.) (Lepidoptera Lymantriidae): bioecologia e nemici naturali - Tesi di Laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Agraria, A.A. 1991-92, 100 pp.

2778 FACCIOLI G., PASQUALINI E., BARONIO P. 1993 - Optimal Trap Density in *Cossus cossus* (Lepidoptera: Cossidae) Mass-Trapping – *Journal of Economic Entomology,* 86 (3): 850-853.

2779 FAQUAET M. 1993 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 7 (Lepidoptera) - *Phegea,* 21 (2): 65-69.

2780 FAQUAET M. 1993 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 8 (Lepidoptera) - *Phegea,* 21 (4): 137-139.

2781 FERRARI G. 1993 - Farfalle della Valle Cannobina - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 7: 36-37.

2782 FERRUTI P., DEL BIANCO G. 1993 - Ritrovamento di *Leucodonta bicoloria* nelle Prealpi Lombarde - *Dispar, Boll. AICF,* Milano, 6: 32-33.

2782bis FIBIGER M. 1993 - *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) (= *A. messmeri* Schadewald, 1992, syn. n.; = *A. voelkeri* Schadewald, 1992, syn. n.) and *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) (= *P. lamii* Schadewald, 1992, syn. n.) (Lepidoptera, Noctuidae) - *Nota lepidopterologica,* 16 (1): 18-22.

2783 FIBIGER M. 1993 - Noctuidae europaeae. Vol. 2. Noctuinae II - Entomological Press, Sorø: 230 pp.

2783bis GIUSTI F., FAVILLI L., MANGANELLI G. 1993 - La Fauna. In: Giusti F. (a cura di), La Storia Naturale della Toscana meridionale - Amilcare Pizzi Ed., Cinisello Balsamo (Milano): 343-439.

2784 GROPPALI R. 1993 - Cuculi italiani negli ecosistemi naturali e di origine antropica - *Informatore Fitopatologico,* XLIII (2): 17-21.

2785 GROPPALI R, PRIANO M., CAMERINI G., PESARINI C. 1993 - Ragni (Araneae) in nidi di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) nella Pianura Padana centrale - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 25 (2): 153-160.

2786 HAUSMANN A. 1993 - Contributo alla conoscenza della fauna siciliana: i rappresentanti della famiglia Geometridae presso la collezione dello Zoologische Staatssamlung di Monaco (Insecta: Lepidoptera) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XVII (1-2): 83-101.

2787 HAUSMANN A. 1993 - *Idaea eugeniata* Millière, 1870, neu für die Fauna Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen,* 42 (1): 24-25.

2788 HAUSMANN A. 1993 - Der Aussagewert struktureller Unterscheide im 8. Sternit. Revision der in Italien vorkommenden Arten der Gattung *Glossotrophia* Prout, 1913 (Lepidoptera, Geometridae) - *Atalanta,* Würzburg, 24 (1/2): 265-297.

2789 JUTZELER D. 1993 - Élevage d'*Euchloe tagis* ssp. *bellezina* (Boisduval, 1828) du Piémont (Italie du Nord-Ouest) (Lepidoptera: Pieridae) - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 45-48.

2790 JUTZELER D. 1993 - Note sur l'ecologie et le développement d'*Euchloe crameri* (Butler, 1869) sur la côte ligurienne (Italie) - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse:* 63-66.

2790bis LADDOMADA B. 1993 - Bioetologia del complesso degli oofagi della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa* Den. et Schiff.) in pinete della Puglia - Tesi di Laurea in Zoologia generale

agraria, Facoltà di Agraria, Università di Bari, A. A. 1992-93, 103 pp.

2791 LEO P., MELONI C. 1993 - Sulla presenza in Sardegna di *Gegenes nostrodamus* (Fabricius, 1793) e *G. pumilio* (Hoffmannsegg, 1804) (Lepidoptera, Hesperiidae) - *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali,* Milano, 29: 85-87.

2792 LONGO S. 1993 - Relieves on activity of *Telonomus turkarkandas* (Szabo') (Hym.: Scelionidae), an egg parasite of *Euproctis chrysorrhoea* (L.) (Lep.: Lymantriidae) in Sicily - *Phytophaga,* Palermo, III: 61-67. (1985-1989).

2793 MARCUZZI G. 1993 - La fauna dei Colli Euganei - Editoriale programma. Padova, 205 pp.

2793bis MARINI M., TRENTINI M. 1993 - Considerazioni sui Nottuidi (Insecta, Lepidoptera) di meleti della val di Non (Trento) - Atti del 55° Congresso dell'Unione Zoologica Italiana, Torino 27/09-2/10/1993: 78-79.

2794 MIKKOLA K., HONEY M.R. 1993 - The Noctuoidea (Lepidoptera) described by Linnaeus - *Zoological Journal of the Linnean Society,* 108: 103-169, 23 figg.

2795 MINELLI A., NEGRISOLO E. 1993 - Ricerche zoologiche nell'alto Trevigiano. II. Materiali faunistici (Annelida, Arthropoda) - *Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali,* 18: 59-132, Venezia.

2796 NARDELLI U. 1993 - Il *Parnassius phoebus* Fabr. dell'Adamello. Influenza della pianta alimentare *Rhodolia rosea* L., sull'aspetto della farfalla (Lepidoptera: Papilionidae) - *Natura Alpina,* XLIV (3): 39-46, 2 Tavv., 4 figg.

2797 NARDELLI U. 1993 - Bemerkungen zur Zucht einiger Zerynthiinii und Parnassiini (Lepidoptera: Papilionidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 103 (12): 213-228, 104 (1): 236-243, 19 figg.

2798 NARDELLI U. 1993 - Drei neue Unterarten von *Zerynthia polyxena* Denis & Schiffermüller in Italien (Lepidoptera: Papilionidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 103 (4): 41-68, 2 gr. figg.

2799 PAPP J. 1993 - New braconid wasps (Hymenoptera, Braconidae) in the Hungarian Natural History Museum, 4 - *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici,* 85: 155-180, 79 figg.

2800 PARENZAN P., PORCELLI F. 1993 - Aggiunte e correzioni ai Nottuidi dell'Italia meridionale (Lepidoptera) - *Entomologica,* Bari, XXVII: 181-210.

2801 PELEGATTI O., ROVERSI P.F. 1993 - Note preliminari su un ceppo di *Bacillus thuringiensis* Berliner isolato da larve di *Elkneria pudibunda* (L.) (Lepidoptera Lymantriidae) - Atti Convegno sull'attività del Gruppo di Ricerca "Lotta biologica", Acireale 28 novembre 1991: 69-75.

2802 PORCELLI F., PARENZAN P. 1993 - Danni da *Opogona sacchari* e *Sesamia nonagrioides* a *Strelitzia* in Italia meridionale - *Informatore fitopatologico,* XLIII (12): 21-24.

2803 PROTA R. 1993 - Entomofauna delle aree montane - In: Montagne di Sardegna, Carlo Delfino editore, Sassari: 103-125.

2804 RAINERI V. 1993 - Interessanti ritrovamenti di Geometridi per la Fauna italiana (Lepidoptera: Geometridae) - *Doriana, suppl. Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, VI (281): 1-4.

2805 RAINERI V. 1993 - I Lepidotteri Geometridi dell'Isola di Capraia - *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi",* Bergamo, 16: 143-148.

2806 RUMINE P., VETTORI G. 1993 - I Lepidotteri notturni nel comprensorio di Pescia - *Colture protette,* 9: 83-86.

2807 RUSSO L. 1993 - Observations sur une chenille albinisante de *Papilio machaon* L. (Lepidoptera Papilionidae) - *Alexanor,* 18 (1): 64.

2808 SALA G., BOLLINO M. 1993 - Segnalazioni di nuove piante nutrici per il *Parnassius apollo* L. (Lepidoptera, Papilionidae) - *Natura Alpina,* 43 (1992) (3/4): 47-49.

2809 SALA G., BOLLINO M., DE CASTRO V. 1993 - Nuova sottospecie di *Parnassius apollo* L. del Monte Grappa (Prealpi venete). V contributo alla conoscenza dei Papilionidae italiani - *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica,* 68 (1991): 225-232.

2810 SANNINO L., BALBIANI A., ESPINOSA B. 1993 - Biologia di *Lacanobia oleracea* L. in Campania (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 125 (1): 61-70.

2811 SANNINO L., ESPINOSA B. 1993 - Note morfologiche su *Mniotype* (= *Blepharita*) *solieri* (Boisd.) - *Informatore fitopatologico,* XLIII (4): 57-62.

2812 SANNINO L., ESPINOSA B., BALBIANI A. 1993 - Osservazioni sulla morfologia di *Phlogophora meticulosa* L. (Lepidoptera Noctuidae Amphipyrinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 124 (3): 221-230.

2813 STORACE L. 1993 - Sfingidi della zona di Arquata Scrivia nel Piemonte Sud-orientale in Norditalia (Lepidoptera Sphingidae) - *Lambillionea,* 93 (2): 152-154.

2814 TENNENT W.J. 1993 - Population explosion of two Nymphalid butterflies in 1991 and 1992 - *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* 105: 40-41.

2815 TREMATERRA P. 1993 - On the possibility of mass-trapping *Synanthedon myopaeformis* Bkh. (Lep., Sesiidae) - *Journal of Applied Entomology,* 115: 476-483.

2816 TREMATERRA P., FERRARIO P., BINDA M. 1993 - Studies on trapping of Fall Webworm moth, *Hyphantria cunea* (Drury) (Lep., Arctiidae) - *Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz,* Umweltschutz, 66: 51-56.

2817 VALLE M. 1993 - Introduzione allo studio dei Lepidotteri dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano) - *Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi",* Bergamo, 16: 141-142.

2818 WEIGT H.-J. 1993 - Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Teil 5: *Eupithecia pimpinellata* bis *lanceata* - *Dortmunder Beiträge für Landeskunde, naturwis-senschaftlichen Mitteilungen*, 27: 5-108.

2819 ZAHM N. 1993 - I Lepidotteri - In: Piano di assetto Riserva Naturale Regionale Majella Orientale - Cogecstre, Penne: 47-71.

2820 ZILLI A. 1993 - Remarks on the taxonomic value of male abdominal brush-organs: the case of *Apamea maroccana* (Zerny, 1934), bona sp. (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 3 (1992): 19-32.

2821 LATELLA L., DI RUSSO C., SBORDONI V. 1993 - Note sulla fauna cavernicola dei Monti Ernici - *Notiziario del Circolo Speleologico Romano,* N.S., N. 8/10: 135-146.

2822 ALFONSI Q., BRINCHI C. 1993-1995 - Ricerche sui Nottuidi infestanti il fagiolino da industria in Lazio - *Notiziario sulla Protezione delle Piante,* N. S., 3: 99-112.

2823 ALMA A., ARZONE A. 1994 - Notizie fitopatologiche ed epidemiologiche su nottuidi in vigneti piemontesi - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 559-562.

2824 ARDUINO P., BULLINI L., PROTA R., VERDINELLI M. 1994 - Differenziamento genetico del complesso *Lymantria dispar* (Lepidoptera: Lymantriidae) - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 121-124.

2825 ARNSCHEID W.R. 1994 - Wiederfund von *Conisania renati* (Oberthür, 1890) in Italien sowie Bemerkungen zu einigen interessanten Lepidoptera-Funden aus der Provinz Imperia (Ligurien, Italien) (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, 25 (1/2): 351-358.

2826 ARZONE A., CURRADO I., MAZZOGLIO P.J., PATETTA A. 1994 - Gradazione di *Calliteara pudibunda* (L.) in Italia nord-occidentale (Lepidoptera: Lymantriidae) - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 747-750.

2827 BARISELLI M., NANNI C., BOSELLI M. 1994 - Prime indagini sulle ovideposizioni di *Lymantria dispar* (L.) come elemento di previsione delle infestazioni in alcune aree dell'Appennino bolognese - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 755-758.

2828 BENVENUTI S., DALL'ANTONIA P., IOALÈ P. 1994 - Migration pattern of the red admiral, *Vanessa atalanta* L. (Lepidoptera, Nymphalidae) in Italy – *Bollettino di Zoologia,* U.Z.I., 61 (4): 343-351.

2829 BERTACCINI E. 1994 - Le pinete di Ravenna e le zone umide adiacenti rifugio per alcune farfalle italiane (Lepidoptera) - *Pagine del Museo Ornitologico e di Scienze Naturali di Ravenna,* XVIII (1993) (1-2): 82-85.

2830 BERTOLANI R., MANICARDI G.C., RIBECCHI L. 1994 - Faunistic study in the Karst complex of Frasassi (Genga, Italy) - *International Journal of Speleology,* 23 (1-2): 61-77.

2831 BIASIOLO A. 1994 - Indagini preliminari sulla variabilità genetica e sulla struttura delle popolazioni di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera: Arctiidae) in zone di colonizzazione - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 125-128.

2831bis BOLOGNA M.A., ZOIA S. 1994 - La fauna cavernicola del sistema carsico "Inghiottitoio di Pietrasecca-Grotta del Cervo" (Abruzzo) - *Istituto Italiano di Speleologia,* Memoria 5 (II): 151- 158.

2832 BONZANO C., REDA BONZANO B. 1994 - Lepidotteri, ditteri, diplopodi e... di tutto un pò (ricerche biospeleologiche) - *Bollettino del Gruppo Speleologico Imperiese - C.A.I,* 24: 31-39.

2833 BORIANI M. 1994 - New records of parasitoids from *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) in Italy (Lepidoptera, Arctiidae). *Conomorium amplum* (Walker, 1835): correct name of a parasitoid from *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) in Italy (Hymenoptera, Pteromalidae - Lepidoptera, Arctiidae) - *Entomofauna,* Linz, 15 (37): 425-432.

2834 CAODURO G., OSELLA G., RUFFO S. 1994 - La fauna cavernicola della regione veronese. Lepidoptera - *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona (II ser.), sez. biologica,* 11: 57-58.

2835 CARBONELL F. 1994 - Contribution à la connaissance du genre *Polyommatus* Latreille, 1804: le complexe ultraspécifique de *Polyommatus eros-eroides* au Moyen-Orient et en Transcaucasie (Lepidoptera: Lycaenidae) (2ème partie: diagnose et discussion) - *Linneana Belgica,* XIV (8): 439-454.

2836 CASALE A., BALLETTO E., CAMERON-CURRY V. 1994 - Butterfly conservation and protected areas in Piedmont (N-W Italy) -

Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 72 (1993): 485-489.

2837 CERNIGLIARO A., DI BENEDETTO R., LOMBARDO V. 1994 - Quarto contributo alla conoscenza dei Ropaloceri della Sicilia nord-orientale (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 126 (2): 171-174.

2838 CESARONI D., LUCARELLI M., ALLORI P., RUSSO F., SBORDONI V. 1994 - Patterns of evolution and multidimensional systematics in graylings (Lepidoptera: Hipparchia) - *Biological Journal of the Linnean Society,* London, 52: 101-119.

2839 COULONDRE A. 1994 - Systématique et répartition de *Scoliantides orion* (Pallas, 1771) (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XIV (8): 383-420.

2840 DAVID C., SANETRA M. 1994 - Verbreitung, Biologie und Autökologie von *Papilio alexanor* Esper 1799 in den südwestlichen Alpenregion (Lepidoptera: Papilionidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 15 (192): 1-24, 25 figg.

2841 EFETOV K.A. 1994 - *Jordanita* (*Gregorita*) *algirica* (Rothschild, 1917) (Lepidoptera, Zygaenidae), a new Forester moth for the fauna of Europe - *Vestnik Zoologii, 1: 36.*

2842 FRANCARDI V., ROVERSI P.F. 1994 - Fattori di mortalità delle uova di *Orgyia antiqua* (L.) in una piantagione di ciliegio da legno (Lepidoptera: Lymantriidae) - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 751-754.

2842bis GIACOMETTI R., BIN F. 1994 - Allevamento di *Sesamia nonagrioides* Lefevre (sic !) (Lepidoptera: Noctuidae) e del suo ooparassitoide *Telenomus busseolae* Gahan (Hymenoptera: Scelionidae) - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 703-704.

2843 GIARDINI M. 1994 - Osservazioni sugli Sfingidi dei Monti Cornicolani (Italia Centrale) (Lepidoptera, Sphingidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 48 (1993): 39-48.

2844 GIULIANO F., PARENZAN P. 1994 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna siciliana II. I Macrolepidotteri dei Monti Nebrodi - *Phytophaga,* Palermo, 5: 85-110.

2845 GROPPALI R., PRIANO M., CAMERINI G., PESARINI C. 1994 - Predazione di larve di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) su Acero negundo da parte di ragni (Araneae) - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 26 (1): 151-156.

2846 HÄTTENSCHWILER P. 1994 - Die mittel- und westeuropäischen Arten der Gattung *Pseudobankesia* mit Beschreibung von zwei neuen Arten (Lep. Psychidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 44 (3/4): 109-121.

2847 HAUSMANN A. 1994 - "*Idaea circuitaria* (Hübner, (1819))" - ein Komplex von mehereren verschiedenen Arten aus dem Mittelmeerraum (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreischen Entomologen,* 46 (1/2): 45-55.

2848 HAUSMANN A. 1994 - Morphology and taxonomy of the species belonging to the genus *Myinodes* Meyrick, 1892 (Lepidoptera: Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 17 (1/2): 31-43.

2849 HAUSMANN A. 1994 - Revision der altweltlichen Arten der Gattung *Microloxia* Warren, 1893 (Lepidoptera, Geometridae: Geometrinae) - *Atalanta,* Würzburg, 25 (3/4): 571-608.

2850 HEINICKE W. 1994 - Aktuelle Fälle von Arealausbreitung bei Eulenfaltern in Deutschland (Lepidoptera, Noctuidae) - Verh. Westd. Entom. Tag 1993: 205-211, Löbbecke-Mus., Düsseldorf

2850bis HOFER E. 1994 - Lista rossa delle farfalle diurne (Diurna) minacciati dell'Alto Adige. In J. Gepp. (cur.), Lista Rossa delle specie animali minacciate in Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige. Ripartizione tutela del paesaggio e della natura: 132-143.

2851 HREBLAY M. 1994 - New taxa of the tribe Orthosiini, IV. (Lepidoptera, Noctuidae) - *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae,* 40 (3): 241-252.

2851bis HUEMER P. 1994 - Lista rossa dei lepidotteri (Macrolepidoptera) minacciati dell'Alto Adige. In J. Gepp. (cur.), Lista Rossa delle specie animali minacciate in Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige. Ripartizione tutela del paesaggio e della natura: 102-131.

2852 JUTZELER D. 1994 - Ökologie und erste Stände des Italienischen Schachbrettes *Melanargia arge* (Sulzer, 1776) (Lepidoptera: Satyridae) - *Nota lepidopterologica,* 16 (3/4): 213-232.

2853 JUTZELER D. 1994 - Quelques observations de terrain sur l'écologie d'*Eurodryas aurinia* ssp. *provincialis* (Boisduval, 1829) en Ligurie (Italie) et dans les Alpes-Maritimes (France) (Lépidoptères: Nymphalidae) - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse:* 77-81.

2854 KRISTAL P.M., HIRNEISEN N., STEINER A. 1994 - Eine weitere endemische Hepialide aus den Alpen: *Pharmacis claudiae* sp. n. (Lepidoptera: Hepialidae) - *Nota lepidopterologica,* 17 (1/2): 53-72.

2855 LATTES A., MENSI P., CASSULO L., BALLETTO E. 1994 - Genotypic variability in western European members of *Erebia tyndarus* species group (Lepidoptera, Satyridae) - Proc. VIII. Congr. Eur. Lepid., Helsinki 19-23.IV.1992; pubbl. in *Nota lepidopterologica,* Suppl. No. 5: 93-104.

2856 LAUDONIA S., VIGGIANI G. 1994 - *Trichogramma piceum* Dyurich (Hymenoptera Trichogrammatidae), nuova specie per l'Italia - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 26 (1): 147-149.

2857 LO VERDE G., SINACORI A., LO VALVO F. 1994 - Dati su *Teia dubia* (Tauscher) (Insecta Lepidoptera Lymantriidae) e i suoi parassitoidi in Sicilia (Hymenoptera) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XVIII (3-4): 265-271.

2858 LO VERDE G., SINACORI A., LO VALVO F. 1994 - Segnalazione di due specie nuove per l'Italia, *Agrothereutes tunetanus* Haber (Hymenoptera: Ichneumonidae) e *Cotesia judaica* (Papp) (Hymenoptera: Braconidae), e di una nuova per la Sicilia, *Pediobius bruchicida* (Rondani) (Hymenoptera: Chalcidoidea) parassitoidi di *Teia dubia* (Tauscher) (Lepidoptera: Lymantriidae) - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 241-242.

2859 LONGO S., MAZZEO G., PALMERI V. 1994 - Osservazioni bio-etologiche su *Charaxes jasius* L. - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 567-570.

2860 LONGO S., PALMERI V., SISCARO G., SPAMPINATO R.G. 1994 - Rilievi sui Lepidotteri defogliatori nei querceti - Convegno Innovazioni e Prospettive nella Difesa Fitosanitaria, Ferrara, 24-25 ottobre 1994: 343-346.

2861 LUCIANO P., LENTINI A., PROTA R. 1994 - Un quinquennio di prove di lotta microbiologica alla *Lymantria dispar* (L.) - Atti XVII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 759-762.

2862 MENSI P., LATTES A., CASSULO L., BALLETTO E. 1994 - Biochemical taxonomy and evolutionary relationships in *Polyommatus* (subgenus *Agrodiaetus*) (Lepidoptera, Lycaenidae) - Proc. VIII. Congr. Eur. Lepid., Helsinki 19-23.IV.1992; pubbl. in *Nota lepidopterologica,* Suppl. No. 5: 105-114.

2863 MONDERA A., PRIORE V. 1994 - Danni da *Zeuzera pyrina* su giovani oliveti - *Informatore fitopatologico,* XLIV (7-8): 31-32.

2864 MONTERMINI A. 1994 - 1994: dov'è andata l'Ifantria? - *Notiziario Fitopatologico, Consorzio Fitosanitario Reggio Emilia,* n. 8: 1-20.

2865 MONTERMINI A. ET AL. 1994 - L'Ifantria in Italia (*Hyphantria cunea* Drury Lepidoptera; Arctiidae) diffusione, biologia e lotta - Edagricole, Firenze, 227 pp.

2866 MORETTO E., TURCHETTO M., BEGHELLI G. 1994 - L'occupazione dei rilievi (hilltopping) nel macaone, *Papilio machaon* L. (Lepidoptera: Papilionidae), quale strategia riproduttiva - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 427-430.

2867 NARDELLI U., GIANDOLFO B. 1994 - *Melanargia pherusa* Boisduval, 1833: Biologie, Ökologie, Morphologie und Verbreitung im Vergleich mit *Melanargia arge* Sulzer, 1776 (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 15 (1/2): 87-108, 1 cartina, 4 tavv., 7 figg.

2868 PARENZAN P. 1994 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XVII. Heterocera: Geometridae - *Entomologica,* Bari, XXVIII: 99-246.

2869 PARENZAN P., HAUSMANN A. 1994 - Specie del genere *Xanthorhoe* presenti in Italia meridionale e descrizione di *Xanthorhoe vidanoi* n. sp. (Lepidoptera, Geometridae) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 72 (1993): 491-497.

2870 PASSERIN D'ENTRÈVES P., BESSI E., COMBA R. 1994 - Le farfalle della Val di Tovel (Ditrysia: Hesperoidea e Papilionoidea) - Parco Adamello-Brenta, Documenti: 5-79, Strembo (TN).

2871 RAINERI V. 1994 - Contributo alla conoscenza dei Geometridi italiani (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 125 (3): 259-262.

2872 RAINERI V. 1994 - Some considerations on the genus *Thetidia* and description of a new genus: *Antonechloris* gen. nov. (Lepidoptera, Geometridae) - *Atalanta,* Würzburg, 25 (1/2): 365-372.

2873 RAINERI V. 1994 - On a new mediterranean species of *Compsoptera* Blanchard, 1845: *Compsoptera aemiliorum* sp. n. (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae) - *SHILAP, Revta. lepid.,* 22 (88): 317-322.

2874 RAVIGLIONE M.C., BOCCIO F., RAVIGLIONE M. 1994 - Lepidotteri Ropaloceri dell'alta Valle Sessera in Piemonte (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 125 (3): 255-258.

2875 RECINELLI E., RANALLI G., ZILLI A. 1994 - Lepidotteri Nottuidi nella piana del Fucino - *L'Informatore Agrario,* Verona, XLIV (29): 45-47.

2876 RENNWALD E. 1994 - Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1992 - *Atalanta,* Würzburg, 25 (1/2): 67-146.

2877 RONKAY G., RONKAY L. 1994 - Noctuidae europaeae. Vol. 6. Cuculliinae I - Entomological Press, Sorø: 282 pp.

2878 ROTUNDO G., DE CRISTOFARO A. 1994 - Lotta guidata ed uso di ibridi tolleranti nel controllo di *Sesamia nonagrioides* (Lef.) ed *Ostrinia nubilalis* (Hb.) su mais in secondo raccolto - Atti Giornate Fitopatologiche, Montesilvano Lido (PE), 9-12 maggio 1994, vol. 2: 195-202.

2879 SANNINO L., ESPINOSA B. 1994 - Note fenologiche su *Mniotype* (= *Blepharita*) *solieri* (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae: Cucullinae) - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 563-566.

2880 STANGELMAIER G., LEXER E. 1994 - Eine neue Unterart von *Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766) und ihre verbreitung in Friaul-Julisch Venetien (Lepidoptera, Noctuidae) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale,* Udine, 15 (1993): 237-245.

2881 TARASCO E., TRIGGIANI O. 1994 - Antagonisti biologici delle eopupe e delle crisalidi della *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 785-786.

2882 TEOBALDELLI A. 1994 - Nuovi rinvenimenti di Macrolepidotteri nel territorio marchigiano (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 126 (1): 69-74.

2883 TEOBALDELLI A. 1994 - Macrolepidotteri rinvenuti nel territorio di Valleremita e zone circostanti (Appennino marchigiano) (Lepidoptera) - *Biogeographia, Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* (N. S.), XVII (1993): 243-260.

2884terZANI F. 1994 - Reperti Lepidoptera, Satyridae. *Hipparchia neomiris* Godart, 1824 - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 48 (1-4) (1993): 116-117.

2885 TIBERI R., NICCOLI A., SACCHETTI P. 1994 - Parassitizzazione delle uova di *Thaumetopoea pityocampa*: modificazioni conseguenti al potenziamento artificiale di *Oencyrtus pityocampae* - Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 763-766.

2886 TREMATERRA P. 1994 - *Amphipyra pyramidea*, un nuovo fitofago dell'Actinidia - *L'Informatore Agrario,* L (20): 75-77

2887 TURQUIN M.-J. 1994 - Lepidoptera. Generalites. In: Encyclopaedia Biospelaeologica. Tome I - Ed. Société de Biospéléologie Moulis, Bucarest: 333-339.

2888 ZANGHERI S., FURLAN L. 1994 - *Agrotis ipsilon* (Hufn.): sintesi di un programma di ricerche sulla biologia e la prognosi delle infestazioni (Lepidoptera Noctuidae) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 72 (1993): 503-506.

2889 ZILLI A. 1994 - Remarks on european *Myxinia species* (Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, 25 (1/2): 359-364.

2890 ZILLI A. 1994 - Gli Eteroceri dei Monti Lepini (Lazio): suggerimenti per ricerche sul territorio - *Quaderni del Museo di Storia Naturale,* Patrica (FR), 6: 125-130.

2891 BALLETTO E., CAMPORESI S., CASSULO L.A., FIUMI G., KARSHOLT O., ZANGHERI S. 1994 - Lepidoptera Cossoidea, Sesioidea, Zygaenoidea, Choreutoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 84. Calderini, Bologna, 8 pp.

2892 BALLETTO E., CASSULO L.A. 1995 - Lepidoptera Hesperioidea, Papilionoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 89. Calderini, Bologna, 11 pp.

2893 BERTACCINI E., CAMPRI V. 1995 - Prime segnalazioni in Italia di *Recoropha* (sic!) *canteneri* (Dup.) e *Dryobotodes cerris* (Bd.) (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae) - *Pagine Museo, U. D. I.,* Ravenna, XX: 132-135.

2894 BERTACCINI E., FIUMI G., PROVERA P. 1995 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera Heterocera). Volume I - Natura - Giuliano Russo Ed., Monterenzio (BO): 248 pp., 16 tav.

2895 BIANCHINI R. 1995 - *Melanargia galathea* Linné, 1758, et ses formes individuelles voisines de tenebrosa dans les Alpes-Maritimes (Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae) - *Alexanor,* 18 (8) (1994): 503-504.

2896 CAMPADELLI G. 1995 - Su alcuni parassitoidi di *Zeuzera pyrina* L. (Lep. Cossidae) in Emilia-Romagna - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi" dell'Università di Bologna,* 50: 127-131.

2897 CASINI P.M. 1995 - *Erebia montana* De Prunner (1798) dans les Alpes Apuanes (Italie péninsulaire). Description de la ssp. nov. vandellii (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (4): 139-145.

2897bis CAZZUOLI A.L. 1995 - Osservazioni sul Lepidottero *Plusia festucae* L., e sul ciclo di un suo endoparassita *Litomastix truncatellus* (Dalman) - *Natura Modenese*, 3 (1993): 39-41.

2898 CICCARONE C., CAMPADELLI G. 1995 - Larve di Zeuzera pyrina L. attaccate da funghi entomopatogeni - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi" dell'Università di Bologna,* 50: 107-112.

2899 DURANTE M.A., PANZERA S. 1995 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 294 e 295 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 127 (1): 71.

2900 EFETOV K.A., TARMANN G.M. 1995 - An annotated check-list of the Palaearctic Procridinae (Lepidoptera Zygaenidae), with descriptions of new taxa - *Entomologist's Gazette,* 46: 63-103.

2901 EITSCHBERGER U. 1995 - *Bougainvillea spectabilis* Willd. - eine neue Raupenfutterpflanze für *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)? (Lepidoptera, Papilionidae) - *Atalanta,* Würzburg, 26 (1/2): 143-144.

2902 EMBACHER G. 1995 - Beitrag zur Verbreitung und Lebensweise von *Nycteola asiatica* (Kroulikovsky, 1904) (Lepidoptera, Noctuidae, Sarrothripinae) - *Atalanta,* Würzburg, 26 (1/2): 123-131.

2903 FAQUAET M. 1995 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 9 (Lepidoptera) - *Phegea,* 23 (4): 181-182.

2904 FREYTAG K. 1995 - Bemerkungen zu einigen Cucullinae - Arten (Schrank, 1802). Aufsuchen der Raupen im Freiland u. Zucht (Lep. Noctuidae) - *Facetta,* 10 (1): 21-28.

2905 GAEDIKE R., HÄTTENSCHWILER P., KARSHOLT O., TRIBERTI P., ZANGHERI S. 1995 - Lepidoptera Tineoidea I - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 81. Calderini, Bologna, 21 pp.

2906 GEHRIG R. 1995 - Massenauftreten von *Danaus chrysippus* und *Hyles euphorbiae* dahlii auf Sardinien im Herbst 1995 (Lepidoptera: Danaidae, Sphingidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 105 (22): 450-454.

2907 GRILLO N., PARENZAN P. 1995 - Contributo alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana. I. Noctuidae - *Phytophaga,* Palermo, V (1994): 51-83.

2908 GROPPALI R. 1995 - Le farfalle diurne di aree coltivate e seminaturali incluse nella periferia della città di Cremona - *Ecologia Urbana,* 1-2-3 (1993): 9-12.

2909 GUIDO M., BATTISTI A. 1995 - Rilievi faunistici ed ecologici su insetti fitofagi in pascoli altomontani delle Dolomiti d'Ampezzo - *Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali,* 20: 67-79.

2910 HAUSMANN A. 1995 - Neue Geometriden-Funde aus Zypern und Gesamtübersicht über die Fauna (Lepidoptera, Geometridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 85: 79-111.

2911 HENNINGS D. 1995 - *Hyphantria cunea* in Norditalien (Toskana) - *Entomologische Zeitschrift,* 105 (8): 156-157.

2911bis HENSLE J. 1995 - Ist *Pandoriana pandora* ((Denis & Schiffermüller), 1775) ein Wanderfalter ? (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Atalanta,* Würzburg, 26 (1/2): 121-122.

2912 JUTZELER D., GRILLO N., DE BROS E. 1995 - Une visite à l'île de Vulcano (dans les îles Eoliennes, Sicile) pour *Hipparchia leighebi* (Kudrna, 1976) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (3): 119-126.

2913 JUTZELER D., PITZALIS B., DE BROS E. 1995 - Les premiers états d'*Hipparchia neomiris* (Godart, 1924) et *Hipparchia aristaeus aristaeus* (Bonelli, 1826) du Gennargentu, Sardaigne (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (2): 47-54.

2914 JUTZELER D., RUSSO L., DE BROS E. 1995 - Les premiers états de *Melanargia russiae* ssp. *japygia* (Cyrillo, 1787) de "Le Murge" (Pouille, I) et recherches sur la validité de ce taxon (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (4): 182-188.

2915 KARSHOLT O., VAN NIEUKERKEN E.J., WHITEBREAD S., ZANGHERI S. 1995 - Lepidoptera Zeugloptera, Dacnonypha, Exoporia, Monotrysia (= Micropterigoidea, Eriocranioidea, Hepialoidea, Nepticuloidea, Incurvarioidea, Tischerioidea) - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 80. Calderini, Bologna, 12 pp.

2916 KOLEV Z., DE PRINS W. 1995 - A new species of the "brown *Agrodiaetus*" complex from the Crimea (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Phegea,* 23 (2): 119-132.

2917 LASTUVKA Z., LASTUVKA A. 1995 - An Illustrated Key to European Sesiidae (Lepidoptera) - Faculty of Agronomy, Mendel University of Agricolture and Forestry, Brno, 174 pp.

2918 LO VERDE G., MASSA B. 1995 - *Euproctis chrysorrhoea* (L.) (Lepidoptera Lymantriidae) e *Phytomiza phillyreae* Hering (Diptera Agromyzidae) presenti nella macchia mediterranea di Pantelleria: dati biologici e parassitoidi - *Il Naturalista Siciliano,* XIX (Suppl.): 679-691.

2919 LONGO S. 1995 - Una nuova infestazione di *Euproctis chrysorrhoea* (L.) in ambienti mediterranei - *Informatore fitopatologico,* XLV (6): 18-23.

2920 LUCIANO P., PROTA R. 1995 - Insect Pests in Sardinia - *IOBC Bulletin,* 18 (6): 1-7.

2921 MAINI S., GALGANO F., FERRARI R. 1995 - Trappole a feromoni multi-innescate: il caso di *Paranthrene tabaniformis* (Rott.) *Zeuzera pyrina* (L.) e *Cossus cossus* (L.) - *Informatore fitopatologico,* XLV (6): 44-48.

2921bis MASSA B. 1995 - Attuali conoscenze sulle piante ospiti di Artropodi. In: Arthropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria (Canale di Sicilia, Mar Mediterraneo) - *Il Naturalista siciliano*, XIX (Suppl.): 797-824.

2922 MOLINARI F., REGUZZI M.C., QUAGLIA M., GALLIANO A., CRAVEDI P. 1995 - Danni causati da larve di Lepidotteri Nottuidi in pescheti - *Informatore fitopatologico,* XLV (11): 17-26.

2923 PARENZAN P. 1995 - Nuove catture di Bombici e Sfingi. Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XVIII - *Entomologica,* Bari, XIX: 149-162.

2924 PARENZAN P. 1995 - Lepidotteri notturni, in: Parenzan Pietro - La Gravina di Riggio, Grottaglie - Schena Editore, Fasano di Brindisi: 161-166.

2925 PASQUALINI E., BARBARA C., ANTROPOLI A., FACCIOLI G. 1995 - Indagini sulla distribuzione della popolazione, sulla dimensione del campione e sulle tecniche di campionamento per *Zeuzera pyrina* L. (Lepidoptera Cossidae) - *Bollettino dell'Istituto di*

Entomologia "G. Grandi" dell'Università di Bologna, 49 (1994): 175-186.

2926 PORTER A.H., SCHNEIDER W, PRICE B.A. 1995 - Wing pattern and allorzymee in *C. arcania* group - *Nota lepidotterologica,* 17 (3-4) (1994): 155-174.

2927 PRIANO M., PICCO A.M. 1995 - Micoflora associata alla Processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. (Insecta Lepidoptera). In: Ecologia della Padania. Atti del XII Convegno Nazionale del gruppo per l'ecologia di base "G. Gadio", Ferrara 7-9 maggio 1994 - *Quaderni della Stazione di Ecologia del Civico Museo di Stiria Naturale di Ferrara,* 9 (1995): 129-135.

2928 PROLA C., BEER S. 1995 - I feromoni in lepidotterologia e per la conoscenza delle Sesiidae italiane (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 73 (1994): 231-271.

2929 RAINERI V., ZANGHERI S. 1995 - Lepidoptera Drepanoidea, Axioidea, Geometroidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 90. Calderini, Bologna, 23 pp.

2930 RAINERI V., ZANGHERI S., ZILLI A. 1995 - Lepidoptera Thyridoidea, Lasiocampoidea, Bombycoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 88. Calderini, Bologna, 6 pp.

2931 RAINERI V., ZILLI A. 1995 - Lepidoptera Noctuoidea - In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 91. Calderini, Bologna, 43 pp.

2932 REINHARD R., EITSCHBERGER U. 1995 - Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera - Sphingidae - *Atalanta,* Würzburg, 26 (1/2): 215-266.

2933 RENNWALD E. 1995 - Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1993 - *Atalanta,* Würzburg, 26 (1/2): 41-115.

2934 RIEMIS A. 1995 - Geometridae of Turkey 4. *Menophra trypanaria* (Wiltshire, 1948), a new species for the Turkish fauna, with description of the male (Lepidoptera) - *Phegea,* 23 (3): 137-140.

2935 ROMANO F.P., ROMANO M. 1995 - Lepidoptera. In: Arthropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria (Canale di Sicilia, Mar Mediterraneo) - *Il Naturalista Siciliano,* XIX (Suppl.): 693-722.

2936 RONKAY G., RONKAY L. 1995 - Noctuidae europaeae. Vol. 7. Cuculliinae II - Entomological Press, Sorø: 224 pp.

2937 ROVERSI P.F. 1995 - Studi su fecondità e fattori di mortalità in ovature di *Lymantria dispar* (L.) (Lepidoptera Lymantriidae) deposte su *Eucalyptus camaldulensis* Dehn - *Redia,* Firenze LXXVIII (2): 283-292.

2938 SABINO G. 1995 - Lepidotterofauna di areali a frumento duro in Puglia e Basilicata - Tesi di Laurea, Facoltà di Agraria, Università di Bari, A. A. 1994-95, 103 pp.

2939 SANNINO L. 1995 - Osservazioni sulla biologia di *Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller) in Campania (Lepidoptera Noctuidae Cuculliinae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 126 (3): 285-292.

2940 SANNINO L., ESPINOSA B., BALBIANI A. 1995 - Morfologia comparativa negli stadi preimmaginali di lepidotteri del tabacco. 2. Larve - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* L (1993): 23-91.

2941 SCALERCIO S. 1995 - Rhopalocerofauna della Calabria - Tesi di Laurea anno acc. 1993/94, Facoltà di Sc. Mat. Fis. e Nat., Università della Calabria, Cosenza, 126 pp. (gennaio 1995).

2942 TARASCO E. 1995 - Morfologia larvale e biologia di *Coelichneumon rudis* (Boyer de Fonscolombe) (Hymenoptera: Ichneumonidae) endoparassitoide delle crisalidi della *Thaumetopoea pityocampa* (Denis et Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - *Entomologica,* Bari, XXIX: 5-51.

2943terZANI F. 1995 - Reperti Lepidotteri Satyridae. *Coenonympha elbana* Staudinger, 1901; *Hipparchia aristaeus aristaeus* Bonelli, 1826 - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 49 (3-4) (1994): 215-216.

2944 VALENTINI V. 1995 - Lepidotteri diurni, in: Parenzan Pietro - La Gravina di Riggio, Grottaglie - Schena Editore, Fasano di Brindisi: 155-160.

2945 ZAHM N. 1995 - Ergebnis der Erfassung der Macrolepidopteren-fauna der "Riserva Naturale orientata Valle dell'Orfento" in Mittelitalien (Abruzzen, Majella). Teil 1: Diurna, Bombyces et Sphinges (Lepidoptera) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 49 (3-4): 55-70. (1994).

2946 ZILLI A. 1995 - On the identity of "*Dichagyris renigera castellanii*" Hartig (Lepidoptera, Noctuidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 49 (3-4): 71-73. (1994).

2947 ZILLI A. 1995 - On the little known Genus *Orectis* Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale,* Udine, 16 (1994): 203-212.

2948 BALDASSARI N., MARTINI A., BARONIO P., FIUMI G., RAMA F., CAPIZZI A. 1995 - Le catture dei Lepidotteri carpofagi del castagno con attrattivi sessuali sintetici specifici e la risposta di altri lepidotteri: Oecophoridae, Tortricidae, Thyatiridae, Geometridae e Lymantriidae - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi" dell'Università di Bologna,* 50: 155-181.

2949 BELLA S., RUSSO P., PARENZAN P. 1996 - Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna della Sicilia. III. Bombici e Sfingi - *Phytophaga,* Palermo, VI (1995): 85-109.

2950 BERTACCINI E. 1996 - Le farfalle più caratteristiche di Monte Mauro (Ravenna) (Lepidoptera) - *Uccelli d'Italia e Pagine del Museo, Ravenna,* XX (1): 67-70.

2951 BERTONAZZI M.C. 1996 - Insetti di recente introduzione in Italia settentrionale - *Pianura,* 8: 123-132.

2952 BIERMANN H., EITSCHBERGER U. 1996 - Bemerkungen zu *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) und *Lasiommata paramegaera* (Hübner, (1824)) (Lepidoptera, Satyridae) - *Atalanta,* Würzburg, 27 (1/2): 253-319.

2953 BISCHOF A., BITTERMANN J. 1996 - *Agrochola kindermanni* sicula ssp. n. aus Sizilien (Madonie) - *Esperiana,* Staffelstein, 4: 482-484.

2954 BOLLINO M., VITALE F., SALA G. 1996 - Note su *Anthocharis damone* Boisduval et *A. euphenoides* Staudinger dell'Italia meridionale con descrizione di una nuova sottospecie (Lepidoptera, Pieridae) - *Lambillionea,* Centenaire 1996: 31-36.

2955 CAMPADELLI G. 1996 - Nemici naturali di *Zeuzera pyrina* (Lepidopetra Cossidae) - *Informatore fitopatologico,* XLVI (9): 13-16.

2956 CASINI P.M. 1996 - Deux nouvelles stations d'*Euchloe tagis* (Hübner, 1804) en Italie centrale. Élevage d'*Euchloe tagis calvensis* Casini (1993), *Euchloe ausonia* (Hübner, 1804) et *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758) au Mont Calvi (Livorno, Italie centrale) (Lepidoptera: Pieridae) - *Linneana Belgica,* XV (7): 275-280.

2957 CASSULO L.A., RAINERI V. 1996 - Primi dati sui Lepidotteri della Garzaia di Valenza Po (Piemonte) (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 127 (3): 257-266.

2958 CHIAVETTA M. 1996 - Segnalazioni faunistiche n° 15. *Apatura ilia* ((Denis & Schiffermüller), 1775) (Insecta, Lepidoptera, Nymphalidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 6: 80.

2959 CHIAVETTA M. 1996 - *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758) in Emilia-Romagna (Insecta, Lepidoptera, Nymphalidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 6: 33-34.

2960 COBOLLI M., LUCARELLI M., SBORDONI V. 1996 - Le farfalle diurne delle piccole isole circumsarde - *Biogeographia, Lavori della Società Italiana di Biogeografia,* (N. S.), XVIII (1995): 569-582.

2961 CUPEDO F. 1996 - Die morphologische Gliederung des *Erebia melampus*-Komplexes, nebst Beschreibung zweier neuer Unterarten: *Erebia melampus semisudetica* ssp. n. und *Erebia*

sudetica belledonnae ssp. n. (Lepidoptera, Satyridae) - *Nota lepidopterologica,* 18 (2): 95-125.

2962 DIANA G., SANNINO L. 1996 - Avversità della coltura del tabacco: Insetti - *Informatore fitopatologico,* XLVI (7-8): 24-31.

2963 DURANTE M.A., PANZERA S., MARZANO G. 1996 - Interessanti reperti nel Salento (Italia Meridionale) (Lepidoptera, Heterocera) - *Lambillionea,* XCVI (1): 219-221.

2964 FAQUAET M. 1996 - De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 10 (Lepidoptera) - *Phegea,* 24 (4): 187-188.

2965 FIUMI G., FABBRI A. 1996 - *Chamaesphecia doleriformis* (Herrich-Schäffer, 1846) in Emilia-Romagna (Insecta, Lepidoptera, Sesiidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 5: 41-47.

2966 GRASSI A. 1996 - Sesia del Ribes. Strategie d'intervento - ter*ra Trentina,* 4: 44-50.

2967 GRILLO N., PARENZAN P. 1996 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana. IV. Geometridae - *Phytophaga,* Palermo, VI (1995): 111-129.

2968 GRILLO N., PARENZAN P., PORCELLI F. 1996 - Segnalazioni faunistiche di Geometridi e Nottuidi per l'Italia settentrionale e centrale (Lepidotteri) - *Entomologica,* Bari, 30: 167-184.

2969 HACKER H. 1996 - Revision der Gattung *Hadena* Schranck, 1802 (Lepidoptera: Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 5: 7-696.

2970 HAUSMANN A. 1996 - The morphology of the geometrid moths of the Levant and neighbouring countries. Part 1: Orthostixinae and Geometrinae - *Nota lepidopterologica,* 19 (1/2): 3-90.

2971 HENNINGS D., SCHMITZ W. 1996 - Zur Heteroceren-Fauna der Versilia (Toskana), Norditalien (Lepidoptera) - *Entomologische Zeitschrift,* 106 (9): 375-381.

2972 HREBLAY M. 1996 - Neue paläarktische Taxa aus der Gattung *Perigrapha* Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 4: 65-94.

2973 HUEMER P. 1996 - Schmetterlinge - Lepidoptera. In: Hellrigl K.: Die Tierwelt Südtirols - Band 1 der Veröffentlichungen des Naturmuseums Südtirol, Bozen: 532-618, Ed. Athesiadruck, Bozen.

2974 HUEMER P. 1996 - Lepidopteren im Bereich der dealpinen flüsse Meduna und Tagliamento (Friuli-Venezia Giulia, Norditalien) - *Gortania, Atti del Museo Friulano di Storia Naturale,* Udine, 18: 201-214.

2975 JUTZELER D. 1996 - Élevage de *Coenonympha corinna elbana* (Staudinger, 1901) du Monte Argentario (Toscane, Italie) avec explication géologique de l'aire de répartition du complexe *corinna*

(Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (8): 332-347.

2976 JUTZELER D., DE BROS E. 1996 - Élevage de *Coenonympha corinna corinna* (Hübner, 1804) de Sardaigne; notes sur la répartition de l'éspèce *C. corinna* (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae) - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse,* Janvier-Mars: 1-10, Avril-Juin: 25-32.

2977 JUTZELER D., GRILLO N., RUSSO L., NARDELLI U., DE BROS E. 1996 - Position taxinomique et biologie de *Melanargia pherusa* (Boisduval, 1833) de Sicile selon les stades pré-imaginaux (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (5): 203-213.

2978 JUTZELER D., LEESTMANS R., DE BROS E. 1996 - Observation des premiers états de *Zygaena corsica* (Boisduval, 1829) - espèce endémique de Sardaigne et de Corse - dans le massif du Gennargentu, Sardaigne (Lepidoptera: Zygaenidae) - *Linneana Belgica,* XV (7): 267-270.

2979 JUTZELER D., RUSSO L., DE BROS E. 1996 - Écologie et premiers états d'*Euchloe insularis* (Staudinger, 1861) des Monti del Gennargentu (Sardaigne) (Lepidoptera: Pieridae) - *Linneana Belgica,* XV (5): 214-218.

2980 KARSHOLT O., RAZOWSKI J. 1996 - The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist - Apollo Books Ed., Stenstrup, 380 pp.

2981 KRISTAL P.M., NASSIG W.A. 1996 - *Leptidea reali* Reissinger 1989 auch in Deutschland und einigen anderen europäischen Landern (Lepidoptera: Pieridae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 16 (4): 345-361.

2982 LO VALVO, MASSA 1996 - Breeding performance of *Parus caeruleus ultramarinus* on Pantelleria Island (Sicilian Channel) - *Rivista di Ornitologia,* 65 (2): 129-135.

2983 MARCHI A., ADDIS G., EXPOSITO HERMOSA V., CRNJAR R. 1996 - Genetic divergence and evolution of *Polyommatus coridon gennargenti* (Lepidoptera: Lycaenidae) in Sardinia - *Heredity,* 77 (1): 16-22.

2983bis MARINI M. 1996 - *Papilio hospiton* Géné, 1839. In: Backgroung information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera - Nature and environment, Edited by Van Helsdingn, Willemse & Speight, No. 79: 189-193.

2984 NARDELLI, GIANDOLFO 1996 - Annerkungen über die sizilianische Population von *Callimorpha dominula* L. mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lepidoptera: Arctiidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 17 (3): 293-299, 6 figg.

2985 NAUMANN C.M., TREMEWAN W.G. 1996 - Geographical variation in the last instar larvae of *Zygaena* (*Mesembrynus*) *corsica* Boisduval,

(1828) (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Linneana Belgica,* XV (7): 286-288.

2986 PARENZAN P. 1996 - Preliminary data on the Macrolepidoptera of the Natural Reserve of Vendicari (Siracusa, SE Sicily) and first record for Sicily of *Leucania palestinae* Staudinger, 1897 (Lepidoptera: Noctuidae) - Proceedings XX International Congress of Entomology, Firenze, Italy, August 25-31, 1996: 02-094.

2987 PARENZAN P., SCALERCIO S. 1996 - Nuove segnalazioni di Nottuidi (Lepidoptera) per l'Italia meridionale. (Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XIX) - *Entomologica,* Bari, 30: 105-133.

2988 PELLECCHIA M., PIZZETTI L. 1996 - Note sulla Lepidotterofauna degli Appennini settentrionali e centrali (Rhopalocera e Heterocera) - *Lambillionea,* XCVI: 318-323.

2989 PELLECCHIA M., PIZZETTI L. 1996 - On the distribution of *Satyrus ferula* Fabricius 1793 in Italy (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* 15 (8): 356-358.

2990 RAINERI V. 1996 - La collezione di Geometridi del conte Turati conservata al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 14 (1): 179-247.

2991 RAINERI V., SCIARRETTA A. 1996 - Contributo alla conoscenza dei Lepidotteri Geometridi del Molise - *Doriana, suppl. Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, VI (N. 295): 1-11.

2992 REZBANYAI-RESER L. 1996 - *Mesapamea*-studien IX. *Mesapamea insolita* n. sp. aus der Südschweiz sowie die bisherigen Fundangaben von *Mesapamea remmi* Rezbanyai-Reser 1985 in Europa (Lepidoptera: Noctuidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 106 (3): 81-92

2993 RUSSO L. 1996 - Une femelle aberrante de *Melanargia arge* (Sulzer, 1776) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (6): 253-254.

2994 RUSSO L. 1996 - Considération sur la validité des sous-espèces géographiques de *Melanargia arge* (Sulzer, 1776) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XV (6): 249-252.

2995 SALA G. 1996 - I lepidotteri diurni del comprensorio gardesano - SEM Ed., Salò, 160 pp.

2996 SALA G., GUIDI M., MAZZOTTI L., BOLLINO M. 1996 - The presence of *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) in Italy (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Atalanta,* Würzburg, 27 (1/2): 321-322.

2997 SANNINO L., BALBIANI A., LOMBARDI P., AVIGLIANO M. 1996 - *Spodoptera littoralis*: un insidioso parassita delle colture erbacee - *L'Informatore Agrario,* LII (18): 76-79.

2998 SANNINO L., ESPINOSA B., LOMBARDI P. 1996 - Descrizione degli stadi preimmaginali di *Heliothis peltigera* ((Denis & Schiffermüller), 1775) e confronto morfo-etologico con *Helicoverpa armigera* (Hübner, (1808)) (Lepidoptera Noctuidae Heliothiinae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* LII: 63-88.

2999 SANNINO L., ESPINOSA B., LOMBARDI P., BALBIANI A. 1996 - Comparative morphological study of larval and pupal stages of *Helicoverpa armigera* (Hb.) and *Heliothis peltigera* (D. et S.) (Lepidoptera Noctuidae Heliothiinae) - Proceedings XX International Congress of Entomology, Firenze, Italy, August 25-31, 1996: 03-069.

3000 SANNINO L., ESPINOSA B., PIZZIOL P. 1996 - Aspetti morfologici di *Hoplodrina ambigua* (Lepidoptera Noctuidae Amphipyrinae) - *Informatore fitopatologico,* XLVI (7-8): 56-61.

3001 SPATENKA K., GORBUNOV O., LASTUVKA Z., TOSEVSKI I., ARITA Y. 1996 - Die Futterpflanzen der paläartischen Glasflüler (Lepidoptera: Sesiidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 17 (1): 1-20.

3002 VACANTE V., COCUZZA G., PUCCI C., DE CLERCQ P. 1996 - Note su *Podisus maculiventris* e *P. nigrispinus* (Heteroptera Pentatomidae) - *Informatore fitopatologico,* XLVI (6): 11-16.

3003 ZILLI A. 1996 - Colour polymorphism of *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) in Italy, and the problem of polytopic subspecies (Lepidoptera, Arctiidae, Callimorphinae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 86: 79-98.

3003bis ZILLI A. 1996 - Le farfalle della XIX Circoscrizione. In: "Martedì Cultura, uomo natura territorio" - Comune di Roma, XIX Circoscrizione: 21-24.

3004 AGRÒ A., LO PINTO M., SINACORI A. 1996 - Incidenza di *Helicoverpa armigera* (Hübner) e *Peltothis peltigera* Dennis & Schiffermüller (sic) (Lepidoptera: Noctuidae) sulla coltura di cece (*Cicer arietinum* L.) in Sicilia - *Notiziario sulla Protezione delle Piante,* 7: 227-233 (Giornate di Studio su Orticoltura e ambiente: la difesa delle colture, Palermo 21-22 Novembre 1996: 26).

3005 ALMA A., ARZONE A., ROMANA G.P. 1997 - Notizie su biologia, epidemiologia e difesa dei nottuidi della vite in Piemonte - *Informatore Fitopatologico,* XLVII (10): 13-17.

3006 ARZONE A., ALMA A., TAVELLA L., BASATO E. 1997 - Aspetti biologici e fitopatologici di Nottuidi in coltivazioni liguri di basilico - *Notiziario sulla Protezione delle Piante,* 7: 249-254 (Giornate di Studio su Orticoltura e ambiente: la difesa delle colture, Palermo 21-22 Novembre 1996: 29).

3007 BERTACCINI E., FIUMI G., PROVERA P. 1997 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera Heterocera). Volume II - Natura - Giuliano Russo Ed., Monterenzio (BO): 256 pp., 16 tav.

3008 BOGGIO F., RAVIGLIONE M.C. 1997 - Fauna lepidotterologica delle Baragge Biellesi (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 129 (2): 141-144.

3009 CERNIGLIARO A., DI BENEDETTO R., LOMBARDO V. 1997 - Primo contributo alla conoscenza degli Eteroceri della Sicilia nord-orientale: generi *Leucania*, *Aletia*, *Sablia*, *Acantholeucania*, *Pseudaletia* (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 128 (3): 185-188.

3010 COBOLLI M., KETMAIER V., LUCARELLI M. 1997 - 14. Lepidoptera Papilionoidea e Hesperoidea (Insecta). In: Osella B.G, Biondi M., di Marco C. & Riti M. Ricerche sulla Valle Peligna (Italia centrale, Abruzzo) - *Quaderni di Provinciaoggi, Amministrazione Provinciale L'Aquila,* 23 (1): 255-282.

3011 COLOMBO M., FASCE D., DAOLIO E. 1997 - Prove di lotta contro *Spodoptera littoralis* (Boisduval) (Lepidoptera Noctuidae) su Basilico - *Notiziario sulla Protezione delle Piante,* 7: 23-34 *(Giornate di Studio su Orticoltura e ambiente: la difesa delle colture, Palermo 21-22 Novembre 1996: 1).*

3012 CONTARINI E. 1997 - Contributo alla conoscenza della biologia, ecologia, fenologia e distribuzione di *Sphenoptera antiqua* (Illiger, 1803) in Romagna - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 8: 55-61.

3013 CRNJAR R., SPANO S. 1997 - Fragili ali di Sardegna - *Oasis,* XIII (116): 88-91, Musumeci Ed., Quart (AO).

3014 CUPEDO F. 1997 - Die geographische Variabilität und der taxonomische Status der *Erebia manto bubastis*-Gruppe, nebst Beschreibung einer neuen Unterart (Nymphalidae: Satyrinae) - *Nota lepidopterologica,* 20 (1/2): 3-22.

3015 DE FREINA J.J. 1997 - Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Ins., Lepid.), Bd. 4 - Edition Forschung & Wissenschaft GmbH, München, 432 pp., 31 tavv.

3016 DISNEY R.H.L., CAMPADELLI G. 1997 - A new species of *Megaselia Rondani* (Diptera: Phoridae) reared from a moth larva (Lepidoptera: Cossidae) in Italy - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi" dell'Università di Bologna,* 51: 63-68.

3017 FAZEKAS I. 1997 - Revision des *Nychiodes obscuraria* Villers 1789-Artenkomplexes, mit ergänzenden Anfaben zu *Nychiodes dalmatina* F. Wagner 1909 (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologica romanica,* Cluj-Napoca, 2: 13-44.

3018 FIBIGER M. 1997 - Noctuidae europaeae. Vol. 3. Noctuinae III - Entomological Press, Sorø: 418 pp.

3019 GIORGINI M., VIGGIANI G., MELLONE G. 1997 - Possibilità di controllo integrato del rodilegno giallo - *L'Informatore Agrario,* LIII (18): 73-77.

3020 HACKER H. 1997 - Ergänzungen zu "Die Noctuidae Vorderaniens" und neuere Forschungsergebnisse zur Fauna der Türkei II (Lepidoptera) - *Esperiana,* Staffelstein, 4, (1996): 273-330.

3021 HÄTTENSCHWILER P. 1997 - Psychidae-Sackträger. In: Schmetterlinge und ihre Lebensräume. 2 - Pro Natura (Hrsg.). Fotorotar, Egg: 165-308.

3022 HAUSMANN A. 1997 - Zur Nomenklatur der europäischen Unterarten von *Pseudoterpna coronillaria* (Hübner, (1817)) (Lepidoptera: Geometridae, Geometrinae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 18 (2/3): 223-225.

3023 HAUSMANN A. 1997 - The Lepidoptera of Israel. Faunistic data on Geometridae: I. Orthostixinae and Geometrinae - *Nota lepidopterologica,* 20 (1/2): 102-136.

3024 HUEMER P. 1997 - Diversität von Schmetterlingen (Lepidoptera) in Waldökosystemen Südtirols und Trients - *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum,* 75/76 (1995/96): 23-96.

3025 JUTZELER D., BIERMANN H., HESSELBARTH G., RUSSO L., SALA G., DE BROS E. 1997 - Études sur la biologie, la morphologie et l'éthologie de *Hipparchia sbordonii* Kudrna, 1984 de l'Isola di Ponza (Latium, Italie) et *Hipparchia neapolitana* (Stauder, 1921) du Monte Faito (Campanie, Italie) et compléments sur la biologie de *Hipparchia leighebi* (Kudrna, 1976) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (3): 105-132.

3026 JUTZELER D., DE BROS E. 1997 - Quelques aspects peu connus des stades pré-imaginaux de *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) d'Italie centrale (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (1): 43-47.

3027 JUTZELER D., DE BROS E. 1997 - Écologie, élevage et status toxinomique de *Coenonympha corinna trettaui* (Gross, 1970) de l'Isola di Capraia (Toscane, Italie) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (2): 70-78.

3028 JUTZELER D., LEIGHEB G., DE BROS E. 1997 - Écologie, élevage et distribution du Myrtil de Sardaigne *Maniola nurag* (Ghiliani, 1852) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (4): 143-149.

3029 JUTZELER D., LEIGHEB G., DE BROS E. 1997 - Ecologie et élevage de *Fabriciana elisa* (Godart, 1823), endemique de Sardaigne et de Corse (Lepidoptera: Nymphalidae) - *Linneana Belgica,* 16 (2): 63-69.

3030 LATELLA L., COBOLLI M., RAMPINI M. 1997 - La fauna delle grotte nei gessi dell'alto crotonese (Calabria) - Il Carsismo dell'area Mediterranea, 1° Incontro di Studi (Castro-Marina 1-2 Settembre 1997), Supplemento al n. 23 di *Thalassia Salentina*: 103-113.

3031 LERAUT P. 1997 - Liste systematique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition) - Suppl. à *Alexanor* & *Bulletin de la Société entomologique de France*, Paris, 404 pp.

3032 LO CASCIO P., PASTA S. 1997 - Sulla presenza di *Thyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera Arctiidae) nell'isola di Stromboli (Isole Eolie) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XXI (1-2): 135-136.

3033 MARTINI S., BASEGGIO A. 1997 - Razionalizzazione degli interventi per il controllo di *Hyphantria cunea* sulla base di parametri meteorologici - Controllo del Territorio, suppl. a *"Dimensione pulito",* anno 6 (1): 16-22.

3034 MATTEDI L., FORTI D., VARNER M., MARINI M., CAPPELLETTI C. 1997 - Larve di Lepidotteri dannose al melo in post-fioritura - *Informatore fitopatologico,* XLVII (2): 43-47.

3035 NEGRISOLO E., CALORE F. 1997 - Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna Euganea - *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali,* 22: 15-24.

3036 OLIVIER A., COUTSIS J.G. 1997 - A revision of the superspecies *Hipparchia azorina* and of the *Hipparchia aristaeus* group (Nymphalidae: Satyrinae) - *Nota lepidopterologica,* 20 (3/4): 150-292.

3037 PELLECCHIA M., PIZZETTI L. 1997 - Lepidotteri poco noti nel Parmense - Atti del Workshop "Esplorazioni Naturalistiche nel Parmense", Felegara 18 ottobre 1997: 65-68.

3038 PELLIZZARI G., DALLA MONTÀ L. 1997 - Gli insetti fitofagi introdotti in Italia dal 1945 al 1995 - *Informatore fitopatologico,* XLVII (10): 4-12.

3039 PÖYRY J., KULLBERG J. 1997 - A taxonomic revision of the genus *Holoarctia* Ferguson, 1984 (Arctiidae) - *Nota lepidopterologica,* 20 (1/2): 45-65.

3040 RAINERI V., FAVA A., SCALI S. 1997 - I Geometridi del Lajone nel gruppo del Monte Beigua, Appennino ligure occidentale (Lepidoptera Geometridae) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, XCI (1996/1997): 607-613.

3041 RÁKOSY L. 1997 - Die Noctuiden Rumäniens (Lepidoptera Noctuidae) - Druckerei Gutenberg, Linz, 648 pp.

3042 REDONDO V.M., GASTÓN F.J. 1997 - *Gnophos* (*Euchrognophos*) *assoi* sp. n. de la Penìnsula Ibérica (Lepidoptera: Geometridae) - *ZAPATERI, Revista Aragonesa de Entomologia,* 6 (1996): 155-162.

3043 REGUZZI M.C. 1997 - Contributo alla conoscenza dei Lepidotteri Nottuidi della Pianura Padana (Italia settentrionale) - *Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura,* Serie II, 29 (2): 199-217.

3044 REZBANYAI-RESER L. 1997 - Herbstliche Lichtfallen- und Tagfänge von Groß-Schmetterlingen an drei Orten in Mittelitalien (Marche, Toscana, Lazio) (Lepidoptera: Macrolepidoptera) - *Entomologische Zeitschrift,* Essen, 107 (9): 362-390.

3045 ROVERSI P.F., BORETTI R., MERENDI G.A., BARTOLOZZI L., TOCCAFONDI P. 1997 - Processionaria della quercia: danni e criteri di controllo - *Sherwood,* 3 (8): 1-16.

3046 SANNINO L. 1997 - Osservazioni sul ciclo biologico di *Hoplodrina ambigua* (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 129 (2): 145-154.

3047 SPICCIARELLI R. 1997 - Primi reperti di larve di *Acanthobrahmaea europaea* (Hrtg.) (Lepidoptera Brahmaeidae) su *Phillyrea latifolia* L. - *Entomologica,* Bari, 3I: 191-195.

3048 STORACE L. 1997 - Ancora sulla presenza di *Zygaena* (*Agrumenia*) *hilaris* O. (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Lambillionea,* XCVII (1): 105-108.

3049 TOLMAN T., LEWINGTON R. 1997 - Butterflies of Britain & Europe - Harper Collins Publishers, London, 320 pp.

3050 TREMATERRA P., ZILLI A., VALENTINI V., MAZZEI P. 1997 - *Cacyreus marshalli*, un lepidottero sudafricano dannoso ai gerani in Italia - *Informatore fitopatologico,* XLVII (7-8): 2-6.

3051 VOLPE G., PALMIERI R. 1997 - *Melitaea diamina* (Lang). Ritrovamenti in Campania sui Monti Picentini e sui Monti del Matese - *Bollettino dell'Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, Sez. Campania,* 14-15: 31-37.

3052 ZILLI A. 1997 - Lepidoptera. In: Zapparoli M. (ed.), Gli Insetti di Roma - *Quaderni dell'Ambiente,* N. 6. Comune di Roma, Dip. X Area Risorsa Suolo e Tutela Ambiente e Associazione Romana di Entomologia, Fratelli Palombi Editori, Roma: 294-311.

3053 ZILLI A. 1997 - 13. Lista preliminare dei lepidotteri macroeteroceri Bombicoidei (s.l.) e Nottuoidei della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" (Insecta). In: Osella B.G. et al. (eds), Ricerche sulla Valle Peligna (Italia centrale, Abruzzo) - *Quaderni di Provinciaoggi, Amministrazione Provinciale de L'Aquila,* L'Aquila, 23 (1): 241-253.

3054 ZILLI A., DI GIULIO A. 1997 - Diversità degli organi androconiali nei Mythimnini italiani: morfologia comparata ed implicazioni filogenetiche (Lepidoptera, Noctuidae) - *Fragmenta entomologica,* Roma, 28 (1) (1996): 97-147.

3055 AISTLEITNER E., AISTLEITNER U. 1997 - Notizen zur Schmetterlingsfauna der Insel Pantelleria (Italien, Sizilien). I: Diurna, Bombyces & Sphinges s.l. - *Nota lepidopterologica,* 21 (1): 31-36.

3056 BIERMANN H. 1998 - Tabellarische Übersicht über die Tagfalter der tyrrenischen Inseln und des angrenzenden Festlands (Lepidoptera, Hesperoidea, Papilionoidea) - *Atalanta,* Würzburg, 28 (3/4): 277-287.

3057 CHIAVETTA M. 1998 - Segnalazioni faunistiche n. 20. *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) (Insecta, Lepidoptera, Hesperiidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 9: 75-76.

3058 CHIAVETTA M. 1998 - La Vanessa Egea (*Polygonia egea*, Cramer 1775) - *Natura & Montagna,* Bologna, XLVI (1): 44-45.

3059 CHIAVETTA M. 1998 - Le farfalle dell'Emilia-Romagna - Nuova Editoriale Grasso, Bologna, 252 pp.

3060 CUCUZZA G. 1998 - Rinvenimento di una colonia riproduttiva di *Danaus chrysippus* in una zona della Sicilia orientale (Lepidoptera Danaidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 130 (3): 273-276.

3061 CULLOTTA S., PARENZAN P., SINACORI A. 1998 - Notes about a new pest (*Spodoptera littoralis* (Boisduval, 1833)) on fennel, and a case of larval allotrophy of *Gortyna xanthenes* (Germar) on avocado fruits in western Sicily (Lepidoptera, Noctuidae: Hadeninae) - VI° European Congress of Entomology, Ceské Budéjovice, August 23-29, 1998: 517.

3062 DAPPORTO L. 1998 - I Macrolepidotteri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi del Monte Falterona e di Campigna (Insecta: Lepidoptera) - Tesi di Laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Firenze, A. A. 1997-1998, 83 pp., 6 tabb., 28 figg.

3063 DE FREINA J.J. 1998 - Neue Sesiiden-Nachweise aus mittelitalienischen Gebirgen (Monti Reatini, Abruzzen) (Lepidoptera: Sesiidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 19 (3/4): 357-362.

3064 DEUTSCH H. 1998 - *Euphyia adumbraria*: ein Beitrag zur Biologie (Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 21 (3): 215-223.

3065 DURANTE M.A., PANZERA S. 1998 - Segnalazioni faunistiche in Italia meridionale (Lepidoptera, Heterocera) - *Lambillionea,* XCVIII (4): 533-534.

3066 DURANTE M.A., PANZERA S. 1998 - *Apaidia barbarica messapia* n. ssp. dal Salento (Italia Meridionale) (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae) - *Lambillionea,* XCVIII (2): 190-196.

3067 ERLEBACH S. 1998 - *Xestia cohaesa* (Herrich-Schäffer, 1849): Neu für die italienischen Südalpen (Lepidoptera: Noctuidae) - *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen,* 47 (3/4): 76-80.

3068 FABBRI A. 1998 - Farfalle notturne raccolte a S. Pietro Puos d'Alpago (BL) - Gruppo Natura Bellunese. Convegno "Aspetti naturalistici della provincia di Belluno", Belluno, 30 maggio 1998: 274-282

3069 FABBRI R., CHIAVETTA M., STIGNANI S. 1998 - Segnalazioni faunistiche n. 22. *Apatura ilia* ((Denis & Schiffermüller), 1775) (Insecta, Lepidoptera, Nymphalidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 9: 76-77.

3070 FABIANO F., ZILLI A. 1998 - Reperti. Lepidoptera, Geometridae. *Archieatis notha* (Hübner, (1803)) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 53 (1-4): 76.

3071 FLAMIGNI C. 1998 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 336 & 338 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 130 (1): 82-84.

3072 FLAMIGNI C., BASTIA G. 1998 - Osservazioni sulle specie emiliane del genere *Idaea* Treitschke, 1825 (Insecta Lepidoptera Geometridae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 9: 13-42.

3073 FÖHST P. 1998 - Zur kenntnis der Lepidopterenfauna am Passo di Croce Domini im sudlichen Adamellogebiet (Italien) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 18 (4): 373-395.

3074 FUMI M. 1998 - Osservazioni ecologiche su alcuni nuovi Ropaloceri per i Monti Sibillini (Appennino Centrale) (Lepidoptera) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* 53 (1-4): 63-73.

3075 GARONI F. 1998 - *Synanthedon spuleri* (Fuchs) ed altri Lepidotteri Sesiidae catturati mediante attrattivi sessuali - Tesi di Laurea. Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Sc. Agrarie. Sessione III Anno Accademico 1997-1998, 47 pp.

3076 GASPARO F. 1998 - La fauna della Grotta Gigante (Carso Triestino, Italia) - *Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan",* XXXV (1997): 43-62.

3077 GOVI G., FIUMI G. 1998 - Le attuali conoscenze sui lepidotteri diurni della Romagna (Insecta Lepidoptera Rhopalocera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 10: 17-32.

3078 GROS P. 1998 - Neues über die Verbreitung von *Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928) im Alpenraum und Bibliographie der derzeit bekannten europäischen Fundorte der Art - *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen,* 47 (3/4): 95-100.

3079 HACKER H. 1998 - Die Typen der von E. J. Ch. Esper (1742-1810) in seinem "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur" beschriebenen Noctuoidea (Lepidoptera) - *Esperiana,* Staffelstein, 6: 433-468.

3080 HACKER H. 1998 - Ergänzungen zur "Die Noctuidae Vorderasiens" und neuere Forschungsergebnisse zur Fauna der Türkei III (Lepidoptera) - *Esperiana,* Staffelstein, 6: 185-212.

3081 HACKER H. 1998 - Revision der Gattungen *Hadula* Staudinger, 1889 (= *Discestra* Hampson, 1905; = *Aglossestra* Hampson, 1905; (= *Cardiestra* Boursin, 1963), *Anartomorpha* Alphéraky, 1892, *Trichanarta* Hampson, 1895, *Anarta* Ochsenheimer, 1816 und *Cardepia* Hampson, 1905 mit Beschreibung einer neuen Gattung *Hadumorpha* gen. n. (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 6: 577-883, 13 tavv. (pp. 886-911).

3082 HUEMER P., HAUSMANN A. 1998 - S*cotopteryx ignorata* sp. n., eine bisher übersehene europäische Art des *Scotopteryx mucronata-luridata*-Komplexes (Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 21 (4): 240-263.

3083 IPPOLITO F., PARENZAN P. 1998 - I Macrolepidotteri del Demanio Forestale di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna della Sicilia. VI - *Phytophaga,* Palermo, VIII: 57-84.

3084 JUTZELER D. 1998 - *Lasiommata paramegaera* (Hübner, 1824) des Iles Tyrrhénienes: una "bonne espèce" (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (7): 267-276.

3085 JUTZELER D. 1998 - Au sujet de la biologie de *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (8): 303-306.

3086 JUTZELER D. 1998 - *Coenonympha gardetta lecerfi* (de Lesse, 1949), une ssp. isolée du complexe gardetta des Monts du Forez (Puy-de-Dôme, Auvergne, F.) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (5): 192-195.

3087 JUTZELER D., BOLLINO M., RUSSO L., SALA G. 1998 - Études sur *Anthocharis damone* (Boisduval, 1836) et *Euchloe ausonia* (Hübner, 1804) de l'Italie méridionale (Lepidoptera: Pieridae) - *Linneana Belgica,* XVI (6): 227-235.

3088 JUTZELER D., CAMERON-CURRY V., HELLELBARTH G., MEYER-WESTFELD N. 1998 - A comparison between *Hipparchia pellucida* (Stauder, 1923) from Georgia and *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758) from NW Germany (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (7): 277-284.

3089 JUTZELER D., HESSELBARTH G., CAMERON-CURRY V. 1998 - Ecology and rearing of *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) from Mount Faito (Campania, Italy) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (6): 236-241.

3090 LEIGHEB G., CAMERON-CURRY V. 1998 - Observations on the biology and distribution of *Pseudophilotes barbagiae* (Lycaenidae, Polyommatini) - *Nota lepidopterologica,* 21 (1): 66-73.

3091 LEIGHEB G., CAMERON-CURRY V., BALLETTO E. 1998 - Description of the early stages of *Zygaena orana sardoa* (Mabille, 1892) from Sardinia (Lepidoptera, Zygaenidae) - *Linneana Belgica,* XVI (6): 249-252.

3092 LEIGHEB G., CAMERON-CURRY V., RIBONI E., CECCHIN S. 1998 - Present knowledge on the distribution of *Erebia christi* (Nymphalidae: Satyrinae) in the Italian Alps - *Nota lepidopterologica,* 21 (4): 290-295.

3093 LO VERDE G, MASSA B. 1998 - *Teia* cfr. *trigotephras* (Boisduval) e *Tortrix viridana* L., lepidotteri defogliatori in ambienti forestali e a macchia mediterranea della Sicilia e incidenza dei loro parassitoidi - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 152.

3094 LONGO S., PALMERI V., CAROLEI A.E. 1998 - Note biologiche su *Charaxes jasius* in agrumeti della Calabria - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 132.

3095 MAINI S., GARONI F., FIUMI G., RAMA F., REGGIORI F. 1998 - *Synanthedon spuleri* (Fuchs) ed altri lepidotteri Sesiidae catturati mediante attrattivi sessuali - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 258.

3096 MAINI S., RIOLO P., NARDI S. 1998 - Indagini sui lepidotteri endofiti del mais nel marchigiano - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 146.

3097 MARCHESINI E., TOSI L., GALBERO G. 1998 - Limitatori naturali di crisalidi svernanti di *Hyphantria cunea* (Drury) (Ler., Arctiidae) nel Veneto - *Notiziario sulla Protezione delle Piante,* N. S., 8: 71-81.

3098 MARINI M. 1998 - Osservazioni sull'ecologia di una popolazione di *Zerynthia polyxena* D. & S. in un'area della pianura bolognese - Atti Convegno "Delle specie neglette, ovvero: quanto costa un rospo?", Provincia di Bologna, Assessorato all'Ambiente: 70-71.

3099 MARINI M. 1998 - Lepidotteri. In "Zone umide della pianura bolognese" - a cura di Tinarelli R. & Tosetti T., IBC, Regione Emilia-Romagna, Ed. Compositori: 89-192.

3099bis MERMET E. 1998 - I Lepidotteri ropaloceri del Varesotto - *Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali,* 86: 25-36.

3100 MIKKOLA K. 1998 - Revision of the genus *Xylomoia Staudinger* (Lepidoptera: Noctuidae), with descriptions of two new species - *Systematic Entomology,* 23: 173-186.

3101 MOLINU A. 1998 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 337 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 130 (1): 83.

3102 NEKRUTENKO Y.P. 1998 - A catalogue of the type specimens of Riodinidae and Lycaenidae deposited in the collection of Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig (Bonn) - *Nota lepidopterologica,* 21 (2): 119-148.

3103 PARENZAN P. 1998 - Osservazioni preliminari sulla Macrolepidotterofauna della Riserva Naturale di Vendicari (Siracusa) e prima segnalazione di *Leucania palestinae* Staudinger, 1897 (Lepidoptera Noctuidae) per la fauna italiana. (Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana V) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XXII (3-4): 355-364.

3104 PARENZAN P., HAUSMANN A., SCALERCIO S. 1998 - Addenda e corrigenda ai Geometridi dell'Italia meridionale (Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XX) - *Entomologica,* 32: 51-79.

3105 PELLECCHIA M., PIZZETTI L., BEDULLI D. 1998 - Farfalle - Collana naturalistica, Parco Fluviale regionale del Taro: 1-48.

3106 PIZZETTI L., RAINERI V. 1998 - Segnalazioni di alcuni Geometridi della collezione Barajon interessanti per la fauna italiana (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 130 (2): 159-166.

3107 RAMELLA A., VIOLANI C. 1998 - I lepidotteri Ropaloceri del Verbano nella collezioni Taccani - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 64.

3108 RAVAGLIOLI L. 1998 - I Lepidotteri. In: Tedaldi G. (red.), - La fauna della Riserva Naturale Orientata "Bosco di Scardavilla" un patrimonio da conoscere e tutelare - Comune di Meldola - R.N.O. "Bosco di Scardavilla", Collana Studi e Ricerche: 19-27.

3109 REZBANYAI-RESER L. 1998 - *Chortodes sohnretheli* (Püngeler, 1907), neu für die Fauna der Schweiz und des Tessins (Lepidoptera: Noctuidae) - *Entomologische Berichte Luzern,* 39: 107-112

3110 RICCHI C., SCARAVELLI D. 1998 - Segnalazioni faunistiche n. 21. *Euphydryas provincialis* (Boisduval, 1828) (Insecta, Lepidoptera, Nymphalidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 9: 76.

3110bis RUSSO L. 1998 - Les formes individuelles chez *Melanargia arge* (Sulzer, 1776) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (5): 223-224.

3111 SANNINO L., ESPINOSA B. 1998 - Ciclo biologico di *Mamestra brassicae* e danni alle colture ortive in Campania - *Informatore fitopatologico,* XLVIII (5): 59-67.

3112 SANNINO L., ESPINOSA B., LOMBARDI P. 1998 - Description of immature stages of *Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel et Hanigk,

1983, and morphological comparison with adult of *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759) (Lepidoptera Noctuidae Noctuinae) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* 54: 17-30.

3113 SCALERCIO S. 1998 - Ricerche sui lepidotteri Ropaloceri in ambienti mediterranei: la Sila Greca (Lepidoptera Rhopalocera) - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 63.

3114 SCHEIDWEILER A. 1998 - Segnalazioni faunistiche n. 23. *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) (Insecta, Lepidoptera, Arctiidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 9: 77.

3115 SCIARRETTA A., RAINERI V, ZILLI A. 1998 - Indagini sul popolamento lepidotterologico in biotopi di interesse naturalistico nel Molise - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 60.

3116terZANI F. 1998 - Sulla presenza di *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) in Toscana (Lepidoptera, Danaiidae) - *Atti del Museo di Storia naturale della Maremma,* 17: 193-194.

3117 TIBERI R., NICCOLI A. 1998 - I principali insetti fitofagi del noce negli impianti da reddito dell'Italia centrale - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 125.

3118 TROPEA GARZIA G., COCUZZA G. E., BARBAGALLO S. 1998 - Dinamica dei voli e infestazioni di *Spodoptera littoralis* (Boisduval) in Sicilia sud-orientale - Atti XVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Maratea 21-26 giugno 1998: 136.

3119 VACANTE V., EROS G. 1998 - Presenza di *Chrysodeixis chalcites* nella serricoltura fredda della Sicilia sud orientale - *Informatore fitopatologico,* XLVIII (5): 21-26.

3120 VALENTINI V. 1998 - Farfalle: trovata sul Pollino un'altra spendida "rarità"... - *Apollinea,* 2 (6): 11.

3121 ZANGHERI S., FURLAN L., SANNINO L. 1998 - *Agrotis ipsilon* (Hufnagel): indagini sullo svernamento in diverse regioni italiane (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 30 (2): 125-130.

3122 ZILLI A. 1998 - Larval chaetotaxy of *Pharmacis aemilianus* (Lepidoptera Hepialidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 130 (2): 167-175.

3123 ZILLI A. 1998 - Il turnover delle faune lepidotterologiche in ambiente urbano: dinamiche a confronto ed effetti nell'hinterland - Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana, Roma: 73-81.

3124 ZILLI A., PERIA E. 1998 - *Characoma nilotica* (Rogenhofer) new to Italy (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 130 (1): 83.

3125 BARTOLINI L. 1998 - I Lepidotteri Ropaloceri del Padule di Fucecchio e delle Cerbaie (e altro ancora) - Stamperia Benedetti, Pescia: 176 pp.

3126 BELLA S. 1999 - Presenza di *Orectis proboscidata* in ambiente ipogeo sull'Etna (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 131 (3): 253-257.

3127 BELLA S., RUSSO P. 1999 - *Pandesma robusta* new to the italian fauna (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana,* Staffelstein, 7: 472.

3128 BELLA S., RUSSO P., PARENZAN P. 1999 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana. VII - I Lepidotteri Eteroceri del Pantano Longarini (Siracusa, Sicilia Sud-orientale) - *Phytophaga,* Palermo, IX: 15-37.

3129 BERTACCINI E., FIUMI G. 1999 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera Zygaenidae). Volume III - Natura - Giuliano Russo Ed., Monterenzio (BO): 159 pp., 13 tav.

3130 BETTAG E., BLÄSIUS R. 1999 - Über den Status von *Dipsosphecia megillaeformis* var. *tunetana* (Lepidoptera: Sesiidae) - *Phegea,* 27 (3): 93-101.

3131 BIERMANN H. 1999 - Falterbeobachtungen im Frühling auf Elba (Insecta, Lepidoptera) - *Atalanta,* Würzburg, 29 (1/4): 291-299.

3132 BOLOGNESI A. 1999 - Conoscere ed allevare gli *Agrodiaetus* d'Italia (Lycaenidae) - Alberto Bolognesi, Milano, 55 pp.

3133 BORDONI A., LEO P. 1999 - *Zygaena* (*Mesembrynus*) *corsica* (Boisduval, 1828): notes sur l'habitus, la biologie et l'écologie (Lepidoptera: Zygaenidae) - *Linneana Belgica,* XVI (2): 55-60.

3134 CAMERINI G., GROPPALI R. 1999 - Predatori e parassitoidi di *Hyphantria cunea* in provincia di Pavia - *Informatore Agrario,* 10: 19-28.

3135 CAMPOBASSO G., COLONNELLI E., KNUTSON L., TERRAGITTI G., CRISTOFARO M. 1999 - Wild Plants and Their Associated Insects in the Palearctic Region, Primarily Europe and the Middle East - United States Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service, n. 147, 243 pp.

3136 CASINI P.M. 1999 - *Heodes tityrus subalpinus* (Speyer, 1851): première station en Italie péninsulaire (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XVII (1): 5-10.

3137 CASULA P. 1999 - Approccio integrato nella valutazione del rischio di estinzione di specie endemiche sarde: indagine biogeografica e genetica - Contratto di ricerca (ex art. 37, L.R. n. 2/94), cod. 320.

Dipartimento di Biologia Sperimentale, Sez. di genetica, Università di Cagliari: 16 pp.

3138 DAPPORTO L., CECCHI B., LO CASCIO P., SFORZI A. 1999 - Contributi alla conoscenza dell'artropodofauna dell'Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano). II. Prima nota sui macrolepidotteri (Insecta Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 131 (3): 245-252.

3139 FLAMIGNI C. 1999 - Segnalazioni faunistiche n. 391, 392, 393 - *Bollettino della Società entomologica italiana,* 131 (4): 267-268.

3140 FLAMIGNI C., BASTIA G. 1999 - Nuovi dati sulla distribuzione in Italia di alcune specie della Famiglia Zygaenidae (Lepidoptera) - *Giornale Italiano di Entomologia,* 8 (1997): 291-300.

3141 GRECO F., NUCIFORA S. 1999 - I fitofagi del pistacchio - *L'informatore agrario,* 26: 65-71.

3142 GRILLO N. 1999 - Riscoperta in Sicilia di *Coenonympha corinna* (Hübner, 1804) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XXIII (3-4): 591-592.

3143 GRILLO N. 1999 - Record of *Danaus chrysippus* Linnaeus, 1758) in the province of Palermo (Sicily, Italy) (Lepidoptera: Danaidae) - *Linneana Belgica,* XVII (1): 3-4.

3144 HACKER H.H. 1999 - Die Typen der von E. J. Ch. Esper (1742-1810) in seinem "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur" beschriebenen Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Hepialoidea, Lasiocampoidea, Noctuoidea, Pyraloidea, Tineoides (Lepidoptera) - *Esperiana,* Staffelstein, 7: 443-461.

3145 HELLMANN F., BROCKMANN E., KRISTALL P.M. 1999 - I Macrolepidotteri della Valle d'Aosta - Museo Regionale di Scienze Naturali, Saint-Pierre - Valle d'Aosta, Monografie, 2, 284 pp.

3146 JUTZELER D., BIERMANN H., GRILLO N., LO CASCIO P., VOLPE G 1999 - Au sujet du statut taxinomique d'*Hipparchia blachieri* (Fruhstorfer, 1908) de la Sicile (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVI (2): 69-84.

3147 JUTZELER D., LEESTMANS R. 1999 - Évaluation du degré de spéciation atteint par *Plebejus argus corsicus* (Bellier, 1862) basée sur l'étude des stades pré-imaginaux (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XVII (3): 87-100.

3148 KLEINEKUHLE J. 1999 - Die Tagfalter (Rhopalocera) Sardiniens aus biogeographischer Sicht - *Oedippus,* 16: 1-60.

3149 LATELLA L., DI RUSSO C., DE PASQUALE L., DELL'ANNA L., NARDI G., RAMPINI M. 1999 - Preliminary investigations on a new sulfurous cave in Central Italy - *Mémoires de Biospéologie,* XXVI: 131-135.

3150 LEIGHEB G., CAMERON-CURRY V. 1999 - Observations on the presence of *Danaus chrysippus* (Linné, 1758) in the Mediterranean area, with special reference to Italy (Lepidoptera, Danaidae) - *Linneana Belgica,* XVI (2): 61-68.

3151 LERAUT P. 1999 - Contribution à l'étude des espéces du genre *Crocota* Hübner (Lepidoptera Geometridae) - *Alexanor,* 20 (8), 1998 (1999): 467-481.

3152 MALAVASI D., TRALONGO S. 1999 - Osservazioni sulle comunità di Lepidotteri Ropaloceri e Odonati presenti nel Parco regionale dello Stirone - *Pianura,* 11: 133-145.

3153 MAZEL R., LEESTMANS R. 1999 - Seconde contribution à l'ètude des relations entre *Leptidea sinapis* Linné et *L. reali* Reissinger en France, Belgique et quelques autres contrées européennes (Lepidoptera: Pieridae) - *Linneana Belgica,* XVII (4): 155-168.

3154 NEGRISOLO E., CALORE F. 1999 - Nuovi dati sui Lepidotteri diurni dei Colli Euganei e considerazioni generali sul popolamento dell'area - *Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali,* 24: 19-26.

3155 PARENZAN P., BELLA S., RUSSO P. 1999 - *Idaea completa* (Staudinger, 1892) (Lepidoptera: Geometridae) specie nuova per la fauna di Sicilia e italiana. (Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana. VI) - *Entomologica,* Bari, 32 (1998): 195-199.

3156 PARENZAN P., ROTUNDO G., DE CRISTOFARO A. 1999 - Relazione preliminare sui risultati delle indagini sulla macrolepidotterofauna della Riserva naturale di Collemeluccio (Pescolanciano, IS) (Molise) - 5° Conv. Naz. Biodiversità: Biodiversità e Sistemi Ecocompatibili, Caserta, 9-10 settembre 1999: 671-675.

3157 PELLECCHIA M. 1999 - Note preliminari sulla lepidotterofauna dei Monti dell'Orsomarso - Parco Nazionale del Pollino (Lepidoptera Hesperioidea e Papilionoidea) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 131 (1): 31-40.

3158 PELLECCHIA M., PIZZETTI L. 1999 - Note faunistiche su alcuni macrolepidotteri degli Appennini (Rhopalocera et Heterocera) - *Lambillionea,* XCIX: 339-343.

3159 PÜHRINGER F., RYRHOLM N., DOBLER G. 1999 - *Synanthedon polaris* (Staudinger, 1877), der Polarglasflügler (Lepidoptera, Sesiidae) auch in Südtirol - *Linzer biologische Beiträge,* 31: 533-539.

3160 RALLO G. 1999 - Ambiente naturale e trasformazioni antropiche a Mestre e area contermine. In: Storia di Mestre - Tipolitografia F.lli Liberato - Mestre (Ve): 185-198.

3161 REDONDO V.M., GASTÓN F.J. 1999 - Los Geometridae (Lepidoptera) de Aragón (España) - Monografia n. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, 131 pp.

3162 REZBANYAI-RESER L. 1999 - Zwei wichtige Berichtigungen zur Nachtfalterfauna vom Wallis: Das offensichtliche Nichtvorkommen von *Cryphia pallida* (Baker, 1894) und *Parietaria serotinaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae & Geometridae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 49 (4): 136-145.

3163 ROOS P.H., HUCK S. 1999 - Entwicklung und Morphologie der Präimaginalstadien von *Erebia montana* (Nymphalidae: Satyrinae) - *Nota lepidopterologica,* 22 (4): 241-261.

3164 ROTUNDO G., PARENZAN P., DE CRISTOFARO A. 1999 - Contributo alla conoscenza della fauna della Riserva Naturale di "Collemeluccio" (Molise): Lepidoptera, Heterocera - *Phytophaga,* Palermo, IX: 39-62.

3165 ROVERSI P.F., VETRALIA G., PENNACCHIO F., BINAZZI A., FRANCARDI V. 1999 - Attacchi di processionaria della quercia e indicazioni gestionali per i querceti dell'Italia centrale - Atti II Congresso Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Bologna 20-22 ottobre 1999: 453-457.

3166 SANNINO L., ESPINOSA B. 1999 - On the morphology of *Noctua comes* (Lepidoptera Noctuidae) - *Il Tabacco*, 7 (2): 35-43.

3167 SANNINO L., ESPINOSA B. 1999 - Biology of *Mamestra brassicae* (Lepidoptera Noctuidae) in Campania (South Italy) - *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria "F. Silvestri" Portici,* 55: 79-81.

3168 SANNINO L., ESPINOSA B. 1999 - Aspetti morfologici ed etologici di *Scopula turbidaria* (Lepidoptera Geometridae) - *Fragmenta entomologica,* Roma, 31 (2): 377-395.

3169 SANNINO L., PIRO F. 1999 - Fragola, come bloccare la Spodoptera - *Terra e Vita,* 48: 78-79.

3170 SANNINO S., ESPINOSA B. 1999 - *Spodoptera littoralis* su piante da acquario - *Informatore fitopatologico,* XLIX (6): 55-59.

3171 SCALERCIO S. 1999 - Macrolepidotteri notturni catturati nel Vincese (Toscana - Italia) (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 77: 311-316.

3172 SCALERCIO S. 1999 - Biodiversità e sinecologia dei Lepidotteri Ropaloceri nel paesaggio mediterraneo: la Sila Greca (Italia, Calabria) - Tesi di Dottorato di Ricerca in Biologia Animale, XI Ciclo, anno acc. 1998/99, Università degli Studi della Calabria, Cosenza, 131 pp.

3173 SCIARRETTA A., PARENZAN P. 1999 - Contributo alla conoscenza della Macrolepidotterofauna del Molise - Bombyces et Sphinges (Heterocera) - *Entomologica,* Bari, 32 (1998): 81-107.

3174 SCOBLE M.J. (EDITOR), PARSONS M.S., HONEY M.R., PITKIN L.M., PITKIN B.R. 1999 - Geometrid Moths of the World. A Catalogue (Lepidoptera, Geometridae). Vol. 1 and 2 - CSIRO Publishing and Apollo Books, Stenstrup, 1016 pp. (+ 129 of index).

3175 TREMATERRA P., ZILLI A. 1999 - Sulla presenza in Europa di *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, lepidottero licenide sudafricano dannoso ai gerani coltivati - *Notiziario sulla Protezione delle Piante,* N. S., 10: 45-52.

3176 TUZOV V.K. 1999 - The type-specimens of palaeartic Nymphalidae in the Zoologische Sammlungen des Bayerischen Staates, München, Entomologisches Museum Eitschberger, Marktleuthen and Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde (Lepidoptera, Rhopalocera) - *Atalanta,* Würzburg, 29 (1/4): 209-243.

3177 VERDINELLI M., SERRA G., LUCIANO P. 1999 - Indagini preliminari sulla distribuzione delle ovideposizioni di *Malacosoma neustrium* (L.) (Lepidoptera Lasiocampidae) in sugherete della Sardegna - Atti delle "Giornate di studio sui metodi numerici, statistici ed informatici nella difesa delle colture agrarie e delle foreste", Sassari, 19-22 Maggio 1999. *Frustula entomologica,* N. S. XXII (XXXV): 191-196.

3178 VERDINELLI M., SERRA G., LUCIANO P. 1999 - Osservazioni sulla distribuzione spaziale di ovideposizioni e nidi di *Malacosoma neustrium* (L.) in sugherete della Sardegna - *Redia,* Firenze, LXXXII: 181-196.

3179 VOLPE G., PALMIERI R. 1999 - Le Farfalle diurne dei Campi Flegrei. Campania (Lepidoptera Rhopalocera) - Associazione Arion Onlus, Castelvolturno (CE): 15 pp. + 55 tavv.

3180 ZAHM N. 1999 - Zusammenhänge zwischen Arealsystemen vertikaler Verbreitung und Habitatbindung von Faunenelementen am Beispiel der Rhopalocera (Lepidoptera) der Majella (Apennin) - *Neue Entomologische Nachrichten,* 42: 292 pp.

3181 ZILLI A. 1999 - Taxonomic remarks on *Agrochola wolfslaegerae* Boursin, 1953 (sp. rev.) (Lepidoptera: Noctuidae) - *Entomologica,* Bari, 32 (1998): 133-138.

3182 ZILLI A. 1999 - Lepidoptera species with a western and eastern distribution in the Mediterranean: reasons for a disjunction - *Biogeographia,* XX: 223-228.

3183 ARNSCHEID W. 1999 - Die Macrolepidopterenfauna Westligurien - *Neue Entomologische Nachrichten,* 47: 3-310.

3184 BERTACCINI E. 2000 - Contributo alla conoscenza di *Leptidea reali* Reissinger 1989 (Insecta, Lepidoptera: Pieridae) - *U. D. I., pagine del Museo (Ornitologico e di Scienze Naturali Ravenna),* XXIV (1-2): 77-80 (1999).

3185 BUSATO E., TEDESCHI R., ALMA A. 2000 - Biologia e morfologia larvale di *Peribatodes rhomboidarius* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera Geometridae) su Vite - *Redia,* Firenze, LXXXIII: 11-21.

3186 CHIAVETTA M. 2000 - Le farfalle dell'Emilia-Romagna. Aggiornamento - Nuova Editoriale Grasso, Bologna, 52 pp.

3187 CHIAVETTA M. 2000 - Le Farfalle d'Italia. Atlante Biogeografico - Nuova Editoriale Grasso, Bologna, 111 pp.

3188 CUPEDO F. 2000 - Die geographische Variabilität von *Erebia flavofasciata*, nebst Beschreibung einer neuen Unterart (Nymphalidae: Satyrinae) - *Nota lepidopterologica,* 23 (2): 173-184.

3189 DANNER F., EITSCHBERGER U., SURHOLT B. 2000 - Die Entwicklungstadien von drei *Sphinx ligustri*-Unterarten im Vergleich. 7. Ergänzung zu "Die Scgwärmer der westlichen Palaearktis" (Danner, Eitschberger & Surholt, 1998) (Lepidoptera, Sphingidae) - *Atalanta,* Würzburg, 31 (1/2): 217-221.

3190 DAPPORTO L., FABIANO F. 2000 - Nuovi reperti di Eteroceri in Toscana e Romagna (Insecta Lepidoptera Heterocera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 13: 45-52.

3191 DAPPORTO L., FABIANO F. 2000 - Notes on some interesting Geometridae collected in Tuscany (Italy) - *Nota lepidopterologica,* 23 (2): 185-190.

3192 DAWSON M.J., HEMMING J. 2000 - Sardinia 1999 - *Bulletin of the Amateur Entomologist's Society,* 59: 15-17.

3193 EFETOV K.A. 2000 - A new Subgenus of the Genus *Adscita* Retzius, 1783 (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae) - *Tavricheskiy Mediko-Biologicheskiy Vestnik,* 3 (1-2): 168-174, 12 figg..

3194 EFETOV K.A., KEIL T., MOLLET B., TARMANN G.M. 2000 - New data on the chaetotaxy of the first instar larva of Forester moths (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 21 (2): 83-90.

3195 EFETOV K.A., TARMANN G.M. 2000 - On the systematic position of *Procris alpina italica* Alberti, 1937 and *Procris storaiae* Tarmann, 1977 (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae) - *Tavricheskiy Mediko-Biologicheskiy Vestnik,* 3 (1-2): 161-167.

3196 FUMI M. 2000 - Note sui Papilionoidea dell'Umbria (Italia centrale) (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 132 (1): 69-82.

3197 GOVERNATORI G. 2000 - Entomofauna del bacino montano del torrente Cellina (Coleoptera, Lepidoptera). In: Quaia L. - Contributi alla conoscenza dell'entomofauna della Val Cellina (Prealpi carniche occidentali) - *Bollettino della Società Naturalisti "Silvia Zenari",* Pordenone, 24: 7-43.

3197bis GROS P. 2000 – Belliers Würfel-Dickkopffalte Pyrgus bellieri (Oberthür, 1910) aus dem Gardaseegebiet im Trentino – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen,* 49 (1/2): 27-30.

3198 HÄTTENSCHWILER P. 2000 - Aggiornamenti alla Checklist delle specie della fauna italiana. Fascicolo 81 - Lepidoptera Tineoidea I. Famiglia Psychidae - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 132 (3): 277-278.

3199 HÄTTENSCHWILER P. 2000 - *Typhonia beatricis* sp. n., eine möglicherweise aus dem östlichen Mittelmeerraum eingeschleppte Psychide (Lepidoptera, Psychidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 50 (1): 2-17, 8 figg.

3200 HENSLE J. 2000 - Herbstfunde von *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) in Kalabrien (Süditalien) (Lepidoptera, Nymphalidae, Danainae) - *Atalanta,* 31 (1/2): 56-60.

3201 HIRSCHFELD G., NARDELLI U. 2000 - Das Männchen von *Parnassius apollo* ab. *costellai* Nardelli & Hirschfeld, 1992 nebst einigen Anmerkungen zu diesen Phänomen (Lepidoptera, Papilionidae) - *Atalanta,* Würzburg, 31 (3/4): 457-459.

3202 LEIGHEB G., JUTZELER D., CAMERON-CURRY V. 2000 - The breeding of *Pseudophilotes barbagiae* De Prins & van der Poorten, 1970, an endemic species of the Gennargentu massif, Sardinia, Italy (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XVII (6): 239-246.

3203 LONGO S., PALMERI V., CAROLEI A.E. 2000 - Biologia di *Charaxes jasius* in agrumeti della Calabria (Lepidoptera Nymphalidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 132 (1): 83-90.

3204 LUCIANO P., ROVERSI P.F., MAIORCA G., CARIDI D., CRUPI D., LETO R.F.C., PENNA F., PALEOLOGO P. 2000 - Infestazioni di lepidotteri nei querceti dell'Aspromonte - *L'Informatore Agrario,* LV (38): 72-75.

3205 MERIGHI F. 2000 - Contributo alla conoscenza dei Lepidotteri nel comune di Castenaso (Bologna) (Insecta Lepidoptera Rhopalocera, Heterocera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 13: 35-44.

3206 NARDELLI U., GIANDOLFO B. 2000 - Biologische und ethologische Angaben über eine der am wenigsten bekannten Lymantriiden von Sizilien: *Orgyia dubia arcerii* Ragusa, 1923 (Lepidoptera:

Lymantriidae) - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 21 (2): 123-128.

3207 NARDELLI U., GIANDOLFO B. 2000 - Biologische und ethologische Angaben über eine der am wenigsten bekannten Lymantriiden von Sizilien: *Orgyia dubia arcerii* Ragusa, 1923 (Lepidoptera: Lymantriidae). Corrigendum - *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo,* N. F., 22 (1): 36.

3208 NEKRUTENKO Y.P. 2000 - A catalogue of the type specimens of Palaearctic Riodinidae and Lycaenidae (Lepidoptera, Rhopalocera) deposited in the collection of the Museum für Naturkunde der Humboldt Universität zu Berlin - *Nota lepidopterologica,* 23 (3/4): 192-352.

3209 ORTNER S. 2000 - Neu zur Fauna Mitteleuropas hinzugekommen Makrolepidopteren seit dem Standardwerk von Forster & Wohlfahrt Eulen - Noctuidae (Insecta: Lepidoptera) - *Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut,* 3: 150-154.

3210 PARENTI U. 2000 - A Guide to the Microlepidoptera of Europe - Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 436 pp, 156 Tavv.

3211 PARENZAN P., SCALERCIO S. 2000 - First record of *Setina irrorella* in Southern Italy and of *Setina roscida* in Abruzzo (Central Italy) with some considerations on european species of genus *Setina* (Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae) - XXI International Congress of Entomology - Foz do Iguassu, 20-26 August 2000, I: 277.

3212 PINZARI M. 2000 - Il comportamento territoriale di *Melitaea trivia* (Lepidoptera, Nymphalidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* LV (1-4): 67-134.

3213 RAINERI V., CARNEVALE P. 2000 - Le specie del genere *Colias* della collezione Bari conservate nel Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova (Lepidoptera Pieridae) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria",* Genova, XCII: 247-271.

3214 REZBANYAI-RESER L. 2000 - Zur Morphologie, Phänologie und Verbreitung von *Crocota tinctaria* Hübner, 1799, und der erst vor kurzem erkannten *C. pseudotinctaria* Leraut, 1999 (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologische Berichte Luzern,* 44: 137-162.

3215 REZBANYAI-RESER L., HAUSMANN A. 2000 - Über *Mythimna* (*Morphopoliana*) *languida* (Walker, 1858), eine neue, tropische Wanderfalterart Europas, und ihre Dundangaben in Nord- und Süditalien (Lepidoptera: Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, 31 (1/2): 77-85.

3216 RIGHINI D., BENDAZZI I. 2000 - *Hyles hippophaes* (Esper, 1793) in Emilia-Romagna (Insecta Lepidoptera Sphingidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 13: 53-55.

3217 ROVERSI P.F., BIN F. 2000 - A moth conceales eggs in the egg schells of another moth and escapes parasitoids - Proceeding Antonie Van Leeuwenhoek Symposium, 7° European Workshop on Insect Parasitoids, 1-16 October 2000, Haarlem, The Netherlands: 21.

3218 SALA G., BETTINI R. 2000 - Contributo alla conoscenza della lepidotterofauna (Lepidoptera, Hesperioides e Papilionoidea) del Comprensorio Gardesano e di altri biotopi del bresciano con la prima segnalazione di *Brenthis ino* per la provincia di Brescia (Primo aggiornamento sulla corologia e biologia delle farfalle diurne) - *"NATURA BRESCIANA" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali,* Brescia, 32: 77-88.

3219 SALERNO P., LORETI M., CARINI V. 2000 - Il complesso minerario della "Cava del ferro" (Appennino Umbro-Marchigiano, PG) - Federazione Speleologica Triestina, Bora 2000. Atti dell'Incontro Internazionale di Speleologia, Trieste, Baia di Sistiana - 1/5 novembre 2000: 23-36.

3220 SANNINO L., ESPINOSA B. 2000 - Comparative morphological study on pupae of Plusiinae and observations on the vice-like abdominal structure (Lepidoptera, Noctuidae) - *Atalanta,* Würzburg, 31 (1/2): 229-243.

3221 SCALERCIO S., PARENZAN P. 2000 - *Pandesma robusta* (Walker, 1858) (Noctuidae, Catocalinae) e *Calamodes subscudularia* (Turati, 1919) (Geometridae, Ennominae), specie nuove per la fauna dell'Italia continentale (Lepidoptera). (Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XXI) - *Entomologica,* Bari, 34: 133-142.

3222 SCIARRETTA A., ZILLI A. 2000 - Materiale per una fauna dei Nottuidi del Molise (Lepidoptera Noctuidae) - *Frustula entomologica* (1998) N. S. XXI (XXXIV): 149-195.

3223 VOLPE G., PALMIERI R., ARIANI A.P. 2000 - Lepidotteri diurni (Hesperioidea, Papilionoidea) del Parco Nazionale del Vesuvio. In: Elementi di biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvio - Ente Parco Nazionale del Vesuvio: 115-129, Napoli, Ed. Picariello O., Di Fusco N. & Fraissinet M.

3223bis VOLPE G., PALMIERI R., CATAUDO A. 2000 - Le farfalle del Parco - Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Napoli, 139 pp.

3224 YOSHINOBU NISAKA - 2000 - La situazione attuale dei Ropaloceri europei. Parte 2. Licenidi - *Yadoriga*, 184: 10-40, 8 Tavv. (in giapponese, nomi e località in caratteri latini)

3225 ZILLI A. 2000 - Endemismi italiani. *Pharmacis aemilianus* (Costantini, 1911) (Lepidoptera, Hepialidae) - *Bollettino della Associazione romana di Entomologia,* LV (1-4): I-II.

3226 AISTLEITNER E., AISTLEITNER U. 2000 - Weitere Notizen zur Schmetterlingsfauna von Pantelleria, den Pelagischen und Ägadischen Inseln (Italien, Sizilien) - *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft oesterreischen Entomologen,* 53: 93-100.

3227 BASSANI G., PENATI F., VIOLANI C. 2001 - Le Farfalle diurne (Insecta, Lepidoptera, Papilionoidea) della provincia di Sondrio (Lombardia, Italia settentrionale): dati di letteratura e di collezione - *Il Naturalista Valtellinese - Atti del Museo civico di Storia naturale di Morbegno,* 12: 95-156.

3228 BELLA S., DUCHI A., GALLETTI I., TURRISI G.F. 2001 - Contributo alla conoscenza della fauna di Cava Randello - *Quaderni di Botanica Ambientale e Applicata*, 12: 109-116.

3229 CASINI P.M. 2001 - Les premiers états *d'Euchloe tagis calvensis* Casini, 1993. Carte de répartition d'*Euchloe tagis* (Hübner, 1804) en Italie centrale. Considérations géologiques et zoogéologiques (Lepidoptera: Pieridae) - *Linneana Belgica,* XVIII (2): 75-86, Tavv. I-IV.

3230 CHIAVETTA M. 2001 - Le Farfalle d'Italia. Atlante Biogeografico. Aggiornamento 2001 - Nuova Editoriale Grasso, 28 pp.

3231 DAPPORTO L., LO CASCIO P. 2001 - Nuove segnalazioni di Lepidotteri Eteroceri per l'Arcipelago Eoliano (Mar Tirreno meridionale) (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 133 (2): 167-172.

3232 FABIANO F., VIGNALI V., DAPPORTO L. 2001 - Lepidotteri. In: Sforzi A. & Bartolozzi L., Libro rosso degli insetti della Toscana - Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel settore Agricolo-forestale, Firenze: 293-343.

3233 FALCI A. 2001 - Lepidotterofauna del comprensorio di Mimiani (Lepidoptera Hesperoidea et Papilionoidea) - *Il Naturalista siciliano,* S. IV, XXV (Suppl.): 443-464.

3234 FAVILLI L., MANGANELLI G. 2001 - La fauna. In: La Montagnola Senese, una guida naturalistica - Ed. "il mio amico", Roccastrada (GR), WWF Regione Toscana, Serie Scientifica, N. 7: 45-67.

3234bis FISCHER K., FIEDLER K. 2001 - Partiel biennalism in alpine *Lycaena hippothoe* (Lycaenidae: Lycaenini)? - *Nota lepidopterologica*, 24 (1/2): 73-76.

3235 FLAMIGNI C. 2001 - On the presence of *Phytometra sanctiflorentis* and *Heterophysa dumetorum* in Italy (Noctuidae) - *Nota lepidopterologica,* 24 (2): 37-38.

3236 FLAMIGNI C. 2001 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. N. 408 - *Eupithecia carpophagata* Stadinger, 1871 (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 133 (3): 272.

3237 FLAMIGNI C., BASTIA G., DAPPORTO L. 2001 - Nuove segnalazioni e note critiche sui Geometridi di Emilia, Romagna e Toscana. I Parte (Insecta lepidoptera, Geometridae: Ennominae, Oenochrominae, Geometrinae, Sterrhinae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 14: 89-112.

3238 GASPARO F., GOVERNATOLI G., STOCH F. 2001 - Osservazioni sulla fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee delle Prealpi Carniche orientali. In: Il fenomeno carsico delle Prealpi Carniche orientali (Friuli) - *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia,* s. II, XII: 75-88.

3239 GIANTI M. 2001 - Sulla presenza in Piemonte di alcune specie del genere *Idaea* Treitschke, 1825 (Lepidoptera, Geometridae) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 18 (2): 409-412.

3240 HAUSMANN A. 2001 - Introduction. Archiearinae, Orthostixinae, Desmobathrinae, Alsophilinae, Geometrinae - in A. Hausmann (ed.): The Geometrid Moths of Europe. Vol. 1: 1-282.

3241 HUEMER P. 2001 - Ökologische Bewertung nachtaktiver Schmetterlingsgemeinschaften (Lepidoptera) im Biotop Kalterer See (Südtirol) - *Gredleriana,* 1: 419-447.

3242 JUTZELER D., REBEUSEK F., SALA G., VERONIK R. 2001 - The confirmation of the specificity of *Erebia stirius* (Godart, 1824) and *Erebia styx* (Freyer, 1834), diagnosed by Lorkovic (1952) with a nomenclatural abstract concerning the specific names of the *styx*/*stirius*-complex (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (2nd part) - *Linneana Belgica,* XVIII (4): 175-186.

3243 KALLIES A. 2001 - Revision of the *Brachodes pumila* (Ochsenheimer, 1808) species-group (Sesioidea: Brachodidae) - *Nota lepidopterologica,* 24 (1-2): 7-19.

3244 LANA E. 2001 - Biospeleologia del Piemonte. Atlante fotografico sistematico - Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, Torino: 257 pp.

3245 LASTUVKA Z., LASTUVKA A. 2001 - The Sesiidae of Europe - Apollo Books, Stenstrup, 245 pp., 9 tavv.

3246 LATELLA L., STOCH F. 2001 - Biospeleologia. In: Grotte e fenomeno carsico - Quaderni Habitat, Museo Friulano di Storia Naturale, Udine: 158 pp.

3247 LONGO S., BARBAGALLO S., RAPISARDA C., TROPEA GARZIA G., MAZZEO G., SISCARO G., BELLA S. - 2001 - Note sull'Artropodofauna degli ambienti forestali ed agrari del Parco dell'Etna - *Tecnica Agricola,* LIII (3-4): 1-59.

3248 LUCIANO P., ROVERSI P.F. 2001 - Fillofagi delle querce in Italia - Industria Grafica Poddighe, Sassari, 161 pp.

3249 PARENZAN P., SCALERCIO S. 2001 - Presenza di *Setina irrorella* (Linnaeus, 1758) in Italia meridionale e di *Setina roscida* (Denis & Schiffermüller, 1775) in Abruzzo; considerazioni sulle specie europee del genere *Setina* Schranck (Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae) - *Entomologica,* Bari, 35: 89-101.

3250 RALLO G, ULIANA M. 2001 - Note su alcuni Lepidoptera di Valle Averto in Laguna di Venezia e dell'entroterra veneziano. Ricerche scientifiche nella Riserva naturale del W.W.F. di Valle dell'Avertp - 9 - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia,* 52: 103-112.

3251 RAVIGLIONE M., BOGGIO F. 2001 - Le Farfalle del Biellese - Collana Ambiente, Assessorato alla Tutela Ambientale, 371 pp.

3252 REZBANYAI-RESER L. 2001 - *Mythimna congrua* (Hübner, 1817) im Südtessin, eine Bestätigung für die Fauna der Schweiz, sowie weitere Südschweizer Fundangaben von *M. riparia* (Rambur, 1829) (Lep., Noctuidae) - *Entomologische Berichte Luzern,* 46: 147-150.

3253 RONKAY L., YELA J.L., HREBLAY M. 2001 - Noctuidae europaeae. Vol. 5. Hadeninae II - Entomological Press, Sorø: 452 pp.

3254 RUSSO P., BELLA S., PARENZAN P. 2001 - Contributo alla conoscenza dei Nottuidi della Sicilia (Lepidoptera, Noctuidae) - *Phytophaga,* Palermo, XI: 11-85.

3255 SALA G. 2001 - An interesting aberration of *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae) from Italy - *Linneana Belgica,* XVIII (2): 93-94.

3256 SANNINO L., ESPINOSA B., BALBIANI A. 2001 - Lepidotteri delle ortive e del tabacco - Ed. Edagricole della Calderini S.r.l., Bologna, 323 pp.

3257 SCALERCIO S. 2001 - Biodiversità e sinecologia dei Lepidotteri Ropaloceri nel paesaggio mediterraneo: la Sila Greca (Italia, Calabria) - *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi",* Bergamo, 20 (2000): 13-31.

3258 SCHMITT T., SEITZ A. 2001 - Intraspecific structuring of *Polyommatus coridon* (Lycaenidae) - *Nota lepidopterologica,* 24 (1/2): 53-63.

3259 SCIARRETTA A., PARENZAN P. 2001 - I Lepidotteri Ropaloceri del Molise (Italia Centrale) (Lepidoptera Hesperioidea, Papilionoidea) - *Phytophaga,* Palermo, XI: 87-104.

3260 SCIARRETTA A., RAINERI V. 2001 - Nuove conoscenze faunistiche sui Geometridi del Molise (Italia centrale) (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura,* Serie II, 33 (1): 19-41.

3261 TARASCO E. 2001 - Gli insetti dannosi alla coltura dell'asparago - *L'Informatore Agrario,* 50: 36-38.

3262 TRIGGIANI O., TARASCO E. 2001 - Preliminary attempts to control overwintering populations of *Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) with *Steinernema feltiae* (Filipjev, 1934) (Nematoda: Steinernematidae) - *Entomologica,* Bari, 35: 7-15.

3263 TRUSCH R., ERLACHER S. 2001 - Zur Morphologie, Verbreitung, Bionomie und Identification der *Dyscia*-Arten (Lepidoptera, Geometridae: Ennominae) - *Bonner Zoologische Monographien,* Nr. 49, 115 pp, 37 figg., 12 Tavv.

3264 VOLPE G., JUTZELER D. 2001 - Différenciation spécifique d'*Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763) et d'*Hipparchia alcyone* (Denis & Schiffermüller, 1776) de Campanie (Italie) et des régions limitrophes selon les caractères des ailes, des armatures génitales, de l'oeuf et de la chenille (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVIII (1): 1-26.

3265 VOLPE G., PALMIERI R. 2001 - Farfalle italiane. Hesperoidea, Papilionoidea, Zygaenoidea. 1. Campania e territori limitrofi - Edizioni Arion, Castel Volturno (Caserta), 164 pp.

3266 VOLPE G., PALMIERI R. 2001 - La conservazione delle farfalle diurne in Campania: Monte Maggiore, un biotopo da proteggere - *Uomo e Natura,* II (5/6): 34-38.

3267 VOLPE G., PALMIERI R. 2001 - Le farfalle del Monte Tifata (Caserta, Campania) (Lepidoptera Hesperoidea, Papilionoidea, Zygaenoidea) - *Libera Facoltà di Scienze Turistiche, Caserta, Coll. Studi e Ricerche sul Turismo,* N. S. XXIII; 337-350.

3268 ZILLI A., MALTZEFF P., PINZARI M., RAINERI V. 2001 - I Lepidotteri della tenuta presidenziale di Castelporziano (Lepidoptera) - *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia,* 56 (1-4): 13-48.

3269 ALMA A. 2001 - Ampelopatie causate da Lepidotteri e Coleotteri - *Atti dell'Accademia Italiana di Entomologia, Firenze, Rendiconti* L: 189-202.

3270 BALESTRAZZI E. 2002 - Lepidotteri diurni - *Atlante della biodiversità nel Parco Ticino.* Volume 1: 283-293.

3271 BENDAZZI I. 2002 - Brevi note sulla biologia ed etologia di *Hyles hyppophaes* (Esper, 1793) (Insecta Lepidoptera Sphingidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 16: 77-80.

3272 BERIO E. 2002 - Revisione delle Noctuidae (Lepidoptera) della collezione Turati - *Museo Regionale di Scienze Naturali,* Torino, Monografie XXXII, 524 pp, 180 figg.

3273 BERTACCINI E., FIUMI G. 2002 - Bombici e Sfingi d'Italia (Lepidoptera: Sesioidea). Volume IV - Filograf, Forlì: 181 pp.

3274 BRUNO S. 2002 - Lepidotteri della Puglia - Umanesimo della Pietra, Martina Franca, 232 pp.

3275 DAPPORTO L. 2002 - I Lepidotteri raccolti all'isola di Gorgona con trappola Malaise nel periodo 1999-2002 (Insecta, Lepidoptera) - *Frustula Entomologica,* n.s., XXV (XXXVIII): 49-56.

3276 DAPPORTO L., FABIANO F., NAPPINI S. 2002 - Segnalazioni di alcuni Lepidotteri rinvenuti nel Parco Naturale della Maremma e considerazioni biogeografiche - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 16 suppl.: 129-136.

3277 DAPPORTO L., STRUMIA F. 2002 - I macrolepidotteri raccolti nel Parco Naturale della Maremma con trappole Malayse e primo reperto di *Eupithecia sardoa* Dietze, 1910 nell'Italia peninsulare (Lepidoptera, Geometridae) - *Frustula Entomologica,* n.s., XXV (XXXVIII): 165-180.

3278 DE FREINA J.J., GECK M. 2002 - Bemerkungen zum *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)-Komplex, Beschreibung der Larvalstadien sizilianischer "*euphorbiae*" und die Frage, ob diese Populationen taxonomisch neu zu bewerten sind: *Hyles sammuti* Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 subspec. nov.? (Lepidoptera, Sphingidae) - *Atalanta,* Würzburg, 33 (3/4): 403-409, Tav. XXV-XXVI.

3279 DE MARTIN P. 2002 - Lepidotteri. Segnalazioni 110-142. In: Biodiversità della Laguna di Venezia - *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia,* 53: 292-301.

3280 DELL'AGATA M. 2002 - Il bombice del pino. Segnalazione della presenza di *Dendrolimus pini* L. in Abruzzo - *De rerum Natura*, X (31-32): 48-49.

3281 FABBRI A. 2002 - Indagine preliminare sui lepidotteri diurni lungo le siepi in aziende agricole biologiche del forlivese e cesenate (Insecta Lepidoptera Hesperioidea, Papilionoidea) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 16: 81-94.

3281bis FABIANO F., TERZANI F. 2002 - Nuovi reperti di *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) in Toscana (Insecta Lepidoptera Hesperiidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 16 (suppl.): 123-128.

3282 FAVILLI L., PIAZZINI S. 2002 - Farfalle. In: Monte Labbro. Alta Valle dell'Albegna - Ed. "il mio Amico", 128 pp.

3283 FLAMIGNI C., BASTIA G., DAPPORTO L. 2002 - Nuove segnalazioni e note critiche sui Geometridi di Emilia, Romagna e Toscana. II parte (Insecta Lepidoptera Geometridae: Larentiinae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 16: 37-76.

3284 FRACASSO A. 2002 - *Leptidea reali* (Reissinger, 1989): notre preliminari sulla distribuzione nel Nord-Est dell'Italia

(Lepidoptera Pieridae) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia,* 53: 149-154, 4 figg.

3285 GIANTI M. 2002 - Remarks on the morphology and habitat of *Glacies belzebuth* (Praviel, 1938) (Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 24 (4): 59-68.

3286 GIANTI M., GALLO E. 2002 - Nuovi dati sulla presenza in Italia settentrionale di *Leptidea reali* (Lepidoptera Pieridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 134 (1): 67-72.

3287 GRILL A., CRNJAR R., CASULA P., MENKEN S. 2002 - Applying the IUCN threat categories to island endemics: Sardinian butterflies (Italy) - *Journal Nature Conservation,* 10: 51-60.

3288 HACKER H., RONKAY L., HREBLAY M. 2002 - Noctuidae europaeae. Vol. 4. Hadeninae I - Entomological Press, Sorø: 419 pp.

3289 HÄTTENSCHWILER P. 2002 - Paarungsversuche mit verschiedenen Arten aus der Gattung *Rebelia* Heylaerts, 1900 (Lepidoptera, Psychidae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel,* 52 (1): 16-18.

3290 HENSLE J. 2002 - Zur Biologie von *Pieris mannii todaroana* Pincitore-Marott, 1879 (Lepidoptera, Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, 33 (1/2): 77-80.

3291 HENSLE J. 2002 - Nymphalidae, Danaidae, Lybitheidae und Lycaenidae 2001 - *Atalanta,* Würzburg, 33 (3/4): 271-302.

3292 HENSLE J. 2002 - Nymphalidae, Danaidae, Lybitheidae (Rest) und Lycaenidae 2000 - *Atalanta,* Würzburg, 33 (1/2): 34-36.

3293 HUEMER P. 2002 - Biomonitoring der Schmetterlingsfauna in Waldstandorten Südtirols und Trients (Lepidoptera) - *Linzer biologische Beiträge,* 34 (1): 199-264.

3293bis JUTZELER D., SALA G., MORANDINI C, VEROVNIK R., VOLPE G. 2002 - The identification, variation, races and distribution of *Erebia styx* (Freyer, 1834) and *E. stirius* (Godart, 1824) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (4th part of the *styx*/*stirius*-series devoted to *Erebia stirius*) - *Linneana Belgica,* XVIII (7): 335-350.

3294 JUTZELER D., SALA G., VEROVNIK R., VOLPE G. 2002 - The identification, variation, races and distribution of *Erebia styx* (Freyer, 1834) and *E. stirius* (Godart, 1824) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (3th part of the *styx*/*stirius*-series devoted to *Erebia stirius*) - *Linneana Belgica,* XVIII (5): 205-220.

3295 JUTZELER D., LEESTMANS R., DAIDÉ S., LAFRANCHIS T., SALA G., VOLPE G. 2002 - Comparaison de deux sous-espèces d'*Erebia ottomana* Herrich-Schäffer (1847): la ssp. *tardenota* Praviel (1941) du sud-est du Massif central (France) et de la ssp. *benacensis*

Dannehl (1933) du Mt. Baldo (Italie) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XVIII (8): 377-390.

3296 KALLIES A., SPATENKA K. 2002 - Four species of Brachodidae new to the fauna of Europe (Sesioidea) - *Nota lepidopterologica,* 25 (2/3): 155-160.

3297 KUDRNA O. 2002 - The Distribution Atlas of European Butterflies - *Oedippus, 20.*

3297bis LANG R. 2002 - *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, nun auch im mittleren Südosten Italiens in den Abruzzen nachgewiesen (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 112 (6): 162-163.

3298 PARENZAN P. 2002 - Macrolepidotterofauna della Riserva Naturale WWF "Lago di Pignola" - Basilicata, Potenza - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XXII. *Phytophaga,* Palermo, XII: 43-116.

3299 PARENZAN P., RUSSO P., BELLA S. - 2002 - *Eublemma pannonica* (Freyer, 1840) (Lepidoptera, Noctuidae), specie nuova per la fauna di Sicilia e italiana. Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna siciliana. IX - *Entomologica,* Bari, 36: 165-169, 1 fig.

3300 PIZZETTI L. 2002 - Fontanili di Besnate - Cavaria con Premezzo. Osservazioni preliminari sui macrolepidotteri (Lepidoptera: Rhopalocera et Eterocera) - *Atlante della biodiversità nel Parco Ticino.* Volume 2: 178-181.

3301 PIZZETTI L., PELLECCHIA M. 2002 - Manuale pratico per conoscere le falene che vivono negli ambienti del Parco del Taro - Parchi e Riserve dell'Emilia Romagna. Parco fluviale Regionale del Taro. Collana Naturalistica, 5. Falene, Graphital Parma: 50 pp.

3302 REZBANYAI-RESER L. 2002 - Sympatrisches Vorkommen von *Crocota tinctaria* (Hübner, 1799), und *pseudotinctaria* Leraut, 1999, swischen Olivone und dem Lukmanierpass, Nordosttessin, sowie weitere Fundorte in der Schweiz, in Italien und Frankreich (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologische Berichte Luzern,* 44: 137-162.

3303 SANNINO L., ESPINOSA B. 2002 - Note sulla morfologia degli stadi preimmaginali di *Idaea seriata* (Lepidoptera, Geometridae) - *Fragmenta entomologica,* Roma, 34 (1): 189-206.

3304 SCALERCIO S. 2002 - La fauna a Lepidotteri Ropaloceri della Sila Greca (Italia meridionale) (Lepidoptera Hesperoidea e Papilionoidea) - *Memorie della Società entomologica italiana,* 81: 167-204.

3305 SCIARRETTA A., ZAHM N. 2002 - I Macrolepidotteri dell' "Abetina di Rosello" (Abruzzo) con note faunistiche, biogeografiche ed ecologiche - *Phytophaga,* Palermo, XII: 25-42.

3306 SPEIDEL W., AARVIK L. 2002 - Synonyms of European Tortricidae and Noctuidae; with special reference to the pubblications of Hübner, Geyer and Frölich - *Nota lepidopterologica,* 25 (1): 17-21.

3307 TOMELLERI N., LATELLA L., VIGNA YAGLIANTI A. 2002 - Grotta e fauna dell'area carsica del Medicale e della Raia del Pedale (Cilento, Campania) - Atti 21° Incontro Internazionale di Speleologia, Nervesa della Battaglia, 1-3 Novembre 2002: 127-149.

3308 TRIBERTI P., ZILLI A. 2002 - Ordine Lepidoptera - In: Mason F., Cerretti P., Tagliapietra A., Speight M.C.D. & Zapparoli M., Invertebrati di una foresta della Pianura Padana - Bosco della Fontana - Gianluigi Arcari Ed., Mantova: 139-149.

3309 TRIGGIANI O., TARASCO E. 2002 - Efficacy and Persistence of Entomopathogenic Nematodes in Controlling Larval Populations of *Thaumetopoea pityocampa* (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - *Biocontrol Science and Technology,* 12: 747-752.

3310 USVELLI A. 2002 - 25 anni di ricerche entomologiche a Badia della Valle, Marradi (Firenze). I. Macrolepidotteri (Insecta Lepidoptera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* Cesena, 17: 61-76.

3311 VALENTINI V. 2002 - Le farfalle diurne di Parco Cacace (Lepidoptera Rhopalocera), in: Valentini V. & Medagli M., La Murgia crispianese di Parco Cacace - Congedo Editore, Galatina (LE): 63-85.

3312 VEGLIANTE F. 2002 - Le Farfalle della Val Chiarino. In: Chiarino, rocce, piante animali, uomini - Le Orme, Collana del Parco Naturale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, L'Aquila: 117-128.

3313 BERTACCINI E. 2002 - Prima segnalazione in Piemonte di *Agrodiaetus ripartii* (Freyer, 1831) e descrizione di *A. ripartii susae* ssp. nova (Insecta Lepidoptera Lycaenidae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 17 suppl.: 127-138, 22 figg.

3314 BERTACCINI R., CAMPRI V. 2003 - Alcuni Eteroceri inediti ed altri poco conosciuti per la Liguria occidentale (Insecta Lepidoptera Heterocera) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 17 suppl.: 119-126, 8 figg.

3315 BIERMANN H. 2003 - Tabellarische Übersicht über die Tagfalter der tyrrenischen Inseln und des angrenzenden Festlands (1. Nachtrag) (Lepidoptera, Hesperioidea, Papilionoidea) - *Atalanta,* Würzburg, 34 (3/4): 411-419.

3316 BRANDMAYR P., MINGOZZI T., SCALERCIO S., PASSALACQUA N., ROTONDARO F., PIZZOLOTTO R. 2003 - *Stipa austroitalica garigues* and mountain pastureland in the Pollino National Park (Calabria,

Southern Italy) - Pasture Landscapes and Nature Conservation, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg: 53-66.

3317 CAMERINI G., GROPPALI R. 2003 - Nuove segnalazioni di *Lycaena dispar* (Haworth) in pianura padana (Lepidoptera Rhopalocera) - *Pianura,* 17: 142-145.

3318 CASINI P.M. 2003 - Présence de *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898) à Florence (Italie) et notes sur son élevage (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XIX (4): 177-178.

3319 CASULA P., NICHOLS J.D. 2003 - Temporal variability of local abundance, sex ratio and activity in the Sardinian chalck hill blue butterfly - *Oecologia,* 136: 374-382.

3320 CERNIGLIARO A., DI BENEDETTO R., LEOTTA R. 2003 - Nuovi dati sulla presenza di macrolepidotteri in Sicilia (Lepidoptera) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 135 (3): 181-187.

3321 CERRETTI F., TAGLIAPIETRA A., TISATO M., VANIN S., MASON F., ZAPPAROLI M. 2003 - Artropodi dell'orizzonte del faggio nell'Appennino settentrionale. Primo contributo - Ed. Gianluigi Arcari, Mantova, 253 pp.

3321bis CIANCHI R., UNGARO A., MARINI M., BULLINI L. 2003 - SEM Differential patterns of hybridization and introgression between the swallowtails of *Papilio machaon* and *P. hospiton* from Sardinia and Corsica islands (Lepidoptera: Papilionidae) - *Molecular Ecology*, 12: 1461-1471.

3322 DAPPORTO L., BALDERI F., BIERMANN H., FABIANO F., NAPPINI S. 2003 - New data about Heterocera of Tuscan Archipelago (Insecta, Lepidoptera) - *Atalanta,* Würzburg, 34 (1/2): 135-151.

3323 DE FREINA J.J. 2003 - Zur Kenntnis der Biologie, Morphologie und Taxonomie von *Heterogynis andalusica* Daniel, 1966 sowie ergänzenden Bemerkungen zum Status von *Heterogynis thomas* Zilli, 1987 stat. rev. (Lepidoptera, Zygaenoidea, Heterogynidae) - *Atalanta,* Würzburg, 34 (1/2): 179-192, Tavv. XV-XIX.

3324 DELL'AGATA M. 2003 - Elenco sistematico delle falene del Lago di Penne - *De rerum Natura*, XI (35-36): 40-46 (integrato con i dati effettivi di cattura, Dell'Agata in litt.).

3325 ESPINOSA B., RUSSO G., DI MUCCIO P. 2003 - *Paysandisia archon*, una minaccia per le nostre palme - *L'Informatore Agrario,* 59 (7): 61.

3326 FLAMIGNI C. 2003 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 417 - *Orectis massiliensis* (Millière, (1864)) (Lepidoptera Noctuidae). 418 - *Pseudozarba bipartita* (Herrich-Schäffer, 1850) (Lepidoptera Noctuidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 135 (2): 117-118.

3327 FLAMIGNI C., BASTIA G. 2003 - Nuovi dati faunistici su alcune specie di Geometridi, Nottuidi e Nolidi dell'Italia centrale,

meridionale e insulare - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 17 suppl.: 79-86.

3328 FLAMIGNI C., BASTIA G. 2003 - Contributo alla conoscenza dei Geometridi delle Alpi italiane (Lepidoptera, Geometridae) - *Giornale italiano di Entomologia,* Cremona, 10: 237-250.

3329 FLAMIGNI C, BASTIA G. 2003 - I Geometridi del bolognese. I parte (Insecta Lepidoptera, Geometridae: Ennominae, Alsophilinae, Geometrinae, Sterrhinae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 17 suppl.: 87-118.

3330 GALLO E., GIANTI M. 2003 - Sulla presenza in Italia di *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) - *Doriana,* VIII (335): 1-8.

3331 GOATER B., RONKAY L., FIBIGER M. 2003 - Noctuidae Europaeae. Vol. 10. Catocalinae & Plusiinae - Entomological Press, Sorø: 452 pp.

3332 HÄTTENSCHWILER P. 2003 - *Phalacropteryx fritschi*, eine neue Psychide aus der Portugesischen Algarve (Psychidae) - *Nota lepidopterologica,* 26 (1/2): 9-18.

3333 HÄTTENSCHWILER P., SCALERCIO S. 2003 - Systematik, Morphologie und Verbreitung von *Taleporia defoliella* Constant, 1895 comb. rev. (Psychidae) - *Nota lepidopterologica,* 26 (1/2): 19-25.

3334 HAUSMANN A. 2003 - New Sterrhinae from Europe, North Africa, and the Caucasus (Lepidoptera, Geometridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 113 (11): 319-328, 10 figg.

3335° HENNINGS D. 2003 - Camaiore, Toskana (Alta Versilia), Nord-Italien. Beobachtungen am Licht 1989-2003 - Dattiloscritto non pubblicato, 13 pp.

3336 HUEMER P., NÄSSIG W.A. 2003 - Der Pfauenspinner *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763) sp. rev. im Gebiet der Ostalpen (Lepidoptera: Saturniidae) - *Entomologische Zeitschrift,* 113 (6): 180-190.

3337 JUTZELER D., CASULA P., GASCOIGNE-PEES M., GRILL A., LEIGHEB G. 2003 - Confirmation du status spécifique de *Polyommatus gennargenti* (Leigheb, 1987) de Sardaigne comparé à *Polyommatus coridon* (Pola, 1761) de la région de Schaffhouse (CH) par élevage parallèle (Lepidoptera: Lycaenidae) 1ère partie - *Linneana Belgica,* XIX (3): 109-118.

3338 JUTZELER D., CASULA P., GASCOIGNE-PEES M., LEIGHEB G., GRILL A. 2003 - Confirmation du status spécifique de *Polyommatus gennargenti* (Leigheb, 1987) de Sardaigne comparé à *Polyommatus coridon* (Poda, 1761) de la région de Schaffhouse (CH) par élevage parallèle (Lepidoptera: Lycaenidae) 2ème partie - *Linneana Belgica,* XIX (4): 149-160.

3339 JUTZELER D., LEIGHEB G., MANIL L., VILLA R., VOLPE G. 2003 - Deux espèces de Lycènes négligées de l'espace tyrhénien: *Lycaeides bellieri* Oberthür (1910) de Sardaigne et Corse et *Lycaeides villai* sp. n., de l'île d'Elbe (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XIX (2): 65-80.

3340 LONGO S. 2003 - Note sul Licenide sud-africano dei gerani *Cacyreus marshalli* (Lepidoptera Lycaenidae) nell'Italia meridionale - *Tecnica Agricola,* LV (4): 1-9.

3341 LUCIANO P., LENTINI A., CAO O.V. 2003 - La lotta ai lepidotteri defogliatori delle sughere in Provincia di Sassari - Industria Grafica Poddighe s.r.l., Sassari, 71 pp.

3342 MIRONOV L. 2003 - Larentiinae II (Perizomini and Eupitheciini) - In A. Hausmann (ed.): The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4: 1-463.

3343 PETRU M., LISKA J. 2003 - *Postsolenobia nanosella* sp. n. (Psychidae) from Slovenia - *Nota lepidopterologica,* 26 (1/2): 3-8.

3344 PINZARI P., PROLA C. 2003 - Nuovi dati sulle Sesiidae della fauna italiana (Lepidoptera Sesiidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 134 (3): 265-272.

3345 POVOLNY D. 2003 - The High-Mountain Geometridae of the Genus Psolos Treitschke and some questions of the problem of a species - XVth International Congress of Zoology, Sect. II, 17: 1-6.

3346 RUSSO L. 2003 - *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898) en Pouille et Campanie (Italie méridionale) (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XIX (4): 193-194.

3347 SCALERCIO S., INFUSINO M. 2003 - I Macrolepidotteri di fosso Scuotrapiti, lago dell'Angitola (Calabria, Italia meridionale) (Lepidoptera) - *Phytophaga,* Palermo, XIII (2003): 25-52.

3348 SCALERCIO S., INFUSINO M., NICOLAI F. 2003 - *Araeopteron ecphaea* (Hampson, 1914), specie nuova per la fauna italiana (Lepidoptera Noctuidae) - *Frustula entomologica,* n. s., XXIV (XXXVII) (2001): 111-115.

3349 SCIARRETTA A., ZAHM N. 2003 - *Eupithecia variostrigata* Alphéraky, 1878, eine neue Art für die Fauna Italiens (Lepidoptera: Geometridae) - *Entomologische Zeitschrift,* 113 (1): 29-30.

3350 SERENA F. 2003 - L'ambiente cavernicolo: aspetti ecologici e considerazioni sugli organismi che lo popolano, pp. 67-133. In: Atti del 27° Corso di III livello SSI di Biospeleologia - ARPAT, Livorno, 216 pp.

3351 TREMATERRA P., PARENZAN P. 2003 - *Cacyreus marshalli*, lepidottero in rapida diffusione sui gerani - *L'Informatore Agrario,* LIX (31): 57-60.

3352 TRIGGIANI O., TARASCO E. 2003 - Application of entomopathogenic nematodes in controlling overwintering larvae of *Thaumetopoea pityocampa* (Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) - *Insect Pathogenes and Insect Parasitic Nematodes, IOBC wprs Bulletin* 26 (1): 165-167.

3353 ULIANA M. 2003 - Nuove segnalazioni di Ropaloceri per i Colli Euganei (Lepidoptera Hesperoidea, Papilionoidea) - *Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali*, Venezia, 28: 79-80.

3354 VALENTINI V. 2003 - *Cupido alcetas* Hoff. e *Cupico argiades* Pall., altre due "perle" nello scrigno del territorio del Parco del Pollino - *Apollinea,* 7 (3): 18.

3355 VALENTINI V. 2003 - L'Aurora del glasto (= *Anthocharis damone* Boisd.), detta anche Aurora di Sicilia, ultima grande V.I.B. (= Very Important Butterfly) del Parco del Pollino - *Apollinea,* 7 (2): 18.

3356 ZAHM N. 2003 - Eine Wanderung von *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Sphingidae) - *Atalanta,* Würzburg, 34 (3/4): 393-394.

3357 ABRUZZESE C., DELL'AGATA M. 2003 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3358 ARNONE M., RAINERI V. 2004 - Catalogo dei Geometridae della collezione Mario Mariani (Lepidoptera) - *Il Naturalista Siciliano,* S. IV, XXVIII (2): 1065-1093.

3359 BESHKOV S., GRASSI A., ZILLI A. 2004 - *Caradrina* (*Paradrina*) *suscianja* (von Mentzer) in Central Italy (Lepidoptera: Noctuidae) - *Esperiana,* Schwanfeld, 10: 691-692.

3360 BONELLI S., CROCETTA A., BERBERO F., BALLETTO E. 2004 - Importanza della scelta femminile nell'ovideposizione di *Maculinea alcon* (Lepidoptera Lycaenidae) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. I: 185-190.

3361 CAMERINI G., CARONNI F., ROVERSI P.F. 2004 - Gradazioni di processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea* L.) in boschi planiziali: monitoraggio e controllo nel Parco Lombardo della Valle del Ticino (Lombardia - I) (Lepidoptera Thaumetopoeidae) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 879-883.

3362 CASULA P., SCANU D., CRNJAR R., GRILL A., MARCHI A. 2004 - The fragmented population structure of the Sardinian chalck hill blue butterfly (Lepidoptera, Lycaenidae) - *Journal for Nature Conservation,* 12: 77-83.

3363 CERBONESCHI A. 2004 - Risultati di cinque anni di osservazioni sul parassitismo determinato da *Blepharipa pratensis* (Meig.) e *Brachymeria intermedia* (Nees) su due popolazioni di *Lymantria*

dispar L. in Sardegna - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 849-854.

3363bis CERBONESCHI A. 2004 - Osservazioni sull'attività dei parassitoidi oofagi del lepidottero defogliatore *Lymantria dispar* L., in un soprassuolo a *Quercus suber* L. - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 843-848.

3364 CUPEDO F. 2004 - Geographische Variabilität uns spätglaziale Einwanderungswege von *Erebia pluto* (de Prunner, 1798) in der Ortlergruppe und den Ötztaler Alpen (Nymphalidae) - *Nota lepidopterologica,* 26 (3/4): 137-152, 7 figg. (2003).

3365 DAPPORTO L., FABIANO F. 2004 - Caratteri generali della lepidotterofauna toscana (Lepidoptera) - *Onychium,* 1: 28-32.

3366 DAPPORTO L., FABIANO F. 2004 - Due specie di lepidotteri nuove per l'Arcipelago Toscano: *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 e *Aletia languida* (Walker, 1858) (Lycaenidae, Noctuidae) - *Atti della Società toscana di Scienze naturali residente in Pisa,* Memorie serie B, 110 (2003): 1-2.

3367 DE ASCENTIIS A., DELL'AGATA M. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3368 DE FREINA J.J. 2004 - Ersnachweise von *Itoplectis maculator* (F.) als parasitoide Ichneumonide (Pimplinae) von *Heterogynis penella* (Hübner, (1819)) (Lepidoptera, Zygaenoidea, Heterogynidae; Hymenoptera, Ichneumonidae) - *Atalanta,* Würzburg, 35 (1/2): 117-118, Tav. Xb.

3369 DELL'AGATA M. 2004 - Segnalazione della presenza di *Drasteria cailino* (Lefebvre, 1827) in Abruzzo - *De rerum Natura*, XII (37-38): 76-77.

3370 FABBRI A., GIANTI M. 2004 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. N. 429. *Discoloxia blomeri* (Curtis, 1832) (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 136 (I): 76-77.

3371 FAVILLI L., PIAZZINI S., MANGANELLI G. 2004 - I Lepidotteri Ropaloceri (Hesperioidea e Papilionoidea) della Riserva Naturale "Monte Labbro" (Toscana meridionale) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 136 (3): 213-226.

3372 FAVILLI L., PIAZZINI S., MANGANELLI G. 2004 - Nuovi dati sulla distribuzione in Toscana meridionale di alcuni lepidotteri diurni (Papilionoidea, Hesperioidea) rari o poco noti - *Atti della Società toscana di Scienze naturali residente in Pisa,* Memorie serie B, CX (2003): 25-29.

3373 FISCHER H. 2004 - Beobachtungen zur Phänologie und zum Migrationsverhalten des Kleopatrafalters am Gardasee - sowie Ausarbeitung seiner nördlichsten Verbreitung anhand rezenter

und historischer Daten (Lepidoptera, Pieridae) - *Atalanta,* Würzburg, 35 (1/2): 21-25.

3374 GERMINARA G.S., ROTUNDO G., ANFORA G., DE CRISTOFARO A. 2004 - Comportamento di richiamo sessuale e rilascio del feromone in femmine vergini di *Malacosoma neustrium* (L.) (Lepidoptera Lasiocampidae) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 811-816.

3375 HACKER H.H. 2004 - Revision of the genus *Caradrina* Ochsenheimer, 1816, with notes on other genera of the tribus Caradrini (Lepidoptera, Noctuidae) - *Esperiana*, Schwanfeld, 10: 7-690, Tavv. 1-27.

3376 HAUSMANN A. 2004 - Sterrhinae - in A. Hausmann (ed.): The Geometrid Moths of Europe. Vol. 2: 1-600.

3377 HAUSMANN A., DÖTTERL S. 2004 - Nectar plants and larval food-plants of the genus *Glossotrophia* (Geometridae, Sterrhinae): studies on pollen grains attached to museum specimens - *Nota lepidopterologica,* 26 (3/4): 127-136, 11 figg., (2003).

3378 HELLMANN F., BERTACCINI E. 2004 - I Macrolepidotteri della Valle di Susa. Italia Nord-occidentale (Alpi Cozie-Graie) - Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze Naturali, Monografie XL, 389 pp., 16 Tavv.

3379 HUEMER P., MORANDINI C., MORIN L. 2004 - New Records of Lepidoptera for the Italian Fauna (Lepidoptera) (Nuove segnalazioni di Lepidotteri per la fauna italiana) - *Gortania, Atti Museo Friulano di Storia Naturale,* Udine, 26: 261-274.

3380 HUEMER P., TRIBERTI P. 2004 - Il Monte Pastello. I Lepidotteri - Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2. Serie. Monografie Naturalistiche, 1: 177-208.

3381 JUTZELER D., GASCOIGNE-PEES M., GRILLO N., TARRIER M., VILLA R., VOLPE G. 2004 - *Melitaea aetheriae* (Hübner, 1826) de Sicile et d'Afrique du Nord: nouvelles données écologiques, géonémiques et taxinomiques induites par un élevage de la souche sicilienne (Lepidoptera: Nymphalidae) - *Linneana Belgica,* XIX (9): 361-374.

3382 JUTZELER D., LEIGHEB G. 2004 - Évaluation du statut taxonomique des populations côtières sardes de *Lycaeides bellieri* Oberthür (1910) se fondant sur du matérial d'élevage provenant de l'île de la Maddalena, Sardaigne du Nord (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Linneana Belgica,* XIX (6): 285-290.

3383 LOI L., CANOVAI R. 2004 - Catalogo dei Ropaloceri (Lepidoptera Hesperoidea e Papilionoidea) presenti nella collezione del Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G.

Scaramuzzi" dell'Università di Pisa - *Frustula entomologica,* N. S. XXV (XXXVIII): 129-147.

3384 LONGO S, PULVIRENTI A., MAZZEO G., PAPPALARDO V. 2004 - Osservazioni sull'attività degli oofagi di *Lymantria dispar* (Lepidoptera Lymantriidae) in sugherete meridionali - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 817-821.

3384bis LUPI M. 2004 - Alcuni interessanti reperti di Lepidotteri per l'Italia settentrionale e zone limitrofe (Lepidoptera) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale,* 25: 239-246.

3385 MAZEL R., TAVOILLOT C., BRUSSEAUX G. 2004 - Quelle biogéographie pour *Cilix hispanica* Perez De-Gregorio & al., 2002? (Lepidoptera, Drepanidae) - *Revue de l'Association Roussillionnaise d'Entomologie, R.A.R.E.,* XII (3): 119-122 (2003).

3386 MAZZEI P. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3387 MAZZOGLIO P.J., SALVATO P., CURRADO I., PATETTA A., ZANE L., BATTISTI A. 2004 - Indagini biologiche e genetiche sulla processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) in Italia nord-occidentale - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 795-801.

3388 MÖRTTER R. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3389 NICCOLI A., PANZAVOLTA T., BONUOMO L., TIBERI R. 2004 - Insetti dannosi al frassino nell'Italia centrale - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 785-790.

3390 PANFILI R. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3391 PARENZAN PIETRO 2004 - Animalia Speluncarum Italiae - Congedo Editore, 160 pp., 56 figg.

3392 PELLECCHIA M., MARINI M., SCALI V. 2004 - Diversità mitocondriale nel *Papilio machaon* species complex (Papilionidae): evidenze dai geni CO I e NADH 4 - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. I: 131-134.

3393 PENSOTTI C.S.M. 2004 - Nuovo contributo alla conoscenza delle Farfalle diurne (Insecta, Lepidoptera, Hesperioidea e Papilionoidea) della provincia di Sondrio (Lombardia, Italia Settentrionale) - *Il Naturalista Valtellinese - Atti del Museo civico di Storia naturale di Morbegno,* 15: 29-59.

3394 RAINERI V., DELMASTRO G.B. 2004 - Alcune raccolte di Geometridi nel Piemonte occidentale (Lepidoptera Geometridae) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale,* 25: 209-238.

3395 RAVIGLIONE M.C., BOGGIO F. 2004 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. N. 431. *Pharmacis claudiae* (Kristal & Hirneisen, 1994) (Lepidoptera Hepialidae). - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 136 (I): 78.

3396 RIOLO P., NARDI S., CARBONI M., RIGA F., PIUNTI A., FERRACINI C., ALMA A., ISIDORO N. 2004 - *Paysandisia archon* (Lepidoptera, Castniidae): prima segnalazione di danni del pericoloso minatore delle palme sulla riviera adriatica - *Informatore Fitopatologico,* LIV (10): 28-31.

3397 RUSSO L. 2004 - Rhopalocères et Hespéridés de Pouille (Italia méridionale) (Lepidoptera: Rhopalocera et Hesperioidea). Données anciennes et mises à jour - *Linneana Belgica,* XIX (9): 387-392.

3398 SACCO M., ARATO E., D'AQUILA F., PASINI C. 2004 - Prove di difesa da *Cacyreus marshalli* Butler su geranio - Atti Giornate Fitopatologiche, 1: 201-206.

3399 SANNINO L., ESPINOSA B., LOGIURATO G., NIGRO C. 2004 - *Eriogaster lanestris* dannosa al melo in Basilicata (Lepidoptera Lasiocampidae) - Atti Giornate Fitopatologiche, 1: 29-30.

3400 SCALERCIO S. 2004 - I guardrails stradali come mezzo di campionamento dei Lepidotteri Psichidi: risultati faunistico-ecologici in due aree campione della Catena Costiera Paolana (Calabria, Italia) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. I: 191-196.

3401 SCALERCIO S. 2004 - Caratterizzazione della comunità dei macrolepidotteri eteroceri fototropici della pino-abetina di Monte Cocuzzo (Calabria, Italia) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. I: 237-242, 2 figg.

3402 SCIARRETTA A. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3403 SCIARRETTA A., TREMATERRA P. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3404 SIESA M., BONDESAN M. 2004 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. N. 430. *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 (Lepidoptera Lycaenidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 136 (I): 77.

3405 SPAMPINATO R., LONGO S., PULVIRENTI A. 2004 - Il controllo integrato della Processionaria del pino in pinete del Parco dell'Etna - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 885-899.

3406 SPICCIARELLI R. 2004 - La Psiche del Frassino - Consiglio Regionale della Basilicata, 175 pp.

3407 SPICCIARELLI R., FIMIANI P. 2004 - Chasse en Lucanie. Mont Vulture (Italie méridionale) (Lepidoptera Bombycoidea Brahmaeidae) - *Alexanor,* 22 (7) (2002): 411-415.

3408 TARASCO E. 2004 - La *Parahypopta caestrum* (Hübner) (Lepidoptera Cossidae) nelle asparagiaie di Puglia (nota preliminare) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. I: 667-670.

3409 TEOBALDELLI A. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3410 TIBERI R., ROVERSI P.F., RAPONI G., SABBATINI PEVERIERI G., PANZAVOLTA T., BROGI A. 2004 - Rilievo dei periodi di volo e studio degli indicatori biologici di *Lymantria dispar* (L.), in cedui a prevalenza di roverella dell'Italia centrale - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 837-842.

3411 TIMOSSI G. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3412 TRANFAGLIA A., ROMANO V.A., RIVIELLO L. 2004 - Entomofauna del pino loricato (Pinus leucodermis Antoine) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 943-948.

3413 TRIGGIANI O., TARASCO E. 2004 - Controllo invernale di *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera Thaumetopoeidae) con nematodi entomopatogeni - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 803-809.

3414 VARALDA P.G. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3415 VEGLIANTE F., ZILLI A. 2004 - Larval morphology of *Heterogynis* (Lepidoptera: Heterofynidae) - *Europea Journal of Entomology,* 101: 165-184.

3416 VERDINELLI M., PASSINO G.S., SERRA G., LUCIANO P. 2004 - Osservazioni sullo sviluppo e il comportamento delle larve di *Malacosoma neustrium* (L.) (Lep. Lasiocampidae) - Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania 10-15 giugno 2002, vol. II: 855-860.

3417 VIGLIOGLIA V. 2004 - Note preliminari sull'entomofauna del Parco degli Acquedotti (Roma) - *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia,* 59 (1-4): 1-18.

3418 VILLA R., RIGHINI D. 2004 - Early stages of *Gegenes nostrodamus* Fabricius, 1793 (Lepidoptera: Hesperiidae) - *Linneana Belgica,* XIX (6): 259-263.

3419 ZILLI A. 2004 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3420 AISTLEITNER U., POLLINI M. 2004 - Weitere Meldungen von *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, aus der Südschweiz und Oberitalien (Lepidoptera: Lycaenidae) - *Entomologische Berichte Luzern,* 52 (2004): 153-154.

3421 BALDIZZONE G., FIUMI G., GIANTI M. 2005 - Geometridae del Parco Naturale Alpi Marittime (Piemonte, Italia) (Lepidoptera) - *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino,* 22 (2): 443-516.

3422 BALLETTO E., BONELLI S. 6 CASSULO L. 2005 - Insecta Lepidoptera Zygaenoidea. In: Ruffo S., Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana - *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie, Sezione Scienza della Vita* 16: 257-258.

3423 BALLETTO E., BONELLI S., CASSULO L. 2005 - Insecta Lepidoptera Papilionoidea. In: Ruffo S., Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana - *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie, Sezione Scienza della Vita* 16: 259-263.

3424 BERTACCINI E. 2005 - Alcuni Psychidi dell'Emilia-Romagna particolarmente interessanti (Insecta Lepidoptera Psychidae) - *Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 21: 33-57.

3425 BORIANI L., BURGIO G., MARINI M., GENGHINI M. 2005 - Faunistic study on butterflies collected in Northern Italy rural landscape - *Bulletin of Insectology,* 58 (1): 49-56.

3426 CICERALE T., SCIARRETTA A. 2005 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 438. *Archirearis notha* (Hübner, (1803)) (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 137 (I): 65.

3427 CICERALE T., SCIARRETTA A. 2005 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3428 DAPPORTO L., FABIANO F., BALDERI F. 2005 - I Macrolepidotteri della Val di Farma (Toscana) - *Aldovrandia,* 1: 37-54.

3429 DAPPORTO L., FIORINI G., FIUMI G., FLAMIGNI C. 2005 - I Macrolepidotteri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi del Monte Falterona e di Campigna (Lepidoptera) - *Memorie della Società entomologica italiana,* Genova, 83: 179-248.

3430 DELL'AGATA M., DE ASCENTIIS A. 2005 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3431 ESPINOSA B., SANNINO L. 2005 - Note sulla morfologia dei primi stadi giovanili di *Cymbalophora pudica* (Esper) - Proceedings del

XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 265.

3432 FARNESI R.M., PIVOTTI I., BARILI A. 2005 - Farfalle vulnerabili in Umbria: quattro specie emblematiche - Proceedings del XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 140.

3433 FLAMIGNI C., ZANGHERI S., RALLO G., ULIANA M., GIANTI M. 2005 - Contributo alla conoscenza dei Geometridi del Veneto: litorale, Colli Euganei e pianura circostante (Lepidoptera Geometridae) - *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia,* 56: 113-135.

3434 GOVI G., FIUMI G. 2005 - *Macaria ichnusae* una nuova specie di Geometride della Sardegna (Insecta Lepidoptera Geometridae Ennominae) - *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna,* 21: 129-135.

3435 GRASSI A. 2005 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3436 GRASSI A., ZILLI A. 2005 - New data on the distribution and ecology of some italian species of *Eilema* and reappraisal of *Eilema marcida* new rank (Insecta, Lepidoptera: Arctiida)- *Aldovrandia,* 1: 5-15.

3437 JUTZELER D., FOURNIER F., SAVOUREY M., VOLPE G. 2005 - Biologie, répartition, histoire nomenlaturale et taxinomie d'*Erebia aethiopellus* Hoffmansegg (sic!) (1806) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XX (3): 75-87.

3438 JUTZELER D., VOLPE G. 2005 - Confirmation de la dualité du "Petit Sylvandre" diagnostiquée par Leraut, 1ère partie: clarification nomenclaturales et comparaison des stades larvaires d'*Hipparchia alcyone* Denis et Schiffermüller (1775) et d'*H. genava* Fruhstorfer (1908) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) - *Linneana Belgica,* XX (4): 145-160.

3439 KURZ M. 2005 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3440 LEIGHEB G., LEO P., CRNJAR R., BALLETTO E. 2005 - A distribution atlas of the butterflies of Sardinia (First part) - *Linneana Belgica,* XX (4): 135-144.

3441 LUCIANO P., CAO O.V. 2005 - Osservazioni sull'abbondanza di alcuni Geometridi fillofagi della Roverella in Sardegna - Proceedings del XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 307.

3442 MAZZOGLIO P.J., PAOLETTA M., PATETTA A., CURRADO I. 2005 - *Calliteara pudibunda* (Lepidoptera Lymantriidae) in Northwest Italy - *Bulletin of Insectology,* 58 (1): 25-34.

3443 PANFILI R. 2005 - Specie catturate durante la manifestazione European Moth Nights - www.european-moth-nights.ch.vu

3444 PENSOTTI C.S.M. 2005 - Prima segnalazione di *Carcharodus alceae* (Esper), *Carcharodus flocciferus* (Zeller) e *Pieris mannio* (Mayer) per la provincia di Sondrio (Insecta, Lepidoptera, Hesperiidae e Pieridae) - *Il Naturalista Valtellinese - Atti del Museo civico di Storia naturale di Morbegno,* 16: 63-65

3445 PORCELLI F., PERCOCO A., STINGI N., CAVALLO C. 2005 - Presenza di *Paysandisia archon* (Burmeister, 1880) (Lepidoptera Castniidae) e suoi danni in Puglia - Proceedings del XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 257.

3446 RIOLO P., ISIDORO N., NARDI S. 2005 - Indagini biologiche su un lepidottero minatore delle foglie delle palme di recente introduzione in Italia - Proceedings del XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 262.

3447 ROTUNDO G., PISAPIA G, GERMINARA G.S., DE CRISTOFARO A., PARENZAN P. 2005 - Risultati preliminari dello studio sulla macrolepidotterofauna della Riserva Man and Biosphere di Montedimezzo (Vastogirardi, IS) - Proceedings del XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 88.

3448 RUFFO S., STOCH F. (EDS.) 2005 - Checklist e distribuzione della fauna italiana - *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie, Sezione Scienza della Vita* 16, 307 pp.

3449 SALA G., CRNJAR R., GUIDI M. 2005 - *Polyommatus coridon nufrellensis* Schurian, 1977 (Lepidoptera: Lycaenidae) rediscovered - *Linneana Belgica,* XX (4): 121-122.

3450 SANNINO L., ESPINOSA B., CORTESE G., CAPONERO A. 2005 - Attacchi di *Spodoptera littoralis* (Boisduval) alla vite in Italia meridionale - Proceedings del XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 266.

3451 SCALERCIO S. 2005 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 437. *Eumasia parietariella* (Heydenreich, 1851) (Lepidoptera Psychidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 137 (I): 64.

3452 SCALERCIO S., SCIARRETTA A. 2005 - Segnalazioni faunistiche italiane N. 436. *Penestoglossa dardoinella* (Millière, 1865) (Lepidoptera Psychidae) - *Bollettino della Società entomologica italiana,* Genova, 137 (I): 63-64.

3453 SCIARRETTA A. 2005 - Macrolepidotteri dal bosco igrofilo Le Mortine (Campania-Molise), con segnalazione di *Cilix hispanica*, nuova per la fauna italiana - Proceedings XX Congresso Nazionale italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 giugno 2005: 104.

3454 SIESA M., BONDESAN M. 2005 - Primo censimento dei Lepidotteri Ropaloceri nel Parco lombardo del Grugnotorto: osservazioni su specie chiave - Proceedings del XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 138.

3455 TIMOSSI G. 2005 - Lepidotteri Eteroceri del Parco Nazionale Dolomiti bellunesi: primi interessanti reperti (Lepidoptera Geometridae, Noctuidae, Arctiidae) - *Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali,* Venezia, 30: 147-148.

3456 VALENTINI V. 2005 - E' arrivata anche a Taranto la Sudafricana "Licena dei gerani". Una farfalla sudafricana ora vola tra noi - *Apollinea,* 9 (5): 26-27.

3457 VOLPE G., PALMIERI R. 2005 - Le farfalle a volo diurno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Lepidoptera: Hesperoidea, Papilionoidea, Zygaenoidea, Noctuidea) - Tipolitografia Iannuzzi, Agropoli (SA), 231 pp.

3458 VOLPE G., PALMIERI R., JUTZELER D. 2005 - Nouveaux sites de *Melitaea diamina* (Lang, 1789) en Italie centro-méridionale avec discussion du statut taxonomique de deux populations montrant des différences dans la forme et le dessin dea ailes (Lepidoptera: Nymphalidae) - *Linneana Belgica,* XX (3): 103-111.

3459 ZILLI A. 2005 - Insecta Lepidoptera Hepialidae. In: Ruffo S., Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana - *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie, Sezione Scienza della Vita* 16: 255-256.

3460 ZILLI A. 2005 - Insecta Lepidoptera Noctuidae (Plusiinae, Noctuinae). In: Ruffo S., Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana - *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie, Sezione Scienza della Vita* 16: 264-268.

3461 ZILLI A., RONKAY L., FIBIGER M. 2005 - Noctuidae europaeae. Vol. 8. Apameini - Entomological Press, Sorø: 323 pp.

3461bis CABELLA C., FIORI F. 2006 - I macrolepidotteri della provincia di Alessandria (Piemonte sud-orientale) (Lepidoptera) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, Stazzano (AL), 27: 143-219.

3462 DAPPORTO L., MAGI F., STRUMIA F. 2005 - I Macrolepidotteri dell'area boschiva e retrodunale della Riserva di San Rossore (Pisa) - *Frustula entomologica,* XXXIX (2005): 20-45.

3462bis FAVILLI L., PIAZZINI S., MANGANELLI G. 2006 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. N. 450. *Pieris ergane* (Geyer, (1828)) (Lepidoptera Pieridae). N. 451 - *Lycaena thersamon* (Esper, 1784) (Lepidoptera Lycaenidae). - *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 138 (1): 78-79.

3463 FLAMIGNI C., FIUMI G., PARENZAN P., DAPPORTO L. 2006 - Lepidotteri eteroceri d'Italia. Vol. V. Geometridae Ennominae. I - Natura Edizioni Scientifiche, Bologna (in stampa)

3463bis GIANTI M., DELMASTRO B. 2006 - Prime notizie sulla presenza in territorio italiano di *Pharmacis bertrandi* (Le Cerf, 1936) (Lepidoptera Hepialidae) - *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, 27: 133-143.

3464 HUEMER H., MORANDINI C. 2006 - *Chesias angeri* Schawerda, 1919 stat. Rev., a long neglected species from northern Italy (Geometridae) - *Nota lepidopterologica,* 28 (3/4): 167-175.

3465 LEIGHEB G, LEO P, CRNJAR R., BALLETTO E. 2006 - A distribution atlas of the butterflies of Sardinia (Second part) - *Linneana Belgica,* XX (6): 234-244.

3465bis LUNARDINI S. 2006 - Macrolepidotteri Eteroceri delle Saline di Cervia (RA) (Insecta: Lepidoptera) - Tesi di Laurea, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2004-2005, Sess. III (15.III.2006), 80 pp., 15 Tavv.

3466 PARENZAN P., BELLA S., RUSSO P. 2006 - Sette specie di Lepidotteri (Lycaenidae, Geometridae, Noctuidae) nuove per la fauna di Sicilia (Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna siciliana. X) - *Entomologica,* Bari, 39 (2005): 61-70.

3467 PARENZAN P., SANNINO L., SCALERCIO S., SCIARRETTA A. 2006 - Nuovi dati sulla Macrolepidotterofauna dell'Italia meridionale (Lepidoptera) - *Entomologica,* Bari, 39 (2005): 183-206.

3468 RUSSO L. 2006 - Rhopalocères et Hespérides de Pouille (Italie méridionale). Addenda et mise à jour (Lepidoptera: Rhopalocera et Hesperioidea) - *Linneana Belgica, (in stampa)*

3469 SCALERCIO S., INFUSINO M. 2006 - I Macrolepidotteri notturni del basso corso della Fiumara del Trionto (Calabria, Italia meridionale) (Lepidoptera) - *Quaderni della Stazione di Ecologia, Ferrara (in stampa)*

3470 SCIARRETTA A., PARENZAN P., MANCINI M. 2006 - I Lepidotteri cavernicoli in Italia - Atti 3° Incontro di Studi "Il Carsismo nell'Area Mediterranea", Castro Marina (Lecce) 16 - 18 settembre 2005, *Thalassia salentina*, 29 (1): (in stampa)

3471 TIMOSSI G. 2006 - Lepidotteri Eteroceri del Parco Nazionale Dolomiti bellunesi: secondo contributo (Lepidoptera Geometridae, Noctuidae, Lymantriidae) - *(in stampa)*

3472 ZAHM N., CIESLAK A., HAUSMANN A. 2006 - *Perizoma barrassoi* species nova aus den Abruzzen (Lepidoptera Geometridae) - *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft,* 96: 31-35.

3473 ZILLI A., GRASSI A. 2006 - When disrupted characters between species link: a new species of *Conistra* from Sicily (Noctuidae) - *Nota lepidopterologica*, 29 (1/2): 95-111.

Indirizzo degli Autori - Author's Addresses

Prof. Paolo Parenzan - Dipartimento S.En.Fi.Mi.Zo, Sezione di Entomologia, Acarologia e Zoologia, Viale delle Scienze - I - 90128 Palermo (I - Italia). E-mail: paolo.paren@libero.it

Prof. Francesco Porcelli - Di.B.C.A., Sezione Entomologia e Zoologia, Facoltà di Agraria, Via Amendola, 165/a - 70126 Bari (I - Italia). E-mail: porcelli@agr.uniba.it

Indice delle specie

Il numero si riferisce al numero d'ordine delle specie nel testo

***abbreviata Eupithecia* 1323**
abencerragus 455
***abencerragus Pseudophilotes* 458**
abetonica 472
***abetonica Lycaeides* 473**
***abietaria Eupithecia* 1243**
***abluta Enargia* 1787**
ablutaria 1133
ablutaria 1139
***ablutaria Nebula* 1134**
abrotani 1635
***abruptaria Menophra* 789**
***abruzzensis Paradrina* 1736**
abscondita 1433
***absinthiata Eupithecia* 1283**
***absinthii Cucullia* 1632**
***acaciae Satyrium* 441**
***accentifera Ctenoplusia* 1558**
accipitrina 2067
***accreta Pyrgus* 358**
***aceraria Alsophila* 906**
***aceris Acronicta* 1426**
acetosellae 1791
***acetosellae Mesogona* 1790**
achatana 2299
achatina 1488
achilleae 165
achilleata 1303
***achine Lasiommata* 575**
achromaria 1133
***achromaria Nebula* 1139**
Acidalia 1021
acis 487
acquiaria 709
***actaea Satyrus* 640**
***actaeata Eupithecia* 1274**
***acteon Thymelicus* 368**
aculeata 263
***aculeata Dyspessa* 262**
***acuminaria Aspitates* 890**
adaequata 1226
***addictata Eupithecia* 1286**
***adippe Argynnis* 514**
adjunctaria 1029
admetus 504
***admetus Polyommatus* 500**
***adriana Hadena* 1934**
***adriaticus Triodia* 3**
***adspersella Diplodoma* 15**
***adulatrix Eutelia* 1548**
***adumbraria Euphyia* 1209**
***adusta Mniotype* 2093**
adustaria 1065
***adustaria Ochodontia* 1065**
***adustata Ligdia* 687**
advena 1895
***advenaria Cepphis* 722**
***aegeria Pararge* 570**
aegon 471
aelia 643
aelia 644
aëllo 658
aemilianus 13
aemilianus 6
aemilianus 7
aemilianus 8
***aemilianus Pharmacis* 8**
aemiliorum 902
***aemiliorum Compsoptera* 901**
***aemula Autographa* 1580**
***aemulata Horisme* 1190**
aenea 1542
***aerifrons Chamaesphecia* 241**
aeruginaria 930
aeruginea 2076
***aeruginea Dichonia* 2058**
***aerugula Nola* 2291**
***aescularia Alsophila* 905**
aesculi 266
aestimaria 702

***aestimaria Chiasmia* 701**
***aestivaria Hemithea* 919**
aestivata 232
aetherie 557
***aetherie Melitaea* 550**
aethiopalis 1459
***aethiopellus Erebia* 612**
aethiops 2079
aethiops 265
aethiops 612
***aethiops Erebia* 606**
aetna 371
aetnea 1548
***affinis Cardepia* 1893**
***affinis Cosmia* 1795**
***affinis Pyropteron* 234**
***affinitata Perizoma* 1220**
agamos 1498
***agaritharia Onychora* 900**
***agatha Aegle* 1702**
***agathina Xestia* 2246**
agestis 485
***agestis Aricia* 483**
***aglaja Argynnis* 513**
***agnorista Abrostola* 1552**
agricola 2119
agrostidis 88
***agrostidis Ptilocephala* 109**
***ain Syngrapha* 1585**
alaudaria 1193
***alaudaria Melanthia* 1194**
alba 1031
alba 1041
alba 1043
***alba Glossotrophia* 1042**
***albago Xanthodes* 1630**
***albanensis Bembecia* 218**
albanica 217
***albanica Adscita* 136**
***alberganus Erebia* 609**
***albicans Polyommatus* 499**
***albicillata Mesoleuca* 1128**
albicollis 1590
albicolon 1915
***albida Ptilocephala* 102**
***albimacula Hadena* 1936**
albimacularia 1219
***albina Platyperigea* 1725**
***albiocellaria Cyclophora* 1053**
albipuncta 1959
***albipuncta Mythimna* 1969**
***albipunctata Cyclophora* 1052**
albistrigatus 1476
***albitorquata Idaea* 982**
albonigrata 1159
***albovenosa Simyra* 1438**
***albovenosana Earias* 2306**
***albula Meganola* 2287**
albulana 2287
albularia 1227
***albulata Asthena* 1363**
***albulata Perizoma* 1227**
alceae 338
***alceae Carcharodus* 337**
***alcetas Cupido* 453**
alcetas. 452
***alchemillata Perizoma* 1221**
alchymillae 339
alchymista 1478
***alchymista Catephia* 1480**
***alciphron Lycaena* 425**
alcon 468
***alcon Maculinea* 467**
alcyone 644
***alcyone Hipparchia* 643**
***alecto Theretra* 332**
alepecurus 1848
***alexanor Papilio* 382**
alexis 492
***alexis Glaucopsyche* 461**
alfacariata 1140
alfacariensis 410
alfacariensis 414
***alfacariensis Colias* 415**
***algae Capsula* 1843**
***algae Cryphia* 1442**
***algira Dysgonia* 1488**
***algirica Jordanita* 141**
***aliena Lacanobia* 1906**
alliacea 1768

***alliaria Eupithecia* 1266**
allionia 652
allionii 653
allous 484
***almoravida Calophasia* 1664**
***alni Acronicta* 1422**
***alniaria Ennomos* 741**
***alopecuri Mythimna* 1964**
***alpestrella Pseudobankesia* 46**
alpestris 2342
***alpestris Chersotis* 2190**
***alpestris Setina* 2340**
alpicola 278
***alpicola Malacosoma* 279**
***alpicola Xestia* 2235**
alpicolaria 1230
alpicolella 27
***alpicolella Siederia* 34**
alpina 133
alpina 134
alpina 2081
***alpina Adscita* 132**
***alpina Epichnopterix* 78**
***alpina Lycia* 761**
***alpina Poecilocampa* 270**
***alpina Rhegmatophila* 1409**
alpina. 269
***alpinata Glacies* 885**
***alpium Moma* 1421**
alsines 1744
alsinides 1744
alsus 449
alternaria 693
alternata 1107
alternata 1221
***alternata Epirrhoe* 1106**
***alternata Macaria* 693**
altheae 339
alticauda-alba 1380
***alticolaria Glacies* 878**
alveolus 350
alveus 359
***alveus Pyrgus* 357**
***alysoniformis Chamaesphecia* 240**
***alyssumata Idaea* 962**
***amandus Polyommatus* 490**
***amasinus Triodia* 4**
amata 1049
amata 1050
amatusia 523
***ambigua Hoplodrina* 1749**
***ambiguata Kemtrognophos* 856**
ambrosiana 2132
***ambusta Atethmia* 1997**
***ambustaria Selidosema* 810**
amenata 1814
***amethystina Eucarta* 1782**
amicissima 2098
ammonia 1489
amoena 1617
amoenissima 1450
ampellophaga 131
***ampellophaga Theresimima* 130**
ampelophaga 130
amphidamas 420
***amurensis Laothoe* 311**
***amygdalaria Nychiodes* 788**
***anachoreta Clostera* 1382**
***analoga Eupithecia* 1244**
***anaphanes Autophila* 1528**
anapheles 1914
***anarrhini Amephana* 1677**
***anastomosis Clostera* 1383**
anatolica 2195
anatolica 2196
***anatolica Chersotis* 2197**
***anatolica Egira* 1996**
***anatolica Omphalophana* 1668**
anceps 2166
***anceps Apamea* 1849**
***anceps Peridea* 1415**
***ancilla Dysauxes* 2347**
ancipitalis 2290
andalusaria 785
***andalusiaria Nychiodes* 785**
***andereggaria Elophos* 876**
andereggi 2338

andereggii Chersotis **2188**
anderreggii Mythimna **1963**
andrenaeformis Synanthedon **206**
andromedae Pyrgus **347**
angelicae Zygaena **179**
angeri 1344
angeri Chesias **1345**
angularia 1072
angularia 822
angularia Scotopteryx **1073**
angulata 1050
angustella 109
anilis Mniotype **2094**
ankeraria Erannis **777**
annellata Chamaesphecia **247**
annularia Cyclophora **1054**
annulata 1054
anomala Stilbia **2112**
anonyma 563
anselminae 9
anselminae Pharmacis **11**
anseraria Asthena **1364**
anthemidis 1650
anthophilaria 1064
anthraciformis Chamaesphecia **251**
anthrax Chamaesphecia **238**
antiopa Nymphalis **538**
antiqua 2274
antiqua Orgyia **2272**
antiqualis Rhynchodontodes **1532**
antiquaria 952
antiquoides Orgyia **2273**
antirrhinii Omphalophana **1666**
antophilaria Casilda **1063**
aostae 1738
apenninigena 625
apfelbecki Pseudoxestia **1755**
apiciaria 734
apiformis 110
apiformis 195
apiformis 33
apiformis Phalacropterix **114**
apiformis Sesia **194**
apistella Bijugis **64**
apollinus Archon **375**
apollo Parnassius **378**
appendiculata Brachodes **183**
appensata Acasis **1376**
aprica 1590
aprilina 2061
aprilina Dichonia **2060**
aptata Colostygia **1168**
aquata Horisme **1192**
aqueata Colostygia **1170**
aquila Apamea **1847**
aquilina Euxoa **2131**
arabs Abromias **1860**
arachne 621
arbia 1980
arbusculae Eriogaster **273**
arbuti 1699
arcania Coenonympha **579**
arcerii 2278
archon Paysandisia **335**
arcuinna Odice **1602**
arcuosa 1839
ardua Epichnopterix **79**
arenacearia 713
arenacearia Tephrina **714**
arenaria Fagivorina **822**
areola Xylocampa **2116**
arethusa Arethusana **655**
arge 636
arge Melanargia **635**
argellus 473
argentaria Compsoptera **904**
argentea Cucullia **1633**
argenterae Dahlica **27**
argentina Spatalia **1418**
argentula 1598
argester 489
argiades Cupido **452**
argillaceago Polymixis **2087**

argiolus Celastrina **454**
argus 472
argus 473
argus Plebejus **471**
argyrognomon Lycaeides **477**
argyrotoxus 471
aridata 968
arion 465
arion Maculinea **464**
aristaeus 646
aristaeus 655
aristaeus Hipparchia **648**
armeniaca 2114
armeniaca Praestilbia **2115**
armeriae 1934
armigera 1710
armigera Helicoverpa **1713**
armoricanus 350
armoricanus 353
armoricanus Pyrgus **356**
artaxerxes Aricia **484**
artemisiae Cucullia **1635**
arterica 2339
artesiaria Macaria **697**
arundinis 1826
arundinis 267
arvernensis 619
asbestaria 985
asclepiadis Abrostola **1551**
asella Heterogenea **127**
asellaria 1031
asellaria Glossotrophia **1044**
aselliformis 191
ashworthii Xestia **2240**
asiatica Nycteola **2300**
asiliformis 209
asperaria Rhoptria **720**
aspersa Platyperigea **1728**
assimilaria Tephrina **716**
assimilata Eupithecia **1285**
associata 1144
astatiformis Chamaesphecia **257**
asteria Melitaea **559**
asteris Cucullia **1651**
astfälleri 2069
astragali 1518
astragali 222
astrarche 483
astrarche 484
astrella Narycia **17**
atalanta Vanessa **530**
athalia Melitaea **560**
atlantica Lymantria **2264**
atlanticaria Ekboarmia **820**
atomaria 711
atomaria Ematurga **828**
atra Acanthopsyche **88**
atrata Odezia **1354**
atriplicis Trachea **1771**
atropos Acherontia **313**
attenuaria 960
attenuaria Idaea **959**
auberti Crocallis **753**
augur Graphiphora **2215**
aulica Hyphoraia **2378**
aurago Tiliacea **2000**
aurantiaria Agriopis **774**
aurantiomaculata 2089
aurea 1573
aurelia 558
aurelia Melitaea **557**
aureliaria 933
aureola 2333
aureolaria Idaea **940**
auricoma Acronicta **1431**
auriflua 2280
aurinia 547
aurinia Euphydryas **545**
aurita Amephana **1678**
aurita Setina **2339**
auroraria 706
auroraria 942
ausonia 392
ausonia 393
ausonia 395
ausonia 396
ausonia Euchloë **394**
australis 1029
australis 414

australis 415
***australis Aporophyla* 2075**
***australis Stygia* 264**
***austriacaria Colostygia* 1174**
autumnalis 1180
autumnalis 1180
***autumnaria Ennomos* 739**
***autumnata Epirrita* 1215**
***autumnella Taleporia* 44**
***aversata Idaea* 1004**
***badiata Anticlea* 1126**
baetica 1679
***baetica Cleonymia* 1675**
***baeticus Carcharodus* 340**
***baja Xestia* 2241**
***bajaria Agriopis* 773**
***bajularia Comibaena* 914**
***balcanicus Tarucus* 446**
***baldensis Glacies* 887**
ballettoi 646
ballettoi 649
***ballus Tomares* 434**
banghaasi 2081
***banghaasi Omia* 1681**
***bankiana Deltote* 1598**
barbagiae 455
barbagiae 458
***barbagiae Pseudophilotes* 459**
barbalis 1466
barbalis 1467
barbara 1713
***barbarica Apaidia* 2315**
barnabeica 173
***barrassoi Perizoma* 1232**
barteli 1455
barthae 1653
basigramma 2155
basilinea 1850
basochesiata 1207
***basochesiata Catarhoe* 1098**
bassiaria 1234
***bastelbergeri Alcis* 815**
***bastelicaria Sardocyrnia* 799**
***bathseba Pyronia* 590**
***batis Thyatira* 660**
***baton Pseudophilotes* 455**
baumgartneri 224
beatricis 52
***beatricis Typhonia* 53**
***beckeraria Scopula* 1028**
beckeri 1570
***belemia Euchloë* 391**
***belemiata Idaea* 967**
belia 392
***belia Anthocharis* 388**
belinus 481
***bellargus Polyommatus* 495**
bellezina 395
***bellezina Euchloë* 396**
bellieri 1567
bellieri 360
bellieri 472
bellieri 475
***bellieri Charissa* 854**
***bellieri Euchalcia* 1568**
***bellieri Lycaeides* 474**
belzebub 610
***bembeciformis Sesia* 195**
***benesignata Pachycnemia* 732**
bengalensis 1559
***bentelii Glacies* 881**
berbera 1691
***berbera Amphipyra* 1692**
***berberata Pareulype* 1195**
***bertrandi Pharmacis* 9**
beryllaria 933
***betulae Thecla* 431**
***betularia Biston* 769**
***betulina Proutia* 56**
***biangulata Euphyia* 1206**
***bibioniformis Chamaesphecia* 250**
***bicolorana Bena* 2303**
bicolorata 1154
***bicolorata Hecatera* 1923**
bicolorella 109
bicoloria 1873
bicoloria 1878
***bicoloria Leucodonta* 1405**
***biconica Agrotis* 2158**

***bicruris Hadena* 1929**
bicuspidaria 1193
bicuspidaria 1194
***bicuspis Furcula* 1387**
***bidentata Odontopera* 749**
***bifaciata Perizoma* 1224**
***bifasciata Coscinia* 2352**
***bifasciata Grammodes* 1489**
***bifida Furcula* 1388**
***bigramma Agrotis* 2155**
bilinearia 1003
bilineata 1116
***bilineata Camptogramma* 1115**
biliosata 844
biliosata 928
bilunaria 745
bilunulata 1244
***bimaculata Lomographa* 837**
***bimaculosa Meganephria* 2109**
binaevata 725
***binaevata Petrophora* 724**
binaria 673
***binaria Watsonalla* 672**
binubeculosa 2190
***bipartita Pseudozarba* 1592**
bipuncta 665
***bipuncta Zobida* 2336**
***bipunctaria Scotopteryx* 1076**
***biren Papestra* 1910**
***birivia Euxoa* 2121**
biriviata 1208
***biriviata Xanthorhoe* 1085**
***bischoffi Polymixis* 2092**
***biselata Idaea* 990**
bisetata 990
bistortata 824
bistrigaria 776
bistrigata 1098
bistrigata 1115
***bistrigata Camptogramma* 1116**
blachieri 646
***blachieri Hipparchia* 650**
blanda 1746
blanda 1747
***blanda Hoplodrina* 1745**
***blandiata Perizoma* 1226**
***blandiatrix Eutelia* 1549**
blandina 606
blattariae 1653
***blattariae Shargacucullia* 1654**
***blenna Lacanobia* 1907**
blidaensis 2020
***blidaensis Agrochola* 2019**
***blomeri Discoloxia* 1360**
boeklini 982
boeklini 984
***boeticum Ocnogyna* 2356**
***boeticus Lampides* 442**
***boisduvalaria Crocallis* 754**
boisduvaliaria 754
bombycaria 761
***bombycella Bijugis* 62**
***bombycina Polia* 1895**
bombyliformis 316
bondii 1840
***borelii Gortyna* 1807**
braconiformis 229
braconiformis 230
***bractea Autographa* 1581**
bramafama 493
***brassicae Mamestra* 1913**
***brassicae Pieris* 399**
***breviculata Eupithecia* 1272**
***briseis Chazara* 657**
***britannica Thera* 1159**
***britomartis Melitaea* 558**
***brizae Zygaena* 153**
***brosiformis Tinthia* 192**
brumata 1217
***brumata Operophtera* 1216**
***brunnea Diarsia* 2225**
brunnearia 800
brunnearia 808
brunnearia 941
***brunnearia Selidosema* 807**
***brunneata Itame* 711**
bruzzanaria 1481

bryce 639
***bryoniae Pieris* 404**
bucephala 1413
***bucephala Phalera* 1412**
***bucephalina Phalera* 1413**
bucephaloides 1413
***bucephaloides Phalera* 1414**
***budensis Jordanita* 138**
bulgariata 1099
bupleuraria 927
***cacaliae Pyrgus* 348**
***caecigena Perisomena* 300**
***caecimacula Ammoconia* 2071**
caelibaria 876
***caelibaria Elophos* 874**
***caeruleocephala Diloba* 1697**
caerulescens 2091
***caesarea Phragmatobia* 2363**
***caesia Hadena* 1940**
caesiaria 1123
***caesiata Entephria* 1123**
***caestrum Parahypopta* 260**
***cailino Drasteria* 1494**
***caja Arctia* 2382**
calabra 1046
calabra 1048
***calabra Rhodostrophia* 1047**
calabraria 1047
calabraria 1048
calabrica 279
calaritana 1055
calberlae 116
calberlae 1570
calberlae 2112
***calberlae Stilbia* 2113**
***calberlai Lasionycta* 1949**
c-album 541
***c-album Polygonia* 535**
***calcaria Erebia* 618**
calcatrippae 1917
calcearia 980
calcescens 1945
***calendulae Cucullia* 1645**
caligans 2353
***caliginearia Chemerina* 771**
***caliginosa Acosmetia* 1722**
callidice 393
***callidice Pieris* 405**
calligrapha 1442
***calligraphata Horisme* 1191**
caloris 1590
***calunetaria Idaea* 966**
***calvaria Idia* 1456**
calvescens 2088
calvescens 2090
camastra 2031
***cambrica Venusia* 1361**
camelina 1406
camilla 563
***camilla Limenitis* 562**
***campanulae Cucullia* 1642**
campanulata 1289
camparia 982
***camparia Idaea* 984**
camuna 1955
***canaliculata Glacies* 880**
canaria 2007
***candelisequa Dichagyris* 2161**
***candens Lycaena* 429**
candida 2351
***candidana Eublemma* 1610**
candidaria 1227
candidata 1363
candidula 1621
***candidula Pseudeustrotia* 1600**
canensis 270
***canescens Aporophyla* 2080**
caninae 1654
caninae 1657
***caninae Shargacucullia* 1653**
***caniola Eilema* 2328**
canitiaria 868
cannae 1843
***canteneri Recoropha* 1683**
capicola 1753
***capitata Ecliptopera* 1148**
***cappa Hecatera* 1927**
caprearum 1607

caprearum Eublemma **1608**
capreolaria Puengeleria **846**
capriata 1346
capsincola Hadena **1930**
capsincoloides 1929
captiuncula Photedes **1838**
capucina 1408
capucina 1530
capucina Ptilodon **1406**
cararia Stegania **688**
carbonaria Macaria **699**
carbonis 2065
carbonis Dryobotodes **2066**
cardamines Anthocharis **387**
cardui Schinia **1705**
cardui Vanessa **531**
caricaria Scopula **1012**
caricis 1981
carlinae Pyrgus **354**
carmelita Odontosia **1408**
carmenta 619
carmenta Erebia **620**
carna Pharmacis **7**
carniolica 162
carniolica Zygaena **163**
carpinata Trichopteryx **1370**
carpophaga 1942
carpophagata Eupithecia **1262**
carthami Pyrgus **345**
carvalhoi Idaea **983**
cassandrata 1262
cassandrella Brachodes **186**
cassinia 1687
cassioides 618
cassioides Erebia **619**
cassiope 602
casta 1665
casta 2360
casta Psyche **60**
castanea Xestia **2244**
castaneae Phragmataecia **267**
castigata 1290
castor 630
castrensis Malacosoma **277**
cataphanes Autophila **1527**
catax Eriogaster **275**
cauchiata Eupithecia **1280**
c-aureum Lamprotes **1575**
cavernosa Hyssia **1912**
cecilia Pyronia **589**
celerio Hippotion **331**
celsia Staurophora **1800**
celsicola Yigoga **2166**
celtis Libythea **510**
cembrae Thera **1160**
cembrella 33
cemenelensis Cucullia **1637**
centaureae Pyrgus **349**
centaureata Eupithecia **1269**
centonalis 2291
centrago Atethmia **1998**
centralitaliae 357
centralitaliae Pyrgus **359**
cephiformis Synanthedon **215**
cerasi Orthosia **1986**
cerataria 718
cereola Setema **2337**
ceriaeformis 247
cerris 2065
cerris 2066
certata 1200
cervantaria Idaea **993**
cervantes 2181
cervantes Epipsilia **2182**
cervinalis Hydria **1200**
cervini Holoarctia **2368**
cespitis Tholera **1952**
ceto 609
chaerophyllata 1354
chalcidiformis 227
chalcidiformis 237
chalciformis Chamaesphecia **236**
chalciptera 1489
chalcites Chrysodeixis **1559**
chalcocnemis 227
chamaesyces 1419
chamaesyces 1420

chamomillae 1645
***chamomillae Cucullia* 1646**
chaonia 1396
characterea 1846
charlotta 513
charon 172
***charon Zygaena* 173**
***cheiranthi Plusidia* 1576**
***chenopodiata Scotopteryx* 1078**
chenopodii 1885
***chenopodiphaga Eremohadena* 1881**
***chi Antitype* 2068**
***chioleuca Aporophyla* 2076**
chiron 481
***chlamitulalis Nola* 2295**
chlamydulana 2295
***chloerata Pasiphila* 1340**
chloris 1442
chloris 1952
chloris 519
***chloros Jordanita* 142**
***chlorosata Petrophora* 723**
choenorrhini 1675
***christi Erebia* 603**
***christyi Epirrita* 1214**
chryseis 426
chrysidiformis 226
***chrysidiformis Pyropteron* 227**
***chrysippus Danaus* 659**
chrysitaria 781
***chrysitaria Athroolopha* 782**
***chrysitis Diachrysia* 1562**
chryson 1573
***chryson Diachrysia* 1561**
chrysoprasaria 929
***chrysoprasaria Hemistola* 928**
***chrysorrhoea Euproctis* 2279**
***chrysotheme Colias* 413**
chrysozona 1926
***cicatricalis Nola* 2290**
***ciliaris lugubris Typhonia* 52**
***cilium Spodoptera* 1753**
***cinctaria Cleora* 812**
***cineracea Cucullia* 1634**
cineraria 830
cinerascens 1724
cinerascens 1725
cinerascens 911
***cinerea Acronicta* 1433**
***cinerea Agrotis* 2139**
cinerina 1622
***cinnamomea Pyrois* 1689**
cinxia 542
***cinxia Melitaea* 548**
***circe Brintesia* 656**
***circellaris Agrochola* 2022**
***circuitaria Idaea* 964**
circumflexa 1560
***circumflexa Cornutiplusia* 1582**
***circumscripta Thysanoplusia* 1557**
***cirsii Pyrgus* 355**
***citrago Tiliacea* 1999**
citraria 892
***citrata Dysstroma* 1151**
civica 2379
clandestina 1865
clara 1937
***clara Hadena* 1941**
***clathrata Chiasmia* 700**
***clathrella Praesolenobia* 19**
***claudiae Pharmacis* 10**
***claustrella Bacotia* 55**
***clavaria Larentia* 1124**
clavata 1560
clavellata 848
***clavipalpis Paradrina* 1737**
***clavis Agrotis* 2143**
cleopatra 408
***cleopatra Gonepteryx* 417**
***clorana Earias* 2305**
***cloraria Chlorissa* 921**
clotho 632
***c-nigrum Xestia* 2237**
***coarctaria Scotopteryx* 1074**

coassata Lithostege **1358**
cocciferata Eupithecia **1325**
cochylioides 1611
cochylioides Eublemma **1612**
codetaria Tephronia **831**
codeti Synanthedon **210**
coenobita Panthea **2259**
coenosa Laelia **2282**
coerulata 1180
cognata 144
cognata 145
cognata Schinia **1706**
cognata Thera **1162**
cohaesa Xestia **2251**
colchica Stygioides **265**
collaria 720
collina Xestia **2248**
Colostygia **1169**
columbana Nycteola **2298**
comae 1049
comae Timandra **1050**
comes 2052
comes Noctua **2205**
comitata Pelurga **1129**
comitella Bruandia **57**
comma 1776
comma Hesperia **369**
comma Leucania **1974**
communimacula Calymma **1605**
commutaria 1034
complana Eilema **2326**
complanula 2325
completa Idaea **954**
compta 1934
compta Hadena **1932**
concinnula 1621
concordaria 704
confinaria 1031
confinaria 1042
confinaria Glossotrophia **1041**
confinis Cosmia **1794**
confusa 1582
confusa Hadena **1933**
confusa Macdunnoughia **1560**
confusalis Nola **2289**
confusaria 1098
congrua 1959
congrua Mythimna **1971**
congruata 1018
conigera Mythimna **1957**
conjuncta Catocala **1503**
conopiformis Synanthedon **211**
consanguinaria 987
consanguinaria Idaea **950**
consecraria 1063
consecraria Casilda **1064**
consobrinaria 813
consocia Lithophane **2044**
consolidata 994
consolidata Idaea **979**
consonaria Paradarisa **825**
consortaria 819
conspectaria Xanthorhoe **1097**
conspersa 1933
conspersaria Dyscia **893**
conspicillaris Egira **1995**
conspicua Euxoa **2119**
conspurcatella Bankesia **49**
constanti Dichagyris **2163**
contaminaria Adactylotis **829**
contaminei Zygaena **148**
conterminata Eupithecia **1336**
contestata Entephria **1121**
contigua Lacanobia **1902**
contiguaria Idaea **994**
contractella Pseudobankesia **47**
convergata Petrophora **725**
convergens Dichonia **2059**
conversa Catocala **1498**
convolvuli Agrius **312**
cooptata Eupithecia **1311**
coraciata 1150
coracina 882

coracina 883
***coracina Glacies* 884**
***cordigera Coranarta* 1891**
cordula 639
coretas 453
coridon 497
coridon 498
coridon 499
***coridon Polyommatus* 496**
corinna 579
corinna 585
***corinna Coenonympha* 583**
cornucata 2245
***corollaria Protorhoe* 1113**
coronata 1338
***coronillaria Pseudoterpna* 911**
corrigata 953
***corrivalaria Scopula* 1011**
***corsalta Aplocera* 1351**
corsica 2110
corsica 2277
corsica 231
corsica 471
corsica 472
corsica 474
corsica 476
corsica 477
corsica 864
corsica 866
***corsica Allophyes* 2111**
***corsica Euchrognophos* 865**
***corsica Hecatera* 1924**
***corsica Lycaeides* 475**
***corsica Ocnogyna* 2355**
***corsica Teia* 2276**
***corsica Zygaena* 150**
***corsicaria Pseudoterpna* 912**
corsicola 2125
***corsicola Euxoa* 2125**
corticaria 830
***corticata Horisme* 1185**
corticea 2143
***corylata Electrophaes* 1167**
***coryli Colocasia* 2261**
cos 2120
***cos Euxoa* 2130**
***cossus Cossus* 258**
costaestrigalis 1475
***costaestrigalis Schrankia* 1474**
crabroniformis 195
***craccae Lygephila* 1520**
cramera 483
***cramera Aricia* 482**
***crameri Euchloe* 392**
crassa 2155
crassa 2156
crassalis 1535
***crassalis Hypena* 1540**
***crassicornis Loebelia* 118**
***crassiorella Psyche* 61**
***crassipunctaria Dyscia* 894**
crataegata 733
***crataegi Aporia* 398**
***crataegi Trichiura* 271**
cremiaria 830
***cremiaria Tephronia* 832**
***crenata Apamea* 1848**
***crenata Gluphisia* 1411**
***crenulata Costignophos* 859**
crenulella 122
crepuscularia 825
***crepuscularia Ectropis* 824**
***cretaceata Eupithecia* 1279**
cretica 1976
***cretica Sesamia* 1879**
cretula 1625
creusa 374
cribralis 1460
***cribraria Coscinia* 2351**
***cribraria Orthostixis* 908**
cribrum 2351
***cribrumalis Macrochilo* 1460**
crinalis 1466
***crini Brithys* 1719**
***cristatula Nola* 2293**
***croatica Hemaris* 318**
***croceago Jodia* 2038**
croceus 410
croceus 412
croceus 413

croceus 415
***croceus Colias* 411**
croceus. 409
cruda 2023
***cruda Orthosia* 1987**
***cruentaria Lythria* 1068**
crypta 2127
cryptica 214
cubicularis 1737
cucubali 1916
***cuculata Catarhoe* 1102**
cuculla 1407
***cucullatella Nola* 2288**
***cuculliaria Eupithecia* 1242**
***cucullina Ptilodon* 1407**
***culiciformis Synanthedon* 202**
***culminicola Euxoa* 2134**
culoti 1728
culoti 2101
***culta Lamprosticta* 1686**
***cultraria Watsonalla* 674**
***cunea Hyphantria* 2372**
cuprea 138
***cuprea Chersotis* 2198**
cupreata 1098
***cupreata Euphyia* 1207**
***cupressata Thera* 1165**
curialis 2379
curoi 1815
***cursoria Euxoa* 2120**
curtula 1382
***curtula Clostera* 1380**
***curvatula Drepana* 675**
***cuspis Acronicta* 1423**
***cyanata Entephria* 1119**
cycloides 1753
***cyclopea Omia* 1682**
cyllarus 461
***cymbalariae Omia* 1680**
cymbalariata 865
***cynarae Zygaena* 151**
cynipiformis 209
***cynthia Euphydryas* 542**
***cynthia Samia* 303**
cyperi 1966
***cypreago Tiliacea* 2002**
cyrnea 233
***cyrnea Chersotis* 2194**
cythisaria 910
dactylidis 1966
***dahlii Diarsia* 2224**
***dahlii Hyles* 323**
dahlii. 322
dalmata 2180
***dalmata Standfussiana* 2176**
***dalmatica Amephana* 1679**
***dalmatina Nychiodes* 787**
***damon Polyommatus* 509**
***damone Anthocharis* 390**
danielata 1286
danieli 1398
dannehli 1818
dannehli 1819
dannehli 2226
daphne 518
***daphne Brenthis* 519**
***daphnis Polyommatus* 494**
daplidice 407
***daplidice Pieris* 406**
***dardoinaria Crocallis* 752**
***dardoinella Penestoglossa* 51**
***dardouini Metachrostis* 1628**
***darwiniana Coenonympha* 582**
***daubei Conistra* 2030**
***daubei Thysanoplusia* 1556**
davus 576
dayensis 1818
dealbata 888
***deaurata Panchrysia* 1573**
***debiliata Pasiphila* 1341**
***deceptoria Deltote* 1596**
***decimalis Tholera* 1953**
decolor 1863
***decolor Scopula* 1026**
***decoloraria Xanthorhoe* 1087**
decolorata 1228
***decora Euxoa* 2133**

decorata Scopula **1018**
decussata Schistostege **1355**
dedalus 489
defoliaria Erannis **776**
defoliella Taleporia **45**
degener 1442
degenerana Nycteola **2299**
degeneraria Idaea **1005**
deianira 575
deione Melitaea **554**
dejeani 1678
delius 377
dellabeffai Leptopterix **97**
dellabrunai 1645
delphinii Periphanes **1717**
denotata Eupithecia **1289**
dentaria Selenia **745**
dentata 756
denticulata Eupithecia **1293**
dentina 1911
deplana 2322
deplana 2323
depressa Eilema **2323**
depuncta Eugnorisma **2230**
derasa 661
derivalis 1458
derivata Anticlea **1127**
deserta Watsonarctia **2360**
designata Xanthorhoe **1086**
determinata Idaea **943**
detersa Auchmis **1776**
detrita Parocneria **2268**
devergens Syngrapha **1583**
deversaria 1367
deversaria Idaea **1007**
dia Boloria **525**
diamina Melitaea **553**
dianthi Hadula **1885**
dictaea 1400
dictaeoides 1401
dictynna 553
didyma 1868
didyma 1869
didyma Melitaea **552**
didymata Perizoma **1229**
diffinis Cosmia **1793**
dilecta Catocala **1508**
dilectaria Stegania **690**
dilucida Autophila **1525**
dilucidaria Elophos **867**
diluta Cymatophorina **666**
dilutaria Idaea **972**
dilutata Epirrita **1213**
dimeralis 1539
dimidia 2142
dimidiata 984
dimidiata Idaea **988**
diniensis 1073
diniensis 760
dipsacea 1708
dirempta 2156
disjuncta Catocala **1497**
disjunctaria 960
disjunctaria Xanthorhoe **1094**
dispar Lycaena **421**
dispar Lymantria **2263**
dissertata Eupithecia **1261**
dissimilata Cataclysme **1070**
dissimilis 1903
dissoluta Archanara **1832**
distinctaria Eupithecia **1308**
distinctaria Idaea **999**
distinctata Aleucis **839**
distinguenda Euxoa **2122**
ditrapezium Xestia **2238**
divergens 1584
diversa Catocala **1500**
divisa 1449
dodonaea Drymonia **1395**
dodoneata Eupithecia **1324**
dognini 867
dognini 869
dognini Elophos **870**
dolabraria Plagodis **729**
doleriformis 253
doleriformis Chamaesphecia **244**
dolus 508

dolus Polyommatus **507**
domestica Cryphia **1451**
dominula Callimorpha **2386**
donzelii 486
dorilis 423
dorus Coenonympha **585**
dorycnii Zygaena **175**
dorylas Polyommatus **489**
doryliformis 253
doryliformis Pyropteron **229**
doryliformis. 237
dotata 1143
dotata 1145
douglasi Bankesia **48**
dracunculi Cucullia **1650**
dragone Peribatodes **802**
dromedarius Notodonta **1391**
druentiata Eupithecia **1306**
dryas Minois **641**
dubia 1938
dubia Oligia **1877**
dubia Polymixis **2091**
dubia Teia **2278**
dubitata 1200
dubitata Triphosa **1203**
dujardini 2009
dumerilii Luperina **1814**
dumetata Odontognophos **851**
dumetorum Heterophysa **1765**
dumi Lemonia **304**
dumonti 247
dumonti Chamaesphecia **246**
duplaris Ochropacha **665**
duplicata 1349
duplicata 1358
duplicella Narycia **16**
duponchelaria 810
duponcheli Leptidea **385**
duponchelli 1356
duponchelli 1357
duponchelli Lithostege **1359**
dysodea 2089
dysodea Hecatera **1926**
eburnata 994
ecksteini Acanthopsyche **89**
ecphaea Araeopteron **1624**
edusa 406
edusa 411
edusa Pieris **407**
efflorata Idaea **958**
efformata Aplocera **1350**
effusa Pyrois **1690**
egea Polygonia **536**
egenaria Eupithecia **1267**
elbana 583
elbana Coenonympha **584**
electa Catocala **1505**
elegans 2197
elegans Chersotis **2196**
elinguaria Crocallis **751**
elisa Argynnis **516**
elocata Catocala **1506**
elongaria 987
elongaria Idaea **968**
elpenor Deilephila **329**
elychrysi Eublemma **1609**
emarginata Idaea **1002**
emortualis Trisateles **1629**
empiformis 256
empiformis Chamaesphecia **255**
empyrea 2074
emutaria Scopula **1037**
encausta 1719
enceladaea 2088
endogaea 2145
endogaea Agrotis **2144**
ephialtes Anthracia **1764**
ephialtes Zygaena **176**
ephialtes. 175
epiphron Erebia **602**
epomidion Apamea **1846**
eremita 128
eremita Dryobotodes **2062**
eremita Heterogynis **129**
ereptricula Cryphia **1447**
ergane Pieris **402**

ericae 2273
ericeata 1317
ericeata 1327
ericeata 1331
***ericeata Eupithecia* 1329**
ericetaria 807
erichi 1218
***eriphyle Erebia* 599**
***erminea Cerura* 1385**
***eros Polyommatus* 493**
***erosaria Ennomos* 743**
erubescens 1750
***eruta Euxoa* 2126**
erythia 655
***erythrina Lycophotia* 2222**
erythrocephala 1653
***erythrocephala Conistra* 2037**
erythroxylea 2147
erythrus 155
***erythrus Zygaena* 156**
***escheri Polyommatus* 488**
***esculi Satyrium* 440**
etrusca 2275
etrusca 606
***etruscaria Phaiogramma* 922**
***euceraeformis Chamaesphecia* 253**
eucrate 341
eucrate 342
eudora 595
***eugeniata Idaea* 998**
***eumedon Eumedonia* 481**
***eunomia Boloria* 521**
euphemus 465
euphenoides 388
***euphenoides Anthocharis* 389**
euphorbiae 1433
euphorbiae 324
***euphorbiae Acronicta* 1432**
***euphorbiae Hyles* 322**
euphrasiae 1432
euphrasiata 1317
***euphrosyne Boloria* 522**
euprepiata 1454
europaea 1244
europaea 1698
***europaea Acanthobrahmaea* 306**
***euryale Erebia* 598**
eurybia 426
eurybia 427
eurydame 426
***eurydame Lycaena* 427**
eurydice 426
evias 607
evidens 1914
***evonymaria Artiora* 748**
exanthemata 1012
***exanthemata Cabera* 836**
***exclamationis Agrotis* 2153**
***exigua Spodoptera* 1752**
***exiguata Eupithecia* 1253**
exoletata 1186
***exoletata Horisme* 1188**
***expallidata Eupithecia* 1284**
***exsiccata Lygephila* 1522**
***exsoleta Xylena* 2050**
extarsaria 958
extensalis 1537
extersaria 826
extraversaria 1237
***extraversaria Eupithecia* 1268**
***extrema Photedes* 1841**
***extremata Eupithecia* 1254**
exuberans 500
exuberans 503
***exuberans Polyommatus* 504**
exulae 322
***exulans Zygaena* 168**
exulis 1865
eynensata 1262
***fabressei Polyommatus* 501**
***faceta Cerastis* 2256**
fagana 2304
***fagaria Dyscia* 895**
***fagata Operophtera* 1217**
fagi 643
fagi 646

fagi Hipparchia **642**
fagi Stauropus **1416**
faillae 2112
faillae Stilbia **2114**
faillata 950
falcataria 675
falcataria Drepana **676**
falconaria 863
falleri 2131
falsalis Zebeeba **1547**
famula Bichroma **704**
famula Dysauxes **2348**
farinata Lithostege **1357**
farinosa 2088
faroulti 1872
fascelina Dicallomera **2270**
fascelis 551
fasciana 1595
fasciaria 845
fasciaria Hylaea **844**
fasciata Arctia **2381**
fasciolaria 1068
fasciolaria Narraga **705**
fasciuncula Oligia **1878**
fatidica Agrotis **2137**
fatua Hipparchia **653**
fauna 652
fausta Zygaena **162**
faustinata Phaiogramma **923**
febretta Oiketicoides **85**
feisthamelaria 1092
fenestrella Thyris **268**
fenestrina 268
ferchaultella 54
ferdinandi Dasypolia **2082**
ferrago Mythimna **1970**
ferrieri 1674
ferrugata 1085
ferrugata 1088
ferrugata Xanthorhoe **1089**
ferruginea 2022
ferruginea Rusina **1763**
ferula 641
ferula Satyrus **639**
festiva 2226
festiva Arctia **2385**
festucae Plusia **1587**
fidia 646
fidia Hipparchia **654**
filacearia 940
filacearia Cleta **937**
filicata Idaea **956**
filigrama 1939
filipendulae 165
filipendulae 177
filipendulae Zygaena **180**
filograna Hadena **1939**
fimbria 2201
fimbrialis Thalera **927**
fimbria-minor 2206
fimbriata Noctua **2201**
fimbriola Chersotis **2199**
fiorii 1807
fiorii 2304
firmata Pennithera **1155**
fissipuncta 1789
fixa Synthymia **1704**
flabellaria Apochima **770**
flamignii 911
flammata 711
flammatra Basistriga **2169**
flammea Panolis **1983**
flammea Senta **1982**
flammea Trigonophora **2074**
flammeolaria Hydrelia **1365**
flava 1703
flava 367
flavago Gortyna **1803**
flavata Entephria **1118**
flaveola 2329
flaveolaria Idaea **941**
flavescens 186
flavescens 189
flavescens 2004
flavescens Brachodes **187**
flavia Arctia **2383**
flavicans Setina **2342**
flavicincta Polymixis **2089**
flavicinctata Entephria **1120**
flavicornis Achlya **670**

flavicrinalis Pechipogo **1468**
flavida Bembecia **223**
flavidaria 713
flavirena Paradrina **1741**
flaviventris Synanthedon **205**
flavofasciata Erebia **601**
flavofasciata Perizoma **1228**
flexula Laspeyria **1513**
floccifera Carcharodus **339**
florella Catopsilia **408**
florentina 1711
florentina 758
florentina 762
florentina 766
florentina Lycia **763**
florida Diarsia **2228**
floslactata Scopula **1035**
fluctuata Xanthorhoe **1093**
fluctuosa Tetheella **664**
fluviaria 1084
fluviata 1084
fluxa Photedes **1837**
foeniformis 251
fontis 1540
forcipula 2092
forcipula 2162
forcipula Yigoga **2165**
formicaeformis Synanthedon **203**
formosa Cucullia **1631**
formosaria Chariaspilates **889**
foulquieri 361
foulquieri Pyrgus **360**
fovea Rileyiana **2055**
fractilineata 992
fractilineata Idaea **991**
fragariae Orbona **2052**
franciscae Gortyna **1805**
franconica 279
franconica Malacosoma **278**
fraudatricula 1441
fraudatricula Cryphia **1440**
fraxini Catocala **1502**
fritillarius 345
fritillum 351
fritillum 355
fritillum 359
friulana 38
frontis 1540
frustata Euphyia **1210**
fucata 2000
fuciformis 316
fuciformis Hemaris **317**
fucosa Amphipoea **1812**
fugax Parexarnis **2174**
fulgens 1752
fulgurita Brachodes **188**
fuliginaria Parascotia **1545**
fuliginosa 2362
fuliginosa Phragmatobia **2361**
fulminea 1899
fulminea Catocala **1495**
fulvago 2001
fulvago 2004
fulvaria 1062
fulvaria 711
fulvata Cidaria **1153**
fulvia 165
fumata 1034
fumosa 2129
fumosella 23
funebris Sympistis **1669**
funerea 1847
funesta 1669
funesta Aedia **1478**
furcata Hydriomena **1179**
furcifera 2045
furcifera Lithophane **2043**
furcula Furcula **1386**
furuncula 1878
furuncula Mesoligia **1873**
furva 2056
furva Abromias **1861**
furvata Gnophos **847**
furvula Athetis **1758**
fusca 1541
fusca Pygmaena **721**
fusca Sterrhopterix **119**
fuscago 1751

***fuscantaria Ennomos* 742**
fuscicornis 1729
***fuscicornis Paradrina* 1735**
fuscinula 1386
fusconebulosa 8
***fusconebulosa Pharmacis* 6**
***fuscovenosa Idaea* 973**
fuscula 1595
gaderensis 215
gaigeri 752
galactina 1934
galassii 1807
***galathea Melanargia* 633**
***galiata Epirrhoe* 1108**
***gallii Hyles* 324**
galloi 1568
galloi 503
***galloi Euchalcia* 1567**
***galloi Polyommatus* 505**
***gamma Autographa* 1577**
***ganna Gazoryctra* 1**
gardetta 576
***gardetta Coenonympha* 581**
***gemellata Eupithecia* 1310**
gemina 1845
***geminipuncta Lenisa* 1830**
gemmaria 801
gemmata 1084
***gemmea Crypsedra* 1799**
***genava Hipparchia* 644**
geneata 1162
***generosensis Dahlica* 24**
genistae 1900
gennargenti 496
***gennargenti Polyommatus* 497**
***geographica Oxicesta* 1419**
geometrica 1489
***germainii Platyperigea* 1731**
***geryon Adscita* 135**
gianellaria 1020
gibbiata 1163
gigantea 1468
***gilva Eremodrina* 1743**
gilvago 2002
***gilvago Xanthia* 2005**
***gilvaria Aspitates* 891**
gilveola 2329
giraffina 1406
glacialis 610
glacialis 627
***glacialis Oeneis* 658**
glaciegenita 545
***glaciegenita Euphydryas* 547**
glandifera 1452
***glandon Agriades* 478**
glarea 1625
***glarearia Heliomata* 691**
glareosa 2193
***glareosa Eugnorisma* 2229**
glauca 1910
glaucata 679
***glaucata Cilix* 678**
***glaucina Episema* 2100**
glaucinalis 1458
glaucinaria 858
***glaucinaria Rhopalognophos* 863**
glaucinaria. 862
glaucinarius 859
globulariae 138
***globulariae Jordanita* 144**
***gluteosa Athetis* 1757**
glycerion 586
***glycerion Coenonympha* 580**
***glyphica Euclidia* 1491**
***gnaphalii Cucullia* 1648**
***gnoma Pheosia* 1401**
goante 625
Gonepteryx 408
gonostigma 2272
gonostigma 2274
***gorge Erebia* 611**
***gorgone Erebia* 614**
gorgophone 612
***gothica Orthosia* 1991**
gozmanyi 1912
***gozmanyi Shargacucullia* 1656**
gracilis 1954
***gracilis Orthosia* 1989**

graeca Boloria **529**
graecarius 763
graecarius Lycia **762**
graminaria 924
graminella 107
graminifera Phalacropterix **115**
graminis Cerapteryx **1951**
grammica 2350
grammiptera 2196
grammiptera 2197
graphata Eupithecia **1312**
graslinella Phalacropterix **117**
gratiosata Eupithecia **1271**
grisea Platyperigea **1726**
grisealis Herminia **1462**
griseanova 1000
griseata 1050
griseata Lithostege **1356**
griseata Timandra **1049**
griseola 2311
griseola Eilema **2324**
griseola Paidia **2312**
griseovariegata 1983
grisescens Epipsilia **2183**
grossulariata Abraxas **683**
grueneri 2101
grueneri Episema **2099**
gryphalis Polypogon **1465**
gueneata Eupithecia **1270**
gueneei 1820
guenéei Hadena **1935**
gutta 1560
haematidea Agrochola **2021**
haifae Agrotis **2145**
halimi Eremohadena **1882**
halterata Lobophora **1368**
hamata 1607
hamifera Calophasia **1662**
hamula 672
harpagula Sabra **677**
harterti Menophra **792**
hartigi 1474
hartigi 1643
hartigi Cardepia **1894**
hartigi Cucullia **1644**
hartigi Schrankia **1475**
hartigi Sciopetris **50**
hastata Rheumaptera **1197**
hastifera Euxoa **2132**
hastulata Epirrhoe **1103**
haworthiata Eupithecia **1239**
hebe 2385
hecate Brenthis **520**
hecta Phymatopus **12**
hector 139
hecuba 611
heliaca 1699
helicinella Apterona **123**
helicoidella Apterona **121**
helicoidella Apterona **122**
heliophila Sympistis **1670**
helix 121
helle Lycaena **420**
hellenica 2335
helveticaria 1277
helvetina Rhyacia **2184**
helvola Agrochola **2017**
hepararia 1362
hepatica 1846
hepatica 2041
hepatica Polia **1896**
hepialina 263
hera 2387
herbaria 925
herbaria Microloxia **924**
herbariata 971
herbida 2254
hermelina 1388
hermione 642
hermione 643
hermione 644
hermione 646
hero Coenonympha **586**
herrichiella Rebelia **73**
herzogi Agrotis **2146**
Hesperia 371
hesperica Hoplodrina **1747**
hexapterata 1368
heydeni 368

heylaertsii 86
hibiscae 341
hiera 573
hilaris Tholera **1954**
himmighoffeni Bembecia **224**
himmighoffeni Eublemma **1620**
hippocastanaria Pachycnemia **730**
hippocrepidis Zygaena **178**
hipponoë 425
hippophaes 324
hippophaes Hyles **327**
hippothoe 428
hippothoë Lycaena **426**
hirsuta 2082
hirsuta Autophila **1523**
hirsuta Canephora **91**
hirsuta. 92
hirsutella 119
hirsutella Leptopterix **95**
hirta Ulochlaena **2106**
hirtaria Lycia **760**
hirtata 884
hispana 499
hispana Polyommatus **498**
hispanica 1967
hispanica 2320
hispanica 678
hispanica Cilix **679**
hispida 2103
hispidaria Apocheima **758**
histriana 760
hochenwarthi Syngrapha **1584**
hofmanni Reisseronia **66**
holosericata 972
homochromata Liodesina **727**
honestata 1018
honestata Scopula **1019**
honoraria Campaea **843**
hornigaria 952
horrida 1859
horridaria 885
hospes Proxenus **1760**
hospiton Papilio **381**
hucherardi 1811
humedasae Polyommatus **502**
humidalis Hypenodes **1473**
humiliata Idaea **974**
humilis Agrochola **2012**
humuli Hepialus **13**
hyale 410
hyale Colias **414**
hydrata Perizoma **1222**
hyemalis 681
hylaeiformis Pennisetia **193**
hylaris Zygaena **161**
hylas 455
hylas 489
hymenaea Catocala **1501**
hymenopteriformis Bembecia **216**
hyperantus Aphantopus **591**
hyperborea 2235
hyperici Actinotia **1779**
i-album 536
iana Conistra **2027bis**
iberica Bembecia **220**
ibericata Nebula **1140**
icarius 490
icarus Polyommatus **492**
ichneumoniformis 221
ichneumoniformis Bembecia **217**
ichnusa 533
ichnusa Aglais **534**
ichnusae Macaria **698**
ichnusaria 801
i-cinctum Perigrapha **1994**
icterata 1292
icterata Eupithecia **1291**
icteritia Xanthia **2004**
icteropus 229
icteropus 253
ida 589
idas 477
idas Lycaeides **472**
ilia 567

ilia 569
***ilia Apatura* 568**
***ilicaria Peribatodes* 806**
***ilicifolia Phyllodesma* 289**
ilicis 437
***ilicis Satyrium* 439**
ilicis. 440
***illunaris Clytie* 1486**
illustris 1566
***illyria Apamea* 1851**
***imbecilla Lasionycta* 1950**
***imitaria Scopula* 1032**
immaculata 928
immaculataria 1012
immanata 1151
***immorata Scopula* 1009**
***immundata Eupithecia* 1240**
immutaria 1030
***immutata Scopula* 1033**
***implexa Saragossa* 1919**
***impluviata Hydriomena* 1180**
impudens 1956
***impura Mythimna* 1959**
***impurata Eupithecia* 1294**
inamoena 1602
***incalcarata Idaea* 960**
incana 1650
incanaria 980
***incanata Scopula* 1029**
incarnaria 1000
***incarnata Chazaria* 1718**
incerta 51
***incerta Orthosia* 1984**
***inclinata Idaea* 992**
***inconspicuaria Tephrina* 715**
inconspicuella 31
***inconspicuella Dahlica* 30**
***incultaria Perizoma* 1231**
incultraria 1231
***incursata Xanthorhoe* 1096**
indelicata 1698
indigata 1319
***indigata Eupithecia* 1315**
***indigenata Eucrostes* 932**
indiges 1856
iners 1788
***ines Melanargia* 638**
***infausta Aglaope* 146**
infesta 1849
***infidaria Entephria* 1122**
***infirmaria Idaea* 995**
infusca 1741
***ingrata Platyperigea* 1732**
ingrica 2044
innocentaria 894
innocentaria 895
***innocentaria Dyscia* 896**
innocentaria. 893
innotata 2002
***innotata Eupithecia* 1319**
***ino Brenthis* 518**
inornata 1006
***inquinata Idaea* 971**
***insigniata Eupithecia* 1255**
***insolitus Paranthrene* 198**
instabilis 1984
***insulana Earias* 2308**
insularis 1827
insularis 2112
insularis 2114
insularis 391
***insularis Euchloë* 397**
***insularis Phragmitiphila* 1828**
***insularis Zethes* 1481**
insularis. 392
insularis. 396
insulicola 2178
***insulicola Standfussiana* 2179**
***interjecta Noctua* 2206**
interjectaria 973
intermedia 544
***intermedia Euphydryas* 543**
***intermedia Neognophina* 861**
intermediaria 1064
***interposita Noctua* 2204**
interpunctaria Myinodes

907
***interrogationis Syngrapha* 1586**
intricata 2031
***intricata Conistra* 2032**
***intricata Eupithecia* 1277**
***inturbata Eupithecia* 1238**
inustaria 1039
***inustaria Scopula* 1038**
***io Inachis* 532**
***iolas Iolana* 463**
iphis 580
***ipsilon Agrotis* 2154**
iris 568
***iris Apatura* 569**
***irregularis Hadena* 1943**
***irriguata Eupithecia* 1252**
irritaria 1249
***irritaria Luperina* 1818**
***irrorella Setina* 2338**
***isabella Chesias* 1346**
isabellae 764
***isabellae Lycia* 765**
isogrammaria 1239
italica 132
italica 1477
italica 1569
italica 1716
italica 2109
italica 2116
italica 2117
italica 417
italica 426
italica 427
***italica Adscita* 133**
***italica Euchalcia* 1570**
***italica Lycaena* 428**
italicata 1007
italicata 1282
***italohelveticus Costignophos* 860**
***jacobaeae Tyria* 2388**
jacobsi 1741
janira 594
***janthe Noctua* 2207**
janthina 2209
***janthina Noctua* 2208**
japygia 632
***japygiaria Menophra* 790**
***jasius Charaxes* 566**
***jaspidea Valeria* 2108**
***joannisi Leucania* 1980**
jocosa 1699
jolaus 645
***jonis Antitype* 2070**
***jordani Xestia* 2245**
***jota Autographa* 1579**
***jourdanaria Compsoptera* 903**
***jubata Alcis* 816**
***jucunda Odice* 1604**
***juliella Postsolenobia* 38**
juliensis 1118
junceti 1752
junci 1837
juniperata 1163
***juniperata Thera* 1163**
jurtina 592
***jurtina Maniola* 594**
***juventina Callopistria* 1780**
***kadenii Platyperigea* 1729**
***kaeckeritziana Aegle* 1703**
***kahri Ptilocephala* 106**
kalavrytana 218
***kalchbergi Hypenodes* 1472**
***karavankensis Montanima* 67**
karsandra 447
***karsandra Zizeeria* 448**
***kermesina Xestia* 2249**
***khalildja Metopoceras* 1685**
***kindermanni Agrochola* 2013**
***kitschelti Colostygia* 1175**
***kitti Sideridis* 1918**
***klimeschi Dahlica* 32**
knysna 448
***knysna Zizeeria* 447**
kollariaria 1123
***kollariaria Colostygia* 1173**
***kovacsi Epichnopterix* 84**
kruegeri 1938

kruegeri 2
kruegeri 2265
kruegeri 2294
kruegeri 2343
kruegeri 2345
kruegeri 63
***kruegeri Luperina* 1817**
***kruegeri Rebelia* 70**
***kruegeri Syntomis* 2346**
kuhlweini 2341
***labecula Dryobota* 2056**
***lacernaria Rhypagla* 1625**
***lacertinaria Falcaria* 671**
lachesis 638
***lachesis Melanargia* 634**
lactata 1035
lactearia 931
***lactearia Jodis* 930**
lacteola 2328
***lactucae Cucullia* 1639**
***laeta Zygaena* 152**
laetaria 1173
***laetaria Colostygia* 1177**
***laevigata Idaea* 957**
***laevis Agrochola* 2023**
***laichartingella Diplodoma* 14**
lajonquierei 2089
l-album 541
***l-album Mythimna* 1972**
lamda 2043
***lamda Lithophane* 2045**
lamii 1773
***lampra Sideridis* 1914**
***lanceata Eupithecia* 1332**
lanceolata 1657
***lanestris Eriogaster* 272**
languida 1977
***languida Mythimna* 1968**
***lapidata Coenocalpe* 1182**
lapidea 2047
***lapidea Lithophane* 2048**
***lapidella Luffia* 54**
***lapidicola Lymantria* 2265**
lappona 600
lappona 630
lappona 631
***lapponaria Lycia* 764**
***laquaearia Eupithecia* 1248**
***larella Dahlica* 28**
***lariciata Eupithecia* 1334**
***larixia Chersotis* 2195**
laspeyres 215
***lata Agrotis* 2156**
***latens Epipsilia* 2181**
***lateritia Abromias* 1863**
latevittata 644
***latevittata Epirrhoe* 1110**
***lathonia Issoria* 517**
lathyri 153
lathyri 385
latiorella 51
***latreillei Callopistria* 1781**
***latruncula Oligia* 1875**
***laudeti Enterpia* 1928**
L-aureum 1558
laurinata 1187
***lavandulae Zygaena* 174**
***lavatherae Carcharodus* 338**
***lazuri Dahlica* 23**
leautieri 2048
***leautieri Lithophane* 2047**
lecerfi 225
lecerfi 227
***ledereri Ocneria* 2267**
lefebvrei 371
legatella 1346
***legatella Chesias* 1343**
leighebi 646
***leighebi Hipparchia* 647**
leighebi. 648
leineri 1920
leineri 1920
leipnitzi 947
***leipnitzi Idaea* 948**
lenta 1758
***lentiscaria Dyscia* 897**
***lentiscata Eupithecia* 1302**
***leoi Dahlica* 25**
lepida 1942
lepida 2250
***lepigone Proxenus* 1761**

***leporina Acronicta* 1427**
***leucogaster Ochropleura* 2173**
leucographa 1807
leucographa 1903
***leucographa Cerastis* 2257**
***leucomelaena Pyropteron* 233**
leucomelas 1478
***leucomelas Aedia* 1479**
leucophaea 1899
***leucophaearia Agriopis* 772**
***leucopsiformis Chamaesphecia* 254**
***leucostigma Helotropha* 1801**
leucothoe 564
***levana Araschnia* 537**
***levantina Paradrina* 1740**
***libatrix Scoliopteryx* 1531**
libyoides 1836
***libyssa Coscinia* 2353**
***lichenaria Cleorodes* 821**
***lichenea Polymixis* 2084**
***lichenella Dahlica* 22**
ligata 2343
ligea 608
***ligea Erebia* 597**
lignaria 1083
ligniperda 258
lignosa 2147
***ligula Conistra* 2028**
***liguriata Eupithecia* 1250**
***ligustri Craniophora* 1435**
***ligustri Sphinx* 314**
***limacodes Apoda* 126**
limbaria 707
***limbaria Isturgia* 706**
***limbata Autophila* 1524**
***limbata Eupithecia* 1249**
limitata 1078
limosa 1521
***limosa Pachypasa* 285**
linariae 1661
***linariata Eupithecia* 1245**
linea 367
***linearia Cyclophora* 1061**
***lineata Siona* 888**
***lineola Thymelicus* 366**
lineolata 1123
***linogrisea Epilecta* 2210**
***literosa Litoligia* 1872**
lithargyria 1970
lithargyrula 2092
***lithographata Eupithecia* 1295**
lithoriza 2116
***lithoxylaea Abromias* 1858**
lithoxylea 1858
litigiosaria 945
***litigiosaria Idaea* 944**
litterata 1492
***littoralis Spodoptera* 1754**
litura 2016
***litura Agrochola* 2015**
liturata 694
***liturata Macaria* 695**
***livida Amphipyra* 1694**
***lividalis Hypena* 1539**
lividaria 1062
lividaria 784
lividaria 785
***livornica Hyles* 328**
***l-nigrum Actornis* 2284**
lobulina 288
loewii 249
***longaria Idaea* 976**
lonicerae 182
***lonicerae Zygaena* 181**
***loranthi Synanthedon* 214**
loreyi 1976
***loreyi Leucania* 1981**
***lorezi Xestia* 2236**
***loricaria Itame* 712**
***lorquinii Cupido* 451**
lota 1990
***lota Agrochola* 2018**
***loti Zygaena* 165**
lubricipeda 2369
***lubricipeda Spilosoma* 2370**
lucasi 106
lucernea 2179

lucernea Standfussiana **2178**
lucida 1591
lucida Acontia **1590**
lucifuga Cucullia **1640**
lucilla 565
lucina Hamearis **418**
lucipara Euplexia **1772**
lucipeta Rhyacia **2186**
luctifera 2363
luctuata 1103
luctuata Spargania **1196**
luctuosa Diaphora **2375**
luctuosa Tyta **1477**
ludicra Lygephila **1517**
ludifica Trichosea **2260**
ludificata Nebula **1138**
lueneburgensis 2077
lueneburgensis Aporophyla **2078**
lugdunaria Perizoma **1223**
lugubrata 1196
lunalis Zanclognatha **1469**
lunaria 746
lunaria 747
lunaris Minucia **1484**
lunata 1807
lunigera Cosmotriche **288**
lunosa Omphaloscelis **2026**
lunula Calophasia **1661**
lunularia Selenia **746**
lupina Catocala **1511**
lupinus Hyponephele **596**
lupulina Korscheltellus **5**
luridata 1042
luridata 826
luridata Scopula **1031**
luridata Scotopteryx **1080**
lurideola Eilema **2325**
lusoria 1518
lusoria Lygephila **1516**
lutarella Eilema **2332**
lutea 2003
lutea 2332
lutea 2370
lutea Oiketicoides **86**
lutea Spilosoma **2369**
luteago Conisania **1922**
lutearia 778
luteata 1365
luteocincta Hadena **1938**
luteola 2323
luteola 2332
luteolaria 1061
luteolaria Idaea **939**
luteolata Opisthograptis **733**
luteostrigata 1251
lutosa Rhizedra **1825**
lutulenta 2078
lutulenta Aporophyla **2077**
Lycaena 473
lycaon Hyponephele **595**
lychnidis Agrochola **2007**
lychnitis Shargacucullia **1658**
lycidas 470
lythoxylata Carsia **1348**
mabillei Denticullus **1836**
machaon Papilio **380**
macilenta Agrochola **2020**
macilentaria Idaea **952**
maculania 2379
macularia Pseudopanthera **736**
maculatus 815
maculosa Chelis **2358**
maeoticaria 1303
maera Lasiommata **574**
magnaiolas 463
magnolii Hadena **1931**
maillardi Abromias **1864**
maja 512
majorella Rebelia **71**
malvae 1630
malvae 359
malvae Pyrgus **350**
malvata Larentia **1125**
malvinella Ptilocephala **101**
malvoides 350
malvoides Pyrgus **351**
manicaria Idaea **977**

manicata 1780
manni 134
***mannii Adscita* 137**
***mannii Eosolenobia* 18**
***mannii Pieris* 400**
***mansueta Agrochola* 2024**
***manto Erebia* 600**
manuelaria 806
maravignae 2199
marchandae 393
***marcida Eilema* 2331**
***margarita Axia* 333**
margaritacea 2229
***margaritacea Chersotis* 2193**
***margaritaria Campaea* 842**
margaritosa 2223
***marginaria Agriopis* 775**
marginata 1714
***marginata Lomaspilis* 686**
marginepunctata 1366
***marginepunctata Scopula* 1030**
mariae 1215
***mariae Solitanea* 1218**
marica 268
maritima 1684
***maritima Chilodes* 1756**
***maritima Heliothis* 1709**
maritimaria 1007
marjana 2346
***marjana Syntomis* 2345**
marmorata 1151
***marmorella Dahlica* 29**
marmorosa 1884
marpessa 70
marrubii 340
***marshalli Cacyreus* 443**
***masariformis Chamaesphecia* 249**
masellaeformis 221
***massiliata Eupithecia* 1326**
massiliensis 1455
***massiliensis Orectis* 1454**
***matronula Pericallia* 2380**
***matura Thalpophila* 1769**
***maturna Euphydryas* 544**
***maura Mormo* 1766**
maurusia 238
***maurusia Chamaesphecia* 239**
medea 606
medea 608
***mediaria Idaea* 947**
medicaginis 280
medio-ochracea 1445
mediterranea 110
medon 611
medusa 628
***medusa Erebia* 608**
***megacephala Acronicta* 1428**
megaera 571
megera 572
***megera Lasiommata* 571**
***megillaeformis Bembecia* 221**
***meierella Siederia* 36**
***melagona Drymonia* 1397**
melaleuca 1670
***melampus Erebia* 605**
***melanaria Arichanna* 817**
***melanocephala Sesia* 196**
melanochroa 1937
melanomorpha 2097
melanopa 1670
***melanopa Hadula* 1889**
***melanops Glaucopsyche* 462**
melanotica 635
***melas Erebia* 627**
meleager 462
meleager 494
meliloti 172
***mellinata Eulithis* 1144**
***melliniformis Synanthedon* 207**
***menadiara Kuchleria* 925**
menalcas 508
mendacula 1442
mendacula 1628
mendaculalis 1626
***mendica Diaphora* 2373**
***mendica Diarsia* 2226**

mensuraria 1078
menthastri 2369
menthastri 2370
***menyanthidis Acronicta* 1430**
***meolans Erebia* 629**
***merckii Lithophane* 2046**
***meriaeformis Pyropteron* 231**
meridionalis 1949
***meridionalis Agrochola* 2016**
merope 547
***mesembrina Euphyia* 1211**
***mesogona Apaidia* 2313**
***mesomella Cybosia* 2317**
messapia 2315
***messapiaria Itame* 710**
messmeri 1577
mestralii 2346
***meticulosa Phlogophora* 1773**
***metis Apatura* 567**
***mi Euclidia* 1492**
miaria 1178
***miata Chloroclysta* 1150**
***micacea Hydraecia* 1808**
micans 134
microdon 1884
microsaria 971
***milhauseri Harpyia* 1417**
***millefoliata Eupithecia* 1303**
***millierata Coenocalpe* 1183**
mimosaria 965
mimus 207
***minianiformis Pyropteron* 228**
***miniata Miltochrista* 2316**
***minima Photedes* 1839**
minimus 451
***minimus Cupido* 449**
***miniosa Orthosia* 1985**
***miniosaria Enconista* 717**
minor 612
minorata 1011
minorata 1038
minorata 1040
***minorata Perizoma* 1225**
***minorata Scopula* 1039**
***minos Zygaena* 157**
***minuscularia Idaea* 981**
minuta 1607
minuta 1610
minuta 1615
minutaria 935
minutata 1283
***minutata Eublemma* 1606**
mioleuca 2058
mioleuca 2076
***mirificaria Celonoptera* 1373**
mirtalis 1055
mixta 2120
mixata 1136
***mixta Cucullia* 1636**
***mnemosyne Parnassius* 376**
***mnestra Erebia* 613**
modesta 1571
***modestoides Euchalcia* 1571**
***moeniata Scotopteryx* 1072**
***moldavicola Ozarba* 1593**
molluginata 1197
molluginata 1212
***molluginata Euphyia* 1111**
***molothina Lycophotia* 2220**
***monacha Lymantria* 2262**
monedulaeformis 225
***moneta Polychrysia* 1572**
***moniliata Idaea* 963**
monilifera 16
monochroaria 1367
***monochroma Dryobotodes* 2063**
monoglypha 1856
***monoglypha Abromias* 1855**
monogramma 1704
montana 1725
***montana Epichnopterix* 80**
***montana Platyperigea* 1724**
***montanata Xanthorhoe* 1092**

montanella Epichnopterix **81**
montanus Erebia **625**
montensis Aricia **485**
montium 1966
montivagata Rheumaptera **1199**
mori Bombyx **334**
morio 610
morio Pentophera **2281**
morpheus Caradrina **1723**
morpheus Heteropterus **363**
morrisii Photedes **1840**
morsei Leptidea **386**
morula 623
mucidaria 849
mucidaria Euchrognophos **866**
mucronata Scotopteryx **1079**
multangula Chersotis **2192**
multifida Ledereragrotis **2175**
multistrigaria Colostygia **1171**
munda Anorthoa **1992**
mundana Nudaria **2309**
munitata 1087
muralis Cryphia **1452**
muricata Idaea **942**
murina 2311
murinaria Tephrina **713**
murinata Minoa **1367**
muscaeformis 256
muscaeformis Pyropteron **232**
muscella 265
muscella Ptilocephala **107**
muscerda Pelosia **2318**
musculosa Oria **1834**
musculus Arytrura **1514**
musiva Albocosta **2170**
mustapha 2116
mustapha Xylocampa **2117**
mutilata 944
mutilata Idaea **945**
mutillaeformis 208
mya 1574
myopaeformis Synanthedon **208**
myopata 867
myricae 1433
myrmidone Colias **412**
myrsinites 250
myrtillata 848
myrtilli Anarta **1890**
mysiniformis Chamaesphecia **235**
nadeja Diachrysia **1564**
nana 1884
nana 1911
nana 1933
nana Brachodes **189**
nanata Eupithecia **1318**
napaea Boloria **528**
napi Pieris **403**
napi. 404
narbonea 724
narbonea 725
narbonea Petrophora **726**
narcaea 402
nausithous Maculinea **466**
neapolitana 646
neapolitana Hipparchia **649**
nebulata Euchoeca **1362**
nebulata Nebula **1136**
nebulosa Polia **1897**
neglecta 2244
neleus 619
nemoralis 1462
nemoraria Scopula **1013**
neomiris 646
neomiris Hipparchia **645**
neoridas 606
neoridas Erebia **626**
neoridens 667
neoridens Polyploca **668**
nepetata 1299
nephohiptamenos Polyommatus **506**
neriaria Proteuchloris **915**
nerii Daphnis **320**

nerine 623
***nervosa Oxicesta* 1420**
***nervosa Simyra* 1437**
***neurica Archanara* 1831**
***neustria Malacosoma* 276**
***nevadensis Zygaena* 169**
nexa 1828
***nexa Phragmitiphila* 1827**
***ni Trichoplusia* 1554**
***nicaea Hyles* 325**
***nicias Aricia* 486**
***nickerlii Luperina* 1820**
***nictymera Standfussiana* 2180**
nigra 268
***nigra Aporophyla* 2079**
***nigrescens Yigoga* 2164**
***nigricans Euxoa* 2129**
nigrita 1670
***nigrita Sympistis* 1671**
nigrocincta 2085
nigrofasciaria 1127
***nigrofusca Euxoa* 2127**
nigrogenava 644
***nigropunctata Scopula* 1015**
***nilotica Characoma* 2302**
***niobe Argynnis* 515**
nisseni 1545
***nisseni Parascotia* 1544**
nisus 1942
nitens 1895
nitida 2009
***nitida Agrochola* 2010**
***nitidata Idaea* 1001**
***nivalis Erebia* 617**
***niveata Crocota* 780**
***nobiliaria Entephria* 1117**
***noctivaga Paradrina* 1739**
noctualis 1606
***nodosalis Nodaria* 1459**
noguera 1744
noguera 1948
nomadaeformis 211
***nonagrioides Sesamia* 1880**
norax 583
***noricana Glacies* 882**
nostrodamus 371
***nostrodamus Gegenes* 372**
***notata Jordanita* 140**
***notata Macaria* 692**
notataria 692
***notha Archiearis* 681**
novaki 198
***nubeculosa Brachionycha* 1688**
***nubigera Heliothis* 1712**
***nudella Psychidea* 76**
***numerica Alvaradoia* 1599**
nupera 2276
***nupta Catocala* 1504**
nurag 595
***nurag Maniola* 593**
nurus 1506
nycthemera 2176
***nycthemeraria Menophra* 791**
nyctymera 2180
***nymphaea Catocala* 1496**
***nymphagoga Catocala* 1499**
***obelisca Euxoa* 2124**
***obeliscata Thera* 1157**
***obesa Agrotis* 2157**
***obesalis Hypena* 1535**
***obfuscata Gnophos* 848**
***obliquaria Idaea* 970**
obliterata 1362
obliterata 1397
***obliterata Phyllophila* 1594**
***oblonga Abromias* 1854**
oblongata 1269
obscura 2211
***obscuraria Nychiodes* 784**
***obscurata Charissa* 853**
***obsitalis Hypena* 1536**
obsoleta 1713
***obsoleta Leucania* 1975**
***obsoletaria Idaea* 969**
***obsoletata Perizoma* 1230**
***obstipata Orthonama* 1084**
***obtusa Pelosia* 2319**
***obvallaria Scotopteryx* 1081**
occidentalis 392

occitanaria Calamodes **797**
occitanica 637
occitanica Melanargia **636**
occitanica Zygaena **164**
occlusa 2056
occulta Eurois **2253**
ocellaris Xanthia **2006**
ocellata Cosmorhoe **1132**
ocellata Smerinthus **309**
ocellina Chersotis **2189**
ochracea 1803
ochraceata Scopula **1023**
ochraria 953
ochrata 938
ochrata Idaea **953**
ochreago Xestia **2247**
ochrearia 891
ochrearia Aspitates **892**
ochridata 1253
ochridata 1319
ochridata Eupithecia **1320**
ochroleuca Eremobia **1802**
ochroleucata 1040
ochroleucria 1039
ochsi Cryphia **1444**
octodurensis Scotopteryx **1077**
octogenaria Hoplodrina **1744**
octogesima 662
octogesimea 662
ocularis Tethea **662**
oculea 1812
oculea Amphipoea **1813**
oditis 2103
oditis 2104
oditis Leucochlaena **2103**
odontites Hadula **1884**
odyneriformis 225
odyneriformis 249
oedippus Coenonympha **577**
oeme Erebia **628**
oleagina Valeria **2107**
oleracea Lacanobia **1904**
olivana 1598
olivata 1168
olivina Teinoptera **1674**
olympiaria Xenochlorodes **933**
omar Metopoceras **1684**
omicata 963
omicronaria 1054
onobrychis 162
onobrychis 163
ononaria 717
ononaria Aplasta **909**
ononis Heliothis **1710**
onopordi Pyrgus **353**
onustaria Kemtrognophos **857**
oo Dicycla **1792**
opacaria 901
opacaria Compsoptera **902**
opacella 88
opalina Calophasia **1665**
operaria Elophos **875**
ophiogramma Lateroligia **1867**
ophioniformis 219
ophthalmicata 856
opima Orthosia **1990**
optabilis Cladocerotis **2159**
optata Catocala **1512**
optilete Albulina **479**
or Tethea **663**
orana 163
orana Zygaena **160**
oranaria 830
oranaria Tephronia **833**
orbicularia 1051
orbifer 341
orbifer Spialia **342**
orbitolus 478
orbitolus Albulina **480**
orbona 2052
orbona 2205
orbona Noctua **2203**
oreina 2190
oreina Chersotis **2191**
orejoni Agrochola **2008**
orenjoni 2008
orichalcea 1561

***orichalcea Thysanoplusia* 1555**
orion 1421
***orion Scoliantides* 460**
***ornata Scopula* 1017**
ornataria 1017
***ornitopus Lithophane* 2042**
orphnata 1297
***orphnata Eupithecia* 1297**
oryssiformis 251
oscura 1845
***osiris Cupido* 450**
***osmiaeformis Chamaesphecia* 242**
osseata 974
***osseola Hydraecia* 1811**
osterodensis 157
***osterodensis Zygaena* 171**
ostrina 1614
***ostrina Eublemma* 1613**
***ostrinaria Idaea* 997**
ostrogovichi 1920
***otregiata Lampropteryx* 1131**
***ottomana Erebia* 615**
***otus Pachypasa* 284**
***oxalina Mesogona* 1791**
oxyacanthae 2111
***oxyacanthae Allophyes* 2110**
***oxybiata Xanthorhoe* 1095**
oxycedrata 1317
***oxycedrata Eupithecia* 1331**
oxyptera 1437
***oxytropis Zygaena* 166**
***pabulatricula Pabulatrix* 1844**
palaemon 365
***palaemon Carterocephalus* 364**
***palaeno Colias* 410**
***paleacea Enargia* 1786**
***pales Boloria* 527**
***palestinae Leucania* 1977**
palleago 2006
***pallens Mythimna* 1958**
***palliatella Eilema* 2329**
***pallida Cryphia* 1443**
pallidata 1350
pallidata 952
***pallidata Idaea* 986**
pallifrons 2330
pallifrons 2331
palliolana 2288
***pallustris Athetis* 1759**
palpalis 1467
***palpalis Hypena* 1537**
***palpina Pterostoma* 1403**
paludata 1347
paludicola 1830
***palustris Chamaesphecia* 252**
***pamphilus Coenonympha* 587**
pancratii 1719
***panda Streblote* 283**
***pandora Argynnis* 512**
pandrose 600
***pandrose Erebia* 630**
***pannonica Eublemma* 1611**
***panoptes Pseudophilotes* 456**
***pantaria Abraxas* 685**
***pantellata Eupithecia* 1251**
pantherina 263
***paphia Argynnis* 511**
***papilionaria Geometra* 913**
papyratia 2371
par 1923
paradoxaria 1373
parallela 1489
parallelaria 1235
parallelaria 735
parallelolineata 1358
parallelolineata 713
***parallelolineata Mesotype* 1235**
paramegaera 571
paramegaera 574
***paramegaera Lasiommata* 572**
paranympha 1495
***parasita Ocnogyna* 2357**

paraustralis 182
parenzani 2111
***parenzani Selidosema* 811**
***parietariella Eumasia* 125**
partheniae 555
***parthenias Archiearis* 680**
parthenie 553
parthenie. 557
***parthenoides Melitaea* 556**
partitaria 726
***parva Eublemma* 1615**
pasiphaë 590
***pastinum Lygephila* 1518**
paula 1606
pauxillaria 1319
pauxillaria 1331
***pauxillaria Eupithecia* 1317**
***pavonia Saturnia* 297**
pavoniella 297
pavoniella 299
***pavoniella Saturnia* 298**
peas 639
***pectinataria Colostygia* 1178**
***pectinella Bijugis* 63**
pedaria 759
pellex 1507
peltaria 726
***peltigera Heliothis* 1711**
***pendularia Cyclophora* 1051**
***penella Heterogynis* 128**
penicillata 1675
***pennaria Colotois* 756**
***pennigeraria Athroolopha* 781**
peregrina 1907
***perflua Amphipyra* 1693**
perla 1451
perlana 1610
perlella 2318
***perlinii Glacies* 883**
***permixtaria Catarhoe* 1100**
permutaria 689
***pernotata Eupithecia* 1281**
***pernyi Antherea* 302**
perochraria 938
perplexa 1945
***perplexa Hadena* 1942**
***persicariae Melanchra* 1908**
***perspersata Odontognophos* 852**
perspicillaris 1777
***perversaria Peribatodes* 803**
***petasitis Hydraecia* 1810**
petraria 723
petricolor 1716
***petricolor Cryphia* 1450**
petrificaria 789
petrificata 2041
***petropolitana Lasiommata* 573**
petroriza 1776
petrosus 610
phaedra 641
***pharte Erebia* 604**
phegea 2346
***phegea Syntomis* 2343**
pherusa 635
pherusa 636
***pherusa Melanargia* 637**
***phicomone Colias* 409**
philanthiformis 232
philanthiformis 250
philea 581
***phlaeas Lycaena* 419**
phoebe 1393
***phoebe Melitaea* 549**
***phoebus Parnassius* 377**
***phoeniceata Eupithecia* 1328**
***phragmitidis Arenostola* 1829**
phytheumae 2189
picata 1206
picena 360
***picena Pyrgus* 361**
pictaria 839
***pigra Clostera* 1381**
***pilosaria Apocheima* 759**
***pimpinellata Eupithecia* 1316**
pinastri 1762

pinastri Hyloicus **315**
pinetaria 711
pineti Bryonycta **1453**
pineti Siederia **35**
pinguedinata 985
pini 1243
pini Dendrolimus **286**
piniaria Bupalus **834**
piniperda 1983
pinivora Thaumetopoea **1379**
pinkeri Griposia **2061**
pirithous Leptotes **444**
pisi Ceramica **1909**
pistacina 2007
pistacinoides 2010
pistacinoides Agrochola **2009**
pityocampa 1379
pityocampa Thaumetopoea **1378**
placida 1923
placida Phragmatobia **2362**
plagiata Aplocera **1349**
plantaginis 1749
plantaginis Parasemia **2366**
platinea Abromias **1862**
platyptera Calophasia **1663**
plebeja Hada **1911**
plecta Ochropleura **2172**
pliniata 1315
pliniata 1319
plumaria Selidosema **808**
plumbaria 1080
plumbeolata 718
plumbeolata Eupithecia **1241**
plumella 73
plumella 83
plumella Epichnopterix **77**
plumifera Ptilocephala **110**
plumigera Ptilophora **1404**
plumigeralis Polypogon **1466**
plumistrella Leptopterix **96**
plummistaria Eurranthis **783**
plumosa Pelosia **2320**
plumularia Anthometra **934**
plumularia Lythria **1066**
plusiaria Thetidia **918**
pluto 627
pluto Erebia **610**
pluviaria Hypoxystis **737**
podalirius Iphiclides **379**
poecilata 1295
poecilata Eupithecia **1296**
poelli Conisania **1920**
polaris Synanthedon **204**
politaria 990
politaria Idaea **975**
politella Taleporia **42**
pollux 630
polychloros 540
polychloros Nymphalis **539**
polycommata Trichopteryx **1369**
polygona Opigena **2214**
polygramma Glossodice **1623**
polygrammata 1071
polygrammata Costaconvexa **1114**
polymita Polymixis **2083**
polyodon 1855
polyodon Actinotia **1777**
polyxena Zerynthia **374**
pomoeriaria 1085
pomonaria Lycia **767**
pontbrillantella Epichnopterix **82**
pontica Craniophora **1436**
popularis 1953
popularis 1954
populata Eulithis **1143**
populeti Orthosia **1988**
populi 1988
populi 311
populi Laothoe **310**
populi Limenitis **561**
populi Poecilocampa **269**
populifolia Gastropacha **292**

porata 1061
***porata Cyclophora* 1058**
***porcellus Deilephila* 330**
porphyrea 2098
***porphyrea Lycophotia* 2221**
***porphyrinia Eublemma* 1614**
porrinata 921
***potatoria Euthrix* 287**
***powelli Brachodes* 184**
***pozzii Pseudluperina* 1823**
***praecellens Phalacropterix* 116**
***praecox Actebia* 2168**
***praeformata Aplocera* 1352**
***prasina Anaplectoides* 2254**
prasinana 2303
***prasinana Pseudoips* 2304**
prasinaria 844
***predotae Charissa* 855**
predotai 1188
***predotai Agrotis* 2148**
***predotai Horisme* 1189**
***predotaria Idaea* 1000**
***prenanthis Shargacucullia* 1660**
primaria 1150
***primaria Theria* 841**
primulae 2226
***proboscidalis Hypena* 1533**
proboscidata 1454
***proboscidata Orectis* 1455**
***procax Lygephila* 1521**
***procellata Melanthia* 1193**
***processionea Thaumetopoea* 1377**
prodromaria 768
progemmaria 775
prolai 2267
***prolai Agrochola* 2011**
***prominens Mythimna* 1967**
***promissa Catocala* 1510**
***pronoë Erebia* 621**
***pronuba Noctua* 2200**
propugnata 1086
prosapiaria 844
proserpina 639
proserpina 656
***proserpina Proserpinus* 321**
prosopiformis 236
protai 1945
protai 1946
protea 2062
***proto Muschampia* 344**
provincialis 545
***provincialis Euphydryas* 546**
***proxima Lasionycta* 1948**
***proxima Platyperigea* 1730**
***proximaria Scotopteryx* 1082**
pruinata 911
***pruinata Pseudoterpna* 910**
***pruinosata Holoterpna* 926**
***prunaria Angerona* 757**
***prunata Eulithis* 1141**
***pruni Odonestis* 293**
***pruni Rhagades* 131**
***pruni Satyrium* 437**
pseudoambigua 1747
***pseudocomplana Eilema* 2327**
pseudokuhlweini 2340
pseudoterrea 1735
***pseudotinctaria Crocota* 779**
***psi Acronicta* 1425**
Psodos 887
psyche 636
psyche 637
psychidion 265
pteridis 1780
***pudibunda Calliteara* 2269**
***pudica Cymbalophora* 2365**
***pudorata Rhodostrophia* 1046**
***pudorina Mythimna* 1956**
***puella Archiearis* 682**
***puengeleri Gortyna* 1806**
***puerpera Catocala* 1507**
pugnax 1716
***pugnax Hadula* 1883**
***pulchella Utetheisa* 2354**

***pulchellata Eupithecia* 1246**
pulchra 2354
***pulchrina Autographa* 1578**
pulla 77
***pulla Scotochrosta* 2057**
***pullata Costignophos* 858**
pulmentaria 922
***pulmonaris Atypha* 1751**
***pulveraria Plagodis* 728**
pulverea 2251
pulverulenta 1987
pumicaria 715
pumicosa 2080
***pumila Brachodes* 185**
pumilata 1337
pumilio 372
***pumilio Gegenes* 371**
***punctaria Cyclophora* 1060**
punctata 1036
***punctata Dysauxes* 2349**
***punctinalis Hypomecis* 819**
***punctosa Leucania* 1978**
punctularia 827
***punctulata Aethalura* 827**
***punctum Zygaena* 149**
punctum. 147
punctum. 148
punctumnotata 182
pungeleri 230
***punicea Paradiarsia* 2219**
***pupillata Epirrhoe* 1104**
***puppillaria Cyclophora* 1055**
***pura Eublemma* 1619**
purpuralis 153
purpuralis 157
***purpuralis Zygaena* 158**
***purpuraria Lythria* 1067**
purpurata 1068
***purpurata Rhyparia* 2376**
purpurea 2376
purpureofasciata 1780
***purpurina Eublemma* 1618**
***purpurina Pyrrhia* 1715**
***pusaria Cabera* 835**
pusilla 1600
***pusilla Brachodes* 190**
***pusilla Eublemma* 1621**
pusillata 1335
***pusillata Eupithecia* 1327**
pustulata 914
***puta Agrotis* 2147**
***putata Jodis* 931**
putataria 931
***putnami Plusia* 1588**
***putrescens Leucania* 1979**
***putridaria Catarhoe* 1099**
***putris Axylia* 2171**
***pygarga Protodeltote* 1595**
***pygmaearia Emmiltis* 935**
***pygmaeata Eupithecia* 1257**
pygmaeola 2331
***pygmaeola Eilema* 2330**
pygmaeus 371
pygmaria 2288
pygmina 1837
***pygmina Denticullus* 1835**
***pylaon Plebejus* 469**
pyraliata 1143
***pyraliata Eulithis* 1145**
***pyralina Cosmia* 1796**
***pyramidea Amphipyra* 1691**
pyrenaeata 1246
***pyrenaella Ptilocephala* 105**
***pyreneata Eupithecia* 1247**
***pyri Saturnia* 296**
***pyrina Zeuzera* 266**
***pyritoides Habrosyne* 661**
***pyropata Eulithis* 1146**
pyrrha 630
***quadra Lithosia* 2322**
***quadrifaria Psodos* 877**
quadrifasciaria 1085
***quadrifasciata Xanthorhoe* 1091**
quadripunctaria 906
***quadripunctaria Euplagia* 2387**
quadripunctata 1737
quaerendaria 1084
***quenselii Grammia* 2367**
quercana 2303

quercaria 743
***quercaria Ennomos* 744**
***quercifolia Gastropacha* 291**
quercii 2346
***quercimontaria Cyclophora* 1056**
***quercinaria Ennomos* 740**
***quercus Favonius* 432**
***quercus Lasiocampa* 281**
***quercus Marumba* 307**
***querna Drymonia* 1398**
quinquaria 711
radicaria 1186
***radicaria Horisme* 1187**
***radiosa Actinotia* 1778**
***ragazzii Syntomis* 2344**
***ragusae Conistra* 2034**
***ragusana Eublemma* 1622**
***ragusaria Nychiodes* 786**
***raiblensis Bruandia* 59**
***rainerii Idaea* 965**
***ramburi Chamaesphecia* 243**
ramburii 2277
ramosa 2339
***ramosa Calliergis* 1672**
***ramosaria Cleta* 936**
rana 2161
rapae 400
***rapae Pieris* 401**
***raptricula Cryphia* 1449**
raptriculoides 1449
raunaria 893
***raunaria Dyscia* 898**
***ravida Spaelotis* 2211**
***ravula Cryphia* 1445**
***reali Leptidea* 384**
***rebeli Dahlica* 26**
***rebeli Maculinea* 468**
recens 2272
***recens Teia* 2274**
***receptricula Cryphia* 1439**
reclusa 1381
***rectalis Simplicia* 1457**
rectangula 2188
***rectangula Chersotis* 2187**
***rectangularis Exophyla* 1515**
***rectangulata Pasiphila* 1339**
rectilinea 1445
***rectilinea Cryphia* 1448**
***rectilinea Hyppa* 1775**
***recussa Euxoa* 2135**
reducta 562
***reducta Limenitis* 563**
reisseri 251
***remissa Apamea* 1845**
***remmi Mesapamea* 1870**
remota 644
***remotata Scopula* 1040**
remutaria 1035
***renalis Haemerosia* 1721**
***renati Conisania* 1921**
***renigera Dichagyris* 2162**
repanda 283
repandaria 735
***repandaria Epione* 734**
***repandata Alcis* 814**
residua 1646
***respersa Eublemma* 1617**
***respersa Hoplodrina* 1748**
respersaria 852
***reticulata Eustroma* 1166**
***reticulata Sideridis* 1917**
***reticulatella Bruandia* 58**
***retusa Ipimorpha* 1784**
***revayana Nycteola* 2297**
reversata 989
***rhadamanthus Zygaena* 167**
***rhaetica Xestia* 2232**
rhagioniformis 217
rhamnata 1205
***rhamni Gonepteryx* 416**
rhamnusia 596
rhingiaeformis 197
***rhodogrammaria Idaea* 996**
rhodopensis 576
rhodopensis 580
***rhodopensis Coenonympha* 578**
rhodosoma 2369
***rhomboidaria Peribatodes* 801**

rhomboidea 2242
***ribeata Deileptenia* 813**
ribesaria 1141
***rica Paidia* 2311**
***ricchelloi Rhegmatophila* 1410**
ridens 668
***ridens Polyploca* 667**
***riguata Cataclysme* 1069**
rimicola 275
***rimicola Eriogaster* 274**
***riparia Anapoma* 1973**
***riparia Eupithecia* 1313**
ripartii 504
***ripartii Polyommatus* 503**
***rippertaria Digrammia* 703**
***rivata Epirrhoe* 1107**
***rivularis Cymbalophora* 2364**
***rivularis Neptis* 565**
***rivularis Sideridis* 1916**
rivulata 1221
rizolitha 2042
robiginosa 2134
***roboraria Hypomecis* 818**
roboris 2066
***roboris Dryobotodes* 2065**
***roboris Laesopis* 433**
***robusta Pandesma* 1482**
roederaria 1250
romana 394
romanaria 1042
romeo 157
romeo 169
romeo 171
***romeo Zygaena* 170**
rondoui 227
***roraria Isturgia* 707**
***rorida Perigrapha* 1993**
rosamaria 1658
***roscida Setina* 2341**
rosea 1616
rosea 2316
***rosea Autophila* 1526**
***rosina Eublemma* 1616**
***rostralis Hypena* 1534**
rotaria 1068
rougemonti 1724
***rubea Ocneria* 2266**
rubecula 2022
rubecula 2247
***rubella Luperina* 1821**
***ruberata Hydriomena* 1181**
rubetra 2007
***rubi Callophrys* 435**
***rubi Diarsia* 2227**
***rubi Macrothylacia* 282**
***rubicundus Zygaena* 155**
***rubidata Catarhoe* 1101**
rubiginata 1023
***rubiginata Plemyria* 1154**
***rubiginata Scopula* 1022**
***rubiginea Conistra* 2035**
***rubiginosa Conistra* 2029**
***rubraria Idaea* 1003**
rubricata 1022
***rubricollis Atolmis* 2321**
***rubricosa Cerastis* 2255**
***rubrirena Abromias* 1866**
***rufa Coenobia* 1833**
rufaria 944
***rufaria Idaea* 949**
***rufata Chesias* 1344**
***rufeola Apaidia* 2314**
rufibasalis 204
***ruficiliaria Cyclophora* 1057**
***ruficollis Asphalia* 669**
***ruficornis Drymonia* 1396**
ruficostata 999
rufifasciata 1253
***rufifasciata Gymnoscelis* 1337**
rufina 2017
rufocincta 2089
***rufocincta Polymixis* 2088**
***rufomixtaria Glossotrophia* 1043**
ruginaria 1067
***rumicis Acronicta* 1434**
***rumina Zerynthia* 373**
***rungsi Eilema* 2335**
runica 2060

rupestraria 1234
***rupestris Teia* 2277**
rupestris. 2276
***rupicapraria Theria* 840**
***rupicolella Siederia* 37**
rurea 1848
russiae 638
***russiae Melanargia* 632**
russula 2377
***rusticata Idaea* 955**
***ruticilla Spudaea* 2025**
rutilago 2000
***sabaudiata Triphosa* 1202**
***sabinata Epilobophora* 1371**
saccarella 157
***sacraria Rhodometra* 1062**
***sagittata Gagitodes* 1233**
***sagittigera Pachetra* 1899**
***salicalis Colobochyla* 1546**
salicata 1122
salicata 1122
salicata 1139
***salicata Nebula* 1133**
***salicis Leucoma* 2283**
salmachus 212
***sambucaria Ourapteryx* 755**
***samnii Luperina* 1822**
sancta 1945
***sancta Hadena* 1946**
***sanctiflorentis Phytometra* 1541**
sanguinaria 1062
***sannio Diacrisia* 2377**
santolinae 1640
***santolinae Cucullia* 1643**
***santolinata Eupithecia* 1301**
***santonici Cucullia* 1647**
santoruana 2152
sao 341
***sapho Rebelia* 69**
saponariae 1917
saportae 156
saportae 2067
saportae 450
***sappho Neptis* 564**
sardalta 1351
sardinica 916
***sardinica Thetidia* 917**
sardoa 163
***sardoa Eupithecia* 1307**
***sardoniata Idaea* 946**
***sarpedon Zygaena* 147**
sartata 852
***sartata Gnophos* 850**
sartatus 719
satellitia 2053
satura 1854
***satura Mniotype* 2098**
***satyrata Eupithecia* 1282**
satyrion 581
***saucia Peridroma* 2223**
***sauteri Dahlica* 31**
saxicolella 57
sbordonii 646
sbordonii 648
***sbordonii Hipparchia* 651**
scabiosae 316
scabiosata 1299
***scabriuscula Dypterygia* 1762**
scalercii 1028
***scalercii Scopula* 1027**
scannaria 896
***schawerdae Evisa* 2054**
***schawerdai Agrotis* 2152**
***schiefereri Eupithecia* 1264**
schiffermülleri 95
schmidii 1310
schmidtii 237
schmidtiiformis 237
***schmidtiiformis Chamaesphecia* 237**
schoenobaena 2007
schwarzi 213
***sciopterella Leptopterix* 98**
sciopterella. 99
***scipio Erebia* 622**
***scirpi Mythimna* 1966**
***scita Phlogophora* 1774**
***scitula Coccidiphaga* 1601**
***scoliaeformis Synanthedon* 199**

***scolopacina Apamea* 1853**
***scopariata Eupithecia* 1330**
***scopigera Bembecia* 219**
***scoriacea Cleoceris* 2102**
scriptaria 1258
***scripturata Euphyia* 1212**
***scrophulariae Shargacucullia* 1655**
***scrophulariphaga Shargacucullia* 1652**
scrophularivora 1653
***scutosa Schinia* 1707**
scutularia 725
sebrus 450
secalella 1870
***secalella Mesapamea* 1869**
secalis 1870
***secalis Mesapamea* 1868**
***secundaria Peribatodes* 805**
secundogenita 182
***sedi Zygaena* 159**
***segetum Agrotis* 2142**
***segnilis Euxoa* 2128**
seitzi 251
***selenaria Ascotis* 823**
***selene Boloria* 524**
***selenitica Gynaephora* 2271**
***selinata Eupithecia* 1275**
selini 1736
selini 1739
***selini Paradrina* 1733**
selinoides 1733
seliza 628
semele 647
semele 648
semele 649
semele 650
semele 655
***semele Hipparchia* 646**
***semiargus Cyaniris* 487**
***semibrunnea Lithophane* 2040**
semicana 1701
semicana 1829
***semicana Aegle* 1700**
semicanaria 718
semigraphata 1278
semigraphata 1299
***semigraphata Eupithecia* 1300**
senecionis 2388
***senectaria Nebula* 1137**
senex 2071
***senex Ammoconia* 2072**
***senex Thumatha* 2310**
senna 2211
***senna Spaelotis* 2212**
senthes 646
sepiaria 832
***sepiaria Tephronia* 830**
***seposita Leucochlaena* 2105**
sera 86
serena 1923
seriata 981
***seriata Idaea* 980**
sericata 1767
***sericealis Rivula* 1543**
***sericeata Idaea* 951**
sericina 1767
serina 2007
***serotinaria Elophos* 869**
***serpentata Idaea* 938**
***serpentina Polymixis* 2086**
serraria 793
serraria 890
***serraria Megalycinia* 793**
***serraria Thera* 1164**
***serrata Omphalophana* 1667**
***serratilinea Polia* 1898**
***serratulae Pyrgus* 352**
***sertata Nothocasis* 1374**
sertorius 342
***sertorius Spialia* 341**
***servadeii Dryobotodes* 2064**
***sexalata Pterapherapteryx* 1372**
sexmaculata 1590
***sexstrigata Xestia* 2252**
seyta 579
sibilla 562
sicanaria 1046
sicanaria 1048

sicanaria 896
sicania 2142
***sicheliella Ptilocephala* 108**
sicheliella. 107
siciliae 182
siciliana 928
***siciliana Hemistola* 929**
sicula 2114
sicula 2142
sicula 864
sicula 896
***sicula Abromias* 1856**
***sicula Mythimna* 1965**
***sicula Pyropteron* 226**
***siculana Nycteola* 2301**
***siculella Dahlica* 33**
siculum 228
***sidae Pyrgus* 346**
sidemii 1257
siderifera 1570
***siderifera Euchalcia* 1569**
***sieboldii Epichnopterix* 83**
***siederi Brevantennia* 41**
siegeli 1849
***siegeli Luperina* 1816**
***sigma Eugraphe* 2216**
***signaria Macaria* 694**
***signifera Yigoga* 2167**
signum 2216
***silaceata Ecliptopera* 1147**
***silenata Eupithecia* 1260**
silene 2029
silenes 1946
***silenes Hadena* 1945**
***silenicolata Eupithecia* 1265**
siliquana 2308
***silphella Ptilocephala* 100**
***silvicolus Carterocephalus* 365**
***similaria Parectropis* 826**
similata 938
similis 246
***similis Sphrageidus* 2280**
***simpliciata Aplocera* 1353**
***simpliciata Eupithecia* 1305**
simplonia 392
***simplonia Agrotis* 2141**
***simplonia Euchloë* 393**
***simplonica Chelis* 2359**
***simulans Rhyacia* 2185**
***simulatricula Cryphia* 1441**
simulatrix 2180
sinapis 385
***sinapis Leptidea* 383**
***sincera Xestia* 2231**
***sinuosaria Eupithecia* 1309**
sinuosata 1365
***sirphiformis Bembecia* 222**
***siterata Chloroclysta* 1149**
***smaragdaria Thetidia* 916**
***sobrina Protolampra* 2218**
sobrinata 1327
***socia Lithophane* 2041**
***sociabilis Cardepia* 1892**
***sociaria Synopsia* 794**
sociata 1106
socrus 1529
sodae 1887
***sodae Hadula* 1888**
sodaliaria 984
sohnretheli 1818
sohnretheli 1819
sohnretheli 1840
solani 2201
solaris 1590
soldaria 1364
***solidaginis Lithomoia* 2049**
solieri 2096
***solieri Mniotype* 2097**
sordaria 871
***sordens Apamea* 1850**
sordida 1849
sordida 888
***sordida Diaphora* 2374**
sordidata 1179
***sororcula Eilema* 2333**
***sororiata Carsia* 1347**
***spadicearia Xanthorhoe* 1088**
***spadiceata Eupithecia* 1304**
***sparganii Capsula* 1842**

sparsaria Itame **709**
sparsata Anticollix **1342**
spartiata 1343
speciosa 2234
speciosa Xestia **2233**
spectrum Apopestes **1529**
spencei 1783
spheciformis Synanthedon **200**
sphinx Asteroscopus **1687**
spinaciae 1904
spinaciae 1926
spini Saturnia **299**
spini Satyrium **438**
spinifera 2158
spinosa Mniotype **2095**
spinula 678
spissilineata Eupithecia **1314**
spissistrigaria 1070
spitzi Glacies **879**
splendens Lacanobia **1905**
spodiaria 713
spodiaria Enconista **718**
sponsa Catocala **1509**
sproengertsi Elophos **868**
spuleri 212
spuleri 215
spuleri Synanthedon **213**
spurcata 876
squalida Nola **2292**
squalidaria Hylaea **845**
squalidaria Idaea **1008**
stabiensis 1338
stabilis 1986
staintoni 48
standfussi 1823
standfussi 1860
standfussi Sterrhopterix **120**
stangelmaieri Xylomoia **1871**
statices Adscita **134**
statilinus 653
statilinus 654
statilinus Hipparchia **652**
stauderi Apterona **124**
staudingeri Chamaesphecia **248**
staudingeri Conistra **2036**
stelidiformis 242
stelidiformis 253
stellatarum Macroglossum **319**
stenochrysis 1565
stenochrysis Diachrysia **1563**
stenoptera 1982
stetinensis Megalophanes **112**
stevenaria Neognopharmia **719**
sthennyo Erebia **631**
stigmatica Xestia **2242**
stigmosa 1888
stigmosa Hadula **1887**
stirius Erebia **623**
stolida Grammodes **1490**
stomoxiformis Synanthedon **201**
stragulata 1161
straminata 944
straminata Idaea **1006**
straminea Mythimna **1960**
strataria Biston **768**
striata Coscinia **2350**
strigata 919
strigilata Pechipogo **1467**
strigilis Oligia **1874**
strigillaria 1015
strigillaria Perconia **899**
strigosa Acronicta **1429**
strigula 1439
strigula 2221
strigula Meganola **2286**
stygne 629
styriaca Rebelia **74**
styx 623
styx Erebia **624**
suasa 1906
suasa Lacanobia **1903**
suava Odice **1603**

***subalpina Lycaena* 424**
***subchlamydula Nola* 2294**
subduplicaria 1235
suberis 2063
subflavella 61
subfulvata 1292
***subfuscata Eupithecia* 1290**
***subhastata Rheumaptera* 1198**
sublactata 1035
***sublustris Abromias* 1859**
sublutea 2088
sublutea 2089
***sublutea Polymixis* 2090**
submutata 1021
***submutata Scopula* 1020**
subnotata 1305
***subpunctaria Scopula* 1036**
***subrosea Coenophila* 2217**
subscudularia 797
***subscudularia Calamodes* 798**
subsequa 2203
subsericeata 968
subsericeata 987
***subsericeata Idaea* 985**
***subsignaria Gnophos* 849**
***subsolana Jordanita* 145**
***subtusa Ipimorpha* 1785**
subumbrata 1335
***subumbrata Eupithecia* 1299**
***succenturiata Eupithecia* 1292**
***suda Antitype* 2069**
sudduplicaria 1358
***suecica Spaelotis* 2213**
***suffumata Lampropteryx* 1130**
suffusa 2154
***sulphurago Tiliacea* 2001**
sulphurea 1589
***superstes Hoplodrina* 1746**
***supinaria Neognophina* 862**
***suppunctaria Cyclophora* 1059**
***surientella Rebelia* 72**
***suscianja Paradrina* 1734**
***suspecta Parastichtis* 1788**
svennsoni 1692
syllius 636
syllius 637
sylvana 2304
sylvanus 370
***sylvata Abraxas* 684**
***sylvata Hydrelia* 1366**
***sylvestraria Idaea* 987**
***sylvestris Thymelicus* 367**
sylvina 12
sylvina 4
sylvina 5
sylvina 6
***sylvina Triodia* 2**
symaea 1658
syracusia 182
syriaca 1856
***syriaca Abromias* 1857**
***syriaca Clytie* 1485**
***syriaca Hadena* 1944**
***syriacaria Godonela* 702**
***syricola Agrotis* 2149**
***syringaria Apeira* 738**
syrphiformis 211
systrophaeformis 219
tabanella 105
***tabaniformis Paranthrene* 197**
tabanivicinella 102
***tabidaria Rhodostrophia* 1048**
***taenialis Schrankia* 1476**
***taeniata Martania* 1219**
***taeniolaria Selidosema* 809**
***tages Erynnis* 336**
***tagis Euchloë* 395**
tallosi 1857
taminaria 837
***tanaceti Cucullia* 1649**
***tantillaria Eupithecia* 1335**
taraxaci 1745
***taraxaci Lemonia* 305**
***tarnierella Reisseronia* 65**

***tarsicrinalis Herminia* 1461**
tarsicristalis 1470
tarsipennalis 1469
***tarsipennalis Zanclognatha* 1471**
tarsiplumalis 1469
***tau Aglia* 295**
tedaldiata 1251
***tedaldii Oiketicoides* 87**
***teleius Maculinea* 465**
telicanus 444
***telmessia Maniola* 592**
***temera Euxoa* 2118**
***temerata Lomographa* 838**
***tempestaria Colostygia* 1176**
tempestivata 1337
***templi Dasypolia* 2081**
***tenebraria Sciadia* 800**
***tenebrata Panemeria* 1699**
***tenebrosa Dryobotodes* 2067**
tenebrosaria 1330
***tenella Oreopsyche* 93**
***tenietaria Afriberina* 795**
***tentacularia Polypogon* 1464**
***tenthrediniformis Chamaesphecia* 256**
***tenuialis Herminia* 1463**
***tenuiata Eupithecia* 1237**
tenuicornis 138
tenuicornis 144
***tenuicornis Jordanita* 143**
tenuis 212
teophrastus 446
***tephroleuca Hadena* 1947**
***terebra Lamellocossus* 259**
teriolensis 229
***ternata Scopula* 1034**
terranea 2151
terranovae 2008
***terrea Platyperigea* 1727**
***tersa Episema* 2101**
***tersata Horisme* 1186**
tersulata 1186
***tertia Noctua* 2209**
tessellaria 1009
***tessellaria Scopula* 1010**
tessellum 345
***tessellum Muschampia* 344 bis**
testacea 1820
***testacea Luperina* 1815**
testaceata 1366
***testata Eulithis* 1142**
testudinaria 2378
***testudinaria Hyphoraia* 2379**
testudo 126
***tetra Amphipyra* 1696**
***tetralunaria Selenia* 747**
texta 1769
***thalassina Lacanobia* 1901**
***thalictrata Eupithecia* 1273**
***thalictri Calyptra* 1530**
***thapsiphaga Shargacucullia* 1657**
thaumas 367
themistocles 609
***theophrastus Tarucus* 445**
theraphne 350
therapne 341
***therapne Spialia* 343**
thersamon 420
***thersamon Lycaena* 430**
***thersites Polyommatus* 491**
thetis 495
thetis 638
***thomanni Postsolenobia* 39**
***thomanni Rebelia* 75**
***thore Boloria* 526**
thracica 247
***thracica Chamaesphecia* 245**
***thrips Catopta* 261**
thymiaria 927
***thymula Nola* 2296**
tiberina 1818
tiberina 1820
***tiberina Luperina* 1819**
***tibiale Baptria* 1236**
tibiaria 732
***tibiaria Pachycnemia* 731**

tiefi 1393
tigelius 572
tigellina 572
tigrina 2381
***tiliae Mimas* 308**
***timozzaria Epirrhoe* 1109**
tincta 1896
***tinctaria Crocota* 778**
tineiformis 192
***tineiformis Tinthia* 191**
tiphon 576
tiphon 576
tiphon 580
tipula 212
tipuliformis 213
***tipuliformis Synanthedon* 212**
***tirhaca Ophiusa* 1483**
tirrenica 2201
***tirrenica Noctua* 2202**
***titania Acontia* 1591**
***titania Boloria* 523**
tithonus 493
***tithonus Pyronia* 588**
***tityrus Lycaena* 423**
***tityus Hemaris* 316**
***togata Xanthia* 2003**
***togatulalis Meganola* 2285**
tophaceata 1136
tophaceata 1210
***tophaceata Nebula* 1135**
torrida 2030
***torrida Conistra* 2033**
***torrida Dysgonia* 1487**
***torva Notodonta* 1392**
***trabealis Emmelia* 1589**
***tragopoginis Amphipyra* 1695**
transalpina 178
transalpina 179
***transalpina Zygaena* 177**
***transversa Eupsilia* 2053**
transversalis 1615
***transversata Philereme* 1205**
***trapezina Cosmia* 1797**
trappi 469
***trappi Plebejus* 470**
treitschkei 1883
***treitschkei Periphanes* 1716**
***tremula Pheosia* 1400**
tremulae 311
***tremulifolia Phyllodesma* 290**
trepida 1415
trepidaria 880
***triangulum Xestia* 2239**
***triannuliformis Pyropteron* 230**
***triarius Erebia* 607**
tricolor 265
***tridens Acronicta* 1424**
***tridens Calamia* 1798**
trifasciata 1047
***trifida Xestia* 2243**
trifolii 150
trifolii 182
trifolii 1885
***trifolii Hadula* 1886**
***trifolii Lasiocampa* 280**
***trifolii Zygaena* 182**
trifolii. 281
***trifurca Agrotis* 2138**
trigemina 1553
trigemina 989
***trigeminata Idaea* 989**
***triglavensis Brevantennia* 40**
***trigonalis Hypena* 1538**
trigotephras 2273
trigotephras 2276
trigotephras 2277
***trigotephras Teia* 2275**
***trigrammica Charanyca* 1750**
trilinea 1750
trilinearia 1061
trilineata 940
trimacula 1395
trimacula 2101
***trimaculata Stegania* 689**
trimaculosa 1896

trinacria 182
***tripartita Abrostola* 1550**
triplasia 1550
***triplasia Abrostola* 1553**
tripunctalis 1613
***tripunctaria Eupithecia* 1288**
***triquetra Euclidia* 1493**
***triquetrella Dahlica* 20**
***triquetrella Dahlica* 21**
trisagittata 1946
***trisignaria Eupithecia* 1276**
***tristalis Paracolax* 1458**
***tristata Epirrhoe* 1105**
tristigma 2238
tristis 1763
***tristis Euxoa* 2136**
tristriaria 1015
tritici 2127
tritophus 1392
***tritophus Notodonta* 1393**
***trivia Melitaea* 551**
***truncata Dysstroma* 1152**
trux 2129
***trux Agrotis* 2151**
***tubulosa Taleporia* 43**
***tullia Coenonympha* 576**
turanica 2292
turatii 112
turatii 1806
turatii 2103
turatii 950
***turatii Agrotis* 2140**
***turatii Leptopterix* 99**
***turatii Leucochlaena* 2104**
***turatii Megalophanes* 113**
turatii. 98
***turbata Colostygia* 1172**
***turbida Sideridis* 1915**
***turbidaria Scopula* 1024**
turbulentaria 1024
***turbulentaria Scopula* 1025**
***turca Mythimna* 1955**
turfosalis 1473
turibulella 82
tusciaria 752
***tusciaria Crocallis* 750**
tutti 1563
tyndarus 619
***tyndarus Erebia* 616**
***typhae Nonagria* 1826**
typhiaeformis 208
***typica Naenia* 2258**
typicata 952
***typicata Idaea* 961**
***ulicata Pennithera* 1156**
ulmaria 684
***ulmi Dicranura* 1390**
***ultima Hydraecia* 1809**
ultimaria 1326
***ultimaria Eupithecia* 1333**
***ulula Dyspessa* 263**
***umbelaria Scopula* 1014**
***umbra Pyrrhia* 1714**
***umbraria Peribatodes* 804**
umbratica 1763
***umbratica Cucullia* 1641**
umbrosa 1807
umbrosa 2252
***unangulata Euphyia* 1208**
***unanimis Apamea* 1852**
***uncinula Watsonalla* 673**
***uncula Deltote* 1597**
***undata Eupithecia* 1258**
undulana 2301
***undulata Hydria* 1201**
***unedonata Eupithecia* 1321**
***unicata Protorhoe* 1112**
unicolor 111
unicolor 276
unicolor 91
unicoloraria 872
***unicoloraria Elophos* 873**
unifasciata 1224
***uniola Eilema* 2334**
***unipuncta Mythimna* 1962**
unita 2329
***unitaria Eupithecia* 1298**
urania 1591
***uroceriformis Bembecia* 225**
urticae 1550
urticae 534

urticae Aglais **533**
urticae Spilosoma **2371**
ustula Epimecia **1673**
vaccinii 2028
vaccinii Conistra **2027**
v-album 541
valerianata Eupithecia **1256**
vallei Mniotype **2096**
vallesiaca Dichagyris **2160**
valligera 2150
vandalusiae 1445
vandalusiae Cryphia **1446**
v-argenteum Panchrysia **1574**
varia Melitaea **555**
variabilis 1567
variabilis Euchalcia **1566**
variata Thera **1158**
variegata 316
variegata 866
variegata Euchrognophos **864**
variegatus 893
variostrigata Eupithecia **1259**
v-ata Chloroclystis **1338**
vau-album Nymphalis **541**
vau-nigrum 2284
vau-punctatum 2029
v-aureum 1578
velitaris Drymonia **1399**
velocior Metachrostis **1627**
velox 1627
velox 1628
velox Metachrostis **1626**
venata Ochlodes **370**
venetaria 721
venetiana Montanima **68**
venosata Eupithecia **1263**
ventilabris 1469
venusta 2087
venustula Elaphria **1720**
veratraria 1262
veratraria Eupithecia **1278**
verbasci Neoharpyia **1389**
verbasci Shargacucullia **1659**
verberata Mesotype **1234**
vernana Earias **2307**
vernaria 928
veronicae Conistra **2031**
versicolor Oligia **1876**
versicolora Endromis **294**
vespertalis 1700
vespertalis 1703
vespertalis 1829
vespertaria 1235
vespertaria Epione **735**
vespertilio Hyles **326**
vespertinalis Aegle **1701**
vespiformis Synanthedon **209**
vesta 1483
vestalis 1496
vestigialis Agrotis **2150**
vesubiana 153
vesubiana Zygaena **154**
vesubiata Idaea **978**
vesubiella Ptilocephala **104**
vetulata Philereme **1204**
vetusta Xylena **2051**
vetustata Thera **1161**
viadrina 112
vibicaria 1050
vibicaria Rhodostrophia **1045**
viciae Lygephila **1519**
viciae Zygaena **172**
viciella Megalophanes **111**
vicina Eremodrina **1742**
vicinaria Scotopteryx **1075**
vicrama Pseudophilotes **457**
vidanoi 1085
vidanoi 1088
vidanoi 1089
vidanoi Xanthorhoe **1090**
viduaria 822
viertlii Phthonandria **796**
vigilata Scopula **1021**
villai 471
villai 472
villai 475

villai Lycaeides **476**
villica Arctia **2384**
villosella Pachythelia **92**
viminalis Brachylomia **2039**
vincularia Itame **708**
vinula 1385
vinula Cerura **1384**
violata 1018
virens 1798
viretata Acasis **1375**
virgata Phibalapteryx **1071**
virgaureae Lycaena **422**
virgaureata Eupithecia **1322**
virgilia 507
virgilia Polyommatus **508**
virginalis 1012
virginalis 932
virgo Eucarta **1783**
virgularia 979
virgularia 980
virgulata 1029
virgulata Scopula **1016**
viridana 1686
viridaria 1178
viridaria 1541
viridaria Phytometra **1542**
viridata Chlorissa **920**
viridescens Xestia **2234**
viridescens. 2233
viridicincta 2084
viridiobscura 2083
viridis Polyphaenis **1767**
viridula 1608
viridula 1609
viridula Eublemma **1607**
viriplaca Heliothis **1708**
viscosa 1919
viscosa Condica **1698**
vitalba Thalpophila **1770**
vitalbata Horisme **1184**
vitellina 2328
vitellina Mythimna **1961**
vitriolata 842
vitta Euxoa **2123**
vittaria Elophos **871**
vittata Orthonama **1083**
vittata Paradrymonia **1402**
vivilo 644
v-nigrum 2284
voelkeri 1577
volgensis Jordanita **139**
vorbrodtella Oreopsyche **94**
vulcanica 1940
vulcanica 1941
vulcanica Hadena **1937**
vulgata Eupithecia **1287**
vulpinaria 955
vuteria 1976
w-album Satyrium **436**
warrenensis Pyrgus **362**
wauaria Macaria **696**
wehrlii Glacies **886**
weissi 1923
weissi 1924
weissi Hecatera **1925**
wimmerii 1594
wiskotti Standfussiana **2177**
witzenmanni Ammopol. **2073**
w-latinum Lacanobia **1900**
wockei 102
wockei Ptilocephala **103**
wolfenbergeri 544
wolfsbergeri 2340
wolfsbergeri 2342
wolfschlaegeri 2013
wolfschlaegeri Agrochola **2014**
wredowi 1645
wullschlegeli Paradri. **1738**
xanthe 423
xanthe 424
xanthenes 1803
xanthenes 1805
xanthenes Gortyna **1804**
xanthochloris Polypha. **1768**
xanthographa Xestia **2250**
xanthomelas Nymphalis **540**
xanthomista Polymixis **2085**
xerampelima 1998

xerampelina 1997
xeranthemi Cucullia **1638**
xiphia 571
xylostei 562
yamamai Antherea **301**
ypsillon Parastichtis **1789**
yvanii Cleonymia **1676**
zeae Leucania **1976**
zelleralis Zanclognatha **1470**
zelleraria 873
zelleraria Elophos **872**
zelleri Acanthopsyche **90**
zeta Abromias **1865**
zetterstedti 1671
ziczac Notodonta **1394**
zinkenii 2045
zobeli 1441
zollikoferi Fabula **1824**
zonaria Lycia **766**
zosimi Diachrysia **1565**