

*Bulletin de la Société d'histoire naturelle de l'Afrique du nord [...] Tome vingt-septième... (1936)*

## **Índice**

1. 144
2. 145
3. 146
4. 147
5. 148
6. 149
7. 150
8. 151
9. 152
10. 153
11. 154
12. 155
13. 156
14. 157
15. 158
16. 159
17. 160
18. 161
19. 162
20. 163
21. 164

## Contribution au Catalogue des Coléoptères de la Tunisie

par le D<sup>r</sup> H. NORMAND.

(9<sup>e</sup> fascicule) (1).

---

### ASPIDIHORIDAE

*Aspidiphorus orbiculatus* Gyll. — El-Feidja, 12.

### CISIDAE

*Xylographus bostrichoides* Duf. — Dans les Polyporacées. Aïn-Draham, 2; Sousse.

*Cedrinus camelus* Ab. — Souk-el-Arba, 9, 10.

*Cis pubescens* Dej. (*striatulus* Mel.). — Dans les Polyporacées, vivant sur les arbres les plus divers; saules, abricotiers, chênes, etc. Aïn-Draham, 5; El-Feidja, 3; Fernana; Le Kef; Souk-el-Arba, 11.

*C. comptus* Gyl. — El-Feidja, 3.

*C. nitidus* F. — Aïn-Draham, 2.

*C. boleti* Scop. — Aïn-Draham; El-Feidja, 3; Le Kef.

*C. pygmaeus* Marsh. — Aïn-Draham; El-Feidja.

*C. maurus* Peyerh. — Sousse.

### LYCTIDAE

*Lyctus impressus* Com. — Aïn-Draham, branches de *Quercus Mirbeckii* D.R., rongées par *Stromatium fulvum* Villers; Le Kef, issu de branchages de lentisque, attaquées par divers xylophages; Téboursouk, 5.

*L. brunneus* Steph. — Kébili, 5, éclos de nervures de palmier, attaquées par *Enneadesmus tripinosus* Ol.; Le Kef, branches d'*Acacia tortilis* Hayne provenant de Gafsa.

*L. linearis* Goeze. — El-Feidja; Fernana, 5; Le Kef; Souk-el-Arba.

*L. cornifrons* Lesne. — Le Kef, en abondance, dans les branches d'*Acacia tortilis* Hayne provenant de Gafsa et attaquées par de nombreux xylophages.

---

(1) Cf. *Bull. de la Soc. d'Hist. Nat. de l'Afr du Nord*, années 1933, 1934, 1935, 1936.

BOSTRYCHIDAE

- Stenomera Blanchardi* Luc. — Le Kef.  
*Rhizopertha dominica* F. — Kairouan; Kébili, 12, feuilles de palmier; Le Kef; Sidi-bou-Zid, (D<sup>r</sup> WASSILIEFF !).  
*Stephanopachys quadricollis* Mars. — Le Kef, 11; Téboursouk, 1.  
*Bostrychus capucinus* L. ab. *nigriventris* Luc. — Bulla Régia, 5; El-Feidja, 8; Fondouk-Djédid, 4; Le Kef; Souk-el-Arba, 5, 6; Téboursouk, 6.  
*B. capucinus* ab. *luctuosus* Ol. — El-Feidja, 8; Le Kef.  
*Lichenophanes numida* Lesne. — Aïn-Draham (AUROUSSEAU !); Ghardimaou.  
*Bostrychoplites Zieckeli* Mars. — Kébili, 5, feuilles de palmier. Alg. — El-Oued, (D<sup>r</sup> CARBONNIER !).  
*Xylopertha picea* Ol. — Fondouk-Djédid, 6; Kairouan; Souk-el-Arba, 6; Tunis, 8, poteaux de figuier supportant un gourbi.  
*Xylonites retusus* Ol. — Aïn-Draham (AUROUSSEAU !).  
*X. praeustus* Germ. — Aïn-Draham (AUROUSSEAU !); Le Kef.  
*Scobicia pustulata* F. — Le Kef, 8, branches de lentisque; Tunis, 8.  
*Sc. Chevrieri* Villa. — Aïn-Draham, 7; Fondouk-Djédid, 11; Le Kef, 11; Souk-el-Arba, 8; Téboursouk, 5; Tunis, 8.  
*Enneadesmus forficula* Fairm. — Kairouan; Le Kef, branches d'*Acacia tortilis* Hayne, provenant de Gafsa; Téboursouk, 7.  
*En. trispinosus* Ol. — Gabès, 6, feuilles de palmier; Kébili, 12; Le Kef, branches d'*Acacia tortilis* Hayne, provenant de Gafsa.  
*Xylomedes rufocoronata* Fairm. — Le Kef, branches d'*Acacia tortilis* Hayne, provenant de Gafsa.  
*Phonapate frontalis* F. sp. *uncinata* Karch. — Kébili, 5, 8, troncs de palmier soutenant une véranda où l'insecte se promenait vers 9 h. du soir.  
*Sinoxylon sexdentatum* Ol. — Vit dans les essences les plus diverses: caroubier, figuier, vigne, etc., mais affectionne particulièrement le lentisque. Aïn-Draham (AUROUSSEAU !); Bordj-el-Amri, 10; El-Feidja, 7; Fondouk-Djédid; Le Kef; Souk-el-Arba, 11; Téboursouk, 7.

ANOBIIDAE

- Xystrophorus Vaulogeri* Pic. — Kébili, 8, (BOITEL !).  
*Dryophilus anobioides* Chevr. — Aïn-Draham; Le Kef.  
*Dr. curticornis* Pic var. *subimpressus* Pic. — Souk-el-Arba, 1, 12; Le Kef.  
*Dr. pusillus* Gyl. — Aïn-Draham, 6; Camp de la Santé. Alg. Bône, 5; Philippeville, 10.  
*Dr. longicollis* Muls. — Gabès, 4.  
*Ochina hirsuta* Seid. var. *africana* Pic. — El-Feidja, 6.

**Xestobium rufovillosum** Deg. — El-Feidja, 6.

**Ernobius Normandi** Pic. — Téboursouk, 3.

**Er. pini** Sturm. — Fondouk-Djédid; Le Kef; Sakiet-sidi-Youssef, 5; Soliman; Souk-el-Arba, 5.

**Er. mollis** F. — Le Kef, issu de branches de *Pinus halepensis* Mil.

**Oligomerus ptilinoides** Woll. — Aïn-Draham.

**Stegobium paniceum** L. — Vit dans les denrées les plus diverses. M. PAGLIANO l'a capturé à Tunis à l'intérieur des biscuits destinés à la troupe. Aïn-Draham; Kairouan, 10; Kébili, 5; Le Kef; Médenine, 11; Radès; Sousse.

**Gastrallus immaginatus** Müll. (?). — Soliman, 6.

**G. pubens** Frm. — Kébili, 5; Le Kef, 6, éclos de nervures de feuilles de palmier rapportées de Gabès et qui depuis 5 ans m'en donnent toutes les années quelques exemplaires; Sidi-bou-Zid, (D' WASSILIEFF!).

**G. laevigatus** Ol. — Aïn-Draham, 7.

**Anobium punctatum** Geer. — Bizerte, 6, (BOITEL!); Le Kef.

**Metholcus cylindricus** Germ. — Bizerte, 6, (BOITEL!); Radès; Soliman, 6; Tabarka, 7.

Alg. — Philippeville, 5.

**Xyletinus bucephalus** Ill. — Un peu partout d'Aïn-Draham, 7 à Gabès, 2 et Kébili, 4.

**Lasioderma semirufulum** Reit. — Téboursouk, 6.

**L. Baudii** Schils. — Bulla Régia; Fondouk-Djédid, 6; Gabès, 4; Le Kef; Souk-el-Arba, 6; Tunis, 8.

**L. serricorne** F. — Dans les capitules de divers Garduacées. Aïn-Draham; Bulla Régia, 5; Fernana, 10; Hammam-Lif; Kébili, 3; Le Kef, 6; Téboursouk, 6.

**L. Mulsanti** Sch. — Hammam-Lif; Le Kef, dans les tiges des Euphorbes vivaces.

**L. Redtenbacheri** Bach. — Commun dans les capitules desséchés des chardons. Aïn-Draham, 4, 7; Fondouk-Djédid; Kairouan; Kébili, 5; Le Kef; Souk-el-Arba, 6; Tunis, 7.

**L. haemorrhoidale** Ill. — Mêmes mœurs. Fernana, 5; Fondouk-Djédid; Hammam-Lif, 11; Le Kef, 5; Radès; Souk-el-Arba, 5; Tabarka, 6; Téboursouk, 4.

**L. haemor. ab. bicolor** Schauf. — Fernana, 5; Fondouk-Djédid; Le Kef, 5; Hammam-Lif; Radès; Téboursouk, 6; Tunis, 10.

**L. Festai** Pic. — Capitules d'Echinops. Le Kef, 6.

**L. torquatum** Chevr. (?). — Kébili, 5; Téboursouk, 6.

**Theca cribricollis** Aubé. — Aïn-Draham.

**Th. byrrhoides** Muls. — Aïn-Draham, 6; Camp de la Santé; El-Feidja, 6; Fernana, 5.

- Th. puncticollis* Reit. — Tunis, 3.  
*Dorcatoma Demmeri* Rosenh. — Aïn-Draham, 11.  
*Caenocara subglobosa* Muls. — Aïn-Draham.

PTINIDAE

- Gibbium aequinoctiale* var. *longicorne* Reit. (?). — Plage de Gabès, 4.  
*Mezium affine* Boield. — Kébili, 4; guano de la grotte de Sidi-Abdallati près du Kef.  
*Paraniptus brunneus* Pic. — Bizerte, (BOTTEL!); Fondouk-Djédid; Khan-guet; Le Kef.  
*Ptinus Grandjeani* Pic. — Téboursouk, 3.  
*Pt. Martini* Pic. — Aïn-Draham, 6; Fernana.  
*Pt. femoralis* Reit. — Aïn-Draham, 6, 11; El-Feidja, 6.  
*Pt. Reitteri* Pic. — Commun en battant les chênes. Aïn-Draham, 11 ; Camp de la Santé, 3; Fernana, 12; Souk-el-Arba, 10.  
*Pt. Reitteri* ab. *obscurus* Pic. — Aïn-Draham, 11, 2.  
*Pt. latic* Fab. — Aïn-Draham; Le Kef, 1, 3; Sousse.  
*Pt. testaceus* Ol. — Téboursouk, 10; Fernana, 3; Kairouan; Le Kef, 1, 5, 10, parfois dans les terriers; Souk-el-Arba.  
*Pt. testaceus* ab. *brunneus* Duft. — Kébili, 5; Le Kef.  
*Pt. testaceus* ab. *brevipennis* Pic. — Le Kef; Monastir; Tabarka; Téboursouk, 3.  
*Pt. atricapillus* Kies. — Le Kef; Mehdià, 3; Téboursouk, 1.  
*Pt. subpilosus* Sturm. — Kébili, 12.  
*Pt. Leprieuri* Pic. — Fernana, 3.  
*Pt. Spitzyi* Villa. — En battant les arbustes et principalement les chênes. Aïn-Draham; El-Feidja, 12; Fernana; Le Kef; Soliman.  
*Pt. phlomidis* Boield. (?). — Kairouan, 11.  
*Pt. obesus* Luc. — Commun partout dans les détritiques ou en battant les buissons. Tous le Nord de la Tunisie au moins jusqu'à Sousse.  
*Pt. Olivieri* Pic. — Fort-Saint, dans les terriers de rongeurs. (D<sup>r</sup> WASILIEFF !).  
*Pt. Aubei* Boield. — Aïn-Draham, 5, en battant les chênes; El-Feidja; Le Kef.  
*Pt. variegatus* Rossi. — Gabès, 4; Kébili, 4; Le Kef; Medjez-el-Bab; Téboursouk, 3.  
*Pt. tunisus* Pic. — El-Djem; Kairouan, 10; Sousse.  
*Pt. Theryi* Pic. — Bir-bou-Rekba; Cherichera; Fondouk-Djédid; Kairouan; Le Kef; Medjez-el-Bab; Zaghuan, 10.  
*Pt. Theryi* Pic ab. *tomentifer* Pic. — Kébili, 3, 5.  
*Pt. lusitanicus* Ill. — Sous les pierres. Fernana, 5; Kairouan, 10; Le Kef, 1, 4; Mehdià, 3; Radès; Téboursouk, 1.

**Pt. xylopertha** Reche. — Djerba, 4; El-Djem.

**Pt. carinatus** Luc. — Commun sous les pierres. Bizerte, 12; Fernana, 3; Fondouk-Djédid; Ghardimaou, 1; Kairouan; Le Kef, 1, 12; Tabarka; Téboursouk, 1; Tunis, 10.

#### GEORYSSIDAE

**Georyssus crenulatus** Rossi. — Dans la boue et le sable humides au bord des eaux. Aïn-Draham; Bir-bou-Rekba; Fernana, 5; Le Kef; Soliman; Souk-el-Arba, 5.

**G. crenulatus** ab. **integrostriatus** Mots. — Aïn-Draham; Fernana, 12; Souk-el-Arba.

**G. costatus** Cast. — Mêmes mœurs. Aïn-Draham; Bir-bou-Rekba; Fernana; Kairouan; Le Kef; Soliman; Souk-el-Arba, 4.

**G. costatus** ab. **cupreus** Reich. — Aïn-Draham.

#### CEDEMERIDAE

**Nacerda melanura** L. — La Goulette, 5; Le Kef; Radès.

**N. dispar** Duf. ab. **aurosa** Fairm. — Bulla Régia, 5; Souk-el-Arba, 5.

**Sessinia obsoleta** Fairm. — Kébili, 4.

**S. obsoleta** ab. **nigrovariegata** Chevr. — Kébili, 3.

**Probosca viridana** Schm. — En fauchant dans les endroits marécageux. Bulla Régia, 5; Kairouan; Kébili, 5, 6.

Alg. — Les Lacs (Constantine).

**Pr. viridana** ab. **nigrofemorata** Pic. — Bulla Régia, 7.

Alg. — Les Lacs, avec de nombreuses formes faisant le passage entre le type et son aberration.

**Pr. Boiteli** (Pic) nov. sp. — *Elongata, nigro-plumbea, capite thoracique olivaceo-metallicis, diverse albo pubescens, membris testaceis.*

Allongé, foncé avec les membres testacés, revêtu d'une pubescence blanche rapprochée ou espacée, avant corps brillant, à coloration olivâtre métallique, avec la partie antérieure de l'épistôme et du labre testacée. Tête à ponctuation peu forte et écartée, ornée de poils blancs épars, longitudinalement ou transversalement disposés, yeux peu saillants; antennes entièrement testacées, grêles et courtes; thorax plus long que large élargi en avant du milieu, à ponctuation en partie pupilleuse, large, écartée sur le milieu; peu impressionné en dessus, orné de poils blancs épars, diversement disposés, les uns sur deux rangées forment une sorte de ligne longitudinale, les autres, sur les côtés transversalement disposés; élytres d'un gris plombé, à peine brillants, assez densément et régulièrement pubescents de blancs; pattes testacées, cuisses, vers le sommet et en dessous vaguement rembrunies. Long. 7 mill.

Tunisie : Kairouan (D<sup>r</sup> BOITEL). Communiqué par le D<sup>r</sup> NORMAND.

Voisin de *P. hispanica* Pic, s'en distingue par l'avant-corps très brillant à reflet métalliques olivâtres avec un pubescence blanche espacée.  
— M. Pic.

**Chitona Baulnyi** Frm. — Kairouan.

**Asclera xanthoderes** Muls. (*tenietensis* Ab.). — Aïn-Draham; Camp de la Santé; El-Feidja, 4.

**As. Reitteri** Gglb. — Le Kef; Téboursouk, 6.

**Oncomera marmorata** Er. — Bizerte, (BOITEL!).

Alg. — Bougie, 5.

**Oedemera brevicollis** Schm. ab. **tibialis** Luc. — Le Kef; Souk-el-Arba, 6; Tabarka, 5; Téboursouk, 5.

**Oe. barbara** F. — Commun sur les fleurs, en particulier celles de la ronce. Aïn-Draham, 5; El-Feidja, 6; Fernana, 5; Le Kef; Souk-el-Arba, 5; Téboursouk, 5.

**Oe. barbara** ab. **abdominalis** Pic. — Cherichera (D<sup>r</sup> SANTSCHI!); Kairouan.

**Oe. nobilis** Scop. — Aïn-Draham; El-Feidja, 5; Le Kef, 5.

**Oe. lurida** Marsh. — El-Feidja, 4; Fondouk-Djédid, 4; Téboursouk, 4.

**Stenostoma coeruleum** Pet. — Bordj Cédria; Radès; Tabarka.

#### PYTHIDAE

**Lissodema lituratum** Costa. — Sous les écorces. Camp de la Santé; Fernana; Souk-el-Arba, 1.

**L. quadripustulatum** Mrsh. — El-Feidja, 6.

**L. Cloueti** Guilb. — Camp de la Santé.

**Salpingus ater** Gyll. — Le Kef.

**S. nitidus** Chevr. — Ghardimaou, 11; Le Kef; Zaghouan, 10.

**Rhincsimus tapirus** Ab. — Aïn-Draham, 11.

**Rh. planirostris** F. — Aïn-Draham, 7; Fernana, 6.

**Mycterus curculionides** F. — Le Kef; Téboursouk, 5.

**M. umbellatarum** F. — Sur les ombelles comme son nom l'indique. Le Kef; Radès, 5; Téboursouk, 5.

**M. umbel.** var. **siculus** Bdi. — Aïn-Draham, 7; El-Feidja, 7; Fernana, 5; Le Kef; Téboursouk, 5.

#### SCRAPTIDAE

**Scraptia ophthalmica** Muls. — Aïn-Draham, 7; Fernana; Gabès, 11; Kairouan; Le Kef, 7; Soliman; Souk-el-Arba, 5; Tabarka, 7; Tunis, 7.

**Sc. dubia** Ol. — Aïn-Draham, 6; Le Kef.

**Trotommidea elongata** Pic. — Aïn-Draham, 6; El-Feidja, 7; Fernana, 6; Téboursouk, 5.

*Troctomma pubescens* Kiesw. — Détritrus végétaux, à moitié desséchés. Fondouk-Djédid; Sousse.

*Tr. pubescens* ab. *tunisea* Pic. — Aïn-Draham, champignons, 4; Camp de la Santé; Fernana, 5; Le Kef.

*Tr. Normandi* (Pic), nov. sp. — *Olongo-subovata, convexa, nitida, sparse griseo pubescens, rufo-castanea.*

Oblong, subovalaire, convexe, orné d'une pubescence grise espacée et en partie soulevée, coloration générale d'un roux châtain. Tête robuste, presque aussi large que le thorax, à ponctuation assez fine écartée; antennes grêles, courtes, obscures, à base plus claire; thorax court et large, subarqué sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, à ponctuation forte et peu serrée; élytres un peu plus larges que le thorax à épaulures nulles, assez courts, et larges, subarqués sur les côtés, atténués à l'extrémité, convexe, un peu enfoncés longitudinalement à la suture, à ponctuation plus ou moins forte et écartée. Long. 2 mill. environ.

Tunisie. — Le Kef (D<sup>r</sup> NORMAND, in coll. NORMAND et PIC).

Voisin de *T. latipennis* Pic, s'en distingue par la coloration plus foncée, le thorax un peu rétréci postérieurement, la ponctuation plus forte des élytres. — Maurice Pic.

#### ADERIDAE

*Aderus pruinosus* Kies. ab. *obscurus* Pic. — Aïn-Draham.

*A. angulithorax* Dbr. — Hammam-Lif; Kairouan, 10; Souk-el-Arba; Téboursouk, 3.

*A. neglectus* Duv. — Aïn-Draham, 7; Le Kef.

*A. populneus* Panz. — Aïn-Draham; Fernana, 5; Le Kef, 4, 10, 11; Téboursouk, 5.

*A. populneus* var. *biskrensis* Pic. — Kébili, 3; Souk-el-Arba, 6.

#### ANTHICIDAE

*Macratia Leprieuri* Rehe. — En battant les chênes. Aïn-Draham, 11; El-Feidja, 5; Fernana, 6.

*Notoxus brachycerus* Fald. — Souk-el-Arba, 6.

*N. brachycerus* ab. *hipponensis* Pic. — Tabarka.

*N. lobicornis* Rehe. — Kébili, 5; Souk-el-Arba, 6; Tabarka, 7.

*N. trifasciatus* Rossi. — Fernana, 6; Souk-el-Arba, 6.

*N. mauritanicus* Laf. — Bordj-Cédria, 6; Hammam-Lif, 6; La Marsa; Radès; Tabarka, 6.

*N. mauritanicus* ab. *conjunctus* Pic. — Tabarka, 6

*N. hispanicus* Mots. var. *cavifrons* Laf. — Kébili, 5; Le Kef, 6; Souk-el-Arba, 6; Tabarka.

*N. excisus* Küst. — Kairouan; Le Kef, 6; Souk-el-Arba, 7.

*N. numidicus* Luc. — Bordj Cédria, 6; El-Feidja, 6; Fondouk-Djédid, 5; Hammam-Lif, 6; Kairouan; Le Kef; Radès, 5; Soliman, 6; Tabarka, 6, en battant les Tamaris.

*N. numidicus* ab. *Cloueti* Chob. — Kairouan.

*Pseudonotoxus testatus* Laf. — Ghardimaou, 1; Kairouan; Souk-el-Arba, 2.

*Mecynotarsus bison* Ol. — Lieux sablonneux, au pied des plantes, surtout au bord de la mer. Hammam-Lif, 4; Gabès, 4; La Marsa, 9; La Goulette, 11; Kairouan; Sousse.

*M. semicinctus* Woll. — Kébili, 12.

*Amblyderus scabricollis* Laf. — Souk-el-Arba, 1.

*Tomoderus compressicollis* Mots. — Le Kef.

*T. ventralis* Mars. — Terreau de feuilles. Aïn-Draham, 11; Camp de la Santé.

*Formicomus cœruleipennis* Laf. — Détrit, surtout au bord des eaux. Gabès, 4; Kairouan, 10; Kébili, 5; Souk-el-Arba, 10; Sousse.

*F. coerul.* var. *cyanopterus* Laf. — Gabès, 4, 9; Kairouan; Kébili, 3.

*F. pedestris* Rossi. — Détrit humides. Souk-el-Arba, 1; Téboursouk, 12.

*F. pedestris* ab. *atratus* Reit. — Radès, 10; Téboursouk, 4, 12.

*F. latio* Laf. — Commun en juillet sur les bords desséchés du marais d'Abida près du Kef. Le mâle de cette espèce présente une épine acérée aux fémurs antérieurs et une forte échancrure au tiers inférieur des tibias antérieurs.

*Leptaleus Rodriguesi* Latr. — Commun partout dans les détrit de même que son aberration *subinfasciatus* Pic.

*L. arabs* Mars. — Ile de Djerba, 4, 11, sous les pierres.

*Anthicus vittatus* Luc. — Aïn-Draham; Sousse.

*A. Desbrochersi* Pic. — Bord des ruisseaux salés. Kairouan; Les Salines près du Kef.

*A. coniceps* Mars. — Détrit au bord des eaux salées. Hammam-Lif; Ile de Djerba, 4; Radès, 4; Soliman; Sousse; Tunis, 10, bords du lac.

*A. coniceps* var. *subopacicollis* Pic. — Sousse.

*A. humilis* Germ. — Commun partout dans les détrit.

*A. humilis* var. *Lameyi* Mars. — Aïn-Draham, 7; Carthage; Kébili, 5; La Goulette.

*A. larvipennis* Mars (?). — La Goulette; Tunis, 9, 10.

*A. testaceipes* Pic. — Kairouan; Kébili, 4, 5.

*A. Bremsi* Laf. — Bulla Régia, 7; Kébili, 3.

*A. lucidicollis* Mars. — Bulla Régia, 5; Hammam-Lif, 4; Kairouan, 10; Le Kef, 5, 9; Souk-el-Arba, 6.

*A. biskrensis* Pic. — (Probablement simple variété de *lucidicollis* M). Bordj Cédria, 10; Kairouan; Kébili, 3; Souk-el-Arba, 6.

- A. Hammami* Pic. — Kairouan; Sousse, détritit des sebkras.  
*A. Vaucheri* Chob. — Le Kef, un exemplaire pris au vol.  
*A. dromodioides* Pic. — Djerba, 11; Souk-el-Arba, 11, au vol.  
Alg. — Biskra, 11.  
*A. minutus* Laf. — Commun dans tout le nord de la Tunisie au moins jusqu'à Kairouan et Sousse.  
*A. minutus* var. *algeriensis* Pic. — Le Kef; Monastir; Sousse.  
*A. debilis* Laf. — Kairouan; Kébili, le soir, à la lumière.  
*A. floralis* L. — Commun partout dans les détritit, les pailiers, les fumiers, etc., d'Aïn-Draham, 7, à Djerba, 11 et Tozeur, 11.  
*A. quisquilius* Thoms. — Mêmes mœurs et tout aussi commun.  
*A. opaculus* Woll. — Djerba, 11; Gabès, 4; Kairouan; Kébili, 3, à la lumière; Sousse; Tozeur, 11.  
*A. instabilis* Schm. — Espèce commune au moins jusqu'à Kairouan et affectionnant les détritit à moitié desséchés du bord des eaux.  
*A. instabilis* ab. *agilis* Küst. — Kairouan.  
*A. instabilis* ab. *Deslogesi* Pic. — Bulla Régia, 5; Kairouan, 9; Téboursoûk, 4.  
*A. instabilis* ab. *sabuleti* Laf. — Aïn-Draham, 7; Bulla Régia, 7; Kairouan, 9; La Marsa, 7; Le Kef.  
*A. veatus* Mars. — Fernana.  
*A. longicollis* Schm. — Ghardimaou, 6.  
*A. transversalis* Villa. — Kairouan; Le Kef, 10; Medjez-el-Bab, 4; Souk-el-Arba, 4.  
*A. Goebeli* Laf. — Aïn-Draham, 7; Djerba, 11; Gabès, 2; Hammam-Lif, 4; Kairouan; Kébili, 3, à la lumière; Le Kef, 9; Souk-el-Arba, 6.  
*A. Goebeli* var. *meridionalis* Pic. — Centre et Sud de la Tunisie. El-Djem, 11; Kairouan; Kébili, 5, à la lumière; Monastir.  
*A. longiceps* Laf. — Le Kef.  
*A. erythroderus* Mars. — Le Kef; Sakiet-sidi-Youssef, 6; Souk-el-Arba, 5; Téboursoûk, 4.  
*A. subcyanus* Pic. — Hammam-Lif, 4; Le Kef, 5; Sakiet-sidi-Youssef, 6; Téboursoûk, 4.  
*A. dichrous* Laf. — Fondouk-Djédid.  
*A. quadriguttatus* Rossi. — Commun partout jusqu'à Tozeur, 11.  
*A. hispidus* Rossi. — Fondouk-Djédid; Souk-el-Arba, 6; Téboursoûk, 6.  
*A. cribripennis* Dbr. — Endroits marécageux. Bulla Régia, 5; Le Kef, marais d'Abida, 7; Souk-el-Arba.  
*A. fuscicornis* Laf. — Souk-el-Arba.  
*A. fuscicornis* var. *barbarus* Pic. — Ghardimaou, 6.  
*A. antherinus* L. — Tabarka; Tunis, 11.  
*A. antherinus* ab. *syriae* Pic. — Bulla Régia; Kairouan; Le Kef.  
*A. laeviceps* Bdi. — Détritit, au bord des eaux. Bulla Régia, 7; Ham-

mam-Lif, 4; Kairouan; Le Kef, 2, 9; Souk-el-Arba, 6; Téboursouk, 12.

*A. laeviceps* ab. *lucidipes* Pic. — Bulla Régia, 7; Téboursouk, 6.

*A. laeviceps* ab. *lucidithorax* Pic. — Bulla Régia, 7; Le Kef.

*A. brunneus* Laf. ab. *quadrimaculatus* Luc. — Fernana, 5; Kairouan; Souk-el-Arba, 6; Téboursouk, 6.

*A. crinitus* Laf. Kébili, 4, à la lumière.

*A. bifasciatus* Rossi. — Bulla Régia, 7; Le Kef; Souk-el-Arba, 10; Téboursouk, 2.

*A. Theryi* Pic. — Un peu partout dans les détritux en voie de dissé-  
cation. Bulla Régia, 9; El-Djem; Fernana, 3; Fondouk-Djédid; Le Khan-  
guet; Kairouan; Le Kef, 2, 9; Sousse; Tunis.

*A. Theryi* ab. *batnensis* Pic. — Kairouan; Le Kef, 1, 9, 10, 11.

*A. Theryi* ab. *Mayeti* Chob. — El-Djem; Kairouan.

*A. tristis* Schm. — Commun partout dans les détritux les plus divers  
d'El-Feidja, 4 à Tozeur, 11.

*A. tristis* ab. *tristiculus* Reit. — Mêmes mœurs et tout aussi répandu.

*A. hamicornis* Mars. — Kébili, 5, à la lumière.

*A. hamicornis* ab. *Bedeli* Pic. — Kairouan; Souk-el-Arba, 6; Tunis, 10,  
bords du lac.

*A. ocreatus* Laf. — Commun sur les fleurs. Camp de la Santé; Fer-  
nana, 5; Fondouk-Djédid; Gafour; Le Kef; Souk-el-Arba, 4; Sousse;  
Téboursouk, 4.

*A. ocreatus* ab. *basicoelis* Pic. — Camp de la Santé; Le Kef; Tébour-  
souk.

*A. posticus* Laf. — Egalement sur les fleurs. Aïn-Draham; Fenana, 5;  
Le Kef; Souk-el-Arba, 5; Sousse; Téboursouk; Tunis.

*A. olivaceus* Laf. — Mêmes mœurs. Aïn-Draham, 7; Bordj-Cédria, 5;  
Bulla Régia, 7; Fernana, 5; Le Kef; Souk-el-Arba, 6; Téboursouk, 6.

*A. pumilus* Bdi. — Aïn-Draham; Ghardimaou, 5; Le Kef, 5; Sousse;  
Téboursouk, 6.

*A. sericeus* Pic. — Le Kef.

*A. cyanipennis* Gril. — Sur les fleurs, en particulier celles des Gé-  
nistées. Bulla Régia, 5; Fondouk-Djédid; Hammam-Lif; Le Kef; Té-  
boursouk, 3.

*A. cyanipennis* ab. *Grilati* Pic. — Khanguet, 4; Le Kef.

*A. fenestratus* Schm. — Plages maritimes. Hammam-Lif, 4; La Gou-  
lette, 8; La Marsa, 7; Radès; Soliman; Tabarka.

*A. fenestratus* ab. *nigricans* Pic. — Djerba, 4; Hammam-Lif, 4, 12;  
Sousse.

*A. fumosus* Luc. — Fernana; Ghardimaou, 6; Le Kef; Souk-el-Arba.

*A. fumosus* ab. *bicolor* Luc. — Fernana; Ghardimaou, 6; Le Kef;  
Souk-el-Arba.

A. *Genei* Laf. — Plages maritimes. Djerba, 4; Hammam-Lif, 12; Monastir; Soliman, 6.

A. *obscuripes* Pic. — Le Kef, 2.

A. *obscuripes* ab. *alutaceipes* Pic. — Le Kef.

A. *insignis* Luc. — Le Kef, 2; Thala, 3.

A. *Noualhieri* Pic. — Gabès, 2.

A. *Aubei* Laf. — Fondouk-Djédid; Le Kef, 4.

A. *Aubei* ab. *calorificus* Pic. — Le Kef.

A. *cinctutus* Mars. — Djerba, 4 (Ile de).

A. *Oberthuri* Bdi. — Le Kef.

A. *Chobauti* Pic. — Djerba, 4.

A. *constricticollis* Desbr. — Téboursouk, 6.

A. *Leprieuri* Bdi. — Le Kef.

A. *Normandi* Pic. — Le Kef.

A. *Oedipus* Chevr. — Le Kef.

A. *succinctus* Chevr. — Le Kef.

A. *tuniscus* Pic. — Aïn-Draham; Le Kef.

A. *valgus* Fairm. — Aïn-Draham; Camp de la Santé; Fernana, 6.

A. *Sicardi* Pic. — Fondouk-Djédid; Le Kef, 4, fentes des rochers du Dyr; Téboursouk, 3.

A. *Sicardi* ab. *thalensis* Pic. — Fernana, 5; Le Kef, 4, rochers du Dyr.

*Endomia tenuicollis* Rossi. — Détritit au bord des oueds, des marais, etc. Bulla Régia, 8; Fernana, 5; Kairouan; Le Kef; Téboursouk, 12.

E. *unifasciata* Bon. — Bir-bou-Rekba, 4; Fernana, 3; Kairouan; Kébili, 3, à la lumière; Le Kef, 4; Souk-el-Arba.

E. *occipitalis* Duf. — Fernana, 3; Ghardimaou; Le Kef; Souk-el-Arba, 7.

#### MELOIDAE

*Lydus algiricus* L. — Sur les fleurs. Le Kef, 6; Téboursouk, 6.

L. (*Alosimus*) *cirtanus* Luc. — Le Kef, 5; Souk-el-Arba, 5; Téboursouk, 5.

L. *mendax* Fairm. — Souk-el-Arba, 5.

L. *viridissimus* ab. *coeruleus* Esch. — Hammam-Lif, 4; Le Kef; Souk-el-Arba, 4; Téboursouk, 3.

*Oenas afra* L. — Fernana, 5; Le Kef, 6; Téboursouk, 6.

*Oenas afra* ab. *maculata* nov. — Corselet rouge présentant au centre une tache noire arrondie, reliée à la base et parfois au bord antérieur. Chérichéra (D<sup>r</sup> SANTSCHI !); Le Kef.

Oe. *afra* ab. *unicolor* Cast. — Bulla Régia, 7; Chérichéra (D<sup>r</sup> SANTSCHI !); Fondouk-Djédid, 5; Le Kef, 5; Téboursouk, 5.

*Cerocoma Schreberi* F. — El-Feidja, 6; Le Kef.

**C. Vahli** F. — Sur les fleurs, principalement les ombelles. Aïn-Draham, 7; Bulla Régia, 5; El-Feidja, 6; Le Kef; Sakiét-sidi-Youssef, 5; Téboursouk, 5.

**Mylabris Hemprichi** Klug. — Kébili, 3.

**M. quadripunctata** L. subsp. **tricincta** Chevr. — Aïn-Draham, 7; Bulla Régia, 5; El-Feidja, 5, 6; Le Kef; Téboursouk, 5.

**M. 4-punctata** subsp. **tricincta** var. **Guerini** Chevr. — Bulla-Régia, 5; El-Feidja, 5; Le Kef.

**M. 4-punctata** var. **Guerini** ab. **rubripennis** Chevr. — Aïn-Draham, 6, 7; Bulla-Régia, 8; Fernana, 6; Le Kef; Sakiét-sidi-Youssef, 6; Téboursouk, 5 (1).

**M. Schreibersi** Reich. — Aïn-Draham, 7; Bulla-Régia, 5; Le Kef, 6; Téboursouk, 5.

**M. olea** Lap. — Bulla-Régia, 6; El-Feidja, 7; Kairouan; Le Kef; Téboursouk, 6.

**M. olea** ab. **hipponensis** Pic. — Téboursouk, 6.

**M. oleae** ab. **mediobliterata** Pic. — Kairouan (D<sup>r</sup> SANTSCHI !).

**M. tenebrosa** Cast. El-Feidja, 4; Hammam-Lif, 6, 7; Le Kef; Soliman.

**M. tenebrosa** ab. **postfuteonotata** Pic. — El-Feidja, 4; Médénine, 4.

**M. calida** Pall. — Bulla-Régia, 7; Ghardimaou, 6; Le Kef, 6; Téboursouk, 6.

**M. calida** ab. **latefasciata** Pic. — Téboursouk, 5.

**M. calida** ab. **maculata** Ol. — Le Kef, 6, 7; Sakiét-Sidi-Youssef, 6; Téboursouk, 5.

**M. Fabricii** Sum. (*10-punctata* F.)?. — Téboursouk, 6.

**M. praeusta** F. ab. **semirufa** Mars. — Aïn-Draham, 7; El-Feidja, 6; Ghardimaou, 5.

**M. praeusta** ab. **superflua** Mars. — El-Feidja, 6.

**M. praeusta** ab. **apicalis** Chevr. — El-Feidja, 6.

**M. praeusta** ab. **nigra** Mars. — Aïn-Draham, 7; Le Kef, 6; Souk-el-Arba, 6; Téboursouk, 5.

**M. Silbermanni** Chevr. var. **nocticolor** Peyerh. — Téboursouk, 6. Cet exemplaire a la pubescence entièrement foncée mais présente les taches habituelles des *Silbermanni* typiques.

**M. impressa** Chevr. — Le Kef; Sakiét-sidi-Youssef, 6.

**M. brevicollis** Bdi. — El-Djem, 4; Le Kef; Souze; Téboursouk, 6.

---

(1) **M. 4-PUNCT. AB. NORMANDI** (Pic) nov. — *Nitidus, griseo-pubesceus, ante fusco hirsutus, niger, elytris rubris, in singulo antice nigro bimaculatis, post medium late nigrofasciatis et apice nigro notatis, sutura postice nigra.*

Algérie. — Batna (D<sup>r</sup> NORMAND, in coll. NORMAND).

Cette aberration, voisine de l'ab. *rubripennis* Chevr. s'en distingue par l'élargissement et la jonction sur la suture des dessins noirs de la partie postérieure des élytres, autrement dit : élytres à moitié apicale noire, moins sur chacun, une fascie antéapicale rougeâtre étroite, sinuée, n'atteignant ni le bord, ni la suture. (Maurice Pic).

- M. brevicollis* ab. *Bauprei* Pic. — Téboursouk, 6.
- M. brevicollis* ab. *mediobisbijuncta* Pic. — Téboursouk, 6.
- M. plagiella* Esc. — Téboursouk, 6. La capture de cette forme marocaine en Tunisie est à noter. Il semble d'ailleurs, ainsi que le fait remarquer de PEYERIMHOFF (in *Bull. de la Soc. des Sc. Natur. du Maroc*, 1935, p. 23) qu'elle ne soit qu'une forme particulière du *M. brevicollis* Bdi.
- M. r8-maculata* Mars. — Téboursouk, 6.
- M. angulata* Klug. var. *incerta* Klug. — Djebibina (D<sup>r</sup> SANTSCHI !).
- M. circumflexa* Chevr. — Commun partout d'Aïn-Draham à Kébili, 5, de même que ses nombreuses variétés :
- M. circumf.* ab. *borealis* Voipts. — El-Djem, 4.
- M. circumf.* ab. *atrojuncta* Pic. — Soliman.
- M. circumf.* ab. *edoughensis* Pic. — Le Kef, 6.
- M. circumf.* ab. *unireducta* Pic. — Kébili, 5.
- M. circumf.* ab. *apicecincta* Pic. — El-Djem, 4; Kébili, 5; Le Kef, 6; Téboursouk, 5, etc.
- M. circumf.* ab. *diversenotata* Pic. — Hammam-Lif, 6; Le Kef, 6; Téboursouk, 5.
- M. circumf.* ab. *antebinotata* Pic. — Ghardimaou, 6; Kébili, 6; Le Kef, 6; Téboursouk, 6.
- M. (Ceroctis) corynoides* Reiche. ab. *breveinterrupta* Pic. — Sakiet-sidi-Youssef, 6.
- M. (Decapotoma) 19-punctata* Ol. — Kébili, 5.
- M. (Coryna) distincta* Chevr. — L'espèce est commune dans tout le Nord de la Tunisie. Elle est des plus variables, ses taches deviennent souvent ponctiformes et s'oblitérant les unes après les autres finissent par donner une forme entièrement concolore qu'on pourrait identifier avec l'aberration *Hafidi* Pic si sa ponctuation n'était identique aux exemplaires typiques de l'espèce, Téboursouk, 6. Les exemplaires à taches réunies sont beaucoup plus rares à signaler seulement l'ab. *andalusiaca* Pic provenant d'Aïn-Draham, 6.
- Cabalia segetum* F. — En fauchant les herbes au printemps. Aïn-Draham, 6; Bulla-Régia, 5; El-Feidja, 6; Fernana, 5; Le Kef; Téboursouk, 5.
- C. segetum* ab. *coerulea* Esch. — Téboursouk, 5.
- Lagorina scutellata* Cast. — Mêmes mœurs. Le Kef; Téboursouk, 5.
- Cylindrothorax verrucicollis* Karsch. — Bir Mellah, sur la route de Sfax à Sidi-bou-Zid, (D<sup>r</sup> WASSILIEFF !); Tozeur, 11.
- Cy. Chanzyi* Frm. — Tunisie méridionale, sur les fleurs. Gabès, 4; Kébili, 4, 5; Médenine, 4.
- Cy. cinereovestita* Frm. ab. *rufula* Frm. (*djerbensis* Esch.). — Ile de Djerba, 4; Kébili, 4.

- Meloë violaceus* Marsh. — El-Feidja, 5.  
*M. siculus* Baudi. (?). — Kairouan; Souk-el-Arba, 4.  
*M. autumnalis* Ol. — Le Kef, 4; Téboursouk, 12; Tunis, 11.  
*M. majalis* L. — Le Kef, 4.  
*M. cavensis* Petagna. — Le Kef, 4; Soliman; Souk-el-Arba, 3, 12; Téboursouk, 3; Tunis, 11.  
*M. tuccius* Rossi. — Fondouk-Djédid; Gabès, 2; Hammam-Lif; Kairouan; Le Kef, 4; Souk-el-Arba, 5; Téboursouk, 4.  
*M. algericus* Esch. — Le Kef.  
*M. rugosus* Marsh. — Aïn-Draham, 11; Fernana, 12; La Goulette, 11; Tunis, 11.  
*M. affinis* Luc. — Thala, 3.  
*M. murinus* Brandt. — Commun un peu partout. Fernana, 11, 12; Fondouk-Djédid; Kairouan, 1; Le Kef, 3; Souk-el-Arba, 11; Téboursouk, 1; Tunis, 11.  
*M. feveolatus* Guér. — Sousse.  
*Apalus Solieri* Pecch. — Souk-el-Arba, 10.  
*Euzonitis fulvipennis* F. ab. *nigra* Tausch. — Téboursouk, 8.  
*Zonitis Bellieri* Reich. — Téboursouk, 5.  
*Z. praeusta* F. ab. *flava* F. — Aïn-Draham, 7; El-Feidja, 7; Souk-el-Arba.  
*Z. praeusta* ab. *analis* Ab. — El-Feidja, 6; Souk-el-Arba.  
*Z. praeusta* ab. *nigrithorax* Pic. — Le Kef.  
*Nemognatha chrysomelina* F. — Kairouan.  
*N. chrysomelina* ab. *maculicollis* Frm. — Kairouan; Kébili, 5.  
*N. chrysomelina* ab. *nigripes* Suffr. — Kairouan.  
*Leptopalpus rostratus* F. — Commun au premier printemps sur les fleurs de *Rhaponticum* acaule D.C. et de diverses *Centaurea* L. Le Kef, 3, 4; Téboursouk, 4.  
*Ptilophorus Dufouri* Latr. — Le Kef; Sakiét-sidi-Youssef, 6; Souk-el-Arba, 4.  
*Pt. Dufouri* ab. *Boryi* Luc. — Sakiét-sidi-Youssef, 6.  
*Rhipiphorus subdipterus* Bosc. — Le Kef, 6, un exemplaire sur une fleur d'*Echinops*.

#### MORDELLIDAE

- Mordella bipunctata* Germ. — Aïn-Draham, 7; El-Feidja, 7; Le Kef; Souk-el-Arba, 8; Téboursouk, 6.  
*M. bipunctata* ab. *breviuscula* Csiki. — Aïn-Draham, 7.  
*M. sulcicauda* Muls. ab. *Ragusai* Em. — El-Feidja, 7; Téboursouk, 6.  
*M. leucaspis* Küst. ab. *vestita* Em. — Aïn-Draham, 7; El-Feidja, 6; Souk-el-Arba, 6; Téboursouk, 6.  
*M. aculeata* L. var. (?). — Téboursouk, 7.  
*Stenalia testacea* F. — Bulla Régia; Le Kef, 5; Téboursouk, 6.

*St. testacea* ab. *meridionalis* Chob. — Aïn-Draham, 6; Bulla Régia; Kairouan; Le Kef, 6; Téboursouk, 6.

*St. atra* Perr. — El-Feidja, 5; Le Kef, 5.

*St. atra* ab. *brunnea* nov. — Diffère des exemplaires typiques par la pubescence brune. El-Feidja, 6, 8; Le Kef, 5; Téboursouk, 5.

*St. atra* ab. *argentata* Schilsk. — Fernana, 5.

*Mordellistena Reichei* Em. — Aïn-Draham, 7.

*M. episternalis* Muls. — Commun partout sur les fleurs et en particulier sur les Ombelles. D'Aïn-Draham à Sousse.

*M. micans* Germ. — Mêmes mœurs et aussi commune. D'El-Feidja, 7, 8, à Djerba, 4.

*M. micans* ab. *Perroudi* Muls. — Hammam-Lif; Le Kef.

*M. pumila* Gyll. — Aïn-Draham, 7; Le Kef, 4; Souk-el-Arba, 4; Téboursouk, 4.

*M. pumila* ab. *deficiens* Muls. — Fondouk-Djédid; Kairouan; Le Kef; Tabarka, 5; Téboursouk, 4.

*M. pumila* ab. *pentas* Muls. — El-Feidja, 5; Le Kef, 5; Téboursouk, 5, 7.

*M. stenidea* Muls. — Aïn-Draham, 5; Tabarka, 6.

*M. confinis* Costa ab. *Emeryi* Schilsk. — El-Feidja, 7; Djerba, 4; Hammam-Lif; Téboursouk, 7.

*M. pulchella* Muls. — El-Feidja, 7; Le Kef; Téboursouk, 6.

*Dellamora palposa* Norm. (A' 1916, p. 285). — Djerba, 4; Le Kef, 4; Médenine, 4; Sousse; Téboursouk, 5.

L'espèce, rare dans le Nord, se prend beaucoup plus communément dans le Sud, en particulier sur les fleurs de *Lotus* et d'*Erodium*.

*D. brevicollis* Em. — Souk-el-Arba, 4; Téboursouk, 4, 5.

*Anthobates Defarguesi* Ab. ab. *pictipennis* Reit. — Kairouan, 4; Sousse.

*A. Defarguesi* ab. *Chobauti* Csiki. — Kébili, 5.

*Anaspis latiuscula* Muls. — Aïn-Draham; El-Feidja, 4; Fernana; Le Kef; Souk-el-Arba, 4.

*A. trifasciata* Chevr. — Aïn-Draham, 10; El-Feidja, 6; Hammam-Lif; Fernana; Le Kef, 9, 10, sur les fleurs d'*Urginea maritima* Bak; Souk-el-Arba, 5; Téboursouk, 6.

*A. trifasciata* ab. *confluens* Schils. — Le Kef; Téboursouk, 6; Zaghuan, 10.

*A. Chevrolati* Muls. — Bulla Régia, 5; El-Feidja, 7; Fernana, 5; Le Kef; Téboursouk, 7.

*A. Chevrolati* ab. *ferruginea* Schils. — El-Feidja, 7; Kairouan, 6; Le Kef; Téboursouk, 6.

*A. Chevrolati* ab. *tristis* Schils. — Commun sur les Ombelles. Aïn-Draham, 7; Bulla Régia, 5; El-Feidja, 6; Fernana, 5; Hammam-Lif; Le Kef; Téboursouk, 6.

A. (*Larisia*) **gafsana** nov. sp. — A. *Chevrolati* ab. *tristis* Schil. *si-millima sed paulo latior, antennis brevioribus, tibiis tarsisque longioribus.* — ♂. *Penultimum segmentum extremitate foveolatum, ultimum ad tertiam partem incisum, intima incisura rotundatum.* Long. 1 mill. 9.

Aspect et taille de A. *Chevrolati* Muls. mais un peu plus large, noir avec la bouche, la base des antennes et une partie des membres testacées. Pubescence brune, couchée ne voilant pas les téguments. Antennes, courtes, à 5 derniers articles foncés. Trois premiers allongés plus de deux fois plus longs que larges, les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> un peu plus courts, le 6<sup>e</sup> carré, les suivants, progressivement plus épais, formant une massue peu prononcées. 7<sup>e</sup> article plus long que chacun des articles 6 et 8, 8<sup>e</sup>, 9<sup>e</sup> et 10<sup>e</sup> un peu transverses mais bien séparés, le 11<sup>e</sup>, ovalaire deux fois plus long que large.

Corselet transverse, une fois et demi plus large que long, dépassant un peu les élytres à leur base, angles antérieurs arrondis et abaissés, angles postérieurs mousses et obtus, base presque droite au milieu, légèrement sinuée latéralement.

Elytres transversalement striolés, deux fois et demi plus longs que larges, arrondis séparément à l'extrémité.

Palpes courts, épais, à dernier article légèrement sécuriforme.

Pattes foncées à segments testacés à la base et au sommet; tarses à articles rembrunis à l'extrémité, les postérieurs allongés leur premier article à peine plus court que les tibias, épines tibiales flaves presque de même longueur.

Dessous. — Mésosternum fortement caréné, métasternum et abdomen moins tectiformes que chez A. *Chevrolati* Muls., ponctuation fine, serrée, à peine distincte, pubescence assez fournie. Epipleures élytraux larges à la base et se rétrécissant brusquement au niveau du premier segment abdominal.

♂. — Tarse antérieurs épaissis. Segments abdominaux ciliés de chaque côté de la ligne médiane; le pénultième fovéolé dans la moitié postérieure de sa partie médiane, le dernier échancré à son extrémité, l'échancrure atteignant les deux tiers de sa longueur et se terminant par une partie arrondie. Au sommet, les bords de cette échancrure sont écartés et légèrement relevés. Enfin le tiers antérieur du segment présente un sillon superficiel se continuant avec celui du segment précédent.

Cette espèce est voisine d'A. *Chevrolati* Muls. mais s'en distingue par sa forme un peu plus large, ses antennes plus courtes et ses pattes plus allongées. D'après la description, elle se rapprocherait également beaucoup d'A. *Revelierei* Em. dont elle se distinguerait surtout par les

caractères sexuels du ♂ qui, dans *A. Revelierei*, ne présenterait pas d'échancre profonde à l'extrémité du dernier segment ventral.

Tunisie. — Gafsa, 11, deux exemplaires.

*A. deserticola* Chob. — Kébili, 5.

*A. subtilis* Hampe. — Souk-el-Arba, 5, un exemplaire, ♂.

*A. labiata* Costa. — Fondouk-Djédid, 4; Hammam-Lif; Tabarka, 5.

*A. pulicaria* Costa. — El-Feidja, 4; Fondouk-Djédid, 4; Le Kef, 5; Souk-el-Arba, 4; Téboursouk, 5.

*A. pulicaria* var. *bilaciniata* Pic (?). — Aïn-Draham, 6, 7; Le Kef.

*A. ruficollis* F. — Aïn-Draham, 6; El-Feidja, 6; Fernana, 5 (1).

*A. lurida* Steph. — Aïn-Draham, 6; Fernana, 5; Le Kef; Tabarka, 7; Téboursouk, 5.

*A. lurida* ab. *fusca* Schrank. — Aïn-Draham, 6; Le Kef.

*A. humeralis* F. (*Geoffroyi* Müller). — Camp de la Santé; Téboursouk, 4.

*A. humeralis* ab. *bisbimaculatus* Pic. — Aïn-Draham; El-Feidja, 4; Téboursouk, 4.

*A. humeralis* ab. *cruciata* Costa. — Téboursouk, 4.

---

(1) *A. SIMPLICATA* nov. sp. — *Rufolestacea*, *elytris*, *metasterno abdomineque nigris; antennis pedibusque proparte nigris*. — ♂. — *Abdominis ultimo segmento ventrali medio deplanato, extremitate rotunde leviterque inciso*. Long. 2 mill. 4.

Voisin, comme forme générale, des petits exemplaires d'*A. ruficollis* F. Rouge testacé, avec le vertex, les élytres, le métasternum et l'abdomen foncés. Pubescence claire, assez fournie.

Tête grosse, atteignant presque les quatre cinquièmes de la largeur du corselet; yeux proéminents, plus volumineux que dans les espèces voisines. Antennes, sans massue distincte, épaisses, peu allongées, rembrunies à partir de leur quatrième article. Deux premiers articles courts, une fois et demie plus longs que larges 3 et 4 allongés, cylindriques, presque d'égale longueur, 5 un peu plus court et plus épais, les suivants tronconiques diminuant progressivement de longueur et augmentant insensiblement de largeur, le dernier ovalaire plus long et plus étroit que le précédent. Palpes testacés, à dernier article fortement sécuriforme.

Corslet transverse, à bord antérieur coupé droit, base formée de trois parties presque rectilignes, la médiane deux fois plus large que les latérales dont elle est séparée par des sinuosités assez profondes; angles antérieurs abaissés et arrondis, les postérieurs émoussés et très légèrement obtus.

Elytres près de trois fois plus longs que larges, ayant leur maximum de largeur près de leur partie médiane. Epipleures graduellement rétrécis, atteignant le quatrième segment abdominal.

*Dessous*. — Tête, prosternum et mésosternum testacés, métasternum et abdomen foncés. Hanches antérieures et intermédiaire testacées de même que la partie interne des hanches postérieures. Pattes testacées avec l'extrémité des tarsi foncée. Premier article des tarsi postérieurs de même longueur que le tibia correspondant.

♂. — Tarsi antérieurs légèrement dilatés; segments abdominaux simples sans lanières, le dernier déprimé sur sa ligne médiane et présentant à l'extrémité une petite échancre arrondie.

Algérie. — Batna, 5, 1935. Un exemplaire ♂.

**A. humeralis** ab. **discicollis** Costa. — Aïn-Draham, 5; Téboursouk, 3, 5.  
**A. maculata** Fourcr. — Camp de la Santé; El-Feidja, 4; Fernana, 5; Fondouk-Djédid, 4; Tabarka, 5; Souk-el-Arba, 4.

**A. maculata** ab. **pallida** Marsh. — Aïn-Draham, 6; El-Feidja, 4; Le Kef; Téboursouk, 4.

**A. maculata** ab. **Dahli** Schils. — Téboursouk, 4.

#### SERROPALPIDAE

**Orchesia micans** Walk. — Aïn-Draham, 6.

**Eucitenomorphus Leprieuri** Perr. — Sous les écorces, dans le bois pourri. Camp de la Santé; El-Feidja, 6; Fernana, 6.

**Abdera quadrifasciata** Curt. — En battant les branches mortes. Aïn-Draham; El-Feidja, 6; Le Kef.

**Ab. biflexuosa** Curt. — Aïn-Draham, 5, 6; Fernana, 6; Le Kef.

**Phloetrya granicollis** Seidl. — Arbres abattus, sous les écorces. Aïn-Draham, 7.

#### LAGRIIDAE

**Lagria hirta** L. — Bulla Régia, 5; Souk-el-Arba, 5.

**L. Pici** nov. sp. — *L. hirta* L. vicina, sed capite latiore, maris antennarum decimo articulo quadrato, copulationis instrumentum longiore gracilioreque. Long. 7,5-8,5 mill.

Voisine de *L. hirta* L. dont elle a la pubescence et la ponctuation. Très variable, elle est ordinairement flave avec la tête, le corselet, l'abdomen et les pattes ferrugineux-foncé, quelques exemplaires ont parfois ces dernières parties et l'écusson noirs.

La tête est plus développée que chez *L. hirta* L., le front plus large, les yeux moins proéminents. Les antennes ont leurs articles moins allongés, les basaux plus brillants, moins rugueux. Chez le ♂, le 10<sup>e</sup> est aussi long que large et le dernier aussi long que les six précédents réunis; chez la ♀, le 11<sup>e</sup> égale seulement les trois avants-derniers.

Corselet plus ou moins allongé, ordinairement un peu plus long que large chez le ♂, plus court chez la ♀ et à ponctuation peu serrée.

Elytres un peu moins longs et parallèles que chez *L. hirta* L., ordinairement avec les côtes nettement marquées. Epipleures parallèles, moins larges que les tibias, visibles jusqu'à l'extrémité des élytres.

Dessous brillant, à peu près imponctué.

♂. — Pénis extrêmement allongé, bien plus que chez *L. hirta* L., très grêle et terminé en pointe effilée à extrémité mousse.

Cette espèce paraît commune tant en Tunisie du Nord qu'en Algérie. Je l'ai capturée à Aïn-Draham, 10; El-Feidja, 7; Le Kef et Algérie, à La Calle, 5 et Philippeville, 5.

- L. lata* F. — Bizerte, 10, (BOITEL !).  
*L. viridipennis* F. — Camp de la Santé; Fernana, 5; Ghardimaou, 1; Le Kef; Souk-el-Arba, 1.  
Alg. — La Calle, 5.  
*L. Poupillieri* Reich. — Aïn-Draham.

ALLECULIDAE

- Mycetocharina megalops* Fairm. (?). — Souk-el-Arba.  
*Prionychus bispinosus* Desbr. — Le Kef.  
*Pr. lugens* Küst. — Aïn-Draham, 7; Bulla Régia, 6; El-Feidja, 6; Ghardimaou, 6; Téboursouk, 6.  
*Isomira ferruginea* Küst. — Commun en battant les arbres et les buissons. Aïn-Draham, 6; El-Feidja, 6; Fernana, 6; Le Kef; Soliman, 4; Tabarka, 5; Téboursouk, 5.  
*Heliotaurus longipilus* Fairm. — Le Kef; Sakiét-sidi-Youssef, 6; Téboursouk, 5.  
*H. distinctus* Cast. — Commun partout. Aïn-Draham, 6; Kairouan; Le Kef, 5; Radès; Souk-el-Arba, etc.  
*H. distinctus* var. *plenifrons* Fairm. — Semble plus méridional. Chérichera (SANTSCHI !); Djerba, 4; Kébili, 5.  
*H. subpilosus* Seidl. — Le Kef; Téboursouk, 4, 5.  
*H. angusticollis* Muls. — Aïn-Draham; El-Djem, 4; Fondouk-Djédid; Le Kef; Soussé; Téboursouk, 5.  
*H. Brisouti* Bedel. — Hammam-Lif.  
*H. Dorisæ* Bedel var. *obscuripes* Pic. — Champs cultivés, accroché aux tiges des céréales où on le trouve assez communément et plus tardivement que ses congénères (fin juin). Le Kef, 6; Téboursouk, 6.  
*H. coeruleus* F. — Nord de la Tunisie, surtout dans les parties boisées. Aïn-Draham, 6; El-Feidja, 6.  
*H. menticornis* Reit. — Bulla Régia, 5; Le Kef.  
*H. confusus* Reit. — Fondouk-Djédid, 5; Le Kef, 5, 6; Souk-el-Arba.  
*H. analis* Desb. — Hammam-Lif, 4; Le Kef, 5; Radès; Souk-el-Arba; Téboursouk, 4, 5.  
Quelques exemplaires présentent, outre un prolongement élytral très accusé, des antennes et des pattes très grêles et très allongées.  
*H. tunisus* Frm. — Soussé.  
*Heliomophlus scabriusculus* Fairm. — Le Kef, 5; Sakiét-sidi-Youssef, 6; Téboursouk, 5.

(A suivre.)

ADDENDA

Depuis le commencement de cet ouvrage, de nouvelles espèces ont

été découvertes en Tunisie. Les deux suivantes me paraissent particulièrement intéressantes et mériter d'être immédiatement décrites.

**Euphantias Boiteli** nov. sp. — *Euphantias insignis* Muls et *Pliginskii* Bernh. vicinus, sed major, capite latiore, antennis longioribus, prothorace simpliciore, elytrorum costulis minus elevatis, intervallis pariter costatis. Long. 2 mill.

Voisin comme forme générale des deux autres espèces européennes *E. insignis* Muls et *Pliginskii* Bernh. mais s'en distinguant à première vue par sa taille plus grande, sa tête plus grosse à tempes plus petites et yeux plus développés. Antennes bien plus allongées; 1<sup>er</sup> article deux fois plus long que large et fortement élargi à la partie moyenne de son bord interne; 2°, ovulaire bien plus étroit; 3°, en forme de massue grêle et allongée, plus de trois fois plus long que large; 4°, un peu plus court; 5°, tout aussi grêle mais beaucoup plus allongé, plus long que le 3°; les suivants formant massue en diminuant de longueur et en devenant de plus en plus transverses; dernier en oval court, à peine plus long que le pénultième.

Corselet plus large que dans les deux autres espèces, aussi large que la base des élytres, angles antérieurs bien marqués, disque moins inégal, longitudinalement relevé avec un fin sillon médian et à peine déprimé en avant et en arrière. Bords légèrement relevés, plus allongés, l'échancrure postérieure étant moins prononcée.

Elytres à bords plus rectilignes, à huit côtes parallèles peu marquées, les alternes un peu plus relevées, surtout la 5° vers l'extrémité et l'humérale à la base.

Abdomen plus large que les élytres, à partie médiane et bords fortement relevés.

Pattes à fémurs foncés, tibias brunâtres et tarse testacés.

Tunisie. — Bords du lac de Bizerte, deux exemplaires récoltés, en octobre 1935, par notre collègue le Commandant BOITEL. (Types in coll. BOITEL et NORMAND).

La capture d'une espèce du genre *Euphantias* dans le Nord de l'Afrique est particulièrement intéressante. Deux espèces seulement étaient signalées de la Région paéarctique, l'une l'*E. insignis* Muls. de l'Europe méridionale, l'autre l'*E. Pliginskii* Bernh. de Crimée. Le genre semble inféodé aux détritits bordant les lagunes et lacs salés; en France, j'avais déjà capturé l'*E. insignis* sur les bords de l'étang de Saint-Nazaire près Elne (Pyrénées-Orientales).

**Geomitopsis Grosclaudei** nov. sp. — *Ferruginea capite elongato, prothoracis latitudinem vix superante; pronoto longiore quam latiore; elytris transversis, basi prothorace latioribus, humeris prominentibus*. Long. 1 mill. 4.

Roux testacé, cylindrique, couvert d'une fine réticulation diminuant à peine le brillant des téguments.

Tête allongée à ponctuation très clairsemée; tempes légèrement proéminentes, dépassant à peine la largeur du corselet; antennes grêles, présentant comme ses congénères, les articles transverses à partir du quatrième article et les articles 5 et 7 beaucoup plus étroits que les voisins.

Corselet allongé, un peu plus long que large, plus étroit à la base qu'au sommet, à côtés presque droits, parallèles dans leur tiers antérieur, puis se dirigeant obliquement vers les angles postérieurs qui sont bien marqués et presque droits. Disque à ponctuation très clairsemée et présentant au-devant de l'écusson une petite fossette assez profonde et se prolongeant vers la base en forme de sillon.

Elytres imponctués, transverses, plus courts que le corselet, plus larges que lui à leur base et s'élargissant légèrement à l'extrémité. Bords droits s'incurvant aux angles postérieurs et au niveau des épaules qui sont distinctes et mieux marquées que dans les espèces voisines. Suture accompagnée de chaque côté, d'une dépression longitudinale, ce qui l'a fait paraître légèrement surélevée.

Abdomen presque imponctué avec des séries transverses de points pilifères à la base et au sommet de chaque segment, le 5<sup>e</sup> une fois et demi plus long que les précédents.

Pattes assez grêles à tibias en forme de massue allongée.

Cette espèce qui porte à deux les formes tunisiennes du genre *Geomitopsis* (1) se distinguera des espèces voisines par sa taille plus petite, sa tête plus étroite et plus allongée, sa fossette prothoracique bien marquée, ses élytres à épaules distinctes, etc.

Tunisie. — Radès, deux exemplaires capturés par notre collègue GROSCLAUDE, en lavant la terre au pied des Asphodèles. (1-1936) (Types in coll. GROSCLAUDE et NORMAND).

---

(1) *Geomitopsis Boiteli* Norm. (Bull. de la Soc. ent. de Fr., 1932, p. 181).