

Riassunto

E' proposta una revisione tassonomica delle specie di *Chthonius* C.L. Koch, 1843 subgen. *Ephippiochthonius* Beier, 1930 presenti in Italia, Corsica e Canton Ticino (Svizzera) ed è fornita una chiave dicotomica delle stesse: queste vengono ripartite in due gruppi di specie (gr. di *C. tetrachelatus* e gr. di *C. fuscimanus*) in base al diverso profilo laterale della mano dei palpi e al diverso modello di dentatura delle dita dei palpi. Sono descritte le seguenti nuove specie: i) gruppo di *C. tetrachelatus*: *Chthonius (E.) altamurae* n. sp. (♀, loc. typ.: Puglia, prov. Bari, Altamura, Grotta Lamalunga 1295 Pu/BA), *Chthonius (E.) elymus* n. sp. (♂, loc. typ.: Sicilia, prov. Trapani, Custonaci, Abisso del Purgatorio 8064 Si/TP), *Chthonius (E.) messapicus* n. sp. (♂, loc. typ.: Puglia, prov. Brindisi, San Pietro Vernotico, Cerano); ii) gruppo di *C. fuscimanus*: *Chthonius (E.) aeneae* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Liguria, prov. Genova, Sestri Levante, Punta Manara), *Chthonius (E.) etruscus* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Toscana, prov. Grosseto, Semproniano, Grotta di Montecchio 254 To/GR), *Chthonius (E.) gallii* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Liguria, prov. Savona, Bergeggi), *Chthonius (E.) intemelius* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Liguria, prov. Imperia, Apricale, Monte Cianela), *Chthonius (E.) latellai* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Lazio, prov. Latina, Bassiano, Grotta di Fiume Coperto 1361 La/LT), *Chthonius (E.) ligur* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Liguria, dint. Imperia, dintorni di Baiardo), *Chthonius (E.) magrini* n. sp. (♂, loc. typ.: Lazio, prov. Frosinone, San Giovanni Incarico, Grotta sulla strada per il Santuario della Madonna della Guardia n. c. La/FR), *Chthonius (E.) monguzzii* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Lombardia, prov. Brescia, Sulzano, Oricina de la Pofa del Giardi 438 Lo/BS), *Chthonius (E.) sulphureus* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Marche, prov. Ancona, Genga, Grotta di Frasassi 1 Ma/AN), *Chthonius (E.) tyrrhenicus* n. sp. (♂♀, loc. typ.: Liguria, prov. Genova, Genova, Quinto al Mare, Monte Moro). Sono formalmente proposte le seguenti sinonimie soggettive: *Chthonius (E.) baumeensis* Callaini, 1983 n. syn. di *Chthonius (E.) berninii* Callaini, 1983, *Chthonius (E.) aegatensis* Callaini, 1989 n. syn. di *Chthonius (E.) berninii* Callaini, 1983, *Chthonius (E.) maltensis* Mahnert, 1975 n. syn. di *Chthonius (E.) concii* Beier, 1953, *Chthonius (E.) bartolii* Gardini, 1976 n. syn. di *Chthonius (E.) concii* Beier, 1953, *Chthonius (E.) elbanus* Beier, 1963 n. syn. di *Chthonius (E.) nanus* Beier, 1953, *Chthonius (E.) cavicola* Gardini, 1990 n. syn. di *Chthonius (E.) troglophilus* Beier, 1930. Le specie di *Ephippiochthonius* presenti sul territorio considerato sono 39, di cui 1 limitata alla Sicilia, 4 alla Sardegna e 4 alla Corsica. *Chthonius (E.) gibbus* Beier, 1953 è considerata specie estranea alla fauna italiana e *C. (E.) vachoni* Heurtault-Rossi, 1963 è specie nuova per l'Italia. *Chthonius poeninus* Mahnert, 1979 è trasferito nel sottogenere *Globochthonius* Beier, 1931.