



Fig. XX Caratteri diagnostici di: a *Tephronia sepiaria* b *E. lepraria* c *T. sicula*.



Fig. XX Zampe posteriori di: *Tephronia sepiaria* (in alto) ed *E. lepraria* (in basso). *T. sicula* ha 4 spine come *lepraria*.

### **Tephronia sepiaria** (Hufnagel, 1767)

**Specie simili.** Si distingue da tutte le altre specie italiane del genere *Tephronia* per la presenza, in entrambi i sessi, di una sola coppia di spine sulle tibie posteriori (Figg.). Nell'habitus si avvicina soprattutto a *lepraria*, da cui si distingue anche per l'andamento della linea postmediana delle ali anteriori, il cui tratto superiore in *sepiaria* è piegato ad arco verso l'interno, mentre in *lepraria* (ma anche in *sicula*, *lhommaria* e *cyrnea*) raggiunge la costa inclinato verso l'esterno (Fig.). L'apparato genitale maschile (Fig.) differisce dalle congeneri per la forma del cornuto presente nell'edeago. Quello femminile è caratterizzato dalla presenza, nella bursa, di una struttura spinosa di forma approssimativamente circolare; una struttura simile è presente anche in *sicula*, ma in quest'ultima specie ha una forma diversa: presenta un'evidente interruzione e in un punto piega bruscamente ad angolo retto (Fig.).

### **Tephronia sicula** (Wehrli, 1933)

**Specie simili.** Si distingue da *T. sepiaria*, oltre che per il pattern alare (si veda al riguardo quanto scritto nella trattazione di questa specie), per la presenza, in entrambi i sessi, di due coppie di spine sulle tibie posteriori (cfr. Figg.). Quest'ultimo carattere la accomuna a tutte le rimanenti specie italiane del genere, in particolare a *T. lepraria*, da cui si differenzia per le seguenti caratteristiche (Figg.). Nell'ala anteriore, la postmediana di *sicula* presenta nella sua parte superiore una concavità, di forma spesso quasi semicircolare, che sporge verso l'interno più della porzione sottostante della linea; in *lepraria* questa concavità, quando è presente, è meno accentuata e la postmediana rientra maggiormente verso l'interno nel suo tratto inferiore. Nell'ala posteriore, la linea postmediana di *lepraria* nei primi due terzi, a

partire dal margine anale, è debolmente arcuata, con la concavità verso l'esterno, mentre nello stesso tratto quella di *sicula* è pressoché rettilinea e piega bruscamente verso l'esterno solo nell'ultimo terzo, con una sporgenza a forma di triangolo. Infine la linea antemediana delle ali anteriori in *sicula* è più marcata e in genere è piegata ad angolo con la punta verso l'esterno, mentre in *lepraria* di norma è più diritta. Gli apparati genitali sono raffigurati nelle Figg.; quelli maschili si differenziano per la forma e la lunghezza del cornuto (Fig.) presente nell'edeago (0,4-0,45 mm in *sicula*, 0,7-0,8 mm, eccezionalmente 0,6 mm, in *lepraria*).

#### **Eumannia lepraria** (Rebel, 1909)

**Specie simili.** Si distingue da *T. sepiaria*, oltre che per il pattern alare (si veda al riguardo quanto scritto nella trattazione di questa specie), per la presenza, in entrambi i sessi, di due coppie di spine sulle tibie posteriori (cfr. Fig.). Per la differenziazione da *sicula* si veda quanto esposto nella trattazione di quest'ultima specie.