

Capo senza carena al vertice; con carena (M) o tubercolo (F) frontale		Gen. EUONTHOPHAGUS				AMYNTAS	7-12; t. It							
<p>Capo con carena al vertice più o meno complessa; con carena frontale sempre (F) o più raramente (M) presente</p> <p>Gen. ONTHOPHAGUS</p>	Pronoto con punti sempre semplici	Sgen. Onthophagus		Elitre con pubescenza solo sui lati; intervalli con punti semplici, fini e sparsi		TAURUS	6-11,5; t. It							
				Elitre con pubescenza su tutta la superficie; intervalli con punti granuliformi, forti		ILLYRICUS	6-11,5; t. It							
	Pronoto con punti rasposi o granuli almeno sugli angoli anteriori del pronoto	Base del pigidio ribordata	Base del pigidio non ribordata; elitre gialle con macchie simmetriche disposte su due fasce arcuate nella 1° e 2° metà elitrale, più o meno marcate		Sgen. Trichonthophagus		MAKI	4-7; t. It						
					Sgen. Furconthophagus		FURCATUS	3,5-5,5; t. It						
			Specie piccole, più o meno NERE; con o senza macchie rosso-scuro	Angoli anteriori del protorace non sporgenti	Subg. Paleonthophagus		Elitre con intervalli con punti granuliformi, piccoli		Carena del vertice (M) semplice, dritta	OVATUS	4-6; N e C It			
							Carena del vertice (M) convessa in avanti		JOANNAE	4-5; t. It				
							Guance con netta intaccatura alla sutura clipeo-genale		RUFICAPILLUS	4-5; t. It				
							Protorace e intervalli delle elitre con punti grossi, quasi a contatto fra loro		GROSSEPUNCTATUS	4-5; It, Sard.				
			Specie con elitre più o meno GIALLE o più o meno NERE; con o senza macchie	Angoli ant. del protorace, sinuosi e sporgenti in fuori	Subg. Paleonthophagus		epipleure testacea; pronoto quasi sempre rosso-porpora metallico		COENOBITA	6-10; t. It				
							guancie intaccate alla sutura clipeo genale		OPACICOLLIS	5-8; t. It				
							epipleure completamente o quasi, NERA	guancie normali	ogni punto pilifero (elitre) preceduto da un granulo		MASSAI	5,5-7; Sic		
									elitre con granuli normali	sutura clipeo genale, sempre ben visibile		SIMILIS	4-7; t. It	
							sutura clipeo genale, invisibile			FRACTICORNIS	7-10; t. It			
							Angoli ant. del protorace, non sporgenti in fuori, normali	lati clipeo e lati pronoto, ciliati di nero; inferiorm. con pubescenza nera		ANDALUSICUS		6-12; t. It		
										macchie simmetriche, disposte in fascia arcuata		LEMUR	5-8; t. It	
										macchie NON simmetriche	V° intervallo sempre con macchia basale		NUCHICORNIS	6-9; t. It
											V° intervallo sempre senza macchia basale		VACCA	7-13; t. It
							Elitre più o meno NERE, con o senza macchie	Angoli ant. del protorace, sinuosi e sporgenti	clipeo sinuoso centralmente; vertice con carena senza corna; protorace con lama trasversale assai lunga, legg. sinuata, con due tubercoli ai lati		SEMICORNIS	7-13; t. It		
clipeo allungato e arricciato centralmente; vertice con carena prolungata in corn o lamellare; intervalli con tre file di punti rasposi		VERTICICORNIS							6-10; t. It					
pronoto con grossa prominenza centrale spesso divisa in due, con due tubercoli ai lati		VITULUS					9-12; t. It(?)							