



Angoli del pronoto sinuosi e sporgenti all'infuori				FURCATUS
Angoli del pronoto sinuosi e sporgenti all'infuori	Guance nettamente divise 			RUFICAPILLUS
	Guance regolarmente sinuose e continue 	Intervalli elitrali con <b>punti piccoli</b> (costituiti da piccole protuberanze), serciati in doppia fila (tranne la prima fila alla sutura)	Punti del protorace con pelo centrale. Convessità anteriore prominente in avanti, almeno nei maschi.	JOANNES
			Punti del protorace con pelo decentrato quasi a contatto col bordo anteriore del punto stesso. Convessità anteriore regolare.	OVATUS
		Intervalli elitrali con <b>punti grossi</b> (costituiti da forti depressioni), di diametro quasi così larghi che quelli del protorace		GROSSEPUNCTATUS

**N.B.:**NON SEMPRE I CARATTERI RELATIVI ALLE SPECIE O.JOANNES E O.OVATUS SONO COSÌ EVIDENTI DA PERMETTERE UNA DETERMINAZIONE CERTA. IMPOSSIBILE NELLE FEMMINE. PERTANTO SOLO UN ESAME DELL'EDEAGO PUÒ DEFINIRE CON CERTEZZA L'APPARTENENZA A QUESTA O QUELLA SPECIE DEGLI INDIVIDUI MASCHI. LE FEMMINE SONO DETERMINATE PER CONSEGUENZA, DATO CHE ALL'INTERNO DELLO STESSO AREALE NON CONVIVONO MAI AMBEDUE LE SPECIE.