

brunneis, elongatis, prope suturam sitis, ad tertiam partem anteriorem incipientibus et ad quartam partem posteriorem terminatis, ornata; *caput*, *prothorax*, *elytrorum* latera, *subtus*-que, velutina; *scutellum*, *elytrorum* medium *pedesque*, nitida. *Caput* in medio longitudinaliter prominens, dextra sinistraque excavatum, valde impressum, antice in cornu amplo, recurvo, erecto, apice bifido productum; *occiput* bituberculatum. *Prothorax* amplus, valde convexus et transversus, suborbicularis, antice angustior et lunatus, postice sub-rectus, impunctatus. *Scutellum* magnum, triangulare, antice et lateraliter punctatum, in medio læve. *Elytra* base prothorace paulum latiora, illo plus quam duplo longiora, depressa, humeris rotundatis ubi latiora sunt, in medio sparsim punctata, punctulatione rotundata, ad latera et versus extremitatem dehiscentia; extremitate rotundata. *Subtus* impunctatus; *abdominis stigmæ* ultimæ haud tubulosæ. *Mesosternum* haud productum. *Pedes* sparsim punctati; *femora* antica robusta, subter in medio valde lunata; *tibiæ anticæ* validissimæ, subter versus medium dente fortissimo subtriangulare armatæ; *tibiæ intermediæ* et *posticæ* extus in medio singulæ unidentatæ. ♀ mihi ignota.

Hæc species *C. elongatum*, G. P. (*Cet.*, p. 111, pl. 15, fig. 2), refert, sed illo: 1° *statura* majore; 2° *prothorace* latiore, unimaculato; 3° *scutello* in medio læve; 4° *elytris* amplioribus, brevioribus, alio modo punctatis (punctis rotundatis, non elongatis), maculis duabus magnis rubro-brunneis ornatis; 5° *subto* velutino, haud nitido, læve, præcipue differt.

Le *Cremostocheilus plagiatus*, Dej., *Cat.*, p. 187, dont je possède le *type*, offre, sur les élytres, les mêmes taches que chez le *C. Lacordairei*; seulement la ponctuation de ces organes est identique avec celle du *C. elongatus*. J'ignore donc si le *C. plagiatus* doit être considéré comme étant le ♂ du *C. elongatus*, ou bien s'il convient d'en faire une espèce à part.

16. INCALA GORILLA. Thomson.

Patria; GABON. Long. 14 mill.; lat. 7 mill. — Supra brunnea, haud nitida, setosa, pallide flavo-variegata; *scutellum* lateraliter ejusdem coloris marginatum, *elytra* post medium singula macula pallide flava ornata, *subtus* haud nitida, setosa, pallide flava, lævissime brunneo-impressa, super *prosternum* impressionibus linearibus, longitudinalibus, super *mesosternum*, *metasternum*, *pygidiumque*, impressionibus rotundatis, conditis, sæpe confluentibus, super *abdominem*, ipsis impressionibus, linearibus, transversis, segmento ultimo brunneo excepto, nitido, impunctato; segmento penultimo extremitate transverse brunneo-marginato; *antennæ*, *palpi*, *pedesque* brunnea, nitida. *Caput* lateraliter marginatum, antice in medio paulum arcuatum, productum, erectum. *Prothorax* hexagonalis, antice paulum angustior, angulis lateralibus acutis, productis, lateraliter in medium acutus, post medium paulum serratus, postice extus arcuatus, angulis lateralibus paulum productis. *Scutellum* subtriangulare, læve. *Elytra* subparallela, paulum depressa, antice prothorace latiora et sinuata, illo plus quam duplo longiora, humeris rotundatis, lævia, versus extremitatem prominentia, apice rotundata. *Subtus* lævis. *Pedes* elongati, crasse punctati, punctulatione condita. *Tarsorum* posteriorum art. 1 longissimus.

Hæc species *I. Quimalancam*: 1° *capite* antice in medio producto, haud granulato; 2° *prothorace* æque læve; 3° *elytris* lateraliter maculatis; 4° *subto* pallido flavo, impresso; 5° *tarsorum* posteriorum art. 1° longissime (1); 6° *corpore* multum minore; præcipue differt.

fig. 3), sous le nom erroné de *Cyclidius elongatus* ♂, Oliv. Je dirai, à cette occasion, que, dans le même ouvrage (pl. 38, fig. 2), on a représenté également, sous le nom d'*Ischnostoma Lacordairei*, Th. (qui n'a jamais été publié par moi!), la *Cetonia albo-picta*, Gory et Percheron.

(1) Ce n'est là, probablement, qu'un caractère purement sexuel. Voir *Arch. Ent.*, I, 162.