

TABELLA PER LA DISCRIMINAZIONE DEI SOTTOGENERI

1. (2) Pronoto punteggiato almeno ai lati e sul margine posteriore (v. fig. 67); tibie posteriori con due file di spinule **Hypocaccus** s. str.
2. (1) Pronoto liscio, grande, punteggiato solo lungo il margine posteriore (v. fig. 68); tibie posteriori con tre file di spinule **Baeckmanniolus** Reichardt

Sottogenere **Hypocaccus** s. str.

Hypocaccus s. str. DAHLGREN⁽¹⁾, 1969, p. 66.

Syn.: *Pachylopus* AUCT. (nec ERICHSON, 1834), (partim).

Rhytidoprinus HOULBERT, 1922 (1923), p. 52 (partim).

SOTTOGENEROTIPO: *Saprinus rugiceps* Duftschmidt, 1805.

Vedasi quanto scritto nella tabella per la discriminazione dei sottogeneri.

Il sottogenere è diffuso in tutto il globo con oltre 45 specie. Nel nostro Paese se ne contano 7.

TABELLA PER LA DISCRIMINAZIONE DELLE SPECIE

1. (8) Elitre con punteggiatura normale, cioè senza aree lucide particolarmente delimitate nella regione periscutellare e nel margine distale; strie dorsali sempre chiaramente distinguibili.
2. (3) 1^a stria dorsale delle elitre notevolmente più lunga delle altre ed incurvata verso l'interno a mo' di arco **metallicus** (Herbst)
3. (2) 1^a stria dorsale delle elitre pressappoco della medesima lunghezza delle altre, oltrepassante cioè di poco la metà (fanno eccezione alcune ff. particolari, quali *H. crassipes* f. *honorable*, *H. rugifrons* f. *girondinus*, *H. brasiliensis* f. *probans*).

(¹) DAHLGREN (l.c., p. 66) non si esprime in merito al sottogenere *Hypocaccus* s. str. Però, a proposito del «genere» *Baeckmanniolus* dice testualmente «*Baeckmanniolus* Rchdt eine Unter-gattung von *Hypocaccus* Thoms.». Mi sembra pertanto implicito che il sottogenere *Hypocaccus* sia da ascrivere all'A. svedese.

4. (5) Parte inferiore del corpo munita ai lati di una pubescenza gialla corta facilmente evidente; tibie anteriori con 3-6 denti ottusi, larghi (v. fig. 66a); tibie e femori ingrossati **crassipes** (Erichson)
5. (4) Parte inferiore del corpo poco pubescente; tibie anteriori con dentellatura normale (v. figg. 66b,c); tibie e femori posteriori non ingrossati.
6. (7) Elitre negli intervalli dei punti non reticolate microscopicamente; punteggiatura abbastanza grossolana che solo molto raramente raggiunge nelle prime tre interstrie la base. Generalmente di colore verde, spesso variabile **rugifrons** (Paykull)
7. (6) Elitre negli interspazi dei punti reticolati microscopicamente; punteggiatura delle elitre nelle prime tre interstrie giungente molto spesso fino alla base. Bronzeo-lucente .. **brasilienis** (Paykull)
8. (1) Elitre con punteggiatura fortemente rugosa giungente nella 1^a e 3^a interstrie fino alla base e con parti lisce nella regione periscutellare chiaramente delimitate; esiste pure una banda liscia al margine apicale, similmente a quella di *Saprinus* del gruppo *aeneus*; strie dorsali delle elitre, eccetto la 1^a, poco visibili.
9. (10) Superfici speculari delle elitre piccole, rotondeggianti, delimitate all'interno dalla 4^a stria dorsale e dalla stria suturale: sono quindi separate tra di loro da una larga banda punteggiata e non comunicanti come nelle due specie seguenti; pronoto con area non punteggiata rugosamente divisa in due piccole aree da una fascia mediana di punti **specularis** (Marseul)
10. (9) Superfici speculari delle elitre grandi, oblunghe, confinanti superiormente e lateralmente con la 4^a stria dorsale, tra di loro non separate; pronoto con un'unica area non punteggiata, grande, triangolare, cui se ne aggiungono una per parte, molto piccole, nell'*H. pelleti*.
11. (12) 1^a stria dorsale delle elitre non più lunga delle altre (fa eccezione *H. pelleti* f. *primintegra*); linee prosternali interne molto distanti fra di loro, disposte a triangolo. Bronzeo **pelleti** (Marseul)
12. (11) 1^a stria dorsale delle elitre giungente fino all'estremità distale e quivi curvata verso l'interno; linee prosternali interne dalla parte posteriore (base sec. gli A.A.) inizialmente e poi decorrenti vicinissime. Nero-bluastro **rugiceps** (Duftschmidt)