

21. — *I. mahena*

Fairmaire.

Pl. 22, fig. 1.

IRIDOTÆNIA MAHENA Fairm., *Bull. Soc. Ent. Fr.* (1891), p. 46.Long. 0<sup>m</sup>,022-0<sup>m</sup>,026; larg. 0<sup>m</sup>,007-0<sup>m</sup>,008.

Obscur en dessus, d'un noir brillant légèrement bleuâtre, souvent avec le front, l'épistome et les côtés du pronotum teintés de pourpre ou de violacé très sombres. Dessous plus clair et plus brillant que le dessus, d'un vert bleuâtre, un peu bronzé en avant.

Tête finement ponctuée; front creusé, l'excavation subovale, sillonnée dans son fond, le sillon terminé en arrière par une fossette profonde et allongée; vertex très finement sillonné. Pronotum un peu moins long que large à la base, en trapèze, atténué en avant; la marge antérieure droite et faiblement sillonnée sur les côtés; ceux-ci très sinueux, dilatés et lobés en arrière; la base bisinuée; le disque avec un fin sillon linéaire un peu approfondi en arrière; une fossette allongée, naissant de la base de chaque côté et séparant le lobe latéral du disque; deux légères dépressions transversales sur les côtés, en avant, l'une formant une sorte de bourrelet longeant la base, l'autre parallèle au premier et limitant le lobe de la base; la surface à ponctuation fine, largement et irrégulièrement espacée sur le disque, plus rugueuse et plus dense sur les côtés. Ecusson très petit, en trapèze. Elytres obliquement tronqués à l'épaule, atténués ensuite en arc régulier jusqu'au sommet, dentelés sur les bords postérieurs; la surface couverte de séries longitudinales de points assez nettes sur le disque, plus irrégulières sur les côtés, où se remar-

quent quelques rides transversales; le quatrième interstrie relevé en côte arquée depuis le tiers postérieur jusqu'au sommet; une côte prémarginale vague le long du bord externe et rapprochée de celui-ci. Dessous finement pointillé; les dépressions des segments abdominaux finement granuleuses; pubescence grisâtre retenant une pulvérulence brun jaunâtre ou rougeâtre, plus abondante dans les dépressions. Fémurs finement pointillés, presque lisses; tibias ponctués.

HAB. — Iles Seychelles (Muséum de Paris, par Lantz; coll. Théry).

## 22. — *I. ocularis*

Kerremans.

IRIDOTENIA OCULARIS Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XXXIX (1895), p. 192.

Long. 0<sup>m</sup>,019; larg. 0<sup>m</sup>,005

Subparallèle, allongé, vert foncé en dessus, vert brillant en dessous; épistome rouge feu très brillant, les yeux bordés de vert clair; pronotum vert bleuâtre sombre avec, de part et d'autre, une tache allongée cuivreuse, l'extrémité des élytres d'un vert plus clair que la partie antérieure.

Voisin des *I. purpureipennis* Waterh. et *mirabilis* Gory, mais moins robuste et plus élancé que ces deux espèces, les yeux relativement plus gros et plus saillants, le sillon qui longe la suture à l'extrémité des élytres mieux accentué.

Tête inégalement ponctuée; front excavé, l'excavation sillonnée dans toute sa longueur; yeux très saillants; antennes bleu foncé. Pronotum presque