

ANIMALI INVERTEBRATI DELLA SARDEGNA

pel Dottor MARCO ALIBONDI

II. Tip. *Coelenterata* (Cnidarii).

Classe I. *Hydromedusae*.

Ord. *HYDROIDEA*.

Gen. *Hydra* L. *H. fusca* Trembley. — La trovai nel rivo di Sestu. *H. viridis*, Trembley. — Ital. Idra.

Gen. *Carymantha*. Haeck. *C. hastata*. Haeck. — Ital. Medusa, sarda « Bromu. »

Ord. *Scyphomedusae*-*Discophora*.

Gen. *Pelagia*. Les. *P. noctiluca*. Per. et Les. — Nel Museo di Cagliari è indicata come proveniente da Carloforte.

Class. II. *Anthozoa* (Coralliari).

Ord. *Octocorallii* (Octactini vel *Alyconarii*).

In generale in Italia Corallo, nella Sardegna merid. Coraddu, nella sett. Corallu, a Carloforte Chalo.

Gen. *Peniculus* L. (Hekkls). *P. species?* — Ital. Penna di mare. - Si trova al Museo di Cagliari.

Gen. *Alygonium* Lam. *A. palmatum* Pall. — Ital. Mano di mare. in Sard. (a Bosa) Corallu a palma.

Gen. *Gorgonia* (L.) M. Edw. *G. verrucosa* Pall. — In sardo Coraddu burdu, biancu. Ad Alghero Corall bianch.

Gen. *Corallium* Lam. *C. rubrum* Lam. — Ital. Corallo rosso, Corallo nobile, a Cagliari Coraddu arrubiu, ad Alghero Corall vernell, fossa.

Gen. *Isis*. Lamark. *I. hippuris*. Lamark. — Ad Alghero Corall negre.

Ord. *Zoantharia* *Hexacorallii* (Hexactiniani vel *Zoantharii*).

Gen. *Antipathes* Pall. *A. scoparia* Lamark, Carloforte. *A. di-cotoma* Pall. *A. subspinata* Ell. et Sol. — Ital. Corallo nero,

Bene osservava nel 1889 un distinto scrittore, l'Oberrthür, che:

« Lorsqu'il s'agit d'étudier un être organisé et de faire connaître le résultat des observations qui le concernent, la première solution à chercher est celle du nom qui désigne cet être et sert à le distinguer des autres êtres ». Quale sia la difficoltà di una esatta nomenclatura scientifica, non v'ha chi lo ignori; ma molto più grande, e spesso insuperabile, è la difficoltà che trovai per la esatta conoscenza ed applicazione dei nomi volgari usati nelle diverse provincie in cui assai variano i dialetti, come appunto avviene nelle due provincie dell'isola di Sardegna. Se questo saggio riesce utile al naturalista, massime continentale, che nella stessa isola ami di ottenere più facilmente molte specie animali, mi parrà che sia compensata la lunga e grave fatica sostenuta nella ricerca de' moltissimi nomi indigeni non prima d'ora da altri raccolti e ordinati.

MEFAZZOI (*Imbricaria*).

I. Tip. *Porifera*. (Spongieri).

Class. I. *Fibrospongiae*.

Ord. *CERATOSPONGIAE*.

Gen. *Euspongia* O. S. — *E. Equina* O. S. — Nome italiano Spongia, sardo merid. « Spongia, » sett. Ispugnia. A Oristano le denominano: Spongia niedda, bianca, debuconis ecc. A Carloforte Spunzia, ad Alghero Espongia.

*E. Neiformis* Lamark. — Ital. Fico di mare.

*E. thotoma*. — Quanto di mare.

Le calcispongie son chiamate in sardo « Spongia virgini ».

Sardo Corradu nieddu. Si trovano al Museo di Cagliari da Carloforte.

*Actiniidae.*

Gen. *Actinia* L. M. Edw. — In italiano Attinia, Ogliole all'Isola d'Elba, a Cagliari e Oristano Orziara, a Bosa Maccarronis, a Sassari Ustigiada o Scarrasciu, Belorbu a Carloforte.

*A. rubra*, Bruguiere. — Ital. Attinia rossa, a Livorno Cazzo rosso, Pomodoro di mare.

*A. viridis* Linn (Gmelin). — In sardo Orziara.

*A. equina* L. — A Cagliari Orziara arrubia, a Oristano Cunnu de mari. — Ital. Cazzo rosso, Pomodoro di mare, Attinia rossa.

*A. Rondeletti* Andr. nel Paguro che sta nel Muves, ecc.

*A. arcuata* M. Edw. Trovata tra Cagliari e Bona nel cordone telegrafico.

*Sagarita rosea* Goss. Anemone di mare.

*Madreporidae.*

Gen. *Caryophyllia* Lam. *C. cyathus* Lamarck. — Ital. Carionella tazza.

Gen. *Cladocora* Ehrbg. *Cl. caespitosa* L. — In sardo Corradu burdu, de scogiuu.

*Cl. stellata* M. Edw. Trovasi a Cagliari.

Class. III. *Otenophorae.*

Ord. STENOSTOMI.

Gen. *Cydippe* Ggbr. < (Hormiphora) *C. plumosa* Sars. — In sardo Orziara burda.

Gen. *Ceclis* Chum. Pér. Les. *C. Veneris* Less. — In italiano Cintura di Venere, a Napoli Sciabola di mare, a Cagliari Fetta de mari.

Gen. *Gyanea*. *C. speciest* — In sardo Orziara burda, in italiano Vesica di mare, Ortica di mare.

III. Tip. *Vermes.*

In Sardegna ogni verme generalmente vien denominato Berme, nel dialetto Logud; nel merid. Bremi; nel sett. Belmu, Sorde; nel Gallurese Ghialmu, Sorde, a Nuoro, quando si mette nelle ferite dei cavalli; Bremi, Gremi ad Oristano.

Class. I. *Plathelmintha.*

Ord. CESTODI.

Gen. *Taenia* L. *T. solium* L. — In Ital. Tenia, Verme solitario, in sardo Bremi solitariu; Verme solitariu a Carloforte, a Bono Sorde mandigadore, a Oliena Merme o Sedas. Poi la *Taenia coenurus* (cenuro delle pecore), che produce il capostoruo, o su addinzu o gadi ghingiu, e il "su bremiorru" o verme delle corna dei buoi. Sonvi poi altre specie di Tenie.

Gen. *Bothriocephalus* Retzius. *B. angustatus* Rudolphi in *Scorpaena porcus*, ed altre specie.

Class. II. *Nemathelmintha.*

Ord. GORDI.

Gen. *Gordius* L. *G. Villosi* Rosa, *G. aquaticus* Villot, trovato a Siliqua. *G. Tolosanus* Dujard, presso Cagliari. *G. pusillus* Baird a Serramanna. Li trovò il professore Lepori. — In italiano Dragoncelli o Crini di cavallo, in sardo Pitu de quaddu. In tutti i rivi.

Class. III. *Anellida. S. Cl. Discophora* (Sanguisughe).

Gen. *Haemopsis* Sav. *H. vorax* Moq. Tand. — In ital. Sanguisuga, Mignatta, in merid. Sanguenera de quaddu, a Meara Abbasoi, a Oliena Ambesuga de cavaddos, a Olzai Ammesuga, a Tomara Abbisui, ad Alghero Ambisus, nella parte settentrionale Sanguisuggia, a Sassari Sanghisugini, ad Oristano Anghisulas, Ambisuas.

Class. IV. Chaetopoda.

Ord. ORIBRACHATA A. Terricola.

Gen. *Lambricus* L. L. *terrestris* L. — In italiano Lombri-  
co; *Baco tetragnolo*, (verme di terra), in sardo Zirringoni,  
*Zorruignis a Ballao*, Zirringoni de arguidda a Santadi, Tilingone  
a Sassari e Bosa; Sullungone, Tirringone a Gavoi. Se ne hanno  
altri sotto il nome di Budda de quaddu a Santadi; Bremeda.  
Pintus, Lameda a Bono, Eroneda a Meana.

*B. limicola.*

Gen. *Tubificor* Lam. T. *reticulorum* Lam. È forse il verme  
che a Gavoi chiamano Erise de arena, presso i rivi, e che si fab-  
brica un tubetto?

Ord. POLYCHAETA A. Errantes.

Gen. *Nereis* Cuv. N. *Dumerilii* Aud Edw. N. Cagliari (N. 1469)  
Thorell. — In ital. Tremolina, Nereide, Escada fango, di sabbia;  
in sardo Trimulirgia a Cagliari, Ischero, Tramadighe a Bosa,  
Tramarigia ad Alghero, Tremise a Carloforte.

*B. Tubicola* (Sedentari).

Gen. *Arenicola* Lam. A. *piscesorum* Lam. — In ital. Vermo  
rosso, Arenicola dei pescatori, in dialetto cagliaritano Zirringoni,  
ad Alghero Cuchet. La Tremolina si trova sotto le pietre, nel  
mare vicino alla spiaggia. L'arenicola o sotto i sassi o sotto le  
alghe secche, dove arriva il mare quando fa tempesta.

Gen. *Spirographis*. Sp. *Spallanzani*.

Gen. *Serpula* L. S. *Philippii* March.

*S. contortuplicata* (L.) Sav. — In ital. Serpula, a Cagliari  
Ferritu.

S. Class. *Gephyrea*.

Ord. GEPHYREI. (Chaetiferi).

Gen. *Bonellia* Rolando. *B. viridis*. Rol. alla Maddalena, e  
presso Alghero la trovò il prof. Carruccio.

*Gephyrei* (inermi).

Gen. *Sipunculus* L. S. *nudus* L. — In ital. Sipuncolo; in  
sardo Pilleda de cani. Si trova al Museo di Cagliari, e ne pos-  
seggo provenienti da Capo Spartivento.

IV. Tip. *Echinodermata*.

## Class. I. Asteroidea.

## Ord. I. Stellariidi.

Gen. *Asterias* L. A. *invispina* Lam., A. *membranacea* Lk.  
 Gen. *Astropecten* (Linck) Mull et Trsch. A. *aurantiacus*  
 Gray. — In ital. Asteria, Stella di mare, a Cagliari Stella de mari,  
 a Carloforte Stelle de mà, a Bosa Rughè de Salomone. Poi si ha  
 Stella arrubia, ecc.

## Ord. Opururi.

Gen. *Opideria* M. et Tr., *O. longicauda* M. et Tr. — In  
 ital. Offura, a Cagliari "Siddu".

## Class. II. Echinoidea.

## Ord. Echinoidi regolari.

Gen. *Echinus* Lam. *E. esculentus* L. — In ital. Riccio di  
 mare comune, in sard. merid. Arrizzoni de mari.

*E. melo* Lamark. — Riccio melone. Trovasi presso Sarroek,  
 Mortorio, Golfo di Cagliari e di Quarto S. Elena.

*E. pileolus* Lamark. — A Cagliari Castangiolas.

Gen. *Strongylocentrotus* Brdt. *Str. heitus* Bradt. — A Ca-  
 gliari le diverse specie in generale le chiamano Arrizzonis, ad  
 Alghero Boga mari, a Bosa Zinzinnu comune, Arestè, Rizzu a  
 Sassari, Zin a Carloforte. Riccio di mare.

## Ord. Clipeastroidi.

Gen. *Ptilularia* Agat. Deg. *F. ovulum* Lam.

Gen. *Echinocyanus* Phels. *E. pusillus* Fr. Mull. — In sardo  
 Arrizzoneddu nascenti.

## Ord. Spatangoidi.

Gen. *Spatangus* Klein. *S. species?* — Si ha al Museo di  
 Cagliari.

Gen. *Echinocardium* Gray. *E. mediterraneum* Gray.

## Class. III. Holothuriae.

## Ord. Holothuriae.

Gen. *Holothuria* L. — *H. tubulosa* Gmel. — Oloturia tubulosa,  
 Cetriolo, Cocomero, legume di mare. A Cagliari Cazzu de mari,  
 a Bosa e a Sassari Cazzu marinu, a Carloforte Cassumen, a Ori-  
 stano Urba marina.

V. Tipo. *Arthropoda*.

## Class. I. Crustacea.

## Ord. BRANCHIOPODI (Phyllopori Claus).

Gen. *Artemia* Leach. *A. salina* L. — A Cagliari nello Stagno orientale.

(Cladoceri).

Gen. *Daphnia* O. Fr. Muller. *D. pulex* Linn.

## Ord. OSTRACODI.

Gen. *Cypris* O. Fr. Muller. *C. sarda* Costa.

## Ord. COPEPODI.

Gen. *Cyclops* O. Fr. Muller. *C. vulgaris* Leach. — Nelle acque pantanose di Muravera insieme alle Dafnie.

Gen. *Lichomolgidium* Kossin. *L. sardum* Kossin. — Alla Maddalena.

## Ord. CYPRIPEDI.

Gen. *Lepas* Lp. (Darwin). *L. anatifera* L. — Caperozzolo di mare (Adria). In Sardegna Muscula. Nel Museo di Cagliari si ha la Lepade, proveniente da Inghilterra.

Gen. *Balanus* List. *B. tintinnabulum* (Penn. — Ghianda di mare, in Sardegna Musculu.

## Ord. STOMATOPODI.

Gen. *Squilla* Rond. *S. mantis*. — In ital. Pannocchia, Conocchia, Squilla maritide, in sardo Canbara aegustina. *S. Desmarestii*. Risso.

Ord. TORACOSTRACA (Podophthalmi) — *Decapoda*.

Gen. *Palaeon* Fabr. *P. brevilianus* Desm. (Targioni Tozzetti, Carruccio ecc.) a Cagliari. — In ital. Gamberetti di mare,

a Cagliari Canbara, a Bosa Camberu, a Oristano Alligustaddu. — *P. arphias*. Risso.

## Ord. MACRURA.

Gen. *Homarus* M. Edw. *H. vulgaris* M. Edw. — In ital. Elefante di mare, Gambero di mare, a Cagliari, Tortoli ecc. Lungofanti, Liofanti, Lungpante a Bosa, Lungubendi a Carloforte.

Gen. *Palinurus* Fabr. *P. vulgaris* Latreille. — In ital. Aragosta, a Cagliari Aligusta, a Sassari Aligusta, ad Alghero Ghigosta. Le piccole a Cagliari Zaccarredda, Aragostinu ad Oristano.

Gen. *Scyllarus* Fabr. *S. arctus* Fabr. — In ital. Scillaro, a Cagliari Suggaggia.

## Ord. ANOMURA.

Gen. *Eupagurus* Brdt. *E. Pridaurui* Helles. — In ital. Bernardo P'erenita, Rancitolo a Napoli, Diavolo di mare, Pagine, a Cagliari Sa manu de simimiga.

## Ord. BRACHYURA.

Gen. *Mala* Linn. *M. verrucosa* M. Edw. — In ital. Grancevola, Granhione, a Cagliari Piurzia, a Bosa Marmotta, ad Alghero Granch de la Maddalena.

Gen. *Carcinus* Leach *C. maenas* Leach. — In ital. Granchio ripario, Granchio menade, Granchio menola, Granella, a Cagliari Cavuru, a Sassari Granu, ad Alghero Granch, a Carloforte Granci, a Bosa Piudu.

Gen. *Pinnotheres* Latr. *P. velorum* Bosc. — In ital. Granchio delle madreperle, Astura a Venezia, a Cagliari Cavuru de bassa.

Gen. *Portunus* Fabr. *P. depurator* Leach. — Trovato da Targioni Tozzetti a Cagliari. A Cagliari Cavuru. Si distinguono poi col nome di Cavuru dormiu, Cavuru de perda, de arena, Piurzia de scogliu, de fundu, Craba marina, a Bosa Piude de ritu, de mari ecc.

## Ord. ISOPODA.

Gen. *Oniscus* L. *O. murarius* Cuv. — In ital. Porcellino dei muri, a Cagliari Babbalotti de centupais, Centupais, Porched-

ne a Oristano, Babbauzu e chentu pes a Sennu, chentu pes a Patada, Porcheddu de chentupets, Forcu Seni, Muntoneddu de porcus a Sinnai.

Gen. *Porcellio* Latr. *P. spatulatus* Costa. — Abbondante nell'Anfiteatro di Cagliari, Porcellino dei muri. In sardo chiamasi come la specie preced.

Gen. *Armadillo* Latr. *A. vulgare* Latr. — Comune.

Gen. *Sphaerona* Latr. *S. ephippium* Costa. — Pulce di mare, in sardo Babbalotteddu de mari, a Oristano Porceddu de arriba.

Ord. AMRIPODA.

Gen. *Orchestia* Leach. *O. mediterranea* Costa, *O. littorea* Mont. — Pulce di mare, a Cagliari abita tutte le coste del mare, e Costa lo trovò a Pula, Terranova, sino nella valle Canonica ad Iglesias. In italiano Pulce di mare, a Cagliari Pulxi de mari, a Bosa Pulighe marinu, ad Alghero Pussa marina.

Gen. *Allorchestes* Dana. *A. pedemontensis* Sp. B. (Q. G. Jeffrey) nelle coste della Sardegna. — In sardo Bobboeddu de arena.

Gen. *Gammarus* Fabr. *G. pulcer* L. — Gambero pulce, in sardo Bobboeddu de arena.

Gen. *Caprella* Lam. *C. species?* — Si dice anche Craba de mari.

Class. II. ARACNIDA.

Ord. ACARI.

Fam. *Dermatophiliidae*.

Gen. *Demodex* Owen. *D. folliculorum* Erichs. — Nelle ghiandole sebacee e nei bulbi piliferi della pelle dell'uomo.

Fam. *Sarcoptidae*.

Gen. *Sarcoptes* Latr. *S. scabiei* Deg. — Acaro della scabbia dell'uomo. Sonvi altre specie.

Gen. *Tyroglyphus* Latr. *T. stro* Gerv. — Acaro del formaggio, in sardo Pruni de casu.

Gen. *Ixodes* Latr. *I. ricinus* L. — Issode, Issode ricino, Zecca dei cani, Ticchio dei cani, in Cagliari Cardanca, a Lanusei Cancaia, Cadenancia, nel Logudoro Adenacra. Nel primo stadio

quando non è attaccata ai cani, quando è rossastra, in campagna, si chiama ad Oristano Arrighini, presso Cagliari Arrexini, Righine a Bosa. Il prof. Carruccio lo trovò numeroso nell'*Ertaceus europaeus*.

Gen. *Argas* Latr. *A. reflexus* Latr. — Come l'*Ixodes*.

Ord. SCORPIONIDI.

Gen. *Euscorpilus* L. *E. haeccaulis*. — In italiano Scorpione, a Cagliari scorpionni, a Ballao Scrapponi de ganciu, Asculpiò o Asculfiò ad Alghero; a Meana, Oristano; Sinnai Scrapponi; a Lanusei Boec'homini, a Oliena Forchidalide vuvula, a Sassari Ischeffioni.

Ord. PSEUDOSCORPIONIDI.

Gen. *Cheifer* Geoffr. *C. cancroides* L. — Chelifero, Scorpione letterato; in sardo Scorpioneddu, Scrapponeddu de papei ad Oristano.

Ord. PHALANGIDI.

Gen. *Phalangium* L. *Ph. opilio* Lin. — Diffuso per il monte e per la pianura. In ital. Falangio opilio, Opilionide, Falangino, Ragno della vergine; in sardo Aquasanterà, Aquanita, Absanterà.

Ord. ARANEIDI (Ragni).

In sardo sono denominati a Cagliari Aragna, Arangia nel Campidano di Cagliari, Taragnà a Carloforte, Leperangiola a Meana, Arangiolu a Ballao, Santadi, Sestu e Lanusei, Aranzolu, Survadura ad Olzai, Franchillossu e Francadossu a Bono; Ragna nella Gallura, Tarranculu nel Sassarese, Ragna ad Alghero, Arangiolu ad Isili; e Bruscias nel Campidano sono denominati i piccoli ragni.

La tela di ragno o la ragnatela vien denominata a Cagliari Tirinnia, Celu de lu tarranculu a Sassari, Arangiola, Leperangiola a Meana, Ciliatica nella Gallura, Nappa a Sinnai, Cheli de ranzolu nel Logudorese, Chelu de tarranculu nella parte settentrionale, Neparangu a Esterzili, a Olzai Tallaranu.

Ord. A. TETRAPNEUMONES.

*E. catelana* Costa. — Abbandante presso il fiume Tancoi nelle pianure Oristanesi.

*E. insulana* O. Costa. — Presso Iglesias.

Class. III. Myriapoda.

Ord. CHILOGNATI.

Gen. *Julus* L. *J. haerens* Koch. Costa lo trovò nell'Anfiteatro a Cagliari. — In ital. Millepiedi, Miriapodo, a Cagliari Bremi de acqua, a Sineri Ungurra de centu pais, Zentupedi a Sassari e Tempio, Merme nacula a Oliena, Bremi, Gremi de acqua o de pani a Oristano e Bauladu, Centhancas a Gavoi, Centhucambas nella Gallura, Mille pedes a Nuoro, Centhucambe a Carloforte, Centupeis a Esterzili, Mamma de terra a Lanusei.

Gen. *Polydesmus* Latr. *P. complanatus* Deg.

Gen. *Glomeris* Latr. *G. marginata* Leach. — Al Campidano di Cagliari, Aperiungia, a Tortoli Babbu nostru, a Lanusei Boborucci cannacca.

Ord. CHILOPODI.

Gen. *Geophilus* Leach. *G. crassicauda* Costa.

Gen. *Scolopendra* L. *S. dalmatica* Koch. diffusa. — In ital. Scolopendra, a Lanusei Cerensula, a Meana Segàppodighe, Chentu pedutu, come pure all'Julus ad Oiena, Pappapizza a Sestu, Pappilleddas a Sinnai.

Gen. *Lithobius* L. *L. lapidicola* Mein. *L. impressus* Koch. — Ital. Tanaglinza, a Sestu Pappapizza piteca.

Gen. *Scutigera* Lam. *S. coleopterata* Lin. comune. — A Sinnai Curricuri.

Class. IV. Insecta (Hexapoda).

L'insetto si indica in Sardegna col nome comune di Babbalotti nel dialetto meridionale; Babbauzu, Babbauddu nel settentrionale, Babbasori a Gavoi, Insetti a Carloforte.

Ord. I. APTERA (Thysanoura).

Fam. *Leptismidae*.

Gen. *Cteniza* Latr. *C. sarda* Costa. — In ital. Cteniza. Cagliari, presso le siepi, in sardo Sulga.

Ord. *B. DIPNEUMONES. A. Vagabundae* — *Saltigradae*.

Gen. *Salticus* Latr. *S. formicarius* De Geer. — In sardo Pappamusa.

Ord. CURCADAE.

Gen. *Lycosa* Latr. *L. puterulenta* Cl. ed altre specie.

Ord. *C. SEDENTARIAE*. — *Laterigradae*.

Gen. *Tegenaria* Walck. *T. domestica* Cl. — In ital. Ragno di casa, Ragno comune, Tegenaria, in sardo Pappamusa, a Oristano Kionzana, Fibonzana.

Gen. *Latrodectus* Walck. *L. 13 guttatus* Rossi. — Trovato dal prof. A. Costa presso lo stagno di Sorso. Più abbondante la *var. lugubris* L. sotto i sassi in primavera a Muravera, in giugno a Tanayta. — In ital. Malinizzato, in sardo Argia a Meana e a Santadi, Vaglia a Olona, Barza a Gieri, Arangioiu sulau a Lanusei, Baglia a Sassari, Baria a Nuoro, Aranzolu de s'arza (fratello eredito) a Sadali, Vargia ad Alghero, Braxia a Oristano. Si ha ancora il pregiudizio, specialmente nella Barbagia di Belvi, che sia necessario suonare e ballare, perchè guarisca chi vien morsicato.

Gen. *Egeira* Walck. *E. diademata* L. — In ital. Orbitelo o Ragno a ruota, a diadema, Ragno crociato, in sardo alcune specie son chiamate Bruscias. La più diffusa a Cagliari.

*E. cornuta* Cl. — A Cagliari.

(1) Il prof. Garruccio nelle colline dette de Santa Miali, tenimento del fu Generale Cugia, nel 1869, aiutato dal preparatore Stefano Maloni, riuscì a isolare diversi nidi intatti con ♂ e ♀ di tale specie, che portò al Museo di Firenze, dove nel Bollettino della Società Entomologica Italiana descrisse diligentemente i caratteri dei due sessi per quella parte non ancor nota, unendo alla descrizione figure assottissime. (Ved. Vol. III, 1871).

Sub Ord. *C. Saltatoria. Acritidae.*

Gen. *Acritum* Latr. *A. migratorium* L. — In ital. Locusta migratrice o Cavalletta; in sardo Aligusta, ad Ozieri Tiliatrice caccaru. Questi anno infestò il Sarrabus. *A. tartaricum* Lin. var. lineola Fab. Diffusa.

Gen. *Oedipoda* Latr. *O. coerulea* Lin. presso Cagliari alla fine di giugno.

Sub Ord. *Locustidae.*

Gen. *Locusta* L. — *L. viridissima* L. — Locusta verde, Cavalletta verdona; in sardo a Cagliari Pibizziri birri, a Tempio Mamma grada, nel Campidano Aligusta. Vengono denominati in Sardegna Pibizziri nella parte meridionale, Pibizziri pringiu, Birri; Tiliatrice nel Logudoro Tiliatrice, ad Alghero Ziliblich, nella parte sett. Tiliatricu, nella Gallura Zilibricu, Zilibrich pancios al verde a Tempio, Attilibische ad Ozieri, Botula, se verde a Calangianus nella Gallura, Tiliatrice a Oliena, Tiliatrice a Gavoi, Aligusta a Lanusei alla grande, Babirodda alla piccola.

Sub Ord. *Gryllidae.*

Gen. *Gryllus* L. *G. campestris* L. — In ital. Grillo, Grillo volgare, Grillo domestico, delle case, in dialetto merid. Grillo, sett. Griglin, ad Alghero Grill.

Gen. *Grylloblatta* Latr. *G. vulgaris* Latr. — Grilloalpa; a Bosa Chibundarzu, a Sestu Cumbiarzu, a Samassi Scraponi, a Isili Cuchiu, a Sinnai Cumburargiu, ad Oristano Moruchuddu, Ferroni de quaddu, Canerriada ad Ozieri, Ururà ad Alghero.

## Ord. PSEUDONEUROPTERA.

Sub Ord. *A. Corrodentia. Termitidae.*

Gen. *Termes* L. *T. lucifugus* Ross., presso Cagliari.

Gen. *Calotermes* Hog. *C. flavicollis* Fabr. — In sardo Formiconi.

Sub Ord. *B. Amphibiotica. Ephemeridae.*

Gen. *Ephemerella* L. *E. vulgaris* L.

*Bollettino della Società Romana per gli Studi Zoologici.*

## Ord. OROPTERA.

Sub Ord. *A. Labiata.*

Gen. *Forficula* L. *F. auricularia* L. — In ital. Forficchia, Forbicina, Pinzaiola; a Cagliari Cugurra, Isperrago a Ozieri, Pofighitta a Bosa. *F. gigantea* Fabr; a Cagliari e a Sassari. *F. decipiens* Gené; diffusa. — Si denominano in sardo a Isili, Cugurra a coa frucedada, Isperraguentas ad Ozieri, Patada, Foffighes a Bosa, Sa goecugurra a Lanusei, Cugurra a Cagliari, Forchidadale nel Logudorese, Isperraguazza a Sassari, Codifolvia nella Gallura, Spizzula cunnu in generale nell'Ogliastra, Forchidadie dalle donne, Sperra gunnus dagli uomini a Bono o Pisciatfuj dalle donne.

Sub Ord. *B. Cursoria.*

Gen. *Periplaneta* Barm. *P. orientalis* L. — In ital. Scara-faggio delle case, Blatta; in sardo a Cagliari e Isili Prettas; per tapudiga ad Oristano, Brabetta nei villaggi vicini a Cagliari, Perfazaddu, Babbaiozzeddu a Sinnai, Cadalani a Sassari, Griglia a Bosa.

Sub Ord. *Mantidae.*

Gen. *Mantis* L. *M. religiosa* L. — In ital. Grillaccio, Pregadio, Mantide religiosa, Mantide pregadio, Grillo devoto, Grillo indovino; in sardo a Cagliari Signorica, a Santadi Semmoredda, Giana, sa fada nel Logudoro, Muneza a Carloforte, Cabadda de donnudu a Gavoi, Quaddu engiu a Esterzili, Su quaddu ammen a Lanusei, Ligadorza a Oliena, Su quaddu dé santu Martinu a Tortoli, Su quaddu de masaledda o Ungiquaddu a Zerza, Segamannus ad Olzai, Su caddu de santu Juani a Tempio, Su cabaddu de su tiandu a Nuoro, Mamma de frittu a Bosa.

*M. Spallanzani* Rossi. Quaddu de santu Giuanni, de santu Perdu ad Oristano.

Gen. *Bacillus* Latr. *B. Rossii* Fabr. Bacillo del Rossi. — In opusa a Ballao Schischini de erba.

... della ...  
 ... a Bosa, Paras de arriu a Isili, Santadi, Esterlizi; ...  
 mazu a Gavoi.

Sub Ord. *Libellulidae*.

Gen. *Diplax* Chp. *D. meridionalis*, Selys *D. depressuscula* Selys.

Gen. *Libellula* L. — *L. depressa* L.; In ital. Libellula depressa. *L. sarda* Ramb. Esclusiva della Sardegna. — *L. ferruginea* Vol. Lind.

In sardo tutte le Libellule vengono denominate a Cagliari Segaddirus, a Isili Semoredda birdi, Segamanus a Olzai, Ziliblith volador ad Alghero.

Ord. NEUROPTERA.

Gen. *Myrmecoleon* L. *M. formicarius* L. — Formicaleone. *M. patens* Ramb., presso Cagliari. *M. distinguendus* Ramb.; presso Cagliari, alla fine di giugno. A Lanusei l'insetto perfetto vien denominato Sinzula de erriu, a Sestu Sinzulmascu, a Oliena la larva Cassaformica, a Ballao Formigheri.

Ord. LEPIDOPTERA. (Farfalle).

L'insetto perfetto ha vari nomi: a Cagliari Papagallu, a Bono Spiritu, a Gavoi, Meana Arizzo, Leperes, Lepereddus, proveniendo dal greco; a Carloforte Pappagiene, Calacasu, Calacasseddù, Calacasu mannu a Lanusei, Folagasu, Folagaseddu a Sestu, a Oliena Cavaglieris, biancus, giallus, ruins ecc.; Mariposa a Gavoi, Olzai, Oliena, Bosa, Meana alle Notturne e alle Sfingine Fagher farina, per il polviscolo, nel Marghine; Sturacandelas a Santadi alle Notturne; Marialene a Olzai, Barabattula a Sassari, Tempio; Barabattledda alle piccole, Colagasu, Pappacasu ad Oristano, Spiritu a Ozieri, Studacandelas alla Notturne a Isili, Pappagalleddu de aqua a Sinnai, alle Notturne a Isili, Papalliu a Alghero. Il bruco presso Cagliari, a Sestu ecc., vien denominato Cugurra, Pappalua, Cugurra biridi a Oristano; Pelose in italiano. Altre come, a Bosa, Ruga, Mammarrugula, Barruga, Sa erruga

e Berruga a Tortoli, Mizzanami a Tempio alla Ninfa, Somnica a Ballao, Sonnighitta a Sinnai. La crisalide, poi, vien detta a Bosa Pane e colvu, Stugiu de calacasu a Lanusei, a Sassari Drumiceolu, Pubureddu ad Ozieri alle farfalle, Mariposa specialmente alle Sfingi, Bremi de trigu al bruco ad Oristano, Manma de sonnu alla crisalide a Tortoli. Alle farfalle grandi a Gavoi danno poi il nome di Lunas, alle piccole pezikas.

Sub Ord. *Rhopalocera*.

Fam. *Papilionidae*. Gen. *Papilio* Latr. *P. polatritus* L. *P. dalirio*, com. in primavera, estate, autunno, al piano, e al monte.

*P. hospitans* Gené. *P. machon* L. — Maccone, in primavera, estate, autunno. Nei terreni incolti, giardini.

Fam. *Pieridae*. *Pieris* Bois. *P. brassicae* L. — Il bruco si trova nei cavoli, cavolata, in sardo Lepere de caule, nella Barbagia di Belvi. *P. rapae* L.

Gen. *Colias* Boid. *C. Hyale* L. — In piani, boschetti, nel piano e nel monte.

Fam. *Nymphalidae*. Gen. *Argynnis* Fab. *A. Cyrene* Bonelli. —

Nei cardì selvatici della regione montuosa. *A. latona* Latonia. Gen. *Vanessa* Fab. — *V. atalanta* L. Alalanta o Vulcano. *V. Io*. Io o Pavone. A Cagliari.

Sub Ord. *Heterocera*.

Fam. *Sphingidae*. Gen. *Deilephila* Och. *D. Daurini* Tr. Gen. *Sphinx* Fab. *S. convolvoni* L. Sfinge del Vilucchio.

Gen. *Acherontia* Och. *A. atropos* L. Sfinge testa di morto. Portanovas a Meana; Spioni, Pappagallu de Sant'Antoniu a Cagliari; Mariposa conca de mortu a Oliena; Mariposa Cap del mortu ad Alghero; Calagasu mannu a Lanusei. A Gavoi il bruco che si trova nelle patate lo denominano Serrone; a Sassari Pizoni de Santu Giunni; ed ha diverso augurio, secondo che la croce in testa è nera, bianca, ecc. Si ha anche il Serroni nei cavoli del *Pieris brassicae*.

Fam. *Sesiidae*. Gen. *Sesia* Fab. *S. anthraciformis* Romb. *S. odyniformis* Ghil.

Fam. *Bombicidae*. Gen. *Bombyx* Bois. *B. quercus* L.

Bozzolo si dà il nome di Coccitta. Alla larva a Santadi si dà il nome di Bremi de liana.

Fam. *Tineidae*. Gen. *Tinea* L. *T. pellionella* L. — In italiano Tignola delle pelliccie, a Cagliari Arna; Tegadia ad Oristano; Tagnula a Sassari; Cannua a Carloforte; Cannula a Bosa; Nastala ad Oliena, altrove Taralu. *T. tapezzella* L., nei panni e nelle lane. *T. sarvicella*. — In italiano Tignola dei panni; Arna a Cagliari; Teca (o toscano) a Nuoro, e negli altri posti come sopra.

Fam. *Tortricidae*. Quella del legno si denomina Lana ad Alghero. Serroni ad Oristano. Gen. *Carpocapsa* C. *pomonella*.

Gen. *Achroia*. *A. abearia*; presso Cagliari si denomina Aberenza, a Lanusei Arrenze, a Oliena Tanzola.

#### Ord. HYMENOPTERA.

##### Sub Ord. Entomophaga.

Fam. *Gallinaceae*. Gen. *Cynips* L. *C. quercus/fohi* L. — Ciupide della foglia, in sardo Cugurra de padente, alla galla, o al gallinetta Gradera a Isili, Grallera a Nuoro, Laddera a Bosa, Ozieri, Sassari.

##### Sub Ord. Aculeata.

Fam. *Chrysididae*. Gen. *Mutilla* L. *M. Spinola* L. Trovasi a Macomer, Cabras. ecc. *M. Spunctata* Oliv. — Nel Campidano di Cagliari, trovata dal Costa. *M. coronata* Fab. In italiano v'ha chi lo chiama Mutilla, in sardo Arza a Sadali, Esterzili, Isili, ecc. Si ha poi *s'Arza bogatta* la serziata, cotada la bruna, vivada la nerasta.

Gen. *Pompilus* Fabr. *P. pilceatus* Costa. — Trovasi a Cagliari, ecc. *P. cingulatus* Rossi. A Cagliari, Oristano, ecc.

Fam. *Formicidae* (Formiche). Sono distinte in Sardegna con i nomi di Fromiga nel dialetto meridionale, Formigula ad Alghero, Formiga nel Logudorese, Frommignia nel settentrione.

Gen. *Formica* L. *F. rufa* L. — Formica rossastra, rossigna. *F. rufibarbis* Fab., a Meana Formiga, a Oristano Formiga cultu arrubiu.

Gen. *Lasius* Fabr. *L. alienus* Fabr. *Aphaenogaster sardous*

Mayr. — A Lanusei denominansi le formiche con i nomi di Fromiga niedda, a conca arrubia, le piccole Lusgana niedda, Lusgana arrubia ad alas; ad Oliena Luzzana niedda, Ruia, a Gavoi Pizirua, conchruina, cun sas alas; a Carloforte Formiga pissacu, cun eae; poi si ha il Formiconi nel meridionale, e il Fromignoni nel settentrione dell'isola.

Fam. *Vespidae*. — In sardo si chiama Espi nel meridionale, Gespa a Lanusei, Ghespe nel Logudoro, Vespa nel settentrione, Espus, Ghespus ad Oristano. Despa o Vespa ad Alghero, Vespa a Tempio.

Gen. *Vespa* L. *V. vulgaris* L. — Vespa comune. *V. candro* Lin. Calabrone, in sardo Abioi, Abiolu, Apiolu, Espiolu, Mamma de funtanedda a Lanusei.

Gen. *Vespa* L. *V. germanica* Fab.

Gen. *Odynerus* Latr. — *O. parietum* a Cagliari.

Gen. *Polistes* Latr. *P. gallica* L. — Poliste, Vespa cartonaja.

Li stessi nomi dela Vespa vulgaris in sardo.

Gen. *Amophyta*, Krb. *A. sabulosa* L. — Vespa della sabbia; in sardo Espi forraina, Espi terrania, Ispadaranza ad Ozieri.

Fam. *Apidae* (Api).

Gen. *Apis* L. *A. mellifica* L. — In italiano Ape; in sardo Abi nel meridionale, Abe nel Logudoro, Abbi nel settentrione, Abba nella Gallura, var. *Ligustica*. Il fuco poi vien denominato Abi mascu, la regina Abi longa a Meana, Abi maista nel Campidano. Da taluni è l'*A. ligustica* Spin. considerata come specie distinta.

Gen. *Bombus* Latr. *B. terrestris* H. — In italiano Bombo terrestre. *B. lucorum* Lin. diffuso per tutta l'isola. Vengono denominati Abioi, Muscone, Bombue ad Olzai, Abioi de monte ad Esterzili, Buveni a Tempio.

#### Ord. COLEOPTERA.

##### Sub Ord. A. Pentamera.

Fam. *Cicindelidae*.

Gen. *Cicindela* L. *C. campestris* L. — In italiano Cicindella campestre, in sardo, a Lanusei, Pretas, a Sinnai Periaz-

zedus, *C. Nervosa* Fabr., var. *sarda* Gené, trovati a Cagliari, Alghero, ecc. *C. illorea* Forsk.

Fam. Carabidae.

Gen. *Carabus* L. *C. coriaceus* L. — Carabo coriaceo.

Fam. Dytiscidae.

Gen. *Dytiscus* L. *D. marginalis* Sturm. — In italiano Dittico marginale, Scarafiggio acquatico. *D. circumflexus* Fab., *D. pisanus* Scop. nei rivi di Monastir, Riu mannu, Laconi e altre. — In sardo Mamma de anguidda nel merid, Mamma de ambidda nel Lugodoro, Mamma de anghidda a Sassari, Mamma de l'anghira ad Alghero, Pappa bobboi ad Esterzili.

Gen. *Gyrinus* L. *G. nator* Scop. nel rivo del Monte Limbara, *G. urinator* Hl. al settentrione nel meridionale. — Si chiama volgarmente a Santadi Danzana, Messadaris; a Meana Coghinas, a Gavoi Gioganzinus, Coddanzinus, a Oliena Coghinas, a Gavoi de acqua ad Esterzili. Cullifurri altreve, Gioguana ad Oristano.

Gen. *Hydrophilus* Geoffr. *H. piceus* L. — Idrofilo piceo o scuro. Mamma de anguidda, de ambidda, de anghidda a Sassari.

Fam. Chaetornitha.

Gen. *Neurophorus* Fabr. *N. vespillio* Fabr. — Neuroforo o beccino.

Fam. Lamellicornia (Scarabeidae).

Gen. *Geotruxes* Latr. *G. stercorarius* L. — Scarabeo stercorario; a Nuoro Carramerda inzeddan, Carri carri a Isili, Carramerda a Sassari, Carracarra a Esterzili, Carru carru, Carramerda ad Alghero, Rubatamerda a Carloforte, a Bosa Carramerda, a Meana Carra carra, a Cagliari Carrabusu, a Lanusei Carrabusu, Tragamerda, nel Logodoro in generale Carramerda. *G. sardous* Erich. — Tutti i nomi di sopra.

Gen. *Oryctes* Hl. *O. nasicornis* L. Scarabeo rinoceronte. — In sardo Boe de celu ad Esterzili, a Gavoi Corripalmas, a Sinnai Carrubuso corruudu, a Bosa Corriucucuruc, a Tempio Micealina, a Samassi e Sestu Serafaioni a corrus, a Oliena Boe tomasu, ad Alghero, Ziribò, Travaioni corruudu ad Oristano.

Gen. *Melolontha* Fabr. *M. vulgaris* Fabr. Maggolino. — Le larve son dette dai Toscani Tormentoni.

Gen. *Cetonia* Fabr. *C. florcola* Herbs. var. *metallica* Fabr., *C. aurata* Linn. var. *carthami* Gené. — Trovata a Decimoputzu, Samassi, Laconi, Tonara.

*C. sarda* Gené. — Presso Orani in Agosto è stata trovata da Costa. A Tempio, specialmente la verde si denomina Bobboi de India.

*C. squatta* L. (Ghliani). — Presso Cagliari, abbondante nell'Aprile e nel Maggio. Nel Campidano di Cagliari Babbalotti des is erbas.

Fam. Pectinicornia.

Gen. *Lucanus* L. *L. cervus* L.; Cervovolante. — *L. Cervus* L. var. *Capra* (Ghliani). — A Meana si denomina Circola; a Gavoi e a Oliena Pesa cantare, Corritolu; a Sassari Tagliatenu.

Gen. *Dorcus* M. *D. parallelepipedus* Linn. *D. musimon* Gené. — Nel Limbara nel mese di Giugno si trovano in regioni montuose. A Carloforte Bagu in cun eae.

Ord. MalacoDERMATA.

Gen. *Lampyrus* Geoffr. *L. noctiluca* L. — Lampiride notticula, Lucciola minore. — *L. instans* Mats. — A Santadi Ognuchidu, a Oristano Cullirei, Culliguida, a Posa Culligughe, a Bono Lunglughhe, Curlughe ad Alghero, Culliusgi a Lanusei, Culliuca a Tempio, Culliuca, Lucilugenti a Tempio, a Sassari Culliuazzi, a Isili Ognuchidu, Cea-bella a Carloforte.

Gen. *Anobium* Fabr. *A. pertinax* L. — Anobio pertinace, Oriolo della morte. In sardo Berme de linna.

Heteromera.

Fam. Tenebrionidae.

Gen. *Blaps* Fabr. *B. gigas* Linn., a Carloforte Baguin, Ascrabat ad Alghero, a Cagliari Scaraavaci, Malangoni a Tempio, a Oliena e Nuoro si chiama Sisaia, a Lanusei Sulafigu, a Sassari Sesaia, come a Patada e Ozieri; Musulu a Sinnai. *Atis punctata* Thunb. — Comune a Cagliari, come il *Blaps gigas*; e prende, forse, per tutta la Sardegna, li stessi nomi di sopra.

*Pteris* *P. sarda*, A Cagliari.

Gen. *Trichodes* Herbst. *T. albearius* Fabr.

Fam. *Meloidae*.

Gen. *Meloe* L. — *M. proscarabeus* L. — *Meloe proscarabeo*. — Ad Ozieri Melogi, Calanitta a Tempio, a Sestu Babbalotti de zerras, Impiccababbus a Simnai, Angesa ad Oristano; *M. violaceus* Marsh.; *Meloe*, Maggiolino unthoso. — *M. purpurascens* Germ (*sardus*) Gené, presso Cagliari.

*Cryptopentamera*.

Fam. *Curculionidae*.

Gen. *Bruchus*. *B. pisi*; bruco del pisello, *B. fabae*; bruco della fava. — In sardo vien denominato a Cagliari Perdufai, a Santadi Perdufai o Faccioni, a Oliena Predupisellu o Predufava, a Lanusei Bobboi de pisu.

Gen. *Calandra* Clair. *C. granaria* Fabr. Punteruolo del grano, *Tenebrio neri*, *Calandra* del grano. In sardo Grugulloni de su trigo; *Saxene* a Nuoro, Oliena; *Igurzone* nel Logudoro; *Gulgrudoni* nella Gallura, *Chiampagne* ad Ozieri.

Fam. *Longicornia*.

Gen. *Cerambyx* L. *C. cerdo* L.; *C. nero* Fab.; *Cerambyce*. A Lanusei e a Senu Seisei, a Santadi Colpira, a Ozieri Zirriolu; a Nuoro, Olzai e Oliena Zinzimureddu, a Bosa Zinzigoru o Belanzoci, Zilimbriua a Tempio; Carrazzolu a Calangianus, Tittirionu a Sassari, ad Oristano Coicoipira, uno piccolo; color di paglia oscuro vien denominato Bobboi de soili.

Ven. *Coccinella* L. *C. septempunctata* L.; *Madonnina*, *Coccinella* dai sette punti. A Cagliari vien denominata Babbatola, corruzione di Babbu bola, nel Campidano di Cagliari e ad Isili vien denominata Mammaitola, a Meana Meriola, a Dorgali e Bono Bihiriola, a Gavoi Castamanzola, a Nuoro Perdu pischeddù, a Sassari Bola bola de Santa Juanni, Pappuseddu a Tempio, ad Alghero Coccinilla, Viola a Oliena, Domininde a Carloforte, Babbauzu de Santa Juanni ad Ozieri, Pibia a Bosa, Pibiola a Cuglieri.

Ord. RYNGHOTA.

Sub. ord. I. *Zoqthittri* — vel *Aptera* (Pidochn).

Fam. *Pentacillidae*.

Gen. *Pentacillus* L. *P. capitis* Deg.; Pidochno del capo. Le nova son dette lendini, in sardo hindiri. Il Pidochno poi in sardo si dice Priogu, nel dialetto meridionale, Piogu nel Logudorese, Pidochnu nel sett. Pidochnu nella Gallura. A Cagliari Mundiedda Priogheddu se piccolo. A Carloforte il Pidochno chiamasi Piroggi.

*P. vestimenti* Burm., Pidochno della vestimenta, della canicia, Pidochno del corpo. In sardo Priogu de persona.

Gen. *Phytirius*. *P. pubis* h., Piattola, Piattone. In sardo Piattola. *Lolheum* Nitsch. *L. anserts* Sulz., Pollino. In sardo Priogu Priogheddu da pudda.

Gen. *Trichodectes* Nitsch. *T. canis* Deg. Priogu de Cani.

Sub. ord. II. *Hemiptera* A. *phytophthores*.

Fam. *Aphididae* (Pidochni delle piante, Gorgogioni). A Cagliari Tingiu, a Bosa Babbauzu.

Gen. *Aphis* L. A. *Brassicae* L. Afide. *Siphonophora lactuca* Pass.

Gen. *Psylloxera* Boy. *Ps. quercus* Hayel, *Ps. florentina* Targ. Tozz., *Ps. vassaltriae* Planch., *Ps. coccinea* Kalt.

B. *Homoptera* (Cicadaria).

Fam. *Cicadidae* (Cicale).

Gen. *Cicada* L. *C. plebeja*. — A Samassi Zittazza, Chirigua, Chirigua ad Oristano, Sizzigolla a Simnai, a Lanusei Sissirigoggia, a Santadi Sisigraxia, Cigoa a Carloforte; a Bosa e Ozieri Chigula, Sigara ad Alghero, ad Oliena Chichela, (Chigula a Sassari, nella Gallura Chilàa, Pizigorra a Ballao, Pisigorra a Sestu, a Esterzili Orceida, a Sadali Circirida.

C. *Heteroptera* (Cimici).

*Hydrocores* (Cimici acquatoie).

Gen. *Hydrometra* Fabr. *H. lacustris* L. Idrometra lacustre. — Ad Oristano Piscadori, a Santadi Andaciana, a Tortoli Bobboi de arriu, ad Ozieri Marineri, a Sestu Pulixi de aqua, a Isili Spareangamma, a Oliena Cherbu de abba, a Ballao Quaddu de aqua; a Esterzili Bobboi de aqua.

Gen. *Notonecta* L. *N. glauca* L. *V. marmorata* Fabr. Tro-

vata da Costa padre, dal Carruccio, ecc. — Nononetta, Cimice acquaiola. In sardo Bobboi, Bobboeddu de acqua a Esterza, Zirrucci a Isili, Culfurria a Ozieri.

*Geocores* (Cimici terrestri).

Gen. *Acanthia* Fabr. *A. lectularia* L. Cimice dei letti. — Nel dialetto merid. Pinnixi, nel logud. Chinnighe, nel sett. Zimizza, anche rulta, nella Gallura Cimicia, ad Oristano Pinniggi, Pinnighi, Cincia ad Alghero, Seinnigge a Carloforte.

Gen. *Pentaloma* Latr. *P. purpurea*. *Bruchypella*. *B. aterrima* etc. — Le Pentatome sono denominate a Sestu Bacchiasiddas de Santu Millanu, a Bosa Bacca de santu Giuanni, Vacas de deus a Nuoro, Vacca de Noè a Esterzili, Vacca de lampada a Oizai. Altre cimici che mandano un odore puzzolente, sono denominate a Oliena Curusta, a Gavoi Pinnighe agreste, presso Cagliari Pinnixi de mata, Zimizza areste, Rulta campina a Sassari, Cincia de abra ad Alghero, Pinnighe areste ad Oristano.

Gen. *Drepana*.

#### A. Nematocera.

Gen. I. *C. pingens* L. Zanara. — A Cagliari si denominano Muschittu, Muschittu de su bine; ad Oristano poi Muschittu, Muscerda de subinu, Sinzula, Zuga, Sinzuoni o Sinzula mascu, Sinzia a Carloforte, Sinzula, ad Isili, Sinzula, Sinzu a Santadi, a Lanusei una specie vien detta Sinzula, un'altra più piccola Coarbedda (papatacci), a Gairo, Sinnai del pari; nel Logudoro Tintula, Tinzula, Zitula a Nuoro, tintula nel sett. Tintula Sassari, Zinzula a Sorso e Ozieri, Zinzula a Tempio. Poi il piccolino a Sassari vien detto Muschitta, Muschina, Muschinedda a Nuoro.

*C. impudicus*. Ficalbi. — Il chiarissimo prof. Ficalbi, che per il primo lo trovò, l'ebbe per mezzo di larve, trovate nel mese di maggio a Sassari in acqua ferma.

#### B. Brachycera.

Fam. *Tabanidae*.

Gen. *Tabanus* L. *T. fulvus* Meig. — Si trova specialmente a Meana. — In ital. Tafano.

*T. aler* Ross. Trovato a Pula da Costa padre nel mese di luglio. — Nel dialetto merid. Musconi, nel sett. Muscone, ad Oristano Dromilloni, a Lanusei Muschettorri, a Santadi e Sinnai Trafioni.

Gen. *Bombus* L., *B. meigeni* L. Penzolaia.

Fam. *Oestridae*.

Gen. *Hypoderma* Latr. *H. bovis* L. Estro bovino. — In sardo Musca de boi, Musconi. La gonfezza vien detta ad Oliena Babazione, la larva ad Ozieri Caizzone, a Gavoi Babazione.

Gen. *Oestrus* L. *O. ovis* L. Estro della pecora. — La larva vien denominata Bremicorru, Sorde de corru, la malattia Suddinzu, Badingiu.

Gen. *Oestrus* L. *O. equi* Fabr. Estro del cavallo.

Gen. *Musca* L. *M. domestica* L. Mosca delle case. — Nel dialetto merid. Musca, nel sett. Mosca.

*M. vomitoria* L. — In sardo Musconi, a Carloforte Muscum. Alla larva si dà il nome di Berme de sapelta, Zirrica, Soddissoddi, Zeria a Gavoi, Bremi de sa pezza a Cagliari, Zarriga ad Oristano, Le larve son dette Cacchioni, Marmeggia.

*M. Caesrr.* L. Mosca cesaren. — In sardo Musca birdi.

Gen. *Piophilta* Fall. *P. casei* L. — Il bacherozzolo vien denominato Bremi de casu a Cagliari, ecc.

Gen. *Sarcophaga* Latr. *S. carnaria* L. Mosca carnaria.

*S. haemorrhoidalis* Fall.

Gen. *Hypoboscra* Latr. *H. equina* L. Mosca cavallina. — In sardo Musca quadina, nel sett. Musca ciaddina, Musca cabaddina nel Logudoro, o Musca de quaddu ad Oristano.

*C. Aphaniptera* (Pulex).

Gen. *Pulex* L. *P. irritans* L. pulce. — Nel dialetto merid. Pulixi, nel Logudorese, nel sett. Pulizi, Pussa ad Alghero; Prusse a Carloforte.



*H. aspera* Linn. — In Ital. Linnæone, ecc.

glieri si denomina Sizzigoru boveri, a Simini Sizzigoru ad Alghero bové, cuccoidu a Sassari, Baosu a Bosa, Coccoi a Roma Barracocu a Tempio, Babbacorrù a Gavoi, Cocciodde a Cagliari, Corovacca a Oliena, Babbarra a Ballao, Pettazzu a Oristano, Coccoidu a Nuoro, Gioga grussa a Sassari.

*H. aspera* Born. *H. naticoides* Drap. Chiocciola vignaiola. — A Carloforte Tapode, a Cagliari e a Oristano Taparas. In autunno quando escono di terra alle prime piogge, sono dette Sizzigorus nieddu a Oristano, a Bono Mongia, come a Sassari, Patada, Ozieri, e a Bosa Monretta.

*H. serpentina* Ferrussac. A Sassari Gioga colorina, a Bosa Coccoidi e ranas.

*H. hastulans* Bonelli. *H. conoides* Draparnaud, var. *calarivana*.

*H. Meloni* von Maltzan. Trovata da Meloni, preparatore alla Università di Cagliari, al Monte Santo di Pula.

*H. lepida* Müller, var. *sarda*, trovata per la prima volta da Villa presso alle Maddalena e dal Targioni Tozzetti e Carruccio nell'isola di S. Antioco, abbondante presso Cagliari. A Cagliari Mongietta, a Sassari Gioga minuda, Caragoll manuvelli ad Alghero, Gioghitta a Ozieri.

Gen. *Leucoirra* Bech. *L. candidissima* Drap. A Cagliari Sizzigoru de coloru, a Sassari Gioga colorina.

*Helix maritima*. A Sassari Gioga minuda marina o de Santu Juanni.

Gen. *Stenogyra* Shuttleworth. *S. decollata* Linn. A Sassari si denomina Piciridinu longu.

Ord. OPISTHOBANCHIATA.

Fam. *Bullidae*.

Gen. *Bulla* Klein. *B. striata* Bruguiere. Commisissima nelle spiagge.

Fam. *Aplysiidae*.

Gen. *Aplysia* Lin. *A. deprensans* L. — In Ital. Aplysia, Lepre di mare, Polmone marino, Potta di mare, Vacca di mare, Asino

di mare. In Cagliari Cummu de mari, Craba de mari, a Oristano Para marinu.

Fam. *Umbrellidae*.

Gen. *Umbrella* Lamarck. *U. mediterranea* Lamarck. A Cagliari Ostioni burdu.

Ord. PROSOBRANCHIATA.

Sub ord. I. *Pectinobranchiata*.

A. *Toxiglossa*.

Fam. *Conidae*.

Gen. *Comus* Lin. *C. mediterraneus* Bruguiere, var. *franciscanus* Brug. — Cono del mediterraneo. A Cagliari Barrallieu, a Sassari Barrallieu, a Tortoli Barrallieu, a Bosa Conchizu, a Oristano Conchillu lisciu.

B. *Rhachiglossa*.

Fam. *Mitridae*.

Gen. *Mitra* Lamarck. *M. ebenus* Lamarck Comune. A Cagliari Barralluga.

Fam. *Fasciolaridae*.

Gen. *Fusus* Klein. *F. syracusanus* Linn. In sardo Barrallieu, Bucconeddu.

Fam. *Nassidae*.

Gen. *Nassa* Lamarck. *N. mutabilis* L. Abbondante. In sardo Barralluga.

Fam. *Columbellidae*.

Gen. *Columbella* Lamarck. *C. rustica* L. — A Cagliari Barralluga (da Bettelluga dell'isole Baleari). A Oristano Conchilleddu. Fam. *Muriceidae*.

Gen. *Murex* L. — In genere a Cagliari Bucconi come a Sassari, a Carloforte Runseggi, Buccò ad Alghero.

Gen. *Murex* L. *M. brandaris*. — In Ital. Carusolo, Rocchetta, Cagliari Bucconi femmina, Bucconi spinosu o de fraggia ad Oristano.

*M. truncatus* L. — Murice, Seonciglio, Murice troncolo, Ginocchello. A Cagliari si denomina Bucconi mascu, a Oristano Bucconi de siccu. All'opercolo si dà il nome di Tappu de bucconi.

Gen. *Purpura* Bruguiere. *P. haemastoma* Philippi. — Murice

Gen. *Solarium* Lamarck. *S. mediterraneum*. — Trovato per la prima volta, in Sardegna da Tiberi. In sardo Caragolu.

Fam. *Cyclostomatidae*.

Gen. *Cyclostoma* Draparnaud.

*C. sulcatum* Drap. — Nelle colline di Cagliari e Sassari. A Sassari vien detto Gioga minuda, Pucidina o Puciriddina.

Fam. *Naticidae*.

Gen. *Natica* Adanson. *N. millepunctata* Lam. — Monaca di mare. A Cagliari Tapàra de mari.

*D. Pleuroglossa*.

Fam. *Scalaridae*.

Gen. *Scalaria* Lamarck. *S. communis* Lamarck.

Sub Ord. II. *Scutibranchiata*.

*A. Rhipidoglossa*.

Fam. *Turbinidae*.

Gen. *Turbo* Lin. *T. rugosus* L. — Turbine, Ochio di S. Lucia. A Cagliari Bucconi de scoglu, Barralluga a ognu de santa Lucia; a Sassari Coceci marinu. Periazzu marinu ad Oristano.

Fam. *Trochidae*.

Gen. *Trochus* (Rondelet) Linn. *T. turbinatus* Born, *T. articularis* Lamarck, *T. umbilicaris* Lin. — In ital. Trocchi o Trotole, Naridole ad Adria, Caragoli. A Cagliari Caragolu; a Sassari Biscacci; Conchiza a Bossa; Cagollai a Carloforte; a Oristano Sinezgornus de mari; Francusina pure ad Oristano e Tortoli, quando ci è dentro un Attinia e un Paguro.

Fam. *Haliotidae*.

Gen. *Haliotis* Lin. *H. tuberculata* L. — In italiano Orecchia di mare, di S. Pietro, Aliofide. A Cagliari Pagellira de fundu de mari.

*B. Doceoglossa*.

Fam. *Patellidae*.

Gen. *Patella* Lister. *P. bastianica* Gmelin. *P. coarctata* L. Patella. — In Cagliari Pagellira; a Sassari Gioga marina; Passelle a Carloforte; Palgiarira ad Alghero; Padedda ad Oristano. Poi ad Oristano distinguono Padedda campana, liscia, lanada.

Gen. *Triton* Montfort. *T. nattererum* Lamarck. — In italiano

Fam. *Tritonidae*.

Gen. *Triton* Montfort. *T. nattererum* Lamarck. — In italiano Buccina marina, Tritone. Nel Golfo di Cagliari si chiama Bucconi mannu, Cornu de mari, Corriettu, Corra, Corroina, nel Logudoro, a Sassari.

*T. corrugatum* Lamarck. A Cagliari Bucconi de scoglu.

*T. cutaceum* L. — A Cagliari Bucconi de scoglu, Tuffseddu.

Ad Oristano i *Murex trunculus* vengon detti Bucconi de canna, i piccoli Zuccurposus.

Fam. *Cassididae*.

Gen. *Morio* Montfort. *M. echinophora* Lin. — A Cagliari vien detta Borniedda, a Oristano Bucconi de groflu.

*M. tyrrhena* Chemnitz.

*Cassidaria* Casco (Tufolla a Napoli secondo Costa). — A Cagliari Borra.

Fam. *Detidae*.

Gen. *Dotium* (D'Argenville). *D. galea* Ian. — In ital. Lunna come di mare. A Cagliari Strumbu.

Fam. *Cypridae*.

Gen. *Trypa* Gray. *T. europaea* Montagu. — In ital. Porcellana, Ciprea, Porcelletto di mare. A Cagliari Porceddana.

*T. pulca* Solander Gray. — A Cagliari Porceddanedda.

Fam. *Cerithiidae*.

Gen. *Cerithium* Adanson. *C. vulgatum* Bruguiere. — Comune. A Cagliari Barrallieu.

Fam. *Vermetidae*.

Gen. *Vermetus* Adanson. *V. triquetus* Bivona a S. Elia.

*V. minor* Lamark. Vermeto. — A Cagliari tanto le ser-pule, li Sphrographis, come i Vermetus son detti Ferritta.

Fam. *Cecidae*.

Gen. *Caecum* Flemming. *C. sardinianum* De Fol. — Trovato a Carloforte.

Fam. *Solaridae*.

## Ord. POLYPLACOPHORA.

Fam. *Chitonidae*.

Gen. *Chiton* Lin. *Ch. squamosus*. Philippi, *C. fascicularis* L. — In ital. Chitone, Scarraboide; a Cagliari Pulixi de scoglitu.

Class. III. *Scaphopoda*.Fam. *Dentalidae*.

Gen. *Dentalium* (Aldrovandi) *D. tarrentinum* Lamarck, *D. entalis* Gray. — Dentale, Dente di mare; a Cagliari Corrixeddu de coraddu.

Class. IV. *Pelecypoda*.

## Ord. TERRABRANCHIA.

Sub Ord. I. *Ostracea*.Fam. *Ostreidae*.

Gen. *Ostrea* Lin. *O. edulis* L., *O. lamellosa* Brocchi. — Ostria. A Cagliari Ostioni; a Sassari ed Alghero e Bosa Ostiriga; a Carloforte Ostreghe; ad Oristano Ostioni, Ciampa. *O. cristata* Bonn. Ostioni burdu.

Sub Ord. II. *Pectinacea*.Fam. *Spondyliidae*.

Gen. *Spondylus* Lin., *S. gaederopus* Lin. — Spondillo pié d'asino, Cernieruolo pié d'asino. A Cagliari Coccicula pellegrina de scoglitu; ad Oristano Coccicula spinosa.

Fam. *Limidae*.

Gen. *Lima* Bruguiere. *L. squamosa* Lamarck, *L. inflata* Chemnitz. — In italiano Sorbolo di mare; a Cagliari Coccicula muscula.

Fam. *Pectinidae*.

Gen. *Pecten* O. F. Müll. *P. glaber* L. Pettine liscio. *P. varius* L. *P. opercularis* L. Pettine opercolare, Cozza di S. Giacomo. *P. jacobaeus* L. — Capitone. A Cagliari Coccicula pellegrina, De pellegrinu ad Alghero.

Sub Ord. III. *Mytilacea*.Fam. *Mytilidae*.

Gen. *Perna* L. *P. nobilis* L. — Nacchera, Penna nobile. A Cagliari Niaccara, come a Sassari, Gnaechere a Carloforte; Mazzigonis ad Oristano.

Gen. *Mytilus* L. *M. edulis* L. — Mitilo, Cozza di Taranto; in sardo Coccicula de niaccara.

Gen. *Modiola* Lamarck. *M. adriatica* L., *M. barbata* L. — A Cagliari Coccicula de niaccara.

Gen. *Lithodomus* Cuvier. *L. lithophilagus* L. — Litodomo, Dat-tero di mare, Datillo o Forapietre. A Cagliari Datilli de mari.

Gen. *Urtio* *Carpigliolo* Payreaudeau. — Trovasi a Muravera, Senlo presso il Fiumedosa e presso il Tirso. In sardo Coccicula de fuvvini.

Sub Ord. IV. *Aracea*.Fam. *Arctidae*.

Gen. *Arca* Linn. *A. barbata* L. *A. Noae* L. — In ital. Mus-solo (Plucàr) e Cofano di grotta a Napoli. A Cagliari Brazzoleddu de mari, Muscula; a Oristano Coccicula de cascioni.

Gen. *Pectunculus* Lamarck. *P. insubricus* Brocchi, var. *etio-lasensis* Lam. — Pettoncolo, Palorda a Napoli. A Cagliari Coccicula de sanguni.

Fam. *Nuculidae*.

Gen. *Nucula* Lamarck. *N. margaritacea* Philippi.

Sub Ord. V. *Submytilacea*.Fam. *Carditidae*.

Gen. *Cardita* Lamarck. *C. antiquata* Poli. — In ital. Tella; briaca o bianca secondo Poli. A Cagliari Coccicula bianca de sanguni.

Sub Ord. VI. *Cardiacea*.

Gen. *Cardium* Linn. *C. tuberculatum* L. — Noce di mare; a Napoli; in sardo Coccicula rigera *C. edule* L. Coccicula da fango. Cagliari Coccicula bianca, a Sassari Cioccicula bianca; a Bosa Coccicula.

*C. ciliatissimum* L. Coccinula bianca de mari bio. *C. ciliatis*.  
Coccinola bianca spinosa.

Sub Ord. VII. *Chamaea*.

Fam. *Chamidae*.

Gen. *Chama* Linn. *Ch. gryphoides* L.

Sub Ord. VIII. *Conchacea*.

Fam. *Veneridae*.

Gen. *Venus* Linn. *V. verrucosa* Gimel. — Venere verrucosa,  
Coccinola riccia, Vongola verrucosa. A Cagliari Coccinula romana.

Gen. *Tapes* Megerle von Millfeldt. *T. decussata* L. — Ar-  
sella nera a Livorno; a Cagliari Coccinula niedda, a Sassari Gio-  
cula niedda, ad Oristano Coccinula de Marceddi, perchè si pesca  
presso Terralba, nello stagno di Marceddi. *T. laeta* Poli. Von-  
gola, e Achitaro a Napoli; a Cagliari Coccinula cabuzza, ad  
Oristano, pescata nello stagno di Cabras, Coccinula lada. Se bianca  
lattea, a Cagliari chimasi Mongia.

Gen. *Venerupis* Lamarck. *V. trus* Linn.

Fam. *Donacidae*.

Gen. *Donax* Linn. *D. semistriata* Poli. — Tellina, Giocula

plana ad Alghero.

Fam. *Psammobidae*.

Gen. *Psammobia* Lamarck. *Ps. pallida*. — A Cagliari Coc-  
cinula de cau.

Fam. *Solenidae*.

Gen. *Solenocurtus* Blainville (Fisch.). *S. strigilatus* L. —  
Lattaro di mare, Solenocorto. A Cagliari Gragalloni, Coccinula de  
cau. — *S. candidus* Ren.

Gen. *Pharus* Leach. *Ph. legumen* Linn. — A Cagliari Coc-  
cinula gragallina.

Gen. *Solen*. Linn. *S. sitigua* L., *S. vagina* L., *S. ensis* L. —  
In italiano Manicai, Cappalunga, Coltellacci, Carnollecchi. Ad Ori-  
stano Rasoiias marinas, a Carloforte Rasui, a Cagliari Gragallus,  
a Bosa Resorras, a Sassari Rasoggi.

Sub Ord. IX. *Myacea*.

Fam. *Mastridae*.

Gen. *Mastra* Linn. *M. stultorum* L. *M. lactea* Poli. — Pa-  
parazzi di mare; a Cagliari Coccinula imbriaiga, ad Oristano Coc-  
cinula lada.

Ord. DIBRANCHIA.

Sub Ord. X. *Lucinacea*.

Fam. *Lucinidae*.

Gen. *Lucina* Bruguiere. *L. lactea* Linn. — A Cagliari Coc-  
cinula de latti, Coccinula bianca de arena.

Sub Ord. XI. *Tellinacea*.

Fam. *Tellinidae*.

Gen. *Tellina* Linn. *T. nitida* Poli, *T. incurvata* L. Tellina.  
A Cagliari Coccinula pìcca de mari bio. *T. planata* Linn. Tellina.  
A Cagliari Coccinula de cau de spiaggia.